

CONCURSO PÚBLICO

038. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **08**.

O lugar de estudo era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos: cinco horas de suplício, uma crucificação. Não há prisão pior que uma escola primária do interior. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os cadernos, não deixei que as moscas me comessem.

Assim, aos nove anos, ainda não sabia ler.

Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama. Novidade: meu velho nunca se dirigia a mim. E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia. Então, espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto e voltei à sala. Aí recebi ordem para me sentar e abrir o volume.

Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. Mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha, indiferente à pontuação, saltando linhas, alcancei o fim da página, sem ouvir gritos. No meio do capítulo meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia. Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida. Traduziu-me em linguagem de cozinha diversas expressões literárias. Alinhei o resto do capítulo, diligenciando penetrar o sentido da prosa confusa. E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.

Recolhi-me preocupado: os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono. Dormi com eles, acordei com eles. À noite meu pai pediu novamente o volume, e a cena da véspera se reproduziu: leitura emperada, mal-entendidos, explicações. Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso. E, no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa, afastou-me com um gesto, carrancudo.

Nunca experimentei decepção tão grande. Era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e de repente a maravilha se quebrasse. E o homem que a reduziu a cacos, depois de me haver ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. A princípio foi desespero, sensação de perda e ruína, em seguida uma longa covardia, a certeza de que as horas de encanto eram boas demais para mim e não podiam durar.

(Graciliano Ramos. *Infância*. 5. ed. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1961. Excerto adaptado)

01. A surpresa do narrador diante da solicitação do pai para que lhe trouxesse um livro deveu-se

- (A) à reconhecida dificuldade do pai, praticamente analfabeto, para praticar qualquer leitura.
- (B) ao receio que ele tinha do quarto do pai, cujo aspecto sombrio lhe causava desconforto.
- (C) à novidade desse acontecimento, já que era muito precária a comunicação entre ele e o pai.
- (D) à decisão do pai de permitir-lhe manusear os livros da casa, algo que ele desejava muito até aquela ocasião.
- (E) à disposição do pai em atender-lhe o desejo num horário em que costumava estar dormindo.

02. No tocante à experiência vivida com seu pai na descoberta da leitura, o narrador conclui que tal passagem

- (A) foi positiva, tendo prevalecido as lembranças do empenho desajeitado do pai para levá-lo a compreender o sentido do que estava lendo.
- (B) constituiu uma tentativa do pai de aproximar-se dele, frustrada pela sua incapacidade em reconhecer a sinceridade desse ato do pai.
- (C) mostrou-se desastrosa, na medida em que ao medo que sentia do pai passou a somar-se o que lhe despertava os personagens da história.
- (D) resultou em frustração, com a forma brusca como o pai passa a negar-lhe os momentos aprazíveis que lhe vinha proporcionando.
- (E) trouxe-lhe a segurança de que precisava e, ao fim, dissiparam-se todas as suas desconfianças em relação ao novo estado de espírito do pai.

03. Considerando o sentido que os dois-pontos (:) estabelecem na frase “Recolhi-me preocupado: os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono...”, eles podem ser corretamente substituídos pelo termo:

- (A) pois.
- (B) mas.
- (C) quando.
- (D) todavia.
- (E) portanto.

04. Na seguinte frase do texto, o pai do narrador é caracterizado de maneira negativa:

- (A) E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia.
- (B) Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. Mastigando as palavras, gaguejando...
- (C) ... meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia.
- (D) Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida.
- (E) Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso.

05. Considere as seguintes frases do texto:

- A imobilidade e a insensibilidade me **aterraram**.
- Principiei. **Mastigando** as palavras, gaguejando...
- Alinhei o resto do capítulo, **diligenciando** penetrar o sentido da prosa...

Os termos em destaque nas frases são empregados como sinônimos, respectivamente, de

- (A) atemorizaram; pronunciando com pouca clareza; empenhando-se para.
- (B) surpreenderam; compreendendo vagamente; preparando-se para.
- (C) aterrorizaram; emitindo involuntariamente; desistindo de.
- (D) motivaram; lendo com dificuldade; atentando para.
- (E) chocaram; pronunciando com rapidez; furtando-se de.

06. O termo destacado na frase "... peguei **com** repugnância o antipático objeto e voltei à sala." forma uma expressão indicativa de

- (A) tempo.
- (B) modo.
- (C) dúvida.
- (D) finalidade.
- (E) intensidade.

07. A seguinte frase do texto caracteriza-se pelo emprego de palavras ou expressões em sentido figurado:

- (A) Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama.
- (B) Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei.
- (C) No meio do capítulo meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia.
- (D) Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida.
- (E) E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.

08. O emprego das vírgulas na frase "... uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama." atende à mesma regra de pontuação da norma-padrão da língua que se verifica em:

- (A) ... espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto...
- (B) Mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha...
- (C) ... os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono.
- (D) ... e a cena da véspera se reproduziu: leitura emperada, mal-entendidos, explicações.
- (E) E, no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa..."

Leia o texto para responder às questões de números 09 e 10.

O último censo da educação superior brasileira deixa claro que o sistema de ensino superior está com dificuldades que _____ se arrastando ao longo dos últimos anos.

Com a crise sanitária da Covid-19, os problemas ficaram mais _____ e foram _____ pela aceleração na queda do número de alunos matriculados e pelos altos índices de evasão, criando uma situação _____ para grande parcela de instituições, principalmente às de pequeno porte do setor privado. Certamente o momento atual se apresenta como uma boa oportunidade para o início de grandes projetos de transformação institucional.

(Oscar Hipólito. Redes de colaboração: uma estratégia para o ensino superior. Folha de S.Paulo, *Caderno Opinião*. 07.04.2021. Adaptado)

09. Em conformidade com as regras de concordância da norma-padrão da língua, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) vêm ... evidentes ... escancarados ... insustentável
- (B) vem ... evidentes ... escancarados ... insustentáveis
- (C) vêm ... evidente ... escancarado ... insustentável
- (D) vem ... evidente ... escancarados ... insustentáveis
- (E) vêm ... evidente ... escancarados ... insustentáveis

10. Assinale a alternativa em que, na redação escrita a partir do texto, a colocação do pronome atende à norma-padrão da língua portuguesa.


- (A) **Se** arrastam nos últimos anos as dificuldades enfrentadas pelo sistema de ensino superior.
- (B) Com a crise sanitária, acentuaram-**se** as dificuldades enfrentadas pelas universidades.
- (C) A queda nas matrículas no ensino superior não restringe-**se** mais a poucas instituições.
- (D) A situação atual já revela-**se** uma oportunidade de transformação das instituições.
- (E) Algumas instituições têm mostrado-**se** melhor preparadas para lidar com a atual crise.

11. Alfredo escolheu 5 número inteiros, distintos e menores ou iguais a 30. Ao somar esses números, ele obteve 139. Logo, o menor número escolhido por Alfredo foi
- (A) 26.
(B) 25.
(C) 24.
(D) 23.
(E) 22.
12. Em um museu, três visitantes estavam observando a única múmia em exposição até que, às 14h, cada um foi observar alguma outra obra. Esses visitantes continuaram a voltar até a múmia em intervalos de tempo regulares, de maneira que um deles voltava a cada 16 minutos, outro a cada 18 minutos e o terceiro a cada 24 minutos. A primeira vez, após às 14h, que esses três visitantes voltaram ao mesmo tempo até a múmia foi às
- (A) 14h48.
(B) 15h44.
(C) 16h24.
(D) 17h.
(E) 17h36.
13. Em um hotel, todos os funcionários falam português, 30% deles são bilíngues e nenhum fala mais de dois idiomas. Considerando as mulheres bilíngues, 20 falam em inglês e 40 falam em espanhol. Os homens bilíngues falam em espanhol, mas nenhum fala em inglês. Nesse hotel, apenas os três idiomas citados são falados e trabalham, no total, 200 homens e 240 mulheres. O total de homens que falam apenas em português é
- (A) 128.
(B) 132.
(C) 136.
(D) 140.
(E) 144.

14. Em busca de apoio para um projeto em uma universidade, 6 alunos conseguiram 960 assinaturas em 4 horas de campanha. Se, com o mesmo rendimento, 8 alunos estivessem buscando esse apoio, em 5 horas de campanha o número de assinaturas que eles conseguiriam seria
- (A) 1540.
(B) 1560.
(C) 1580.
(D) 1600.
(E) 1620.
15. Do total de alunos de uma sala de aula, um quinto possui 2 irmãos, dois terços possui 1 irmão e os demais não possuem irmãos. Sabendo que não existe relação de parentesco entre esses alunos e que a soma dos números de irmãos de todos esses alunos é igual a 48, o total de alunos dessa sala é
- (A) 24.
(B) 30.
(C) 36.
(D) 39.
(E) 45.
16. Leonardo pratica corrida e ciclismo, e a cada dia ele treina apenas uma dessas modalidades. A distância percorrida por dia quando ele está pedalando é de 52 km e a distância diária nos treinos de corrida é de 12 km. Se, em 40 dias, a soma das distâncias percorridas nas duas modalidades foi igual a 1560 km, a diferença entre o número de dias pedalando e o número de dias correndo é
- (A) 6.
(B) 8.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 14.
17. Uma empresa aluga triciclos e bicicletas para passeios em um parque. Atualmente, na frota dessa empresa, para cada 3 triciclos há 8 bicicletas e o proprietário pretende comprar mais 40 triciclos, fazendo com que para cada triciclo haja 2 bicicletas. O número atual de bicicletas mais triciclos é igual a
- (A) 430.
(B) 440.
(C) 450.
(D) 460.
(E) 470.

18. André tem o dobro da idade de Beto, e Beto tem 20 anos a mais que Carla. Sendo a média aritmética das idades dessas três pessoas igual a 24 anos, a idade de Carla, em anos, é
- (A) 3.
- (B) 13.
- (C) 23.
- (D) 33.
- (E) 43.

19. Em um retângulo ABCD, o lado AD mede o dobro do lado CD. No interior desse retângulo, está um ponto E de maneira que a área do quadrilátero AECD é 42 cm^2 , conforme mostra a figura.



Sendo as distâncias do ponto E aos lados AD e CD respectivamente iguais a 2 cm e 10 cm, a área do retângulo ABCD, em cm^2 , é

- (A) 60.
- (B) 66.
- (C) 72.
- (D) 78.
- (E) 84.
20. Um triângulo equilátero tem o mesmo perímetro de um octógono cujos lados têm todos a mesma medida. Se cada lado desse triângulo mede 8 cm, cada um dos lados do octógono mede
- (A) 1,5 cm.
- (B) 2 cm.
- (C) 2,5 cm.
- (D) 3 cm.
- (E) 3,5 cm.

21. Assinale a alternativa correta sobre as Redes de Atenção à Saúde.

- (A) Seus limites geográficos são os de uma determinada região de saúde.
- (B) Os entes federativos devem definir a população usuária das ações e serviços, entre outros.
- (C) O rol de ações e serviços a serem ofertados são definidos pelo Ministério da Saúde.
- (D) Os critérios de acessibilidade e a escala para conformação dos serviços são definidos pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (E) Sua implementação tem sido vista como uma estrutura de funcionamento paralela ao SUS.

22. A VIII Conferência Nacional de Saúde é um marco no processo da Reforma Sanitária no Brasil. Tinha como eixos de discussão:

- (A) saúde como direito universal, reformulação do sistema nacional de saúde e financiamento do setor saúde.
- (B) saúde como direito universal, papel da sistema de saúde suplementar e financiamento do setor saúde.
- (C) saúde como direito inerente à cidadania, aos direitos sociais e ao Estado, financiamento da seguridade social e participação do setor privado na gestão do sistema de saúde.
- (D) saúde como direito humano, papel dos profissionais de saúde como protagonistas transformadores do sistema de saúde e participação da sociedade no sistema de saúde.
- (E) saúde como direito universal, participação da comunidade na gestão do sistema de saúde e parceria público-privada como forma de aumentar a eficiência do setor saúde.

23. O desenvolvimento da maioria dos cânceres ocorre ao longo de muitos anos. Assinale a alternativa correta referente a algumas ações adequadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com o objetivo de eliminar a exposição aos fatores determinantes da doença.

- (A) Aprimorar a capacidade da Atenção Primária da Saúde (APS) em triar os casos de câncer e promover palestras aos usuários para que tenham informações corretas sobre a doença.
- (B) Ampliar a rede de alta complexidade para que os casos de doença sejam tratados corretamente e manter o acompanhamento necessário.
- (C) Fortalecer as organizações de doentes e garantir seus direitos, por meio de participação nos conselhos e nas conferências de saúde.
- (D) Estimular as populações de risco a realizarem autoexame e a comparecerem a consultas médicas periodicamente.
- (E) Fortalecer as ações da APS nas orientações de alimentação saudável, nas estratégias para o controle do tabagismo, no estímulo de atividade física, na vacinação para HPV e hepatite.

24. Uma colisão de ônibus deixa 5 pessoas feridas: o motorista do ônibus tem uma fratura de perna; um senhor aposentado, que faz bicos esporádicos fazendo entregas para um escritório de advocacia, fratura a clavícula; uma empregada doméstica fratura o braço; dois adolescentes de 16 anos, ajudantes em uma obra, sofrem escoriações. Todos são encaminhados a um pronto atendimento do SUS e recebem assistência adequada a cada um dos casos.

Em face do exposto, assinale a alternativa correta no tocante à notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

- (A) Apenas o caso do motorista de ônibus deve ser notificado como acidente de trabalho, pois é o único que tem vínculo formal de emprego.
- (B) Como os adolescentes tiveram lesões leves, somente os que tiveram lesões graves devem ter seus casos notificados como acidentes de trabalho.
- (C) Todos os casos devem ser notificados como acidentes do trabalho.
- (D) Como no SINAN os acidentes no trajeto para o trabalho não são notificados, apenas o caso do motorista deve ser notificado.
- (E) Apenas os casos dos adolescentes devem ser notificados como acidentes de trabalho, pois o registro de eventos em menores de idade independe da gravidade.

25. Assinale a alternativa que apresenta a situação de maior risco de infecção pelo SARS-CoV-2, considerando que as máscaras referidas estão em boas condições.

- (A) Uma pessoa, usando máscara de tecido que recebe uma encomenda e se esquece de higienizar o pacote.
- (B) Uma pessoa que vai uma vez por semana à feira-livre, usando máscara de tecido.
- (C) Uma pessoa, usando máscara de tecido, que recebe compras em casa, ao ar livre, de um entregador que já fez 10 entregas no dia.
- (D) Uma pessoa, usando máscara de tecido, que entra em uma farmácia com um outro cliente também usando máscara de tecido.
- (E) Uma pessoa que trabalha com máscara de tecido em uma agência de banco.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o enfermeiro deve revelar fato sigiloso de que tenha tomado conhecimento em razão da atividade profissional

- (A) em situações de ameaça à vida e à dignidade e na defesa própria.
- (B) quando intimado na condição de testemunha.
- (C) quando se tratar de fato público.
- (D) em caso de falecimento da pessoa envolvida.
- (E) para os órgãos de responsabilização criminal em casos de violência doméstica e familiar contra mulher adulta, independentemente de sua autorização.

27. Leia atentamente a notícia apresentada a seguir.

*Ministério da Saúde insere pessoas
com HIV em grupo prioritário da vacinação*

Por Jovem Pan
30.03.2021

O Ministério da Saúde inseriu nesta segunda-feira, 29, pessoas vivendo com o HIV, de 18 a 59 anos, na lista de priorização da vacinação contra a Covid-19. Segundo nota técnica, a indicação é vacinar este grupo após encerrar a vacinação de pessoas de 60 a 64 anos. A Saúde afirma, no documento, que a intenção é “reduzir o impacto da pandemia nesse grupo, especialmente em relação ao risco de hospitalização e óbito. Pessoas com HIV, maiores de 60 anos, já estão contempladas na priorização por faixa etária.

O ministério também diz que a medida segue “novas evidências científicas” que apontam riscos de “desfechos negativos da Covid-19” neste grupo. As pessoas que vivem com HIV devem receber as doses na mesma etapa em que serão contemplados quem apresenta comorbidades, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Trata-se do maior grupo de risco do plano de imunização, com cerca de 18 milhões de pessoas.

Prefeitos e governadores podem traçar planos próprios, mas há um acordo entre o ministério e conselhos que representam secretários estaduais (Conass) e municipais (Conasems) para que seja seguido o plano nacional de vacinação. Segundo a Saúde, serão considerados na lista de prioridades todos os indivíduos que vivem com HIV, de 18 a 59 anos, independentemente da contagem de linfócitos T-CD4+.

O início da vacinação para este grupo será informado por meio do Programa Nacional de Imunizações.

(<https://jovempan.com.br/noticias/brasil/ministerio-da-saude-insere-pessoas-com-hiv-em-grupo-prioritario-da-vacinacao.html> . Acesso em 05.07.2021. Adaptado)

A inclusão de pessoas vivendo com o HIV na lista de priorização da vacinação contra a Covid-19 atende ao princípio doutrinário do SUS de

- (A) regionalização.
- (B) longitudinalidade do cuidado.
- (C) equidade.
- (D) hierarquização.
- (E) descentralização.

28. A população participa da gestão do SUS por meio dos Conselhos de Saúde (CS), que compreendem representantes de usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviço e governo. A composição dos CS que deve atender, entre outros itens, o critério de paridade, ou seja, em relação ao número total de conselheiros, a proporção de conselheiros que representam os usuários dos serviços de saúde, compreendendo os representantes de entidades e movimentos sociais de usuários do SUS, deve ser de

- (A) 10%.
- (B) 25%.
- (C) 35%.
- (D) 50%.
- (E) 75%.

Para responder às questões de números 29 e 30, considere o relato a seguir.

Em 27.08.2021, P.C., 23 anos, solteira, compareceu à unidade básica de saúde para primeira consulta de enfermagem de pré-natal. Informou ao enfermeiro que iniciara atividade sexual há um ano, com seu namorado, único parceiro sexual e pai do bebê, havia parado de tomar anticoncepcional oral há quatro meses e se tratava de sua primeira gravidez. Mostrou-se preocupada porque nunca havia realizado o exame preventivo do câncer de colo uterino e, há cerca de dez meses, havia apresentado uma pequena ferida indolor em grandes lábios que desaparecera sem tratamento, mas tinha medo de que pudesse voltar a aparecer. Durante a entrevista relatou ainda que seus ciclos menstruais eram regulares, com duração de 28 dias, e que a data de sua última menstruação fora 29.05.2021. Ao exame físico, o enfermeiro não constatou anormalidades, porém, ao realizar os testes rápidos, obteve resultado reagente para sífilis e não reagente para HIV.

29. No momento da consulta, a idade gestacional (IG) calculada por meio da Regra de Nägele, e a data provável do parto (DPP) de P.C., são:

- (A) IG = $11^{6/7}$ semanas; DPP = 07.03.2022.
- (B) IG = $12^{6/7}$ semanas; DPP = 05.02.2022.
- (C) IG = $12^{4/7}$ semanas; DPP = 07.02.2022.
- (D) IG = $12^{6/7}$ semanas; DPP = 05.03.2022.
- (E) IG = $11^{6/7}$ semanas; DPP = 05.02.2022.

30. Frente à obtenção de resultado reagente para sífilis, a conduta do enfermeiro deve compreender, entre outras ações,
- (A) repetir o teste rápido em 72 horas para confirmação do resultado.
 - (B) solicitar exame treponêmico, como FTA-Abs ou ELISA, para confirmação do diagnóstico de sífilis, antes de iniciar o tratamento.
 - (C) solicitar exame não treponêmico, como VDRL, para confirmação do diagnóstico de sífilis, antes de iniciar o tratamento.
 - (D) por se tratar de gestante, iniciar o tratamento com benzilpenicilina benzatina, 2,4 milhões UI, IM, uma vez por semana (1,2 milhão UI em cada glúteo), por 3 semanas, e solicitar exame treponêmico para seguimento mensal.
 - (E) iniciar o tratamento com benzilpenicilina benzatina, 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo) e solicitar exame não treponêmico.
31. Em relação à realização do exame citopatológico para o rastreamento do câncer do colo do útero, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, o enfermeiro deve
- (A) orientar P.C. que a realização do exame está indicada para mulheres a partir dos 25 anos de idade, que já tiveram atividade sexual.
 - (B) aproveitar a oportunidade e coletar material, apenas do fundo de saco vaginal, para a realização do exame.
 - (C) coletar, delicadamente, apenas material da endocérvice, com auxílio de escova de cerdas macias própria para tal.
 - (D) coletar apenas material da ectocérvice e fundo de saco vaginal com auxílio de espátula de Ayre.
 - (E) esclarecer que a coleta de material para a realização do exame é contraindicada para gestantes, independentemente da idade gestacional, devido ao risco de aborto e/ou parto prematuro.
32. Ao desenvolver trabalho educativo em grupo sobre planejamento familiar e anticoncepção, entre outras questões, o enfermeiro discute com os participantes os benefícios, indicações e contraindicações de métodos anticoncepcionais, esclarecendo que, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde,
- (A) o uso concomitante dos preservativos feminino e masculino constitui medida eficaz como método anticoncepcional e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis.
 - (B) o tabagismo em mulheres acima de 35 anos constitui uma contraindicação para o uso dos anticoncepcionais hormonais combinados orais, pois, em qualquer idade, o fumo aumenta o risco para as doenças cardiovasculares.
 - (C) o uso do diafragma é contraindicado para adolescentes porque aumenta o risco de infecção devido as dificuldades em seu manuseio e colocação.
 - (D) os métodos comportamentais são recomendados para mulheres na pré-menopausa porque podem ser utilizados quando existe contraindicação para o uso de anticoncepcional hormonal combinado oral.
 - (E) a mulher que está amamentando pode e deve iniciar o uso de anticoncepcional injetável trimestral no 30º dia pós-parto normal ou cesárea.
33. Entre outros aspectos relacionados à amamentação, as mães e familiares de bebês portadores de fenda labial, sem envolvimento do palato, devem ser orientados que
- (A) devido ao risco de aspiração, o aleitamento materno por meio da sucção da mama está contraindicado.
 - (B) para evitar broncoaspiração, o recém-nascido deve ser alimentado com leite materno oferecido apenas em conta-gotas ou colher de chá.
 - (C) a aplicação de compressas frias nas mamas viabiliza uma boa pega pelo bebê.
 - (D) o posicionamento do mamilo em direção ao lado da fenda facilita a pega e a sucção do mamilo pelo bebê.
 - (E) no transcorrer da mamada, a oclusão da fenda com o dedo da mãe minimiza as dificuldades apresentadas pelo bebê.

34. Durante a realização de consulta de enfermagem de puericultura de um bebê com 18 meses de idade, entre outros detalhes, o enfermeiro observou ou foi informado pela mãe que a criança apresentava os seguintes comportamentos:

I.	Resistência inicial à oferta de novidades na alimentação, passando a gostar de descobri-las.
II.	Não aponta, com o dedo indicador, para mostrar coisas que despertam a sua curiosidade ou as coloca no colo ou frente aos olhos de outras pessoas para chamar sua atenção.
III.	Fixação em algum atributo do brinquedo, como a roda que gira ou uma saliência pela qual ela passa os dedos, deixando de utilizá-lo apropriadamente.
IV.	Não apresenta os primeiros esboços de frases ou as primeiras palavras.

Para essa idade, são interpretados como um sinal de alerta para a ocorrência de transtornos do espectro autista – TEA, os comportamentos apresentados em

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

35. Mãe de F.A., 30 meses, sexo masculino, compareceu com seu filho a uma unidade de pronto-atendimento – UPA, relatando que, nas últimas seis horas, a criança já apresentara três episódios de diarreia e um episódio de vômito. Ao realizar o exame físico de F.A., o enfermeiro obteve peso = 10 800 g e altura = 86 cm. Observou que a criança estava irritada e apresentava olhos fundos, boca úmida e choro com presença de lágrimas. Constatou que o pulso estava rápido, o sinal da prega se desfazia lentamente e o tempo para enchimento capilar era de três segundos.

Frente aos dados obtidos, o enfermeiro deve considerar que a criança

- (A) no momento, não apresenta desidratação e dispensá-la para o domicílio, orientando a mãe a oferecer mais líquidos do que o habitual e manter a alimentação habitual e retornar a UPA caso F.A. não apresente melhora em dois dias.
- (B) no momento, não apresenta desidratação e dispensá-la para o domicílio, orientando a mãe a suspender a alimentação por quatro horas e oferecer Sais de Reidratação Oral (SRO) após cada evacuação diarreica, retornando à UPA caso F.A. apresente febre, sangue nas fezes ou piora da diarreia.
- (C) apresenta desidratação e iniciar a administração de Sais de Reidratação Oral – SRO, observando continuamente e reavaliando F.A. durante a reidratação.
- (D) apresenta desidratação moderada, solicitar avaliação médica, puncionar veia periférica instalando 320 mL de soro fisiológico 0,9% (fase rápida: correr em 30 minutos) concomitantemente à administração de Sais de Reidratação Oral – SRO.
- (E) apresenta desidratação grave e deve ser mantida em jejum, solicitar avaliação médica, puncionar veia periférica, instalando solução de 160 mL de soro fisiológico 0,9% + 160 mL de soro glicosado 5% (fase rápida: correr em 30 minutos), observando continuamente F.A. durante todo o período.

36. Considere os aspectos relacionados à Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE/Processo de Enfermagem e assinale a alternativa correta.

- (A) A evolução de enfermagem caracteriza-se, entre outros aspectos, pelo registro detalhado de um procedimento executado pelo enfermeiro, logo após ter sido executado.
- (B) Ao aplicar o processo de enfermagem, a Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC) e a Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) são sistemas de linguagem padronizada em enfermagem utilizados na etapa de planejamento de enfermagem.
- (C) Para que seja obtido o máximo de eficácia na assistência de enfermagem, as classificações NANDA (Classificação de diagnósticos de enfermagem), NIC (Classificação de Intervenções de Enfermagem) e NOC (Classificação de Resultados de Enfermagem) necessitam ser utilizadas em conjunto.
- (D) Por conter termos distribuídos em sete eixos para a composição de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem, a CIPE® (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem) não se adequa ao desenvolvimento do processo de enfermagem realizado em ambiente hospitalar.
- (E) A aplicação da Classificação Internacional de Diagnósticos de Enfermagem (NANDA-I) não deve ser utilizada no âmbito da Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE em saúde coletiva porque os diagnósticos de risco e promoção da saúde não foram validados para esse fim.

Para responder às questões de números **37** e **38**, considere o relato a seguir.

Encaminhada pelo médico devido a introdução da insulina para o controle da glicemia, A.T., 68 anos, sexo feminino, portadora de diabetes melito tipo 2 há 14 anos, compareceu à Unidade de Saúde da Família – USF, para consulta de enfermagem. Durante o atendimento, o enfermeiro foi informado pela filha da usuária que a dieta estava sendo seguida conforme orientação recebida, mas estavam com dificuldades e dúvidas na administração da insulina em relação a sua conservação e aplicação. Ao realizar o exame dos pés da usuária, constatou perda de sensibilidade protetora dos pés, presença de dedos em martelo em ambos os pés e calosidade plantar e, face as alterações observadas, atribuiu o grau de risco 2 para a ocorrência de feridas. Finalizando a consulta, entre outros cuidados, o enfermeiro explicou as alterações identificadas ao exame dos pés, os cuidados a serem adotados e orientou a conservação adequada e cuidados a serem observados na aplicação da insulina.

37. Ao orientar A.T. e sua filha sobre a conservação e aplicação da insulina, o enfermeiro deve esclarecer que

- (A) a insulina em uso deve ser retirada da geladeira imediatamente antes da aplicação, para evitar perda na sua potência.
- (B) os frascos de insulina lacrados devem ser mantidos em temperatura ambiente até que seja iniciada sua utilização, quando necessitam ser conservados em geladeira.
- (C) após a higienização do local de aplicação da insulina com álcool 70%, a aplicação deve ser realizada enquanto a pele ainda está úmida.
- (D) a temperatura ambiente elevada e o banho quente são fatores que não interferem na velocidade de absorção da insulina.
- (E) a realização incorreta ou a não realização de rodízio nos locais de aplicação da insulina e o reuso de agulhas são fatores de risco para a ocorrência de lipo-hipertrofia.

38. Considerando as alterações observadas ao exame dos pés da usuária e a classificação de risco realizada pelo enfermeiro, o Ministério da Saúde recomenda o acompanhamento periódico por meio de novo exame dos pés a cada

- (A) 12 meses.
- (B) 6 a 12 meses.
- (C) 2 a 3 meses.
- (D) 1 a 3 meses.
- (E) 30 dias.

39. Em atendimento aos princípios da Política Nacional de Humanização do SUS, foi implantado o acolhimento com Classificação de Risco nas unidades de saúde do município. No que diz respeito à atividade de Classificação de Risco, o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN determina que

- (A) para garantir a segurança do paciente e do profissional responsável pela classificação, deverá ser observado o tempo médio de 04 (quatro) minutos por classificação de risco, com limite de até 15 (quinze) classificações por hora.
- (B) em unidades básicas de saúde – UBS, a atividade pode ser realizada por técnico de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro.
- (C) durante a atividade de Classificação de Risco, o enfermeiro poderá exercer, concomitantemente, apenas atividades administrativas relacionadas à unidade de pronto-atendimento.
- (D) para executar a Classificação de Risco e Priorização da Assistência, o profissional de enfermagem deverá ser aprovado em curso de capacitação específico para o Protocolo adotado pela instituição, ministrado por médicos especialistas.
- (E) excepcionalmente, em função de suas características, a aplicação do Processo de Enfermagem está dispensada quando realizada a atividade de Classificação de Risco.

40. Frente a uma gestante com idade gestacional de 28 semanas, em parada cardiorrespiratória, para o alívio da compressão aortocava, antes de serem iniciados os procedimentos de reanimação cardiorrespiratória, o enfermeiro/equipe deve

- (A) manter a vítima em posição de Fowler.
- (B) colocar a gestante em decúbito lateral esquerdo, em prancha.
- (C) inclinar a gestante, lateralmente à esquerda em 25°, apoiando seu tórax e quadril.
- (D) manter a vítima na posição supina e deslocar, manualmente, o útero para a direita.
- (E) manter a vítima na posição supina e deslocar, manualmente, o útero para a esquerda.

41. Jovem, 14 anos de idade, sexo masculino, compareceu a unidade de pronto-atendimento – UPA com ferimento superficial nos dedos indicador e polegar para realização de curativo. Relatou que há 30 minutos, ao oferecer alimento para um macaquinho de propriedade de um vizinho, fora mordido acidentalmente. Informou que o animal costumava permanecer em viveiro próprio e estava em posse do proprietário há cerca de três anos.

Frente a essa situação, no que diz respeito a profilaxia da raiva humana, é correto afirmar que

- (A) após lavagem do ferimento com água e sabão, é desnecessário outro tratamento porque se trata de ferimento superficial ocasionado por animal domiciliado e criado sem contato com outros animais.
- (B) o animal deve ser observado por 10 dias e caso morra, desapareça ou se torne raivoso, deve ser iniciado o esquema profilático com a aplicação de quatro doses da vacina antirrábica de cultivo celular, por via intramuscular nos dias 0, 3, 4 e 7.
- (C) o animal deve ser observado por 10 dias e deve ser iniciado, imediatamente, esquema profilático com a vacina antirrábica de cultivo celular com duas doses, uma no dia 0 e outra no dia 3 e, caso o animal permaneça sadio no período de observação, encerrar o caso.
- (D) deve ser iniciado, imediatamente, o esquema profilático com soro antirrábico e quatro doses da vacina antirrábica de cultivo celular administradas nos dias 0, 3, 7 e 14.
- (E) deve ser iniciado, imediatamente, o esquema profilático com soro antirrábico e cinco doses da vacina antirrábica de cultivo celular administradas nos dias 0, 2, 4, 6 e 14.

42. Trabalhador de uma pequena empresa do ramo da indústria química, transportado por colegas de trabalho, deu entrada no pronto-socorro após exposição acidental a produto na forma de pó, relatando ardor e sensação de queimação na pele dos braços. Ao averiguar o rótulo do produto, o enfermeiro constatou se tratar de hidróxido de sódio/soda cáustica.

Frente a essa situação, a assistência de enfermagem imediata compreende, entre outras ações,

- (A) lavar abundantemente a área contaminada com água morna, incluindo os olhos, antes da retirada das roupas.
- (B) retirar as roupas e remover o excesso do produto cuidadosamente, com compressa seca, antes de realizar a lavagem da área exposta.
- (C) realizar a neutralização do produto com solução de bicarbonato de sódio a 20%, antes de lavar a área afetada com soro fisiológico 0,9%.
- (D) retirar as roupas da vítima e enxaguar a área afetada com ringier lactato por 10 a 15 minutos.
- (E) colocar, imediatamente, a vítima sob chuveiro, ainda com as roupas, para a remoção do produto em contato com a pele e evitar a exposição dos profissionais de saúde, prevenindo queimaduras.

43. Em 05.09.2021, após sutura em mão direita da lesão produzida por lâmina, o enfermeiro solicitou a carteira de vacinação de G.C., sexo masculino, onde observou os seguintes registros:

Nome: G.C.		Data de Nascimento: 31/07/2007	
dT 03.05.2012	Hepatite B 03.05.2012	SCR 03.05.2012	HPV 23.09.2018
dT 22.07.2012	Hepatite B 22.07.2012	SCR 22.07.2012	
dT 23.09.2018	Hepatite B 23.09.2018		Febre amarela 23.09.2018
BGG 03.05.2012		Meningocócica 23.09.2018	

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação (2020), o enfermeiro deve

- (A) providenciar a aplicação de uma dose de reforço da vacina dT (dupla adulto) e as segundas doses das vacinas HPV, febre amarela e meningocócica.
- (B) para a profilaxia do tétano, providenciar a aplicação de uma dose de reforço da vacina dTPa (tríplice bacteriana acelular adulto) e a segunda dose da vacina HPV.
- (C) para a profilaxia do tétano, providenciar a aplicação de uma dose de reforço da vacina dTPa (tríplice bacteriana acelular adulto), apenas.
- (D) providenciar a aplicação de uma dose de reforço da vacina dT (dupla adulto), apenas.
- (E) esclarecer que, para o momento, o esquema vacinal de G.C. está completo.

Para responder às questões de números **44** e **45**, considere os seguintes dados referentes ao Município X, período Y.

- População: 350 000 habitantes
- População maiores de 18 anos: 300 000 habitantes
- Casos confirmados de COVID-19: 40 500
- Casos recuperados = 25 000
- Óbitos confirmados por COVID-19: 1 000
- Vacinas COVID-19 aplicadas em maiores de 18 anos:

Dose única = 10 000 doses

1ª dose = 150 000 doses

2ª dose = 50 000 doses

44. No Município X, a cobertura vacinal para a vacina COVID-19 é de

- (A) 14,2%.
- (B) 16,7%.
- (C) 20%.
- (D) 60%.
- (E) 70%.

45. A taxa de letalidade por COVID-19 no período Y é de

- (A) 3,3 por mil habitantes.
- (B) 0,33 %.
- (C) 0,025 por mil habitantes.
- (D) 2,47%.
- (E) 4%.

46. Com sequelas de acidente vascular encefálico, P.J., 65 anos, masculino, está sendo assistido por equipe de assistência domiciliar (modalidade AD3). Durante visita, ao realizar o exame físico, o enfermeiro constatou, entre outros itens, que P.J. portava sonda nasointestinal, recebia a dieta enteral por método gravitacional, de 4/4 horas, infundida em 15 minutos, vinha apresentando episódios de diarreia.

Frente a essa situação, entre outros cuidados, o enfermeiro deve orientar o cuidador e familiares a

- (A) administrar a dieta em *bolus*, de 2/2 horas.
- (B) observar que a fórmula esteja fria no momento de sua administração.
- (C) alterar a velocidade de administração da dieta para 30 a 60 minutos.
- (D) suspender o fornecimento da fórmula por oito horas caso ocorram dois ou mais episódios de diarreia consecutivos e comunicar a equipe de assistência domiciliar responsável pelo caso.
- (E) alterar o intervalo de tempo entre a oferta das dietas para seis horas.

47. Ao realizar atividades de educação em saúde, trabalhos em grupo e consulta de enfermagem com indivíduos hipertensos, o enfermeiro deve estar ciente de que estudos recentes relacionados ao tratamento não medicamentoso para controle da pressão arterial mostram, entre outros aspectos:

I.	dietas que preconizam o aumento no consumo de frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura e cereais integrais, além de consumo moderado de oleaginosas e redução no consumo de gorduras, doces e bebidas com açúcar e carnes vermelhas, (tipo <i>Dietary Approaches to Stop Hypertension</i> – DASH e semelhantes), devem ser prescritas e incentivadas;
II.	o consumo de sódio deve ser restrito a 2 g/dia, com substituição de cloreto de sódio por cloreto de potássio, se não existirem restrições;
III.	realizar, pelo menos, 150 minutos por semana de atividade física moderada. Deve ser estimulada ainda a redução do comportamento sedentário, levantando-se por 5 minutos a cada 30 minutos sentado;
IV.	o peso corporal deve ser controlado para a manutenção de IMC < 28 kg/m ² .

Está correto o apresentado em

- (A) I, II, III, IV.
- (B) I, II, III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e III, apenas.

48. Entre outras populações consideradas mais vulneráveis os portadores de tuberculose, pessoas que vivem em situação de rua e pessoas que vivem com HIV/AIDS devem ser consideradas sintomáticas respiratórias aquelas que apresentam tosse, acompanhada ou não de outros sinais e sintomas sugestivos de tuberculose, há

- (A) qualquer tempo.
- (B) cinco dias.
- (C) sete dias.
- (D) dez dias.
- (E) duas semanas ou mais.

49. Com base no estabelecido pela ANVISA, considere os aspectos relacionados ao processamento de produtos para a saúde e assinale a alternativa correta.

- (A) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia podem ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos desde que após processados sejam enxaguados, abundantemente, com água purificada.
- (B) As leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas utilizadas em centrais de material e esterilização – CME são equipamentos dispensados de calibração anual.
- (C) Cada etapa do processamento do instrumental cirúrgico e dos produtos para saúde deve seguir Procedimento Operacional Padrão – POP, elaborado com base em referencial científico atualizado e normatização pertinente, devendo ser amplamente divulgado e estar disponível para consulta.
- (D) Os rótulos de identificação de produtos para a saúde processados devem conter, no mínimo, o nome do produto, o meio de esterilização utilizado, a data de esterilização e o nome do responsável pelo preparo.
- (E) O uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde só é permitido para instrumental acondicionado em caixa metálica, com furos que permitam a circulação do ar quente.

50. Convidado a assumir a direção do serviço de enfermagem de uma organização, o enfermeiro responsável técnico decidiu pela utilização do método de planejamento estratégico para a resolução de problemas que vinham ocorrendo. Atualmente está sendo desenvolvida a fase em que os atores que fazem parte do problema são identificados, de quais recursos dispõem para controlar as operações e qual é o peso de cada ator, o que, entre outros itens, caracteriza o momento

- (A) explicativo.
- (B) normativo.
- (C) estratégico.
- (D) tático.
- (E) operacional.

