

CONCURSO PÚBLICO

061. PROVA OBJETIVA

MÉDICO INTENSIVISTA ADULTO

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **08**.

O lugar de estudo era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos: cinco horas de suplício, uma crucificação. Não há prisão pior que uma escola primária do interior. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os cadernos, não deixei que as moscas me comessem.

Assim, aos nove anos, ainda não sabia ler.

Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama. Novidade: meu velho nunca se dirigia a mim. E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia. Então, espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto e voltei à sala. Aí recebi ordem para me sentar e abrir o volume.

Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. Mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha, indiferente à pontuação, saltando linhas, alcancei o fim da página, sem ouvir gritos. No meio do capítulo meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia. Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida. Traduziu-me em linguagem de cozinha diversas expressões literárias. Alinhei o resto do capítulo, diligenciando penetrar o sentido da prosa confusa. E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.

Recolhi-me preocupado: os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono. Dormi com eles, acordei com eles. À noite meu pai pediu novamente o volume, e a cena da véspera se reproduziu: leitura emperada, mal-entendidos, explicações. Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso. E, no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa, afastou-me com um gesto, carrancudo.

Nunca experimentei decepção tão grande. Era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e de repente a maravilha se quebrasse. E o homem que a reduziu a cacos, depois de me haver ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. A princípio foi desespero, sensação de perda e ruína, em seguida uma longa covardia, a certeza de que as horas de encanto eram boas demais para mim e não podiam durar.

(Graciliano Ramos. *Infância*. 5. ed. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1961. Excerto adaptado)

01. A surpresa do narrador diante da solicitação do pai para que lhe trouxesse um livro deveu-se

- (A) à reconhecida dificuldade do pai, praticamente analfabeto, para praticar qualquer leitura.
- (B) ao receio que ele tinha do quarto do pai, cujo aspecto sombrio lhe causava desconforto.
- (C) à novidade desse acontecimento, já que era muito precária a comunicação entre ele e o pai.
- (D) à decisão do pai de permitir-lhe manusear os livros da casa, algo que ele desejava muito até aquela ocasião.
- (E) à disposição do pai em atender-lhe o desejo num horário em que costumava estar dormindo.

02. No tocante à experiência vivida com seu pai na descoberta da leitura, o narrador conclui que tal passagem

- (A) foi positiva, tendo prevalecido as lembranças do empenho desajeitado do pai para levá-lo a compreender o sentido do que estava lendo.
- (B) constituiu uma tentativa do pai de aproximar-se dele, frustrada pela sua incapacidade em reconhecer a sinceridade desse ato do pai.
- (C) mostrou-se desastrosa, na medida em que ao medo que sentia do pai passou a somar-se o que lhe despertava os personagens da história.
- (D) resultou em frustração, com a forma brusca como o pai passa a negar-lhe os momentos aprazíveis que lhe vinha proporcionando.
- (E) trouxe-lhe a segurança de que precisava e, ao fim, dissiparam-se todas as suas desconfianças em relação ao novo estado de espírito do pai.

03. Considerando o sentido que os dois-pontos (:) estabelecem na frase “Recolhi-me preocupado: os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono...”, eles podem ser corretamente substituídos pelo termo:

- (A) pois.
- (B) mas.
- (C) quando.
- (D) todavia.
- (E) portanto.

04. Na seguinte frase do texto, o pai do narrador é caracterizado de maneira negativa:

- (A) E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia.
- (B) Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. Mastigando as palavras, gaguejando...
- (C) ... meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia.
- (D) Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida.
- (E) Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso.

05. Considere as seguintes frases do texto:

- A imobilidade e a insensibilidade me **aterraram**.
- Principiei. **Mastigando** as palavras, gaguejando...
- Alinhei o resto do capítulo, **diligenciando** penetrar o sentido da prosa...

Os termos em destaque nas frases são empregados como sinônimos, respectivamente, de

- (A) atemorizaram; pronunciando com pouca clareza; empenhando-se para.
- (B) surpreenderam; compreendendo vagamente; preparando-se para.
- (C) aterrorizaram; emitindo involuntariamente; desistindo de.
- (D) motivaram; lendo com dificuldade; atentando para.
- (E) chocaram; pronunciando com rapidez; furtando-se de.

06. O termo destacado na frase "... peguei **com** repugnância o antipático objeto e voltei à sala." forma uma expressão indicativa de

- (A) tempo.
- (B) modo.
- (C) dúvida.
- (D) finalidade.
- (E) intensidade.

07. A seguinte frase do texto caracteriza-se pelo emprego de palavras ou expressões em sentido figurado:

- (A) Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama.
- (B) Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei.
- (C) No meio do capítulo meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia.
- (D) Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida.
- (E) E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.

08. O emprego das vírgulas na frase "... uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama." atende à mesma regra de pontuação da norma-padrão da língua que se verifica em:

- (A) ... espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto...
- (B) Mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha...
- (C) ... os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono.
- (D) ... e a cena da véspera se reproduziu: leitura emperada, mal-entendidos, explicações.
- (E) E, no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa..."

Leia o texto para responder às questões de números 09 e 10.

O último censo da educação superior brasileira deixa claro que o sistema de ensino superior está com dificuldades que _____ se arrastando ao longo dos últimos anos.

Com a crise sanitária da Covid-19, os problemas ficaram mais _____ e foram _____ pela aceleração na queda do número de alunos matriculados e pelos altos índices de evasão, criando uma situação _____ para grande parcela de instituições, principalmente às de pequeno porte do setor privado. Certamente o momento atual se apresenta como uma boa oportunidade para o início de grandes projetos de transformação institucional.

(Oscar Hipólito. Redes de colaboração: uma estratégia para o ensino superior. Folha de S.Paulo, *Caderno Opinião*. 07.04.2021. Adaptado)

09. Em conformidade com as regras de concordância da norma-padrão da língua, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) vêm ... evidentes ... escancarados ... insustentável
- (B) vem ... evidentes ... escancarados ... insustentáveis
- (C) vêm ... evidente ... escancarado ... insustentável
- (D) vem ... evidente ... escancarados ... insustentáveis
- (E) vêm ... evidente ... escancarados ... insustentáveis

10. Assinale a alternativa em que, na redação escrita a partir do texto, a colocação do pronome atende à norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) **Se** arrastam nos últimos anos as dificuldades enfrentadas pelo sistema de ensino superior.
- (B) Com a crise sanitária, acentuaram-**se** as dificuldades enfrentadas pelas universidades.
- (C) A queda nas matrículas no ensino superior não restringe-**se** mais a poucas instituições.
- (D) A situação atual já revela-**se** uma oportunidade de transformação das instituições.
- (E) Algumas instituições têm mostrado-**se** melhor preparadas para lidar com a atual crise.

11. Assinale a alternativa correta referente à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

- (A) Para ter acesso aos medicamentos da RENAME, o usuário deve comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com uma prescrição feita por médico brasileiro.
- (B) A RENAME deverá ser atualizada a cada 5 anos e aprovada pelo Ministério da Saúde e depois pelo Congresso Nacional.
- (C) Os estados, municípios e Distrito Federal deverão seguir a RENAME e qualquer complementação deverá ser aprovada pelo Ministério da Saúde.
- (D) A RENAME somente poderá conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- (E) Todas as UBS devem ter os medicamentos da RENAME permanentemente.

12. A Reforma Sanitária brasileira teve, como uma de suas características,

- (A) valorizar a atualização dos conhecimentos médicos como centro da política de saúde coletiva no país.
- (B) constituir-se em movimento com ampla participação social na construção de uma política de saúde universal.
- (C) ter sido criada para subsidiar tecnicamente os parlamentares que definiram o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) colocar as evidências científicas em primeiro plano para definir ações de saúde combatendo falsas crenças populares.
- (E) ter construído as diretrizes do SUS a partir do aprimoramento de propostas feitas por um grupo de sanitaristas nomeados pelo Ministério da Saúde.

13. Referente à pandemia de COVID-19, assinale a alternativa que contenha as medidas mais importantes para a prevenção da doença em uma determinada comunidade.

- (A) Lavar todos os itens de compras, usar máscara e higienizar maçanetas das casas.
- (B) Usar luvas nas feiras livres, usar máscara e higienizar todos os itens de compras.
- (C) Usar máscara, manter distanciamento físico e preferir atividades ao ar livre.
- (D) Falar baixo, higienizar maçanetas das casas e usar máscara.
- (E) Usar máscara, lavar as mãos sempre que chegar em casa e higienizar folhas verdes.

14. Mulher de 43 anos é socorrida em um serviço de urgência e emergência de um município por tentativa de suicídio por ingestão de medicamentos. Feita a lavagem estomacal, recebe alta orientada e sai do serviço com familiares. Assinale a alternativa correta.

- (A) O caso deve ser imediatamente notificado pelo meio de comunicação mais rápido possível.
- (B) O caso deve ser investigado e se confirmada a tentativa de suicídio, notificado.
- (C) Como o suicídio não se consumou, o caso deve ser notificado em até 7 dias.
- (D) O caso deve ser imediatamente notificado, caso haja testemunho de parentes próximos.
- (E) Como se trata de tentativa de suicídio, somente um médico pode fazer a notificação.

15. Considerados aspectos como magnitude, gravidade e severidade, entre outros, para fins de notificação compulsória de importância nacional, o evento de saúde pública inclui

- (A) aborto e ocorrência de surto ou epidemia.
- (B) alteração no padrão clinicoepidemiológico das doenças conhecidas e consumo de álcool.
- (C) consumo de drogas ilícitas e aborto.
- (D) epizootia e consumo de drogas ilícitas.
- (E) ocorrência de surto ou epidemia e ocorrência de doença ou agravo de causa desconhecida.

16. Assinale a alternativa correta referente à vigilância de COVID-19 no Brasil.

- (A) A Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal (SG) foi criada para o monitoramento da COVID-19.
- (B) Atualmente é considerado caso confirmado de COVID-19 somente aquele em que o exame de biologia molecular ou de pesquisa da antígeno seja positivo.
- (C) Um exame laboratorial negativo para COVID-19 em um paciente com uma SG descarta caso de COVID-19.
- (D) Indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial por biologia molecular ou imunológico de recente infecção pelo SAR-CoV-2 devem ser notificados no SUS.
- (E) Os casos de suspeita de COVID-19 devem ser investigados, e casos confirmados devem ser notificados imediatamente.

17. Em relação à COVID-19 afirma-se que

- (A) a vacinação em massa, junto com outras medidas, tem se mostrado uma via adequada para o controle da pandemia.
- (B) há evidências da existência de muitos indivíduos resistentes por mecanismo natural em alguns países onde a pandemia teve pouco impacto.
- (C) os quadros clínicos persistentes após a fase aguda da doença são definitivos.
- (D) sendo uma doença aguda não deve influenciar no indicador Anos Potenciais de Vida Perdidos Ajustados para Incapacidade.
- (E) as populações em que o banho culturalmente é valorizado têm tido sucesso no seu controle.

18. Criança com pouco mais de 3 meses em dia com o calendário básico de vacinação no Brasil deve ter sido imunizada pelas seguintes vacinas:

- (A) Oral contra a pólio (2 doses), tríplice bacteriana, tríplice viral, contra a febre amarela.
- (B) Contra a febre amarela, BCG-ID, tetravalente (2 doses), contra a hepatite (uma dose), BCG-ID.
- (C) BCG-ID, contra a hepatite B (2 doses), tetravalente, oral contra pólio, oral contra rotavírus humano.
- (D) BCG-ID, tríplice bacteriana, tetravalente, contra a febre amarela.
- (E) Contra a hepatite A, hepatite B, tetravalente (2 doses) e tríplice viral.

19. Assinale a alternativa correta no tocante ao sarampo.

- (A) O sarampo tende a se comportar de forma endêmica mesmo com a cobertura vacinal acima de 95%.
- (B) As complicações do sarampo só ocorrem em crianças desnutridas.
- (C) A imunidade passiva conferida pela mãe ao lactente habitualmente é transitória e dura até os 5 anos de idade.
- (D) O período de incubação varia de 5 a 7 dias.
- (E) A transmissibilidade começa 6 dias antes do exantema e dura até 4 dias após seu aparecimento.

20. Assinale a alternativa que contenha objetivos a serem atingidos com a organização da seguridade social, segundo a Constituição Federal.

- (A) Diferenciação dos benefícios às populações urbanas das rurais.
- (B) Fonte de financiamento única.
- (C) Valores flexíveis dos benefícios.
- (D) Universalidade de cobertura e do atendimento.
- (E) Seleção de serviços necessários a cada segmento populacional.

21. A valorização da Atenção Primária da Saúde (APS) vem sendo levantada por muitos estudiosos do SUS. Assinale a alternativa que contenha uma de suas características positivas.

- (A) Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) têm formação para dar aulas sobre as doenças mais prevalentes nos territórios.
- (B) Todas as UBS têm médicos especializados em doenças crônicas o que garante a longitudinalidade do cuidado.
- (C) As equipes de saúde conhecem o seu território.
- (D) As UBS são excelentes triadoras de usuários que necessitam de cuidados especializados.
- (E) Os usuários são responsáveis pela gestão.

22. Assinale características do estudo de caso-controle e do estudo de coorte, respectivamente.

- (A) Baixo poder analítico e alto poder analítico.
- (B) Alto poder analítico e capacidade de produzir de medidas diretas de risco.
- (C) Inadequado para doenças de baixa frequência e baixo poder analítico.
- (D) Simplicidade de desenho e baixo custo relativo.
- (E) Alto custo relativo e incapacidade de estimar risco.

23. A humanização do SUS com política pública tem como um dos objetivos

- (A) construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- (B) corrigir distorções das diretrizes do SUS que foram implementadas ao longo dos anos.
- (C) tratar o usuário com respeito, lembrando que, em geral, ele não possui conhecimentos que as equipes de saúde têm.
- (D) promover atividades educativas que convençam o usuário para que siga os procedimentos orientados para proteger a sua saúde.
- (E) ensinar práticas com metas diárias para que o usuário consiga prevenir a ocorrência e doenças crônicas.

24. Em um determinado ano, uma doença de alta letalidade e curta evolução acomete os internados de um hospital. Assinale a alternativa correta no tocante aos indicadores de saúde desse hospital nesse ano.

- (A) O coeficiente de mortalidade geral deve se elevar em relação aos outros anos.
- (B) O coeficiente de prevalência da doença deve permanecer relativamente baixo durante o ano.
- (C) O coeficiente de incidência da doença deve ser alto durante todo o ano.
- (D) O coeficiente de mortalidade específica pela doença deve se elevar no ano seguinte.
- (E) O coeficiente de letalidade deve diminuir durante o ano.

25. Trabalhador é vítima de uma queda de altura na empresa onde trabalhava, é hospitalizado e evolui a óbito após 10 dias. Assinale a alternativa correta.

- (A) O caso é de acidente de trabalho, deve ser notificado ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o evento deve ser investigado pela vigilância de saúde.
- (B) O caso é de acidente de trabalho, mas a notificação não deve ser feita, pois o óbito não ocorreu imediatamente após o evento e a polícia deve investigar o ocorrido.
- (C) Se o trabalhador tiver carteira assinada, o órgão a ser notificado deve ser a Previdência Social e o caso deve ser investigado pela polícia.
- (D) Se o trabalhador for informal, o caso deve ser notificado no SINAN e a investigação deve ser feita pela polícia por se tratar de evento de causa externa.
- (E) A investigação do ocorrido deve ser feita pelo serviço de atendimento e a notificação deve ser feita no SINAN se for comprovada a responsabilidade da empresa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O caso clínico a seguir refere-se às questões de números **26 e 27**.

Paciente, 71 anos, sexo masculino, tabagista ativo, portador de diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensão arterial, evolui com quadro de dor torácica de forte intensidade, de início súbito, evoluindo com síncope e crise convulsiva tônico-clônica. Chega à sala de emergência após 20 minutos do quadro, mantendo rebaixamento do nível de consciência, com necessidade de intubação orotraqueal e apresentando níveis pressóricos elevados, taquicardia sinusal, sopro cardíaco e assimetria de pulsos.

26. Diante da hipótese diagnóstica, qual é a possível etiologia associada ao quadro clínico?

- (A) Trauma.
- (B) Endocardite infecciosa.
- (C) Doença de Bechet.
- (D) Arterite de células gigantes.
- (E) Doença aterosclerótica.

27. Após realização dos exames complementares iniciais e suporte na sala de emergência, o paciente é transferido para unidade de terapia intensiva. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta corretamente uma das medidas indicadas para esse caso.

- (A) Ultrassom de abdome (FAST).
- (B) Coleta de hemoculturas pareadas.
- (C) Monitorização cardíaca.
- (D) Eletroencefalograma de urgência.
- (E) Ventilação mecânica na posição pronada.

28. A suspeita da infecção pulmonar associada à ventilação mecânica (VM) deve ser investigada quando

- (A) ocorre piora das trocas gasosas com VM adequada em pacientes com sepse e foco infeccioso não definido.
- (B) existe a indicação de bloqueio neuromuscular.
- (C) os pacientes em VM com menos de 24h apresentam instabilidade hemodinâmica.
- (D) existe a necessidade de despertar diário por VM prolongada.
- (E) os pacientes têm necessidade de reintubação precoce após longo período de VM.

29. Segundo a classificação de West Haven para a encefalopatia hepática, e pelos critérios de gravidade de ACLF (acute-on-chronic liver disease), a partir de qual estágio há indicação de suporte intensivo?
- (A) Estágio I e ACLF ≥ 1 .
 - (B) Estágio II e ACLF >1 .
 - (C) Estágio III e ACLF ≥ 2 .
 - (D) Estágio IV e ACLF > 3 .
 - (E) Estágio V e ACLF > 3 .
30. Com relação aos novos critérios de morte encefálica, assinale a alternativa correta.
- (A) O intervalo mínimo de tempo a ser observado entre o primeiro e o segundo exame clínico é de oito horas nos pacientes com idade igual ou superior a dois anos de idade.
 - (B) presença do reflexo de tosse ocorre com taquicardia reflexa à estimulação traqueal com uma cânula de aspiração.
 - (C) Temperatura corporal (esofágica, vesical ou retal) superior a 24 °C deve ser atingida antes de iniciarem-se os procedimentos de determinação de ME.
 - (D) O teste de apneia deverá ser realizado uma única vez por um dos médicos responsáveis pelo exame clínico e deverá comprovar ausência de movimentos respiratórios na presença de hipercapnia (PaCO_2 superior a 55 mmHg).
 - (E) O exame complementar deve comprovar de forma inequívoca presença de atividade elétrica encefálica desorganizada.
31. Em vigência de uma síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST, qual das alternativas é uma contraindicação absoluta para realização de trombólise?
- (A) Acidente vascular cerebral isquêmico nos últimos 3 meses.
 - (B) Presença de alto fluxo menstrual.
 - (C) Neoplasia intratorácica.
 - (D) Reanimação cardiopulmonar > 10 minutos.
 - (E) Uso de anticoagulante oral.
32. Paciente morador de rua, encontrado sem consciência pelo SAMU, porém com presença de pulso carotídeo e hipotermia com temperatura corporal de 33 °C. Durante a transferência para o serviço de urgência, qual é a indicação da estratégia terapêutica para reaquecimento interno neste caso?
- (A) Circulação extracorpórea com ECMO.
 - (B) Hemodiálise com soro aquecido.
 - (C) Irrigação aquecida da cavidade torácica.
 - (D) Cobertores e bebidas aquecidas.
 - (E) Fluido aquecido parenteral.

33. Sobre a pancreatite aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) A tomografia computadorizada de abdome sem contraste é o exame de escolha para avaliar a presença de necrose pancreática precocemente.
- (B) o APACHE II é um critério utilizado de avaliação prognóstica na pancreatite aguda.
- (C) a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) é indicação de rotina.
- (D) a interleucina-3 demonstrou utilidade como marcador precoce.
- (E) O escore de Light permite a identificação precoce da pancreatite aguda grave.

O caso clínico a seguir refere-se às questões de números 34 e 35.

Paciente idosa, internada com choque séptico de foco urinário, com monitorização hemodinâmica invasiva, evolui com diminuição do débito cardíaco, saturação venosa baixa e resposta alterada à prova de volume.

34. A partir da suspeita diagnóstica, o exame complementar que poderia corroborar para o diagnóstico do quadro atual é:

- (A) gasometria venosa.
- (B) ultrassonografia de abdome.
- (C) ecocardiograma com *doppler* colorido.
- (D) dímero D.
- (E) radiografia de tórax, no leito.

35. Com base no quadro atual, a droga vasoativa indicada nesse momento é:

- (A) dobutamina.
- (B) milrinone.
- (C) noradrenalina.
- (D) vasopressina.
- (E) dopamina.


36. Quanto ao tratamento do tromboembolismo pulmonar na UTI, assinale a alternativa correta.

- (A) Está indicada trombólise em todos os casos com intubação orotraqueal.
- (B) A colocação de filtro de veia cava inferior é indicada em pacientes com contraindicação à anticoagulação.
- (C) Recomenda-se o uso de heparina não fracionada subcutânea em todos os casos.
- (D) O fondaparinux apresenta alto risco de trombocitopenia por heparina.
- (E) A dupla antiagregação plaquetária está indicada nas primeiras 6 horas.

37. Paciente portador de cirrose hepática alcoólica evoluindo com hemorragia digestiva alta. Durante o tratamento intensivo, deve-se:
- (A) transfundir concentrados de hemácias com hemoglobina < 10 mg/dL.
 - (B) realizar endoscopia em vigência do sangramento agudo para tratamento endoscópico das varizes esofágicas na fase aguda.
 - (C) administrar plasma fresco congelado.
 - (D) submeter à intubação endotraqueal, na presença de hematêmese persistente, rebaixamento do nível de consciência e insuficiência respiratória.
 - (E) realizar tamponamento com balão nos pacientes com instabilidade hemodinâmica.

O caso clínico a seguir refere-se às questões de números 38 e 39.

Paciente, 41 anos, sexo masculino, com histórico de depressão, hipertensão arterial estágio 1, tabagismo e obesidade grau 1, encaminhado no pós-operatório de cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica eletiva para UTI devido à presença da taquiarritmia detectada na monitorização cardíaca intraoperatória sem repercussão hemodinâmica, conforme segue:



38. O tratamento de escolha nesse caso, na UTI, deve ser:
- (A) adenosina devido ao *flutter* atrial.
 - (B) cardioversão elétrica sincronizada devido ao QRS largo irregular.
 - (C) desfibrilação não sincronizada devido ao QRS largo regular.
 - (D) cardioversão elétrica com 200 J.
 - (E) amiodarona devido ao QRS largo e ritmo regular.
39. Uma das possíveis causas para a presença dessa taquiarritmia que deve ser investigada é:
- (A) hipocalemia.
 - (B) hipocalcemia.
 - (C) uso de antidepressivo tricíclico.
 - (D) uso de bloqueador neuromuscular.
 - (E) uso de inibidor de ECA.

40. Diante de um diagnóstico de coagulação intravascular disseminada (CIVD), assinale a alternativa correta.
- (A) A disfunção plaquetária decorre dos altos níveis de produtos de degradação de fibrina.
 - (B) O aumento do fibrinogênio correlaciona-se com pior prognóstico.
 - (C) A antitrombina III é marcador diagnóstico mais sensível.
 - (D) A síndrome HELLP é o tipo de CIVD mais comum.
 - (E) É a causa mais comum de plaquetopenia em UTI.

41. No paciente com critérios predeterminados de cuidados paliativos, os cuidados na terapia intensiva devem ser pautados:
- (A) nos tratamentos potencialmente prolongadores de vida, por estar internado na UTI.
 - (B) em higiene e controle de sintomas, que devem contemplar a todos os pacientes.
 - (C) na investigação da intercorrência aguda, com exames laboratoriais e de imagem.
 - (D) no uso de analgesia somente quando há potencial de reversibilidade do quadro.
 - (E) na realização de exames laboratoriais ou de imagem de rotina que possam mudar a conduta.

O caso clínico a seguir refere-se às questões de números 42 e 43.

Paciente, 52 anos, sexo masculino, portador de diabetes mellitus, com quadro de infecção por SARS-COV-2 há 8 dias, com internação hospitalar após piora clínica apresentando sintomas respiratórios graves e retorno do quadro febril. Apresenta tomografia pulmonar com padrão de acometimento em “vidro fosco” > 50%. Após deterioração do padrão ventilatório, foi submetido a intubação orotraqueal e ventilação mecânica.


42. Quais dos critérios a seguir caracterizam a síndrome da angústia respiratória do adulto grave?
- (A) $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$ mmHg com PEEP ≥ 10 cmH₂O.
 - (B) $100 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$ mmHg com PEEP ≥ 5 cmH₂O.
 - (C) $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100$ mmHg com PEEP ≥ 5 cmH₂O.
 - (D) $200 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300$ mmHg com PEEP ≥ 5 cmH₂O.
 - (E) $100 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$ mmHg com PEEP ≥ 10 cmH₂O.

43. Diante da ventilação mecânica prolongada e da necessidade de bloqueio neuromuscular, o local mais frequente para o surgimento de lesões por pressão é a região

- (A) trocateriana, devido à posição lateral.
- (B) púbica, devido à posição ventral.
- (C) sacral, devido à posição prona.
- (D) da face, devido à posição prona.
- (E) calcânea, devido à posição ventral.

O caso clínico a seguir refere-se às questões de números 44 a 46.

Paciente do sexo feminino, 72 anos, portadora de mieloma múltiplo em investigação atual. Com internação via pronto-socorro, após terceira ida nos últimos meses, pela mesma história de tosse seca, dispneia ao repouso e edema de membros inferiores. Ao exame físico, apresenta hipofonese de bulhas e presença de terceira bulha, com queda da pressão arterial sistólica de 15 mmHg durante a inspiração profunda; estertores crepitantes nos dois terços inferiores dos pulmões. O eletrocardiograma de repouso com padrão de baixa voltagem e sem sinais de sobrecarga de câmaras esquerdas e o ecocardiograma realizado à beira a leito, na UTI, é o que segue:



44. A hipótese diagnóstica compatível com o quadro clínico é:

- (A) infarto agudo do miocárdio.
- (B) amiloidose cardíaca.
- (C) tromboembolismo pulmonar.
- (D) tamponamento cardíaco.
- (E) endocardite infecciosa.

45. A etologia que deve ser pesquisada para o quadro clínico?

- (A) histoplasmose.
- (B) uremia.
- (C) câncer de mama.
- (D) hipertireoidismo.
- (E) fungemia.

46. O tratamento de escolha diante desse quadro clínico é:

- (A) diurético endovenoso.
- (B) inotrópico endovenoso.
- (C) dois pares de hemocultura e antibioticoterapia.
- (D) trombolítico.
- (E) pericardiocentese.

47. Paciente de 65 anos, sexo masculino, tabagista de 40 anos-maço, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, relata piora intensa da dispneia aos esforços há 5 dias. Internado na enfermaria, é transferido para UTI após acionamento de código de emergência por rebaixamento do nível de oxigênio após instalação de máscara de nebulização com reservatório a 10 L/min devido à dissaturação de oxigênio.

Durante a avaliação, a alteração gasométrica arterial que deve ser encontrada é:

- (A) HCO_3^- : 16 mEq/L.
- (B) pCO_2 : 92 mmHg.
- (C) pO_2 : 70 mmHg.
- (D) pH: 7,46.
- (E) BE – 2.

48. No pós-operatório de cirurgia cardíaca no paciente com desmame ventilatório de sucesso e pós-extubação oro-traqueal, qual é a indicação subsequente de ventilação não invasiva?

- (A) Aumentar a frequência respiratória.
- (B) Diminuir capacidade residual funcional.
- (C) Reduzir o volume expiratório final.
- (D) Melhorar da relação ventilação perfusão.
- (E) Reduzir a pressão parcial de CO_2 .

O caso clínico a seguir refere-se às questões de números **49 e 50**.

Paciente idosa, com câncer de laringe, com terapia nutricional enteral domiciliar com dieta enteral padrão via gastrostomia, há muitos anos.

Internada por sepse de foco cutâneo com uso de antibioticoterapia endovenosa (clindamicina), evolui, há 3 dias, com 8-10 evacuações líquidas por dia, com presença de leucócitos na fezes.

49. Qual exame complementar está indicado para elucidação diagnóstica?

- (A) Hemocultura.
- (B) Pesquisa de toxina de *Clostridium*.
- (C) Cultura de fezes.
- (D) Pesquisa de sangue oculto nas fezes.
- (E) Pesquisa de *Salmonella* nas fezes.

50. Com relação à dieta, a melhor conduta nesse momento é:

- (A) suspender a dieta enteral, até melhora da diarreia.
- (B) trocar por uma dieta parenteral.
- (C) substituir a dieta enteral por fórmula com fibras solúveis.
- (D) substituir a dieta por produto com nutrientes imunomoduladores.
- (E) associar probióticos parenterais.

