Universidade Federal de Santa Catarina
Hospital Universitário Polydoro Ernani São Thiago

Processo Seletivo para Residência Integrada Multiprofissional em Saúde • Edital 02/2018

http://coremu.fepese.org.br

CADERNO DE PROVA

IS1 | Enfermagem

Instruções

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

4 de novembro
30 questões
14h10 às 17h40
3h30 de duração*

COREMUFSC
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE



ENFERMAGEM

FEPESE
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Conhecimentos Gerais

10 questões

1. O papel do Movimento da Reforma Sanitária (MRS) é reconhecido no processo de construção da Constituição Federal Brasileira de 1988.

São exemplos deste papel:

1. A Saúde é um direito fundamental, garantido pela interação dos Entes Federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
2. Os direitos humanos são garantidos no País, consagrados em direitos fundamentais, sociais e econômicos, de aplicação imediata.
3. O direito à saúde é garantido como um direito social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 1.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ☑ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre a relação entre o Sistema Sanitário e o Sistema de Justiça.

( ) A atual Constituição Brasileira determina que o Estado tem o dever de se estruturar, a fim de desenvolver e executar políticas públicas.
( ) O Estado deve garantir a oferta de estrutura e instrumentos para que os direitos à saúde possam ser exigidos.
( ) O sistema sanitário tem o dever de efetivar o direito à saúde e o sistema judicial, o dever de exigir que esse direito seja efetivado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☑ V • V • V
b. ☐ V • V • F
c. ☐ V • F • V
d. ☐ F • V • F
e. ☐ F • F • V

3. Assinale a alternativa **correta** em relação aos componentes da Rede de Atenção às urgências e emergências que se interligam e integram o cuidado.

a. ☐ Sala de estabilização; Unidades de Pronto Atendimento; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); Hospital pediátrico.
b. ☐ Hospital; Atenção Básica em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; clínicas privadas.
c. ☑ Atenção Primária à Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; Sala de Estabilização; Força Nacional de Saúde do SUS; Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas; Hospitalar; e Atenção Domiciliar.
d. ☐ Atenção Primária à Saúde; Unidades de Pronto Atendimento; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); maternidade.
e. ☐ Hospital; Atenção Básica em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; clínicas filantrópicas com fins lucrativos.

4. Os sistemas de informação em saúde têm como objetivo:

a. ☐ Instrumentalizar e apoiar a gestão para calcular os gastos em saúde.
b. ☐ Controlar gastos e grandes epidemias no país, minimizado as mortes em decorrência dessas epidemias.
c. ☐ Calcular o número de vacinas a serem aplicadas na população, principalmente em gestantes e idosos.
d. ☑ Instrumentalizar e apoiar a gestão do Sistema Único de Saúde, em todas as esferas, nos processos de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria.
e. ☐ Cadastrar e acompanhar gestantes, puérperas e as crianças vivas, para o planejamento de consultas de pré-natal, vacinação e planejamento familiar.

5. A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde:

a. ☐ Coletivas, desenvolvidas por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada pelos profissionais médicos com especialização em saúde da família.
b. ☑ Individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
c. ☐ Em equipe multiprofissional, dirigida à população do município, sobre as quais as equipes municipais assumem responsabilidade sanitária, com financiamento dos estados.
d. ☐ Individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção da saúde, exclusivamente no âmbito da Estratégia da Saúde da Família.
e. ☐ Em equipe multiprofissional, prioritariamente no âmbito da Estratégia da Saúde da Família, reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, observados os princípios e diretrizes sanitárias, em caráter permanente.

---

6. Com base no que estabelecem o Decreto nº 7.508/2011 e a Lei Complementar nº 141/2012, a Portaria nº 2.135/2013 estabelece diretrizes para o processo de planejamento no SUS e indica alguns pressupostos:

1. Os três Entes federados devem ter as suas responsabilidades configurada, de forma contínua, articulada, integrada e solidária.
2. O planejamento independe das pactuações entre os gestores nas Comissões Intergestores Regionais, Bipartite e Tripartite.
3. O planejamento deve prever o monitoramento e a avaliação e assegurar a transparência e a visibilidade da gestão da saúde, integrando a participação da comunidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 1.
b. ☐ É correta apenas a afirmativa 3.
c. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

7. Assinale a alternativa **correta** em relação ao conceito de Alta Complexidade.

a. ☐ A Alta Complexidade envolve serviços de alta complexidade e baixo custo para o sistema de saúde hospitalar.
b. ☑ Alta Complexidade é o conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade).
c. ☐ A Alta Complexidade é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos de baixa tecnologia, para o apoio diagnóstico e tratamento em nível hospitalar.
d. ☐ A Alta Complexidade caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde.
e. ☐ São as principais áreas que compõem a alta complexidade do SUS, e que estão organizadas em cuidados individualizados e em apenas uma única direção, ou seja, a assistência hospitalar.

8. Assinale a alternativa **correta** sobre a Política Nacional de Humanização.

a. ☑ Política que busca reorganização do Processo de Trabalho em saúde, implicando as relações sociais que envolvem trabalhadores e gestores na experiência cotidiana de organização e condução dos serviços e busca transformar as formas e produção e prestação de serviços à população.

b. ☐ É considerada uma política unidirecional, pois traduz os princípios do SUS, orienta práticas de atenção, oferece um eixo organizador, constrói práticas solidárias, contagia a Rede por meio das atitudes e ações humanizadoras, e posiciona-se como uma Política Pública.

c. ☐ A Política Nacional de Humanização estrutura-se por meio de princípios, da Transversalidade, da indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia exclusiva dos gestores.

d. ☐ Quanto ao Método, a Política Nacional de Humanização caminha no sentido da exclusão, nos processos de produção de saúde e dos diferentes agentes implicados.

e. ☐ A Política Nacional de Humanização atua a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se mostram através de arranjos de trabalho. Um deles é o Acolhimento que serve exclusivamente para diminuir o número de pessoas nas filas de atendimento.

9. Assinale a alternativa **correta** em relação ao conceito de ambiência.

a. ☐ O espaço físico é usado para o aumento do processo de trabalho, favorecendo a otimização de recursos e o atendimento humanizado, acolhedor e nem sempre resolutivo.

b. ☐ O espaço que possibilita a produção de objetividades – encontro de sujeitos – por meio da ação e reflexão sobre os processos de trabalho e como aumentar o lucro financeiro das instituições de saúde.

c. ☐ O espaço exclusivamente físico que busca o conforto e não a privacidade e individualidade dos sujeitos envolvidos, não considerando elementos do ambiente que interagem com as pessoas.

d. ☑ Ambiência na Saúde refere-se ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana.

e. ☐ O conceito de ambiência busca, através da arquitetura, espaços da Saúde para exames e consultas, assim como locais para internação. Por isso vai além da composição técnica, e são construídas em determinados espaços e num determinado tempo, e vivenciadas por uma grupalidade, um grupo de pessoas com seus valores culturais e relações sociais.

10. A Portaria nº 1.378/2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde, regulamenta aspectos relacionados a:

1. Prevenção e controle das doenças transmissíveis e crônicas não transmissíveis, acidentes e violências.
2. Populações expostas a riscos ambientais em saúde e saúde do trabalhador.
3. Riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse para a saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 1.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ☑ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Conhecimentos Específicos

20 questões

11. O diabetes abrange um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue.

Acerca do Diabetes, é **correto** afirmar:

a. ☑ No diabetes do tipo 1 ocorre a destruição das células beta do pâncreas, devido a fatores genéticos, imunológicos e, possivelmente, ambientais.
b. ☐ A doença macrovascular é uma complicação que pode surgir após longo período da doença e caracteriza-se por retinopatia e nefropatia.
c. ☐ O diabetes tipo 1 tem início lento e progressivo e ocorre mais comumente em pessoas com idade superior a 30 anos e em pessoas com obesidade.
d. ☐ O principal tratamento do Diabetes tipo 1 consiste na redução do peso e modificações nutricionais, sendo a insulina usada como última escolha do tratamento.
e. ☐ A prática de mistura de insulinas não deve ser ensinada aos pacientes quando diante da necessidade de utilizar dois tipos de insulina, uma vez que a mistura diminuiu o efeito da insulina.

12. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

( ) A profundidade da queimadura está relacionada diretamente com a temperatura do agente causador, tempo de contato do tecido corporal com o agente causador.
( ) A gravidade da queimadura está relacionada a múltiplos fatores como: extremos de idade; profundidade da lesão; extensão/percentual atingido; área do corpo queimada; comorbidades e lesão por inalação.
( ) As características da lesão de primeiro grau superficial relaciona-se dor, hiposensibilidade, hiperemia intensa, Edema, Sensível a correntes de ar, intensa de exsudação.
( ) De acordo com a fórmula de reposição volêmica de Baxter e Parkland, devem ser infundidos 4 ml de Lactato de Ringer ou Soro Fisiológico por Quilograma por percentual de área queimada. A solução deverá ser administrada nas primeiras 48 h, sendo a metade nas 8 h após o trauma.
( ) As principais complicações com o paciente queimado envolvem risco de hipovolemia, risco de insuficiência renal aguda e respiratória, além do risco de infecção e sepsemia.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☐ V • V • V • F • F
b. ☑ V • V • F • F • V
c. ☐ V • F • F • V • V
d. ☐ F • F • F • V • V
e. ☐ F • F • F • F • V

13. Assinale a questão **correta**.

a. ☐ Herniorrafia é remoção de uma hérnia.
b. ☐ Mastectomia é reconstrução da mama.
c. ☑ Apendicectomia é a remoção do apêndice.
d. ☐ Artroplastia é um tipo de amputação da articulação, para restaurar movimento e função.
e. ☐ Cistopexia é a fixação externa da bexiga e rins.

14. Paciente chegou à unidade de saúde com queixas de dor abdominal importante em região inguinal direita, há aproximadamente 12 horas, que não cede com na algesia e/ou repouso. Ao realizar exame físico na palpação abdominal você identifica que, pelo quadro apresentado, possivelmente trata-se de uma Apendicite.

Nessa palpação, você identificou:

a. ☐ Nenhum sinal.
b. ☐ Sinal de Murphy.
c. ☐ Sinal de McBurney.
d. ☐ Sinal de Bandeira positivo.
e. ☑ Sinal de Blumberg positivo.

---

15. O câncer é responsável por mais de 12% de todas as causas de óbito no mundo. A explicação para este crescimento está na maior exposição dos indivíduos a fatores de risco cancerígenos.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O uso de tabaco é considerado causa principal dos cânceres de pulmão, laringe, cavidade oral e esôfago e uma das principais causas dos cânceres de bexiga e pâncreas.
2. Alimentação rica em gorduras saturadas e pobre em frutas, legumes e verduras diminui o risco de cânceres de mama, cólon, próstata e esôfago.
3. Substâncias encontradas no ambiente de trabalho, tais como: asbesto, arsênio, benzeno, sílica e fumaça do tabaco não são consideradas carcinogênicas.
4. Hormônios femininos, história menstrual e paridade afetam o risco de câncer de mama, endométrio e ovário.
5. O risco da maioria dos cânceres aumenta com a idade e, por esse motivo, ocorrem mais frequentemente no grupo de idade avançada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

16. Considerando os preceitos do processo de enfermagem e da composição do diagnóstico de enfermagem, segundo NANDA 2015-2017, assinale a alternativa **correta**.

a. ☐ As características definidoras são influências que aumentam a vulnerabilidade de indivíduo, família, grupo ou comunidade a um evento não saudável.
b. ☐ O processo de enfermagem inclui coleta de dados, diagnóstico médico, planejamento, estabelecimento de resultados, plano de cuidados e avaliação.
c. ☐ Diagnóstico de risco é o julgamento clínico a respeito da motivação e do desejo de aumentar o bem-estar e alcançar o potencial humano de saúde. Essas respostas são expressas por uma disposição para melhorar comportamentos de saúde específicos, podendo ser usadas em qualquer estado de saúde.
d. ☐ Diagnóstico de promoção da saúde é o julgamento clínico a respeito da vulnerabilidade de indivíduo, família, grupo ou comunidade para o desenvolvimento de uma resposta humana indesejável a condições de saúde/processos de vida.
e. ☑ Diagnóstico com foco no problema trata-se do julgamento clínico a respeito de uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde/processo de vida que existe em pessoa, família, grupo ou comunidade.

---

17. A Escala de Aldrete-Kroulik é utilizada como um dos parâmetros para alta do paciente da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA).

Assinale a alternativa que identifica **corretamente** os aspectos avaliados por essa escala.

a. ☐ Atividade neurológica • Respiração • Circulação • Consciência • Saturação de oxigênio
b. ☑ Atividade muscular • Respiração • Circulação • Consciência • Saturação de oxigênio
c. ☐ Atividade muscular • Respiração • Circulação • Consciência • Escala de Coma de Glasgow
d. ☐ Atividade muscular • Ruídos Hidroaéreos • Circulação • Consciência • Saturação de oxigênio
e. ☐ Atividade muscular • Respiração • Circulação • Escala de Braden • Saturação de oxigênio

18. Paciente do sexo feminino, M.J, de 50 anos, solteira, com histórico de morte familiar por infarto, está internado na UTI, com dor precordial de forte intensidade, confirmado o diagnóstico médico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supradesnivelamento da onda do segmento S-T.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao caso.

( ) Os fatores de risco que podem levar ao IAM são: Idade, Colesterol alto (LDL, HDL, VLDL); Diabetes, Hipertensão Arterial, Tabagismo, Obesidade e Fatores hereditários (hipercolerestomia familiar).

( ) A angina instável se diferencia dos demais tipos de angina por ser uma dor que acontece repentinamente e se torna pior com o tempo e não passa com repouso.

( ) Antes mesmo da confirmação do IAM por alteração do eletrocardiograma, as dosagens das enzimas cardíacas na amostra sanguínea também podem confirmar o IAM para o paciente. Como por exemplo, a elevação da Troponina (I e T), a da CK-MB, entre outras.

( ) O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) se dá por uma oclusão da artéria coronária, através da formação de um coágulo ou placa de ateroma, diminuindo o fluxo sanguíneo e levando parte do miocárdio a um processo de necrose.

( ) Os sinais e sintomas mais frequentes no paciente com IAM são: a dor torácica persistente, de início súbito e forte intensidade, localizada sobre a região esternal, com irradiação para o braço esquerdo e mandíbula. Essa dor pode vir acompanhada de sudorese, náusea, vômito, palidez, podendo ocorrer uma síncope.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☑ V • V • V • V • V
b. ☐ V • V • V • F • F
c. ☐ V • V • F • V • V
d. ☐ V • F • F • F • F
e. ☐ F • F • V • V • V

19. Você enfermeiro de UTI, para realizar a avaliação clínica e assistência de enfermagem ao paciente grave, com abdômen agudo e hemorragia digestiva alta, do sexo feminino, 30 anos, sem residência fixa, com história de queda de mais de 5 metros de altura, e dependente de drogas ilícitas e álcool, abdômen distendido, refere fortes dores no abdômen, e com escala de coma de Glasgow de 15 no momento da avaliação.

Deve considerar que:

1. Não existe abdômen agudo sem dor.
2. O enfermeiro tem que avaliar a dor abdominal: início da dor; tempo exato e atividade no início; intensidade da dor no início; localização da dor; localização no início; a alteração na localização; irradiação da dor.
3. O enfermeiro tem que continuar a avaliar o caráter da dor: cólica; contínua; aguda; surda; aperto; pulsátil.
4. O enfermeiro tem que continuar a avaliar o tipo de dor; dor visceral; dor referida; dor parietal.
5. A sequência correta para examinar o abdômen dessa paciente com dor abdominal internada na UTI é: inspeção; palpação; percussão e ausculta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

---

20. De acordo com as diretrizes da American Heart Association, os ritmos de parada cardíaca considerados "ritmos chocáveis" incluem:

a. ☐ Assistolia e Atividade Elétrica sem Pulso.
b. ☐ Fibrilação Atrial e Taquicardia Ventricular.
c. ☑ Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso.
d. ☐ Atividade Elétrica sem Pulso e Fibrilação Ventricular.
e. ☐ Bloqueio átrioventricular e Fibrilação Ventricular.

21. Paciente de 20 anos, sexo masculino, após acidente automobilístico, grave, foi atendido e levado imobilizado pelo SAMU à emergência hospitalar, e em seguida ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Não apresenta movimentos voluntários de membros superiores e inferiores. Após tomografia, foi confirmada lesão medular completa.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao caso.

a. ☐ Lesão incompleta: esse termo é usado quando houver ausência da função motora e sensitiva no segmento sacral mais baixo.
b. ☐ A Paraplegia descreve diminuição ou perda da função motora e/ou sensitiva dos segmentos cervical devido à lesão dos elementos neurais dentro do canal medular.
c. ☐ A Tetraplegia descreve diminuição ou perda da função motora e/ou sensitiva dos segmentos torácicos, lombares ou sacrais (porém não cervicais), secundários a danos dos elementos neurais dentro do canal vertebral.
d. ☐ Lesão completa: se for encontrada preservação parcial da função sensitiva e/ou motora abaixo do nível neurológico, incluindo o segmento sacral mais baixo, a lesão se define como incompleta. A sensibilidade sacra inclui sensação na região da união cutâneo-mucosa perianal, assim como a sensação anal profunda.
e. ☑ A Escala de Avaliação ASIA/Frankel *(American Spinal Injury Association* – ASIA), (Gravidade das lesões medulares) é uma escala que se baseia na avaliação da sensibilidade e da função motora, sendo possível classificar o paciente quanto ao tipo de lesão (completa ou incompleta) e determinar o nível neurológico, além de gerar um escore baseado nos achados sensitivos e motores.

22. O diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral deve ser suspeitado sempre que o paciente apresentar início súbito de déficit focal, com ou sem alteração do nível de consciência.

Os principais sinais de alerta do AVC incluem:

a. ☐ Dor de cabeça intensa; sudorese; náuseas; taquicardia e ansiedade.
b. ☐ Perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo; sudorese intensa; queda de pressão arterial, dispneia e náuseas.
c. ☑ Perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo; dificuldade súbita de falar ou compreender; perda visual súbita; tontura; dor de cabeça intensa sem causa aparente.
d. ☐ Perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo; dor de cabeça intensa sem causa aparente; hálito cetônico e aumento da pressão arterial.
e. ☐ Perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo; dificuldade súbita de falar ou compreender; sonolência; sudorese e tremores.

---

23. Em relação ao Aleitamento Materno, é **correto** afirmar que:

a. ☐ A amamentação do recém-nascido após o nascimento deverá ocorrer 10 horas após o parto.
b. ☑ É um método tecnicamente natural, de fácil aprendizagem, higiênico e praticamente isento de custos.
c. ☐ Do ponto de vista nutricional, o leite humano é capaz de suprir todas as necessidades da criança até os dois anos de vida.
d. ☐ O funcionamento da mama está relacionado a três fases concomitantes, que são: fase mamotrófica ou mamogênica, fase galactogênica ou de lactação e fase da galactopoiese.
e. ☐ Devido à ansiedade e alteração hormonal da gestante, deve-se evitar a abordagem sobre manejo da amamentação durante as consultas de pré-natal.

24. Apesar das diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) que enfatizam boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento baseadas em evidências científicas e afirmam que o parto é um evento natural que não necessita de controle, mas sim de cuidados, o modelo de atenção ao parto "normal", mais comum no Brasil, inclusive em hospitais de ensino, é tecnocrático, centrado no profissional médico em instituição de saúde hospitalar, razão pela qual é também chamado de parto normal hospitalar.

Em relação à assistência ao parto no Brasil, assinale a alternativa **correta**.

a. ☐ A taxa de cesariana tem sido utilizada como indicador de avaliação do modelo de atenção ao parto e, segundo padrão normativo da Organização Mundial da Saúde (OMS), não deve ultrapassar 20%.

b. ☐ A atenção hospitalar ao parto é superior a 85% desde 1994, no Brasil, atingindo 97,9%, em 2006, com menor valor (85%) na Região Norte. Os partos são, na sua grande maioria, atendidos por profissionais habilitados (médicos e enfermeiros, em 95,9% dos partos) e 88% são realizados por médicos, com menor proporção nas regiões Nordeste e Norte.

c. ☐ A preferência das mulheres pela cesárea parece ser moldada pela conduta intervencionista do médico e pela crença de que a qualidade do atendimento obstétrico está fortemente associada à tecnologia dura utilizada no parto operatório.

d. ☑ A retirada do papel de protagonista torna a mulher frágil e submissa a uma situação que a infantiliza, fragiliza, descaracteriza e violenta. Nessa condição de fragilidade, o momento do parto e do nascimento passa a ser encarado com medo devido à ameaça de riscos de dor, de sofrimento e de morte, e a cesariana passa a ser uma possibilidade de fuga e de proteção da dignidade, uma vez que o modelo de parto "normal" é considerado degradante.

e. ☐ Há um predomínio do modelo biomédico e da utilização crítica do conhecimento técnico, sobretudo em hospitais, que se encontram entre as instituições contemporâneas mais permeáveis às mudanças e às inovações.

25. Os modelos assistenciais podem ser classificados em três paradigmas: o modelo Tecnomédico ou Biomédico, o modelo Humanista e o modelo Holístico (DAVISFLOYD; ST. JOHN, 1998). Essa classificação baseia-se na identificação das 12 características básicas do princípio básico subjacente e do tipo de pensamento de cada modelo.

Assinale a alternativa que apresenta características do modelo Holístico.

a. ☑ Unicidade de corpo-mente e espírito; cura da pessoa em sua integralidade em um contexto de vida como um todo; estrutura organizacional em rede que facilita a individualização da assistência; a morte é um processo; a cura é o foco.

b. ☐ Unicidade de corpo-mente e espírito; cura da pessoa em sua integralidade em um contexto de vida como um todo; estrutura organizacional em rede que facilita a individualização da assistência; a morte é um processo; foco na prevenção da doença.

c. ☐ A cura é o foco; abarca múltiplas modalidades de cura; foco na prevenção da doença; o paciente como sujeito relacional; diagnóstico e cura de fora para dentro e de dentro para fora; estrutura organizacional em rede que facilita a individualização da assistência.

d. ☐ Organização hierárquica e padronização de cuidados; autoridade e responsabilidade inerente ao médico e não ao paciente; supervalorização da ciência e tecnologia dura; intervenções agressivas com ênfase em resultados de curto prazo; a morte como resultado aceitável.

e. ☐ Unicidade de corpo-mente e espírito; cura da pessoa em sua integralidade em um contexto de vida como um todo; estrutura organizacional em rede que facilita a individualização da assistência; a morte como resultado aceitável.

26. Em relação à assistência no período expulsivo do trabalho de parto, assinale a alternativa **correta**.

a. ☐ A posição de cócoras geralmente é a preferida pelas mulheres quando lhes oferecem a liberdade de escolha e mesmo para a mulher ocidental, não acostumada a adotar tal posição em suas atividades cotidianas, o risco de trauma perineal é menor.

b. ☐ A episiotomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados no mundo inteiro, com a alegação de redução da probabilidade de lacerações perineais do quarto grau, preservação da musculatura perineal e função sexual, além da redução de incontinência fecal e urinária.

c. ☑ Posições verticais no parto sempre foram utilizadas, ocorrendo uma drástica mudança a partir do momento em que o parto passou a ser assistido por médicos e, principalmente, no ambiente hospitalar.

d. ☐ Mesmo sendo considerado seguro, o parto na água requer alguns cuidados para minimizar os riscos em caso de circular de cordão ou cordão curto. São elas: evitar que a água esteja muito funda, trazer a criança gentilmente para a superfície, ter em mãos pinças para clampeamento, deixar a criança nascer completamente dentro da água antes de trazê-la à superfície e otimizar o início da respiração neonatal deixando-o dentro da água por cinco minutos após o nascimento.

e. ☐ Ouso de qualquer posição vertical ou lateral comparado com a posição supina no segundo estágio do parto, esteve associado à redução da duração e do relato de dor grave nesse estágio e na taxa de episiotomia, pequena redução no número de partos assistidos instrumentalmente, e menos anormalidades nos padrões de frequência cardíaca fetal, embora tenha sido encontrado pequeno aumento na incidência de lacerações perineais de segundo grau e aumento no risco estimado de perda sanguínea maior que 600 ml.

27. A diarreia aguda é uma das causas principais de doença em crianças com idade inferior a 5 anos. Compreende um grupo de condições clínicas, cuja manifestação comum é a presença de fezes de consistência diminuída associada a um aumento do número de dejeções, traduzindo um desequilíbrio entre os processos de absorção e a secreção do intestino.

Sobre a diarreia aguda, é correto afirmar:

1. É considerada diarreia aguda o quadro com duração de até 13 dias.
2. Para caracterizá-la a criança deve ter apresentado pelo menos 1 episódio de evacuação com consistência reduzida.
3. Alterações na dieta da criança e agentes tóxicos podem estar entre as causas da diarreia aguda.
4. Na avaliação da criança com diarreia aguda, a história da mãe é a única e essencial forma de diagnosticar e tratar a criança.
5. A Suplementação de Zinco por 5 dias é um tratamento domiciliar indicado para a criança com diarreia, porém, sem sinais de desidratação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

---

28. A escala de coma de Glasgow, bastante utilizada em traumas graves, tem a finalidade de avaliar:

a. ☐ nível de sedação pela abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora.
b. ☐ nível de responsividade, por abertura ocular, resposta verbal e resposta neurológica.
c. ☐ nível de coma, por abertura ocular, melhor resposta dolorosa e percepção sensorial.
d. ☐ nível do trauma, por abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora.
e. ☑ nível de consciência, por abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora.

29. A varicela é uma das doenças transmissíveis mais comuns na infância. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, no período entre 2000 a 2013, foram notificados 7.113 casos de varicela.

Sobre a varicela, é **correto** afirmar:

a. ☐ A artrite, miocardite, pancreatite e orquite são complicações frequentes.
b. ☐ O período de contágio se inicia 10 dias antes da erupção das lesões (período prodômico).
c. ☐ O isolamento da criança é necessário somente na primeira semana de surgimento das lesões.
d. ☑ O agente causador da varicela é chamado de Paramixovírus.
e. ☐ O período de incubação é de duas a três semanas, geralmente 7-16 dias.

30. O Alojamento Conjunto, regulamentado pela Portaria nº 2.068 de 21 de outubro de 2016, visa promover a atenção integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido.

Portanto, é atribuição da equipe de enfermagem, no que diz respeito às necessidades específicas do recém-nascido:

a. ☐ Evitar quaisquer orientações antecipadas sobre procedimentos pós-alta, pois podem gerar ansiedade e confusão aos pais.
b. ☑ Avaliação diária de perda ponderal e realização de exame físico e reflexos.
c. ☐ Considerar que o único objetivo de cuidado com o coto umbilical a mumificação fisiológica do mesmo.
d. ☐ Observar que o cuidado de controle de hipoglicemia neonatal de rotina deve ser feito apenas em recém-nascidos pré-termo ou PIG (pequenos para a idade gestacional).
e. ☐ Analisar a perda ponderal diária, que é considerada fisiológica até o recém-nascido completar 10 dias de vida.

Coluna em Branco. (rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.

GRADE DE RESPOSTAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

COREMUFSC
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE





Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
http://www.fepese.org.br