GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

TIPO

1

MÉDICO RQE

CIRURGIÃO PEDIÁTRICO

(NÍVEL SUPERIOR)

TARDE

SUA PROVA E TEMPO

- Este caderno contém **60 (sessenta)** questões objetivas.
- Verifique se este material está completo e corresponde ao cargo e especialidade para o qual você se inscreveu.
- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões nem qualquer tipo de anotação de suas respostas.
- **30 (trinta) minutos** antes do término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões.
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

INFORMAÇÕES GERAIS

- **ATENÇÃO! Confirme se o TIPO da sua prova é o mesmo no seu CARTÃO DE RESPOSTAS.**
- No cartão de respostas, confira seu nome, número de inscrição e documento de identidade.
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas no espaço reservado no cartão de respostas.
- O preenchimento do cartão de respostas é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição em caso de erro cometido por você.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Boa prova!

FGV CONHECIMENTO

Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

1

Leia o pequeno texto a seguir.

Alguns jornais noticiam que os médicos cardiológicos da Rússia, e não dos Estados Unidos ou Alemanha, mostram melhores resultados no combate às doenças do coração e nos transplantes.

Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) Classifica-se como texto publicitário, valorizando a Cardiologia na Rússia.
(B) Mostra-se como um texto expositivo informativo, que divulga notícias jornalísticas.
(C) Trata-se de um texto argumentativo, em que a tese defende melhor situação da Cardiologia na Rússia.
(D) Identifica-se como texto argumentativo, fundamentado numa contra-argumentação, negando a preponderância dos EUA ou da Alemanha.

2

Leia o texto abaixo sobre Cardiologia Pediátrica:

A Cardiologia Pediátrica é uma especialidade médica que se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas em crianças, desde o nascimento até a adolescência. Esta área da medicina é fundamental, uma vez que as condições cardíacas podem se manifestar de maneiras diferentes em crianças em comparação aos adultos. Os cardiologistas pediátricos são profissionais altamente treinados que compreendem as particularidades do sistema cardiovascular em desenvolvimento, permitindo um atendimento mais eficaz e direcionado.

Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) O primeiro período do texto define a Cardiologia Pediátrica por meio de uma palavra geral (especialidade) e com a indicação da sua finalidade.
(B) O segundo período do texto mostra as diferenças entre a Cardiologia destinada a crianças e a adultos.
(C) O último período do texto mostra a Cardiologia Pediátrica como uma ciência avançada, mas ainda em desenvolvimento.
(D) O texto tem a finalidade de divulgar a Cardiologia Pediátrica como uma área de grande futuro profissional.

3

Os dicionários Houaiss e Aurélio de Língua Portuguesa definem "alergia" do seguinte modo:

Houaiss: *reação normal e específica do organismo após sensibilização por uma substância estranha que não gera problemas na maioria dos indivíduos.*

Aurélio: *designação de estado de hipersensibilidade causado por exposição a determinado antígeno, dito alergênio, sendo observadas reações imunológicas nocivas se houver subsequentes exposições a este mesmo alergênio.*

Em relação a essas definições, assinale a afirmativa correta.

(A) A definição de Houaiss é mais técnica e profissional que a definição de Aurélio.
(B) A definição de Aurélio parece ser direcionada a profissionais médicos.
(C) As definições dadas definem o termo de forma completamente distinta, como se considerassem a alergia como realidades diferentes.
(D) Enquanto a definição de Aurélio mostra-se mais como um texto de divulgação ampla, a de Houaiss mostra-se mais culta.

4

Leia o texto a seguir.

A Anestesiologia é a área da Medicina responsável por proporcionar alívio ou ausência de dor e outras sensações durante procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos, monitorando e acompanhando as funções vitais do paciente antes, durante e após a intervenção.

Além do período intraoperatório, o anestesiologista atua no pré-operatório, avaliando riscos e condições do paciente, e no pós-operatório, acompanhando a recuperação e prevenindo complicações.

Assinale a opção que indica os termos do texto que funcionam como sinônimos.

(A) "alívio ou ausência de dor".
(B) "riscos e condições do paciente".
(C) "monitorando e acompanhando".
(D) "procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos".

5

Leia o texto abaixo com atenção.

A natureza humana é a obra de Deus que resulta mais elevada do que todas as outras, pouco menor do que a natureza angélica; ela reúne a natureza intelectual e a sensível e comporta em si mesma todas as coisas, de tal forma que é chamada justamente pelos antigos de microcosmo ou pequeno mundo.

Sobre um termo desse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) Em "a obra de Deus", a locução "de Deus" equivale ao adjetivo "religiosa".
(B) O pronome relativo "que" na frase "que resulta" se refere ao antecedente "Deus".
(C) A frase "mais elevada do que todas as outras" exemplifica uma construção de superlativo.
(D) No termo "natureza angélica" o adjetivo "angélica" se prende, semanticamente, ao substantivo "anjo".

6

Assinale a opção que apresenta a frase *em ordem direta*.

(A) Grande segredo é a vida.
(B) A ninguém foi dada a posse da vida.
(C) Viver é minha profissão e minha arte.
(D) À diferença de outras doenças, a vida é sempre mortal.

7

Assinale a frase que se enquadra no *uso de linguagem popular*.

(A) Quem compra a imitação, merece-a.
(B) Aceite o desafio de voar com a nossa companhia.
(C) Errar é humano, vender abaixo do custo é divino.
(D) Claro, você pode andar por aí com uma carteira recheada. Mas para quê?

8

Assinale a opção que apresenta o texto que pode ser classificado como *narrativo*.

(A) Os profissionais da saúde estavam em um congresso.
(B) Faça o possível para não chegar atrasado ao seu emprego.
(C) O médico chegou ao hospital e dirigiu-se rapidamente ao quarto do paciente.
(D) Todos os remédios estavam enfileirados na prateleira, disponíveis para o consumo.

9

Assinale a frase que tem corretamente indicado o antecedente do termo sublinhado.

(A) A cura do doente ***que*** está no quarto 12 não vai tardar / cura.
(B) O vidro de remédio ***que*** está sobre a mesa foi trazido pelo paciente / remédio.
(C) As receitas do médico ***que*** foram solicitadas ontem já estão sobre a mesa do consultório / receitas.
(D) O médico e a enfermeira ***que*** trabalharam juntos na operação da manhã são meus amigos / enfermeira.

10

Assinale a frase abaixo em que ocorre mistura ***indevida*** de tratamentos.

(A) V. Exa. deve mudar de estratégia.
(B) Eu te vi de braços dados com sua esposa.
(C) Nunca mais os encontrei com os filhos deles.
(D) Vi seu carro na garagem, mas não encontrei você.

Matemática e Raciocínio Lógico

11

Uma clínica reservou R$ 40.000,00 para a futura aquisição de um equipamento.

Enquanto aguardava a compra, aplicou integralmente esse valor a uma taxa efetiva de 5% ao semestre, sob o regime de juros compostos com capitalização semestral. O dinheiro permaneceu aplicado durante exatamente dois semestres completos.

Durante esse período, não houve depósitos, retiradas, cobrança de tarifas ou incidência de tributos.

Ao final desse período, o montante da aplicação era de

(A) R$ 42.000,00.
(B) R$ 44.000,00.
(C) R$ 44.100,00.
(D) R$ 46.305,00.

12

Para escolher dois representantes para uma comissão interna, um hospital realizará um sorteio entre oito médicos.

Para fins desse sorteio, os profissionais foram distribuídos, sem sobreposição, da seguinte maneira:

- quatro cardiologistas;
- dois anestesiologistas; e
- dois especialistas em Imunologia.

Os dois representantes serão sorteados sucessivamente, sem reposição, e cada médico ainda não sorteado terá a mesma probabilidade de ser escolhido.

A probabilidade de que pelo menos um dos dois médicos sorteados não seja cardiologista é de

(A) 3/16.
(B) 3/14.
(C) 11/16.
(D) 11/14.

13

Em determinada manhã, um hospital realizou um atendimento de cada uma das seguintes especialidades: Cardiologia, Anestesiologia, Imunologia e Dermatologia.

Os quatro atendimentos ocorreram às 8h, às 9h, às 10h e às 11h, com apenas um atendimento em cada horário.

Sabe-se que:

- o atendimento de Dermatologia ocorreu no horário imediatamente seguinte ao de Cardiologia;
- o atendimento de Anestesiologia ocorreu antes dos atendimentos de Imunologia e de Cardiologia; e
- o atendimento de Imunologia não ocorreu às 9h.

Com base nessas informações, o atendimento de Cardiologia ocorreu às

(A) 8h.
(B) 9h.
(C) 10h.
(D) 11h.

14

Durante uma auditoria interna, um hospital estabeleceu metas para a quantidade de prontuários que deveriam ser analisados em etapas sucessivas.

As metas das cinco primeiras etapas formaram a seguinte sequência:

10, 13, 17, 22, 28.

Da primeira para a segunda etapa, houve um acréscimo de 3 prontuários. Em cada transição seguinte, o acréscimo foi uma unidade maior do que o anterior.

Mantida essa regra, é correto concluir que 73 será a meta da etapa

(A) 9.
(B) 10.
(C) 11.
(D) 12.

15

Considere as proposições simples relativas à avaliação de um paciente:

p: “O paciente apresentou febre.”

q: “O paciente apresentou tosse.”

A partir dessas proposições, foi construída a proposição composta

$$(p \vee q) \wedge \neg p.$$

Ao elaborar a tabela-verdade dessa proposição composta, verifica-se que ela é verdadeira somente quando o paciente

(A) apresentou febre e tosse.
(B) apresentou febre, mas não apresentou tosse.
(C) não apresentou febre, mas apresentou tosse.
(D) não apresentou febre nem tosse.

16

Em um projeto de digitalização, 4 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, durante 5 dias, digitalizaram 480 prontuários.

Em uma nova etapa do projeto, deverão ser digitalizados 960 prontuários. Para isso, seis funcionários trabalharão 8 horas por dia.

Considere que todos os funcionários apresentam a mesma produtividade por hora nas duas etapas, que os prontuários exigem o mesmo tempo de processamento e que o trabalho pode ser dividido igualmente entre eles.

Nessas condições, o número de dias de trabalho necessários para digitalizar os 960 prontuários será

(A) 5.
(B) 6.
(C) 8.
(D) 9.

17

Para permitir o acesso temporário a determinado sistema hospitalar, serão criados códigos formados por três algarismos distintos, escolhidos entre 1, 2, 3, 4 e 5.

Por exigência do sistema, o primeiro algarismo do código deve ser ímpar e o último deve ser par. Não há outras restrições.

Dois códigos são considerados diferentes quando diferem em pelo menos uma posição. Por exemplo, 124 e 142 são códigos distintos.

Assinale a opção que indica a quantidade de códigos distintos que podem ser criados nessas condições.

(A) 18.
(B) 24.
(C) 48.
(D) 60.

18

Em um relatório sobre os atendimentos realizados em determinado turno, foi registrada a seguinte afirmação:

"Todos os pacientes encaminhados ao setor de Cardiologia foram avaliados por um cardiologista e realizaram pelo menos um exame complementar."

Considerando o conectivo "***ou***" em seu sentido lógico inclusivo, a negação dessa afirmação é:

(A) Todos os pacientes encaminhados ao setor de Cardiologia não foram avaliados por um cardiologista ou não realizaram nenhum exame complementar.
(B) Nenhum paciente encaminhado ao setor de Cardiologia foi avaliado por um cardiologista, e nenhum deles realizou exame complementar.
(C) Existe pelo menos um paciente encaminhado ao setor de Cardiologia que não foi avaliado por um cardiologista e não realizou nenhum exame complementar.
(D) Existe pelo menos um paciente encaminhado ao setor de Cardiologia que não foi avaliado por um cardiologista ou não realizou nenhum exame complementar.

História e Geografia do Tocantins

19

Leia o texto a seguir.

O estado do Tocantins foi o último estado subnacional criado no Brasil, instituído a partir da promulgação da Constituição de 1988, por meio do artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Porém, o projeto que se viabilizou em 1988 não pode ser considerado o marco inicial para o entendimento das questões relativas à criação do estado do Tocantins. Houve uma intensa luta ao longo do tempo para a autodeterminação política dessa região, cujas primeiras manifestações apareceram ainda no século XVIII e somente foram concretizadas no final do século XX.

Adaptado de FEITOSA, Cid. A criação do estado do Tocantins no Norte do Brasil. América Latina en la Historia Económica, vol.31 no.1, 2025.

Considerando o trecho e o processo histórico de formação do Tocantins, assinale a afirmativa correta.

(A) No período colonial, as bandeiras paulistas deram origem às primeiras reivindicações separatistas do norte de Goiás em relação à capitania, em busca da autonomia necessária à continuidade da escravização indígena.
(B) Em 1809, foi criada a Comarca do Norte, cuja hegemonia econômica, favorecida pela proximidade de Vila Boa, estimulou as primeiras reivindicações separatistas contra o centro-sul de Goiás, região de baixa produção aurífera.
(C) Em 1821, a Comarca do Norte de Goiás proclamou sua autonomia político-administrativa, posteriormente suprimida em 1823, em meio a reivindicações contra a elevada carga tributária e o abandono político da região.
(D) Em 1988, a criação do estado do Tocantins incorporou todo o território que havia pertencido à antiga Comarca do Norte de Goiás, incluindo as regiões das minas do Tocantins e do norte goiano.

20

As bonecas Karajá Ritxòkò constituem uma importante referência cultural dos povos indígenas que habitam a região do rio Araguaia. Produzidas tradicionalmente pelas mulheres Karajá, as peças articulam técnicas de cerâmica, pintura, ornamentação e conhecimentos transmitidos entre gerações, além de desempenharem papel na transmissão de valores, histórias e mitos às crianças.

Considerando essas características, é correto afirmar que as Ritxòkò constituem patrimônio

(A) arqueológico, por representarem vestígios materiais de antigas práticas cerâmicas dos Karajá, preservados como testemunhos de sua ocupação no vale do Araguaia.
(B) material, em razão de sua natureza cerâmica e artesanal, com peças singulares que expressam a cosmologia Karajá.
(C) imaterial, uma vez que seu principal valor reside nos saberes, técnicas e significados próprios da cultura Karajá, transmitidos entre gerações.
(D) paisagístico, pois sua produção e seus significados estão diretamente associados ao território tradicionalmente ocupado pelos Karajá, às margens do rio Araguaia.

21

O estado do Tocantins apresenta significativa diversidade ambiental, com diferentes ecossistemas e paisagens protegidos por unidades de conservação de âmbito federal e estadual. Essas áreas desempenham papel relevante na preservação da biodiversidade e dos recursos naturais do estado.

A respeito das unidades de conservação no estado do Tocantins, assinale a afirmativa correta.

(A) O Parque Nacional do Araguaia protege uma área de elevada diversidade ecológica, marcada por características de transição entre ambientes do Cerrado e da Amazônia.

(B) O Parque Estadual do Jalapão foi instituído para conservar remanescentes do bioma Mata Atlântica, constituindo um importante refúgio florestal do território tocantinense.

(C) O Parque Estadual do Cantão caracteriza-se por abrigar predominantemente formações campestres de Cerrado, associadas à vegetação típica do planalto central brasileiro.

(D) O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba está integralmente situado no Tocantins e tem por finalidade resguardar formações florestais amazônicas no extremo norte do estado.

22

Desde 2024, a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN) adota uma nova regionalização para aperfeiçoar o planejamento e as políticas públicas no Tocantins. Essa organização territorial divide o estado em oito regiões de planejamento, agrupadas em três grandes macrorregiões.

Considerando a lógica dessa divisão territorial, assinale a afirmativa correta.

(A) A divisão baseia-se em critérios técnicos, como a polarização das cidades, os fluxos agropecuários e as características histórico-sociais.

(B) A Macrorregião Sul abrange a maior densidade urbana do estado por sediar a capital, Palmas, e os principais eixos industriais.

(C) A Macrorregião Norte foi delineada com foco exclusivo na proteção ambiental, sendo vedada a atividade agropecuária em seus limites.

(D) A divisão extinguiu a autonomia política dos municípios, que passaram a ser geridos diretamente pelas sedes macrorregionais.

23

Leia o trecho a seguir.

"Um ecótono é uma região resultante do contato entre dois ou mais biomas fronteiriços. São áreas de transição ambiental, onde entram em contato diferentes comunidades ecológicas – isto é, a totalidade da flora e fauna que faz parte de um mesmo ecossistema e suas interações. Por isso, os ecótonos são ricos em espécies, sejam elas provenientes dos biomas que o formam ou espécies únicas (endêmicas) surgidas nele mesmo".

Disponível em: https://oeco.org.br/dicionario-ambiental/28830-o-que-sao-ecotonos/. Acesso em: 25 de out. de 2026.

O estado do Tocantins está situado na transição entre diferentes biomas brasileiros. Um dos ecótonos mais importantes do estado está situado na transição entre Cerrado e Amazônia.

Assinale a opção que indica essa região.

(A) Jalapão.

(B) Gurupi.

(C) Porto Nacional.

(D) Bico do Papagaio.

24

A rodovia BR-153 (Rodovia Belém-Brasília) desempenhou um papel central na configuração socioeconômica e na organização do espaço que hoje compõe o estado do Tocantins. A abertura dessa via de circulação, a partir de meados do século XX, alterou profundamente a dinâmica da região.

Considerando os impactos históricos e geográficos da BR-153 na formação territorial tocantinense, assinale a afirmativa correta.

(A) A implantação da via isolou economicamente o norte do Estado, forçando a população a migrar exclusivamente para o bioma amazônico.

(B) O traçado da rodovia priorizou a integração com a região Norte, deixando o interior do Tocantins dependente do transporte hidroviário.

(C) A rodovia perdeu sua relevância logística após a criação de Palmas, que centralizou todos os fluxos de mercadorias no leste do estado.

(D) A rodovia funcionou como um eixo de integração, estimulando o surgimento de cidades e o fluxo migratório para o seu entorno.

Legislação (SUS)

25

O Decreto nº 7.508/2011 estabeleceu o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) como instrumento de gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre o COAP, de acordo com esse decreto, assinale a afirmativa correta.

(A) Um instrumento voltado à formalização de contratos entre gestores do SUS e prestadores privados.

(B) Um mecanismo destinado à participação da comunidade na formulação das políticas públicas de saúde.

(C) Um acordo de colaboração entre os entes federativos para organizar e integrar as ações e os serviços de saúde.

(D) Um instrumento destinado à definição das diretrizes nacionais para a incorporação de tecnologias em saúde.

26

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma estratégia do Ministério da Saúde que busca efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão.

Com base nos conceitos estabelecidos pela PNH, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A transversalidade é um princípio da PNH que busca a transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos.

( ) O princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão considera a autonomia e o protagonismo dos sujeitos inseridos no processo de cuidado, incentivando a participação ativa de usuários, trabalhadores e gestores na construção dos processos de saúde.

( ) A clínica ampliada pressupõe uma abordagem interdisciplinar que considera a singularidade do sujeito, buscando compreender o processo de adoecimento em seu contexto de vida e ampliar as possibilidades de cuidado.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – V – F.

(B) V – F – V.

(C) F – F – F.

(D) V – V – V.

27

Leia o trecho a seguir.

Para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, gestores de municípios próximos estabeleceram uma atuação articulada no território, buscando organizar a oferta dos serviços de acordo com as necessidades da população.

Assinale a opção que indica o princípio do SUS a que essa iniciativa está diretamente relacionada.

(A) Integralidade.
(B) Universalidade.
(C) Regionalização.
(D) Descentralização.

28

Sobre os princípios específicos da prestação de serviços de saúde por meio da telessaúde, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa correta.

(A) O registro e o rastreamento obrigatório das consultas realizadas.
(B) A autonomia relativa do profissional na prestação do atendimento.
(C) O consentimento livre e informado do paciente para o atendimento.
(D) O atendimento presencial obrigatório antes da consulta por telessaúde.

29

Os Conselhos de Saúde são instâncias de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde.

Acerca dessas instâncias, assinale a afirmativa correta.

(A) São responsáveis por decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS.
(B) Devem reunir-se a cada quatro para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
(C) Possuem competência para determinar a distribuição dos recursos financeiros entre os entes federativos, conforme as necessidades locais identificadas.
(D) São órgãos de caráter permanente e deliberativo que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

30

Sobre as condições para a participação complementar no Sistema Único de Saúde (SUS), com base nas disposições da Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas a seguir.

I. A participação complementar dos serviços privados deve ser formalizada mediante contrato ou convênio, observadas as normas de Direito Público.
II. Os serviços contratados deverão submeter-se às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
III. Na contratação de serviços privados em caráter complementar, as entidades filantrópicas terão preferência sobre as entidades sem fins lucrativos.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

Conhecimentos Específicos

31

Durante uma laparotomia por apendicite aguda não complicada em uma criança previamente hígida, o principal objetivo da reposição volêmica perioperatória é

(A) promover diurese forçada para prevenir infecção urinária.
(B) restringir líquidos sistematicamente para diminuir edema intestinal.
(C) manter níveis elevados de glicemia durante todo o procedimento.
(D) corrigir e manter perfusão tecidual adequada e equilíbrio hidroeletrolítico.

32

Assinale a opção que indica o momento recomendado para o tratamento cirúrgico da criptorquidia congênita persistente.

(A) Após os 5 anos.
(B) Somente após a puberdade.
(C) Imediatamente após o nascimento.
(D) Durante o primeiro ano de vida, após o período inicial em que ainda pode ocorrer descida espontânea.

33

Lactente de 8 meses apresenta crises de dor abdominal em cólica, choro intenso, vômitos e períodos de letargia. Evoluiu com eliminação de fezes com muco e sangue, em aspecto de "geleia de framboesa".

Nesse contexto, assinale o diagnóstico mais provável.

(A) Invaginação intestinal.
(B) Enterocolite necrosante.
(C) Doença de Hirschsprung.
(D) Estenose hipertrófica do piloro.

34

Lactente masculino de 5 semanas, previamente hígido, apresenta vômitos progressivamente mais intensos após as mamadas. Os vômitos são em jato, não biliosos, e a criança demonstra fome logo após os episódios. Ao exame, encontra-se discretamente desidratada.

Assinale a opção que indica o exame de imagem de escolha para confirmação diagnóstica.

(A) Ultrassonografia abdominal.
(B) Radiografia simples do abdome.
(C) Ressonância magnética abdominal.
(D) Tomografia computadorizada abdominal.

35

Recém-nascido apresenta, ao nascimento, exteriorização de vísceras abdominais através de defeito central do anel umbilical. As vísceras encontram-se recobertas por uma membrana translúcida.

Assinale o diagnóstico mais provável.

(A) Onfalocele.
(B) Gastrosquise.
(C) Extrofia vesical.
(D) Hérnia umbilical.

36

Recém-nascido com diagnóstico pré-natal de polidrâmnio apresenta vômitos biliosos nas primeiras horas de vida. Radiografia simples do abdome demonstra distensão do estômago e do duodeno proximal, sem gás significativo distalmente.

Qual achado radiológico clássico está descrito?

(A) Sinal do alvo.
(B) Sinal da dupla bolha.
(C) Sinal do grão de café.
(D) Pneumatose intestinal.

37

Menino de 5 anos, previamente saudável, apresenta episódio de hematoquezia volumosa, indolor, sem febre ou sinais de irritação peritoneal. Após estabilização inicial, permanece hemodinamicamente estável.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, assinale o mecanismo que explica mais frequentemente o sangramento.

(A) Inflamação primária da mucosa retal.
(B) Ruptura espontânea de varizes mesentéricas.
(C) Isquemia colônica causada por vólvulo de sigmoide.
(D) Ulceração da mucosa ileal adjacente decorrente da secreção ácida por mucosa gástrica ectópica.

38

Menino de 3 anos apresenta saída intermitente de líquido claro pelo umbigo desde o período neonatal. Não há exteriorização de conteúdo intestinal. A investigação demonstra comunicação entre o umbigo e a bexiga.

Assinale o diagnóstico mais provável.

(A) Gastrosquise.
(B) Persistência do úraco.
(C) Hérnia umbilical encarcerada.
(D) Persistência do ducto onfalomesentérico.

39

Adolescente de 13 anos apresenta massa indolor na região lateral esquerda do pescoço, localizada junto à borda anterior do músculo esternocleidomastoideo. A lesão aumentou de volume após episódio recente de infecção das vias aéreas superiores.

Assinale a hipótese diagnóstica mais provável.

(A) Cisto do ducto tireoglosso.
(B) Hérnia diafragmática cervical.
(C) Laringocele obrigatoriamente congênita.
(D) Anomalia do segundo arco/fenda branquial.

40

Menina de 7 anos apresenta massa cervical mediana, indolor, percebida há vários meses. Ao exame, a lesão eleva-se durante a deglutição e com a protrusão da língua. Não há sinais de infecção

Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta.

(A) Tireoidectomia total.
(B) Procedimento de Sistrunk.
(C) Aspiração simples e acompanhamento.
(D) Exérese apenas do componente cístico.

41

Prematuro de 29 semanas, em alimentação enteral, desenvolve distensão abdominal, intolerância alimentar, resíduos gástricos e sangue nas fezes. Radiografia abdominal demonstra pneumatose intestinal.

No caso, assinale o diagnóstico mais provável.

(A) Atresia esofágica.
(B) Doença de Hirschsprung.
(C) Enterocolite necrosante.
(D) Estenose hipertrófica do piloro.

42

Recém-nascido com diagnóstico pré-natal de polidrâmnio apresenta vômitos biliosos nas primeiras horas de vida. Radiografia simples do abdome demonstrou distensão do estômago e do duodeno proximal, sem gás significativo distalmente.

Assinale a opção que indica o achado radiológico clássico que está descrito.

(A) Sinal do alvo.
(B) Sinal da dupla bolha.
(C) Sinal do grão de café.
(D) Pneumatose intestinal.

43

Lactente de 6 semanas apresenta icterícia persistente, fezes hipocólicas evoluindo para acolia, urina escura e hepatomegalia. Exames demonstram hiperbilirrubinemia predominantemente conjugada.

Indique o diagnóstico que deve ser investigado prioritariamente.

(A) Atresia biliar.
(B) Intussuscepção.
(C) Icterícia fisiológica prolongada.
(D) Estenose hipertrófica do piloro.

44

Menina de 6 anos apresenta episódios recorrentes de dor abdominal no hipocôndrio direito, associados a icterícia intermitente.

A Ultrassonografia mostrou dilatação cística da via biliar extra-hepática compatível com cisto de colédoco.

Assinale a opção que indica o princípio do tratamento definitivo da forma extra-hepática clássica.

(A) Aspiração percutânea periódica do cisto.
(B) Colecistectomia isolada, mantendo o cisto.
(C) Observação indefinida em pacientes sem febre.
(D) Excisão do segmento cístico e reconstrução da drenagem biliar.

45

Menina de 2 anos apresenta episódios recorrentes de infecção urinária febril. A ultrassonografia demonstrou dilatação discreta do sistema coletor, e há suspeita de refluxo vesicoureteral.

Assinale a opção que indica o exame convencional que permite demonstrar e graduar diretamente o refluxo durante o enchimento e a micção.

(A) Tomografia de tórax.
(B) Endoscopia digestiva alta.
(C) Cistouretrografia miccional.
(D) Radiografia simples do abdome

46

Criança de 3 anos é levada à consulta, após os pais perceberem massa abdominal durante o banho.

Ao exame, apresenta massa abdominal indolor. Não há sinais de abdome agudo.

Assinale a neoplasia renal que deve figurar entre as principais hipóteses.

(A) Osteossarcoma.
(B) Retinoblastoma.
(C) Meduloblastoma.
(D) Nefroblastoma (tumor de Wilms).

47

Criança de 6 anos, em tratamento de pneumonia bacteriana, mantém febre e dificuldade respiratória. A ultrassonografia torácica mostrou derrame pleural volumoso, complexo e septado.

Diante de coleção pleural complicada, assinale a estratégia que pode ser indicada para o caso.

(A) Alta hospitalar e observação domiciliar.
(B) Drenagem pleural associada a tratamento antimicrobiano, considerando fibrinólise intrapleural ou abordagem toracoscópica conforme o caso.
(C) Toracotomia obrigatória como primeira opção em todos os casos.
(D) Suspensão dos antibióticos para aumentar o rendimento das culturas.

48

Adolescente de 13 anos apresenta dor súbita intensa em fossa ilíaca direita, náuseas e vômitos. Ultrassonografia evidencia ovário aumentado associado a massa anexial. Há forte suspeita de torção ovariana.

Assinale a opção que indica o princípio que deve orientar o tratamento.

(A) Iniciar anticoncepcional e observar.
(B) Realizar ooforectomia bilateral profilática.
(C) Aguardar obrigatoriamente 48 horas e repetir a ultrassonografia.
(D) Realizar avaliação cirúrgica urgente visando distorção e preservação ovariana sempre que possível.

49

Recém-nascido apresenta ao nascimento hemiescroto endurecido e aumentado, com testículo de coloração alterada. A avaliação sugere torção testicular neonatal.

Assinale o aspecto que deve ser lembrado na tomada de decisão.

(A) Torção neonatal é sempre bilateral e simultânea.
(B) O tratamento padrão é antibioticoterapia isolada.
(C) Existe possibilidade de acometimento contralateral, inclusive assincrônico, influenciando a estratégia de exploração e fixação.
(D) O testículo contralateral não apresenta qualquer risco.

50

Lactente de 4 meses apresenta abaulamento inguinal direito intermitente, mais evidente durante o choro, facilmente redutível e sem sinais inflamatórios locais.

Assinale o diagnóstico mais provável.

(A) Torção testicular.
(B) Hérnia inguinal indireta.
(C) Linfadenopatia inguinal.
(D) Hidrocele não comunicante.

51

Menino de 10 anos apresenta dor inicialmente periumbilical, posteriormente localizada na fossa ilíaca direita, anorexia, vômitos e febre baixa. Ao exame há defesa localizada.

Assinale o diagnóstico que deve ser considerado prioritariamente.

(A) Apendicite aguda.
(B) Gastroenterite viral.
(C) Constipação funcional.
(D) Infecção urinária baixa.

52

Recém-nascido a termo, com 24 horas de vida, é avaliado antes de procedimento cirúrgico.

Considerando as particularidades fisiológicas do período neonatal, assinale a característica que torna o recém-nascido particularmente suscetível à hipotermia.

(A) Menor relação entre superfície corporal e peso.
(B) Capacidade aumentada de produzir calor por tremores.
(C) Maior relação entre superfície corporal e massa corporal.
(D) Maior quantidade de tecido adiposo subcutâneo isolante.

53

Uma criança de 3 anos será submetida a herniorrafia inguinal eletiva.

Durante a avaliação pré-anestésica, uma condição merece atenção especial porque ela aumenta o risco de eventos respiratórios perioperatórios adversos. Assinale a alternativa que a indica.

(A) Constipação funcional.
(B) Dermatite atópica localizada.
(C) Infecção recente das vias aéreas superiores.
(D) Histórico de hérnia umbilical assintomática.

54

Recém-nascido apresenta exteriorização de alças intestinais por defeito paraumbilical, sem membrana recobrindo as vísceras.

Assinale a opção que apresenta a medida que deve integrar o atendimento inicial.

(A) Iniciar alimentação enteral imediatamente.
(B) Tentar reduzir vigorosamente todas as alças ainda na sala de parto.
(C) Manter as alças expostas para avaliação seriada da coloração.
(D) Proteger as vísceras, prevenir perda térmica e hídrica, realizar descompressão gástrica e iniciar reposição volêmica adequada.

55

Um menino de 7 anos, vítima de colisão automobilística e usuário de cinto de segurança, apresenta equimose transversal na parede abdominal. Inicialmente está hemodinamicamente estável.

Nas horas seguintes, desenvolveu dor abdominal progressiva, taquicardia, defesa e sinais de irritação peritoneal.

Assinale a hipótese que deve receber prioridade.

(A) Gastroenterite coincidente.
(B) Lesão de víscera oca (possível perfuração intestinal).
(C) Apenas contusão superficial da parede abdominal.
(D) Constipação funcional desencadeada pelo trauma.

56

Menino de 11 anos apresenta trauma renal fechado. Após ressuscitação, encontra-se hemodinamicamente estável.

A tomografia demonstra lesão renal, porém há preservação global da perfusão e ausência de outras indicações para laparotomia.

Assinale a opção que indica o princípio mais adequado.

(A) Toda lesão renal pediátrica exige nefrectomia.
(B) Deve-se realizar biópsia renal percutânea imediatamente.
(C) A presença de hematúria determina obrigatoriamente exploração renal.
(D) O tratamento não operatório é apropriado para muitas lesões renais em crianças estáveis.

57

Recém-nascido apresenta volumosa massa sacrococcígea diagnosticada no período pré-natal. Após estabilização e investigação apropriada, indica-se tratamento cirúrgico.

Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

(A) Preservar obrigatoriamente todo o cóccix.
(B) Aspirar o tumor e manter sua cápsula.
(C) Ressecar apenas a porção externa da massa.
(D) Realizar ressecção completa do tumor juntamente com o cóccix.

58

Criança de 2 anos apresenta massa abdominal irregular que ultrapassa a linha média, perda ponderal e irritabilidade. Exames de imagem demonstram massa suprarrenal com calcificações e envolvimento de estruturas vasculares adjacentes.

Indique o exame laboratorial que auxilia particularmente na investigação do diagnóstico suspeito.

(A) Dosagem sérica de troponina.
(B) Dosagem isolada de bilirrubina indireta.
(C) Dosagem urinária de metabólitos das catecolaminas.
(D) Pesquisa de sangue oculto nas fezes como marcador tumoral específico.

59

Recém-nascido masculino apresenta jato urinário fraco, bexiga palpável e hidroureteronefrose bilateral. Exames sugerem obstrução infravesical por válvula de uretra posterior.

Após estabilização inicial, assinale a opção que indica a medida fundamental para aliviar a obstrução urinária.

(A) Nefrectomia bilateral imediata.
(B) Restrição completa de líquidos por 48 horas.
(C) Administração de diuréticos sem drenagem vesical.
(D) Descompressão da bexiga por cateterização adequada.

60

Recém-nascido apresentou diagnóstico pré-natal de Malformação congênita das vias aéreas pulmonares (CPAM), localizada no lobo inferior esquerdo.

Nasceu a termo, sem desconforto respiratório, e permaneceu assintomático. Aos 5 meses, a tomografia computadorizada demonstrou lesão multicística confinada ao lobo inferior esquerdo, sem evidências de infecção e com parênquima pulmonar contralateral normal.

Após discussão multidisciplinar, optou-se pelo tratamento cirúrgico eletivo.

Em relação à estratégia operatória, assinale a afirmativa correta.

(A) A ressecção deve limitar-se aos cistos macroscopicamente identificáveis, preservando obrigatoriamente todo o restante do lobo, pois a lobectomia provoca déficit funcional pulmonar permanente significativo na criança.
(B) A lobectomia do lobo acometido constitui a abordagem cirúrgica consagrada para lesões confinadas a um lobo, podendo ser realizada por técnica minimamente invasiva em pacientes adequadamente selecionados.
(C) A pneumonectomia esquerda constitui a operação de escolha, mesmo nas lesões confinadas a um único lobo, devido ao risco de focos microscópicos de CPAM no restante do pulmão.
(D) A ausência de sintomas durante os primeiros meses de vida constitui indicação para observação definitiva, pois elimina os riscos posteriores de infecção e complicações relacionadas à lesão.

Realização

FGV CONHECIMENTO