**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS**
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

TIPO

1

**MÉDICO RQE**

# CIRURGIÃO PLÁSTICO

**(NÍVEL SUPERIOR)**

**TARDE**

## SUA PROVA E TEMPO

- Este caderno contém **60 (sessenta)** questões objetivas.
- Verifique se este material está completo e corresponde ao cargo e especialidade para o qual você se inscreveu.
- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões nem qualquer tipo de anotação de suas respostas.
- **30 (trinta) minutos** antes do término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.

## NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões.
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

## INFORMAÇÕES GERAIS

- **ATENÇÃO! Confirme se o TIPO da sua prova é o mesmo no seu CARTÃO DE RESPOSTAS.**
- No cartão de respostas, confira seu nome, número de inscrição e documento de identidade.
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas no espaço reservado no cartão de respostas.
- O preenchimento do cartão de respostas é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição em caso de erro cometido por você.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

**Boa prova!**

FGV CONHECIMENTO

# Conhecimentos Gerais
# Língua Portuguesa

**1**

Leia o pequeno texto a seguir.

*Alguns jornais noticiam que os médicos cardiológicos da Rússia, e não dos Estados Unidos ou Alemanha, mostram melhores resultados no combate às doenças do coração e nos transplantes.*

Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) Classifica-se como texto publicitário, valorizando a Cardiologia na Rússia.
(B) Mostra-se como um texto expositivo informativo, que divulga notícias jornalísticas.
(C) Trata-se de um texto argumentativo, em que a tese defende melhor situação da Cardiologia na Rússia.
(D) Identifica-se como texto argumentativo, fundamentado numa contra-argumentação, negando a preponderância dos EUA ou da Alemanha.

**2**

Leia o texto abaixo sobre Cardiologia Pediátrica:

*A Cardiologia Pediátrica é uma especialidade médica que se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas em crianças, desde o nascimento até a adolescência. Esta área da medicina é fundamental, uma vez que as condições cardíacas podem se manifestar de maneiras diferentes em crianças em comparação aos adultos. Os cardiologistas pediátricos são profissionais altamente treinados que compreendem as particularidades do sistema cardiovascular em desenvolvimento, permitindo um atendimento mais eficaz e direcionado.*

Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) O primeiro período do texto define a Cardiologia Pediátrica por meio de uma palavra geral (especialidade) e com a indicação da sua finalidade.
(B) O segundo período do texto mostra as diferenças entre a Cardiologia destinada a crianças e a adultos.
(C) O último período do texto mostra a Cardiologia Pediátrica como uma ciência avançada, mas ainda em desenvolvimento.
(D) O texto tem a finalidade de divulgar a Cardiologia Pediátrica como uma área de grande futuro profissional.

**3**

Os dicionários Houaiss e Aurélio de Língua Portuguesa definem "alergia" do seguinte modo:

Houaiss: *reação normal e específica do organismo após sensibilização por uma substância estranha que não gera problemas na maioria dos indivíduos.*

Aurélio: *designação de estado de hipersensibilidade causado por exposição a determinado antígeno, dito alergênio, sendo observadas reações imunológicas nocivas se houver subsequentes exposições a este mesmo alergênio.*

Em relação a essas definições, assinale a afirmativa correta.

(A) A definição de Houaiss é mais técnica e profissional que a definição de Aurélio.
(B) A definição de Aurélio parece ser direcionada a profissionais médicos.
(C) As definições dadas definem o termo de forma completamente distinta, como se considerassem a alergia como realidades diferentes.
(D) Enquanto a definição de Aurélio mostra-se mais como um texto de divulgação ampla, a de Houaiss mostra-se mais culta.

**4**

Leia o texto a seguir.

*A Anestesiologia é a área da Medicina responsável por proporcionar alívio ou ausência de dor e outras sensações durante procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos, monitorando e acompanhando as funções vitais do paciente antes, durante e após a intervenção.*

*Além do período intraoperatório, o anestesiologista atua no pré-operatório, avaliando riscos e condições do paciente, e no pós-operatório, acompanhando a recuperação e prevenindo complicações.*

Assinale a opção que indica os termos do texto que funcionam como sinônimos.

(A) "alívio ou ausência de dor".
(B) "riscos e condições do paciente".
(C) "monitorando e acompanhando".
(D) "procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos".

**5**

Leia o texto abaixo com atenção.

*A natureza humana é a obra de Deus que resulta mais elevada do que todas as outras, pouco menor do que a natureza angélica; ela reúne a natureza intelectual e a sensível e comporta em si mesma todas as coisas, de tal forma que é chamada justamente pelos antigos de microcosmo ou pequeno mundo.*

Sobre um termo desse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) Em "a obra de Deus", a locução "de Deus" equivale ao adjetivo "religiosa".
(B) O pronome relativo "que" na frase "que resulta" se refere ao antecedente "Deus".
(C) A frase "mais elevada do que todas as outras" exemplifica uma construção de superlativo.
(D) No termo "natureza angélica" o adjetivo "angélica" se prende, semanticamente, ao substantivo "anjo".

**6**

Assinale a opção que apresenta a frase *em ordem direta*.

(A) Grande segredo é a vida.
(B) A ninguém foi dada a posse da vida.
(C) Viver é minha profissão e minha arte.
(D) À diferença de outras doenças, a vida é sempre mortal.

**7**

Assinale a frase que se enquadra no *uso de linguagem popular*.

(A) Quem compra a imitação, merece-a.
(B) Aceite o desafio de voar com a nossa companhia.
(C) Errar é humano, vender abaixo do custo é divino.
(D) Claro, você pode andar por aí com uma carteira recheada. Mas para quê?

**8**

Assinale a opção que apresenta o texto que pode ser classificado como *narrativo*.

(A) Os profissionais da saúde estavam em um congresso.
(B) Faça o possível para não chegar atrasado ao seu emprego.
(C) O médico chegou ao hospital e dirigiu-se rapidamente ao quarto do paciente.
(D) Todos os remédios estavam enfileirados na prateleira, disponíveis para o consumo.

**9**

Assinale a frase que tem corretamente indicado o antecedente do termo sublinhado.

(A) A cura do doente ***que*** está no quarto 12 não vai tardar / cura.
(B) O vidro de remédio ***que*** está sobre a mesa foi trazido pelo paciente / remédio.
(C) As receitas do médico ***que*** foram solicitadas ontem já estão sobre a mesa do consultório / receitas.
(D) O médico e a enfermeira ***que*** trabalharam juntos na operação da manhã são meus amigos / enfermeira.

**10**

Assinale a frase abaixo em que ocorre mistura ***indevida*** de tratamentos.

(A) V. Exa. deve mudar de estratégia.
(B) Eu te vi de braços dados com sua esposa.
(C) Nunca mais os encontrei com os filhos deles.
(D) Vi seu carro na garagem, mas não encontrei você.

## Matemática e Raciocínio Lógico

**11**

Uma clínica reservou R$ 40.000,00 para a futura aquisição de um equipamento.

Enquanto aguardava a compra, aplicou integralmente esse valor a uma taxa efetiva de 5% ao semestre, sob o regime de juros compostos com capitalização semestral. O dinheiro permaneceu aplicado durante exatamente dois semestres completos.

Durante esse período, não houve depósitos, retiradas, cobrança de tarifas ou incidência de tributos.

Ao final desse período, o montante da aplicação era de

(A) R$ 42.000,00.
(B) R$ 44.000,00.
(C) R$ 44.100,00.
(D) R$ 46.305,00.

**12**

Para escolher dois representantes para uma comissão interna, um hospital realizará um sorteio entre oito médicos.

Para fins desse sorteio, os profissionais foram distribuídos, sem sobreposição, da seguinte maneira:

- quatro cardiologistas;
- dois anestesiologistas; e
- dois especialistas em Imunologia.

Os dois representantes serão sorteados sucessivamente, sem reposição, e cada médico ainda não sorteado terá a mesma probabilidade de ser escolhido.

A probabilidade de que pelo menos um dos dois médicos sorteados não seja cardiologista é de

(A) 3/16.
(B) 3/14.
(C) 11/16.
(D) 11/14.

**13**

Em determinada manhã, um hospital realizou um atendimento de cada uma das seguintes especialidades: Cardiologia, Anestesiologia, Imunologia e Dermatologia.

Os quatro atendimentos ocorreram às 8h, às 9h, às 10h e às 11h, com apenas um atendimento em cada horário.

Sabe-se que:

- o atendimento de Dermatologia ocorreu no horário imediatamente seguinte ao de Cardiologia;
- o atendimento de Anestesiologia ocorreu antes dos atendimentos de Imunologia e de Cardiologia; e
- o atendimento de Imunologia não ocorreu às 9h.

Com base nessas informações, o atendimento de Cardiologia ocorreu às

(A) 8h.
(B) 9h.
(C) 10h.
(D) 11h.

**14**

Durante uma auditoria interna, um hospital estabeleceu metas para a quantidade de prontuários que deveriam ser analisados em etapas sucessivas.

As metas das cinco primeiras etapas formaram a seguinte sequência:

10, 13, 17, 22, 28.

Da primeira para a segunda etapa, houve um acréscimo de 3 prontuários. Em cada transição seguinte, o acréscimo foi uma unidade maior do que o anterior.

Mantida essa regra, é correto concluir que 73 será a meta da etapa

(A) 9.
(B) 10.
(C) 11.
(D) 12.

**15**

Considere as proposições simples relativas à avaliação de um paciente:

p: “O paciente apresentou febre.”

q: “O paciente apresentou tosse.”

A partir dessas proposições, foi construída a proposição composta

$$(p \vee q) \wedge \neg p.$$

Ao elaborar a tabela-verdade dessa proposição composta, verifica-se que ela é verdadeira somente quando o paciente

(A) apresentou febre e tosse.
(B) apresentou febre, mas não apresentou tosse.
(C) não apresentou febre, mas apresentou tosse.
(D) não apresentou febre nem tosse.

**16**

Em um projeto de digitalização, 4 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, durante 5 dias, digitalizaram 480 prontuários.

Em uma nova etapa do projeto, deverão ser digitalizados 960 prontuários. Para isso, seis funcionários trabalharão 8 horas por dia.

Considere que todos os funcionários apresentam a mesma produtividade por hora nas duas etapas, que os prontuários exigem o mesmo tempo de processamento e que o trabalho pode ser dividido igualmente entre eles.

Nessas condições, o número de dias de trabalho necessários para digitalizar os 960 prontuários será

(A) 5.
(B) 6.
(C) 8.
(D) 9.

**17**

Para permitir o acesso temporário a determinado sistema hospitalar, serão criados códigos formados por três algarismos distintos, escolhidos entre 1, 2, 3, 4 e 5.

Por exigência do sistema, o primeiro algarismo do código deve ser ímpar e o último deve ser par. Não há outras restrições.

Dois códigos são considerados diferentes quando diferem em pelo menos uma posição. Por exemplo, 124 e 142 são códigos distintos.

Assinale a opção que indica a quantidade de códigos distintos que podem ser criados nessas condições.

(A) 18.
(B) 24.
(C) 48.
(D) 60.

**18**

Em um relatório sobre os atendimentos realizados em determinado turno, foi registrada a seguinte afirmação:

*"Todos os pacientes encaminhados ao setor de Cardiologia foram avaliados por um cardiologista e realizaram pelo menos um exame complementar."*

Considerando o conectivo "***ou***" em seu sentido lógico inclusivo, a negação dessa afirmação é:

(A) Todos os pacientes encaminhados ao setor de Cardiologia não foram avaliados por um cardiologista ou não realizaram nenhum exame complementar.
(B) Nenhum paciente encaminhado ao setor de Cardiologia foi avaliado por um cardiologista, e nenhum deles realizou exame complementar.
(C) Existe pelo menos um paciente encaminhado ao setor de Cardiologia que não foi avaliado por um cardiologista e não realizou nenhum exame complementar.
(D) Existe pelo menos um paciente encaminhado ao setor de Cardiologia que não foi avaliado por um cardiologista ou não realizou nenhum exame complementar.

# História e Geografia do Tocantins

**19**

Leia o texto a seguir.

*O estado do Tocantins foi o último estado subnacional criado no Brasil, instituído a partir da promulgação da Constituição de 1988, por meio do artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Porém, o projeto que se viabilizou em 1988 não pode ser considerado o marco inicial para o entendimento das questões relativas à criação do estado do Tocantins. Houve uma intensa luta ao longo do tempo para a autodeterminação política dessa região, cujas primeiras manifestações apareceram ainda no século XVIII e somente foram concretizadas no final do século XX.*

Adaptado de FEITOSA, Cid. A criação do estado do Tocantins no Norte do Brasil. América Latina en la Historia Económica, vol.31 no.1, 2025.

Considerando o trecho e o processo histórico de formação do Tocantins, assinale a afirmativa correta.

(A) No período colonial, as bandeiras paulistas deram origem às primeiras reivindicações separatistas do norte de Goiás em relação à capitania, em busca da autonomia necessária à continuidade da escravização indígena.
(B) Em 1809, foi criada a Comarca do Norte, cuja hegemonia econômica, favorecida pela proximidade de Vila Boa, estimulou as primeiras reivindicações separatistas contra o centro-sul de Goiás, região de baixa produção aurífera.
(C) Em 1821, a Comarca do Norte de Goiás proclamou sua autonomia político-administrativa, posteriormente suprimida em 1823, em meio a reivindicações contra a elevada carga tributária e o abandono político da região.
(D) Em 1988, a criação do estado do Tocantins incorporou todo o território que havia pertencido à antiga Comarca do Norte de Goiás, incluindo as regiões das minas do Tocantins e do norte goiano.

**20**

As bonecas Karajá Ritxòkò constituem uma importante referência cultural dos povos indígenas que habitam a região do rio Araguaia. Produzidas tradicionalmente pelas mulheres Karajá, as peças articulam técnicas de cerâmica, pintura, ornamentação e conhecimentos transmitidos entre gerações, além de desempenharem papel na transmissão de valores, histórias e mitos às crianças.

Considerando essas características, é correto afirmar que as Ritxòkò constituem patrimônio

(A) arqueológico, por representarem vestígios materiais de antigas práticas cerâmicas dos Karajá, preservados como testemunhos de sua ocupação no vale do Araguaia.
(B) material, em razão de sua natureza cerâmica e artesanal, com peças singulares que expressam a cosmologia Karajá.
(C) imaterial, uma vez que seu principal valor reside nos saberes, técnicas e significados próprios da cultura Karajá, transmitidos entre gerações.
(D) paisagístico, pois sua produção e seus significados estão diretamente associados ao território tradicionalmente ocupado pelos Karajá, às margens do rio Araguaia.

**21**

O estado do Tocantins apresenta significativa diversidade ambiental, com diferentes ecossistemas e paisagens protegidos por unidades de conservação de âmbito federal e estadual. Essas áreas desempenham papel relevante na preservação da biodiversidade e dos recursos naturais do estado.

A respeito das unidades de conservação no estado do Tocantins, assinale a afirmativa correta.

(A) O Parque Nacional do Araguaia protege uma área de elevada diversidade ecológica, marcada por características de transição entre ambientes do Cerrado e da Amazônia.

(B) O Parque Estadual do Jalapão foi instituído para conservar remanescentes do bioma Mata Atlântica, constituindo um importante refúgio florestal do território tocantinense.

(C) O Parque Estadual do Cantão caracteriza-se por abrigar predominantemente formações campestres de Cerrado, associadas à vegetação típica do planalto central brasileiro.

(D) O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba está integralmente situado no Tocantins e tem por finalidade resguardar formações florestais amazônicas no extremo norte do estado.

**22**

Desde 2024, a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN) adota uma nova regionalização para aperfeiçoar o planejamento e as políticas públicas no Tocantins. Essa organização territorial divide o estado em oito regiões de planejamento, agrupadas em três grandes macrorregiões.

Considerando a lógica dessa divisão territorial, assinale a afirmativa correta.

(A) A divisão baseia-se em critérios técnicos, como a polarização das cidades, os fluxos agropecuários e as características histórico-sociais.

(B) A Macrorregião Sul abrange a maior densidade urbana do estado por sediar a capital, Palmas, e os principais eixos industriais.

(C) A Macrorregião Norte foi delineada com foco exclusivo na proteção ambiental, sendo vedada a atividade agropecuária em seus limites.

(D) A divisão extinguiu a autonomia política dos municípios, que passaram a ser geridos diretamente pelas sedes macrorregionais.

**23**

Leia o trecho a seguir.

*"Um ecótono é uma região resultante do contato entre dois ou mais biomas fronteiriços. São áreas de transição ambiental, onde entram em contato diferentes comunidades ecológicas – isto é, a totalidade da flora e fauna que faz parte de um mesmo ecossistema e suas interações. Por isso, os ecótonos são ricos em espécies, sejam elas provenientes dos biomas que o formam ou espécies únicas (endêmicas) surgidas nele mesmo".*

Disponível em: https://oeco.org.br/dicionario-ambiental/28830-o-que-sao-ecotonos/. Acesso em: 25 de out. de 2026.

O estado do Tocantins está situado na transição entre diferentes biomas brasileiros. Um dos ecótonos mais importantes do estado está situado na transição entre Cerrado e Amazônia.

Assinale a opção que indica essa região.

(A) Jalapão.

(B) Gurupi.

(C) Porto Nacional.

(D) Bico do Papagaio.

**24**

A rodovia BR-153 (Rodovia Belém-Brasília) desempenhou um papel central na configuração socioeconômica e na organização do espaço que hoje compõe o estado do Tocantins. A abertura dessa via de circulação, a partir de meados do século XX, alterou profundamente a dinâmica da região.

Considerando os impactos históricos e geográficos da BR-153 na formação territorial tocantinense, assinale a afirmativa correta.

(A) A implantação da via isolou economicamente o norte do Estado, forçando a população a migrar exclusivamente para o bioma amazônico.

(B) O traçado da rodovia priorizou a integração com a região Norte, deixando o interior do Tocantins dependente do transporte hidroviário.

(C) A rodovia perdeu sua relevância logística após a criação de Palmas, que centralizou todos os fluxos de mercadorias no leste do estado.

(D) A rodovia funcionou como um eixo de integração, estimulando o surgimento de cidades e o fluxo migratório para o seu entorno.

## Legislação (SUS)

**25**

O Decreto nº 7.508/2011 estabeleceu o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) como instrumento de gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre o COAP, de acordo com esse decreto, assinale a afirmativa correta.

(A) Um instrumento voltado à formalização de contratos entre gestores do SUS e prestadores privados.

(B) Um mecanismo destinado à participação da comunidade na formulação das políticas públicas de saúde.

(C) Um acordo de colaboração entre os entes federativos para organizar e integrar as ações e os serviços de saúde.

(D) Um instrumento destinado à definição das diretrizes nacionais para a incorporação de tecnologias em saúde.

**26**

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma estratégia do Ministério da Saúde que busca efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão.

Com base nos conceitos estabelecidos pela PNH, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A transversalidade é um princípio da PNH que busca a transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos.

( ) O princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão considera a autonomia e o protagonismo dos sujeitos inseridos no processo de cuidado, incentivando a participação ativa de usuários, trabalhadores e gestores na construção dos processos de saúde.

( ) A clínica ampliada pressupõe uma abordagem interdisciplinar que considera a singularidade do sujeito, buscando compreender o processo de adoecimento em seu contexto de vida e ampliar as possibilidades de cuidado.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – V – F.

(B) V – F – V.

(C) F – F – F.

(D) V – V – V.

**27**

Leia o trecho a seguir.

*Para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, gestores de municípios próximos estabeleceram uma atuação articulada no território, buscando organizar a oferta dos serviços de acordo com as necessidades da população.*

Assinale a opção que indica o princípio do SUS a que essa iniciativa está diretamente relacionada.

(A) Integralidade.
(B) Universalidade.
(C) Regionalização.
(D) Descentralização.

**28**

Sobre os princípios específicos da prestação de serviços de saúde por meio da telessaúde, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa correta.

(A) O registro e o rastreamento obrigatório das consultas realizadas.
(B) A autonomia relativa do profissional na prestação do atendimento.
(C) O consentimento livre e informado do paciente para o atendimento.
(D) O atendimento presencial obrigatório antes da consulta por telessaúde.

**29**

Os Conselhos de Saúde são instâncias de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde.

Acerca dessas instâncias, assinale a afirmativa correta.

(A) São responsáveis por decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS.
(B) Devem reunir-se a cada quatro para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
(C) Possuem competência para determinar a distribuição dos recursos financeiros entre os entes federativos, conforme as necessidades locais identificadas.
(D) São órgãos de caráter permanente e deliberativo que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

**30**

Sobre as condições para a participação complementar no Sistema Único de Saúde (SUS), com base nas disposições da Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas a seguir.

I. A participação complementar dos serviços privados deve ser formalizada mediante contrato ou convênio, observadas as normas de Direito Público.
II. Os serviços contratados deverão submeter-se às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
III. Na contratação de serviços privados em caráter complementar, as entidades filantrópicas terão preferência sobre as entidades sem fins lucrativos.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

# Conhecimentos Específicos

**31**

Em relação às fraturas isoladas do arco zigomático, assinale a afirmativa correta.

(A) A diplopia é o achado clínico mais frequente, pois a fratura isolada do arco zigomático costuma envolver diretamente o assoalho orbitário.
(B) A hipoestesia no território do nervo infraorbitário é manifestação obrigatória, mesmo quando a fratura se limita ao arco zigomático.
(C) O deslocamento medial do arco zigomático pode causar limitação da abertura bucal por impactação sobre o processo coronoide da mandíbula.
(D) O tratamento de escolha é sempre a redução aberta com fixação interna rígida, independentemente do grau de deslocamento ou da repercussão funcional.

**32**

Paciente de 47 anos, em avaliação pré-operatória para mastopexia com inclusão de implantes mamários, realiza mamografia de rotina que evidencia achado classificado como BI-RADS 4.

Considerando o caráter eletivo do procedimento e a classificação mamográfica encontrada, assinale a opção que apresenta a conduta mais adequada.

(A) Solicitar apenas controle mamográfico em 6 meses e manter a programação cirúrgica.
(B) Prosseguir com a mastopexia com implantes, pois o BI-RADS 4 não contraindica cirurgia estética mamária.
(C) Indicar ressonância magnética das mamas como substituto da biópsia e liberar a paciente para cirurgia se o exame for inconclusivo.
(D) Postergar o procedimento estético e encaminhar a paciente para investigação diagnóstica do achado, preferencialmente com biópsia percutânea guiada por imagem.

**33**

Em relação às opções de reconstrução de defeitos moderados a extensos do couro cabeludo, especialmente aquelas que utilizam tecidos locais da região fronto-temporal, assinale a afirmativa correta.

(A) É uma técnica indicada apenas quando há exposição óssea extensa, devendo ser empregada exclusivamente após expansão tecidual prévia.
(B) Trata-se de um retalho locorregional de transposição baseado na vascularização temporal superficial, capaz de proporcionar cobertura de defeitos moderados a extensos do couro cabeludo com boa confiabilidade vascular.
(C) Consiste em um retalho local de avanço utilizado preferencialmente para defeitos centrais do couro cabeludo inferiores a 2 cm, sem necessidade de preservação de pedículo vascular específico.
(D) Constitui um retalho axiale que depende obrigatoriamente da inclusão do periósteo para manutenção da sua viabilidade, independentemente da integridade do plexo vascular do escalpo.

**34**

Em relação à fissura labiopalatina, segundo a Classificação de Veau, assinale a opção que corresponde à fissura do tipo III.

(A) Fissura do palato mole.
(B) Fissura unilateral completa.
(C) Fissura bilateral completa.
(D) Fissura labial anterior.

**35**

Segundo a classificação de Kernahan para as fissuras lábio-palatais, assinale a afirmativa correta.

(A) A classificação divide as fissuras em 4 tipos: palato mole, palato mole e duro, fissura labiopalatal unilateral completa e fissura bilateral completa.
(B) É uma classificação em Y com os braços anteriores correspondendo aos lados direito e esquerdo das fissuras do palato secundário.
(C) A classificação apresenta a limitação de não definir a lateralidade da fissura do palato secundário.
(D) O braço posterior corresponde aos palatos duro e mole pré-forame incisivo.

**36**

Nas fraturas mandibulares, a presença de mordida aberta anterior está associada ao seguinte padrão de fratura:

(A) arco zigomático.
(B) bilateral do côndilo mandibular.
(C) cominutiva do arco central da mandíbula.
(D) parasinfisária com colo condílico contra lateral associado.

**37**

Em relação à síndrome de Moebius, assinale a afirmnativa que ***não*** corresponde a uma manifestação típica da doença.

(A) Coloboma palpebral associado à hipoplasia zigomática bilateral.
(B) Pé torto congênito e outras anomalias musculoesqueléticas dos membros.
(C) Paralisia facial congênita, uni ou bilateral, por acometimento do VII par craniano.
(D) Paralisia do VI par craniano, com limitação da abdução ocular e estrabismo convergente.

**38**

Em relação às complicações e às indicações de reoperação nas reconstruções mamárias com expansores teciduais e implantes, assinale a afirmativa ***incorreta***.

(A) A infecção é, de forma geral, a causa mais comum de reoperação em pacientes submetidas à reconstrução com expansor/implante.
(B) Nos casos de extrusão de implantes por espessura inadequada da pele e subcutâneo, a primeira escolha será reconstrução co retalhos miocutaneos.
(C) A necrose do envelope cutâneo pós-mastectomia pode comprometer a reconstrução protética e é relatada em séries clínicas com taxas que podem chegar a cerca de 21%.
(D) A contratura capsular clinicamente significativa, graus Baker III/IV, pode ocorrer após reconstrução com implantes de silicone ou salina, com taxas descritas em torno de 16% a 30%.

**39**

Assinale a opção que apresenta a contraindicação absoluta para a realização do retalho TRAM com transposição de base superior na reconstrução mamária.

(A) Pacientes com IMC acima de 30.
(B) Paciente nulípara, em idade reprodutiva.
(C) Paciente com cicatrizes na região abdominal inferior.
(D) Divisão prévia do pedículo superior do retalho, geralmente relacionada a incisão transversal de laparotomia na região abdominal superior.

**40**

A inalação de fumaça provoca mais de 50% das mortes relacionadas com o fogo, mesmo quando os pacientes não apresentam graves queimaduras cutâneas. Sobre lesão por inalação, assinale a afirmativa correta.

(A) O calor geralmente causa lesão sub glótica.
(B) Pacientes com níveis de carboxi-hemoglobina por volta 35% apresentam depressão respiratória e coma.
(C) A gasometria arterial poderá revelar acidose metabólica e níveis elevados de carboxi-hemoglobina, mas pode não mostrar hipóxia.
(D) O oxigênio hiperbárico também é recomendado para mulheres gestantes e crianças com níveis de carboxi-hemoglobina acima de 25%.

**41**

Um jovem foi vítima de trauma de na orelha, que causou um grande defeito no terço médio auricular.

As principais técnicas de reconstrução indicadas nesse caso seriam

(A) Converse e Dieffenbach.
(B) Tanzer e Furnas.
(C) Tanzer e Brent.
(D) Antia e Buch.

**42**

Segundo a classificação vascular de Mathes e Nahai aplicada aos retalhos musculares, um músculo classificado como Tipo I apresenta

(A) um único pedículo vascular dominante.
(B) dois pedículos vasculares dominantes independentes.
(C) múltiplos pedículos vasculares segmentares, sem pedículo dominante.
(D) um pedículo vascular dominante associado a múltiplos pedículos menores.

**43**

Um paciente de 60 anos, apresenta parestesia progressiva dos quarta e quinto quirodáctilos, sem outras sintomatologias. Assinale a opção que apresenta a hipótese diagnostica mais provável

(A) Síndrome do túnel cubital.
(B) Síndrome do túnel do carpo.
(C) Síndrome do pronador redondo.
(D) Tenossinovite de De Quervain.

**44**

Paciente adulto apresenta contratura cicatricial linear na região cervical anterior, após queimadura antiga, com limitação progressiva da extensão do pescoço.

A cicatriz é paralela ao eixo de maior tensão cutânea, e há pele adjacente parcialmente disponível, mas pouco elástica.

Em relação ao planejamento da zetaplastia, assinale a afirmativa correta.

(A) A zetaplastia está contraindicada nesse caso, pois cicatrizes cervicais por queimadura devem ser tratadas exclusivamente com enxertos de pele.
(B) A zetaplastia apenas melhora o aspecto estético da cicatriz, sem efeito relevante sobre a contratura ou sobre a redistribuição das forças de tensão.
(C) Ângulos menores que 30° são preferidos em áreas cervicais, pois aumentam o ganho de comprimento e reduzem o risco de necrose das pontas dos retalhos.
(D) A zetaplastia de 60° é uma opção clássica para alongar e reorientar a cicatriz, com ganho teórico aproximado de 75%, embora o resultado real dependa da elasticidade e vascularização locais.

**45**

Assinale a opção que mostra, corretamente, a diferença entre cicatrização por primeira e segunda intenção.

(A) Primeira: coaptação primária; segunda: granulação, contração e epitelização.
(B) Primeira: granulação exuberante; segunda: coaptação imediata das bordas.
(C) Primeira: maior contração; segunda: menor tecido de granulação.
(D) Primeira: cicatriz ampla; segunda: fechamento rápido e linear.

**46**

O ramo do facial mais lesado nas ritidoplastias é o

(A) cervical.
(B) temporal.
(C) zigomático.
(D) marginal mandibular.

**47**

Lactente com sindactilia congênita simples entre dedos centrais da mão, sem fusão óssea ao exame radiográfico. Considerando os princípios clássicos do tratamento cirúrgico, assinale a opção que apresenta a técnica mais empregada e a idade habitual para correção.

(A) Liberação com incisões em zigue-zague, reconstrução da comissura com retalho dorsal e enxerto de pele total, preferencialmente entre 12 e 18 meses.
(B) Liberação linear simples, sem retalhos ou enxertos, preferencialmente após os 6 anos.
(C) Enxertia cutânea isolada na comissura, sem separação digital, no período neonatal.
(D) Amputação parcial do raio acometido, reservando a reconstrução para a adolescência.

**48**

Paciente apresenta fissura craniofacial oblíqua que se inicia entre o filtro labial e a comissura oral, segue lateralmente à asa nasal pela bochecha, compromete a pálpebra inferior lateral ao ponto lacrimal e pode estar associada à microftalmia.

Para esse paciente, o diagnóstico mais provável é Fissura de Tessier

(A) número 3.
(B) número 4.
(C) número 5.
(D) número 7.

**49**

Paciente previamente mastectomizada procura reconstrução mamária autóloga.

A região abdominal não é considerada boa área doadora por cicatrizes prévias e pouca disponibilidade de tecido. Discute-se, então, a possibilidade de reconstrução com retalho miocutâneo transverso do grácil, também conhecido como TUG/TMG.

Sobre esse retalho nas reconstruções mamárias, assinale a afirmativa ***incorreta.***

(A) Pode ser retirado com a paciente em posição supina.
(B) A técnica fornece tecidos moles facilmente moldáveis.
(C) Possui pedículo longo, o que facilita a microanastomose.
(D) É usado na ausência de outras alternativas de reconstrução autóloga.

**50**

Considerando que a ginecomastia pode decorrer de desequilíbrio entre a ação estrogênica e androgênica no tecido mamário, inclusive por efeito medicamentoso, assinale a opção que contém o fármaco ***não*** classicamente relacionado à sua gênese.

(A) Cimetidina.
(B) Cetoconazol.
(C) Paracetamol.
(D) Espironolactona.

**51**

Os queloides representam um desafio terapêutico para o cirurgião plástico por seu comportamento fibroproliferativo, tendência à recidiva e características clínicas peculiares.

Em relação aos queloides, assinale a afirmativa ***incorreta***.

(A) São incomuns nas palmas das mãos e plantas dos pés.
(B) São mais frequentes em indivíduos com maior pigmentação cutânea.
(C) Ultrapassam as bordas da ferida original, invadindo pele previamente normal.
(D) Caracterizam-se pela presença constante de grande quantidade de miofibroblastos com expressão de alfa-actina de músculo liso.

**52**

Sobre os princípios básicos da técnica microcirúrgica, que devem ser do conhecimento de todo cirurgião plástico, assinale a afirmativa ***incorreta***.

(A) Caso vasoespasmo, as veias, menos suscetíveis e menos refratárias ao tratamento.
(B) A sutura contínua é uma técnica adequada para vasos de calibres minimamente discrepantes.
(C) A anastomose termino- terminal utilizando pontos separados é de longe a técnica mais comumente utilizada.
(D) Os agentes mais comumente usados para o tratamento do vasoespasmo são papaverina, lidocaína e bloqueadores de canal de cálcio.

**53**

Paciente masculino, 63 anos, apresenta melanoma cutâneo extensivo superficial no membro inferior direito, com espessura de Breslow de 2,2 mm e ulceração.

Considerando os fatores prognósticos e a conduta cirúrgica no melanoma cutâneo, assinale a afirmativa correta.

(A) A espessura de Breslow e a ulceração são fatores prognósticos importantes e aumentam o risco de comprometimento do linfonodo sentinela.
(B) Para melanomas com espessura maior que 2,0 mm, recomenda-se excisão com margem cirúrgica de 2,0 cm, quando anatomicamente factível.
(C) A desidrogenase lática sérica (DHL) é útil como marcador prognóstico nos pacientes com melanoma metastático.
(D) Na ausência de linfonodo sentinela positivo, não há indicação de dissecção linfonodal regional eletiva.

**54**

A toxina botulínica tipo A é amplamente utilizada em cosmiatria e em diversas indicações terapêuticas.

A toxina botulínica tipo B, representada pela rimabotulinumtoxin B, tem características farmacológicas e clínicas próprias.

Em relação à toxina botulínica tipo B, assinale a afirmativa correta.

(A) Apresenta início de ação mais lento do que a toxina botulínica tipo A.
(B) Costuma causar menor dor no local da aplicação por apresentar pH mais fisiológico.
(C) É indicada para o tratamento de adultos com distonia cervical, reduzindo a postura anormal da cabeça e a dor cervical associada.
(D) Pode ser considerada em casos selecionados de falha de resposta à toxina botulínica tipo A, especialmente quando há suspeita de resistência imunológica.

**55**

O tratamento cirúrgico do pescoço é etapa fundamental no rejuvenescimento cervicofacial, pois envolve avaliação do platisma, gordura submentoniana, glândulas salivares e contorno mandibulocervical.

Em relação a essa abordagem cirúrgica, assinale a afirmativa correta.

(A) Na suspeita de sialocele ou fístula salivar, a análise do líquido aspirado pode demonstrar elevação de amilase salivar.
(B) As bandas platismais decorrem exclusivamente da flacidez cutânea cervical, sem participação da contração muscular ou das adesões fasciais.
(C) A interdigitação completa dos músculos platismais desde a sínfise mandibular até a cartilagem tireoide é a apresentação anatômica mais comum.
(D) Na abordagem da glândula submandibular durante o rejuvenescimento cervical, o conhecimento da anatomia subplatismal é essencial para reduzir riscos de sangramento e lesão de estruturas nobres.

**56**

A análise anatômica e estética do nariz é fundamental no planejamento da rinoplastia, especialmente quanto aos ângulos faciais, à base nasal, ao suprimento vascular cutâneo e aos planos de dissecção.

Sobre a anatomia nasal e sua aplicação cirúrgica, assinale a afirmativa correta.

(A) Na vista basal, a base nasal deve apresentar alargamento fixo de 2 cm em todos os pacientes.
(B) A secção isolada da artéria columelar durante a abordagem nasal externa causa, de forma previsível, necrose cutânea da ponta nasal.
(C) O ângulo nasolabial ideal é geralmente maior nas mulheres do que nos homens, situando-se aproximadamente em 95°–105° no sexo feminino e 90°–95° no sexo masculino.
(D) A dissecção subdérmica agressiva, como no desengorduramento excessivo da ponta nasal, pode comprometer o delicado suprimento vascular da pele e resultar em necrose cutânea.

**57**

Diferentes tecnologias foram desenvolvidas para auxiliar a lipoaspiração, incluindo métodos mecânicos, ultrassônicos e a laser.

A escolha da técnica depende da área tratada, do grau de fibrose, da experiência do cirurgião e dos objetivos de contorno corporal.

Sobre as modalidades de lipoaspiração assistida, assinale a afirmativa ***incorreta.***

(A) A lipoaspiração assistida por ultrassom (UAL) utiliza energia ultrassônica para emulsificar a gordura, facilitando sua remoção por sucção.
(B) Entre as vantagens da UAL estão a menor fadiga do cirurgião e a utilidade em áreas fibróticas ou em procedimentos secundários.
(C) A lipoaspiração VASER corresponde a uma tecnologia assistida por laser, que utiliza sondas sólidas para fornecer energia luminosa ao tecido adiposo.
(D) A lipoaspiração assistida por potência (PAL) utiliza movimento mecânico da cânula, reduzindo o esforço físico do cirurgião e facilitando a aspiração em áreas extensas ou fibrosas.

**58**

A braquioplastia é frequentemente indicada no contorno corporal pós-bariátrico para tratar excesso cutâneo e adiposo dos braços. Seu planejamento deve considerar a posição da cicatriz, a preservação da fáscia profunda e o risco de lesão de estruturas neurovasculares superficiais.

Sobre a anatomia cirúrgica da braquioplastia, assinale a afirmativa correta.

(A) A parestesia definitiva da face medial do braço é inevitável e deve ser esperada na maioria dos pacientes.

(B) A incisão deve ser planejada em plano profundo, com violação deliberada da fáscia braquial para facilitar a ressecção cutânea.

(C) Os ramos cutâneos mediais do braço, incluindo o nervo intercostobraquial, podem ser lesados durante a dissecção, causando alterações sensitivas.

(D) Ao longo de todo o braço e cotovelo, as principais estruturas neurovasculares permanecem superficiais à fáscia profunda, estando igualmente expostas à lesão.

**59**

O conhecimento da anatomia da região glútea é essencial para o planejamento de retalhos, infiltrações, enxertos de gordura e procedimentos reconstrutivos ou estéticos.

Em relação aos músculos glúteos médio e mínimo, sua inervação e vascularização, assinale a afirmativa ***incorreta***.

(A) O músculo glúteo médio é inervado pelo nervo glúteo superior.

(B) A vascularização principal dos músculos glúteos médio e mínimo é proveniente de ramos da artéria glútea superior.

(C) O músculo glúteo mínimo é inervado pelo nervo glúteo inferior e vascularizado predominantemente pela artéria glútea inferior.

(D) O músculo glúteo médio atua principalmente na abdução do quadril e suas fibras anteriores contribuem para a rotação medial do fêmur.

**60**

Paciente de 56 anos, com peso de 70 kg, apresenta queimadura de segundo grau profundo, acometendo 45% da superfície corporal queimada, há 2 dias.

Para estimar a necessidade calórica diária desse paciente, usando a fórmula de Curreri, assinale a afirmativa correta.

(A) 3550.

(B) 3925.

(C) 4325.

(D) 5450.

Realização

