PREFEITURA DE PONTES E LACERDA



CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº. 001/2019-PMPL

CARGO: ODONTÓLOGO

Caderno de Prova

Nome do Candidato

Universidade Federal de Mato Grosso

Gerência de Exames e Concursos

I N S T R U Ç Õ E S

LEIA COM ATENÇÃO

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de **1** a **17**, é constituído de **60 (sessenta)** questões de múltipla escolha, cada uma com **4 (quatro)** alternativas, assim distribuídas:

01 a **10 – Língua Portuguesa**
11 a **60 – Conhecimentos Específicos**

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.

3. ***Sobre a Marcação do Cartão de Respostas da Prova Objetiva***

As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. O Cartão de Respostas não será substituído por erro ou dano do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida no **CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente** o círculo correspondente.

*Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa **C** seja a escolhida.*



3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.

3.3. Não rasure nem amasse o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é **4 (quatro)** horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTAS**.

6. Somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova.

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar **Termo de Ocorrência** declarando sua desistência do concurso.

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente **na última meia hora** de prova.

9. Na página **17** deste Caderno de Prova, encontra-se a **Folha de Anotação do Candidato**, a qual poderá ser utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o gabarito somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova.

10. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o **CARTÃO DE RESPOSTAS.**

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: Leia o texto e responda às questões de 01 a 06.

O risco de demência

Anos atrás, os poucos que chegavam aos 60 anos eram chamados de sexagenários. Hoje, quando morre alguém com 70, dizemos que morreu moço.

Uma pesquisa recente mostrou que, ao completar 50 anos, pessoas que não fumam, bebem com moderação, praticam atividade física com regularidade, adotam dietas com mais vegetais e menos gordura animal e mantêm o peso corpóreo na faixa saudável terão expectativa de viver em média mais 38 anos se forem homens, e mais 43 no caso das mulheres.

O preço a pagar pelo privilégio da longevidade, no entanto, extrapola a questão da Previdência Social, uma vez que a prevalência de enfermidades crônico-degenerativas aumenta com a idade. Entre nós, o custo é mais alto, porque envelhecemos mal – cerca de 90% dos brasileiros chegam aos 60 anos com pelo menos uma doença crônica.

Nesse universo, as demências ocupam lugar de destaque. Nem tanto pela prevalência – hipertensão e diabetes são muito mais prevalentes –, mas pelas consequências devastadoras, pessoais, familiares e sociais.

Diversos pesquisadores avaliaram a influência do estilo de vida na instalação dos quadros demenciais que ocorrem ocasionalmente em indivíduos sem antecedentes familiares. Aprendemos que existem vários fatores capazes de aumentar esse risco – fumo, sedentarismo, dieta pobre em vegetais e rica em gordura animal, abuso de álcool, falta de estímulos cognitivos, distúrbios do sono, dificuldade de engajamento social, traumatismos cranianos e até a poluição.

Por outro lado, os avanços da genética levaram à identificação de mais de 250 mil variantes de genes associadas ao risco de demências. A presença delas explica o número de casos concentrados em determinadas famílias. Para os portadores desses genes, como para filhos, netos e sobrinhos de pessoas com Alzheimer e outras degenerações cognitivas, é fundamental saber se a tendência genética pode ser contrabalançada por meio de mudanças no estilo de vida.

O fatalismo dos que dizem "não vou escapar, meus pais tiveram Alzheimer, minha avó também" deve ser substituído pela disciplina de praticar atividade física, adotar dietas com mais vegetais e menos gordura animal, não fumar de jeito nenhum, beber pouco e ler muito. (...)

(VARELLA, D. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/. Acesso em: 16/07/2019. Adaptado.)

QUESTÃO 01

No trecho: *Entre nós, o custo é mais alto, porque envelhecemos mal – cerca de 90% dos brasileiros chegam aos 60 anos com pelo menos uma doença crônica***,** depreende-se que o autor

A) pertence ao grupo que fumava e bebia com excesso e agora paga um preço alto na velhice.
B) possui uma doença crônica, como demência, já identificada na família.
C) pertence ao grupo de sexagenários que está sendo descrito no texto.
D) se refere ao custo da Previdência Social.

QUESTÃO 02

Na segunda frase do texto, o autor optou pelo emprego da primeira pessoa do plural porque

A) se considera uma pessoa jovem, um moço.
B) cometeu um erro de concordância com a pessoa discursiva do texto.
C) apenas repetiu o que fala a maioria das pessoas.
D) compartilha da opinião expressa pela sentença.

QUESTÃO 03

No texto, o advérbio *ocasionalmente* (linha 15) foi empregado como sinônimo de

A) eventualmente.
B) rapidamente.
C) consecutivamente.
D) parcamente.

QUESTÃO 04

Em O risco de demência, Drauzio Varella defende que

A) os avanços da genética podem ajudar a identificar os genes responsáveis por doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.
B) hábitos saudáveis podem ajudar a combater o fatalismo de doenças crônicas, como as demências, mais devastadoras que outras doenças.
C) viver mais pode representar conviver mais tempo com doenças crônicas.
D) pessoas que fumam e bebem apresentam mais chances de alcançar a longevidade, mesmo com excessos.

QUESTÃO 05

As aspas, no último parágrafo, foram utilizadas com o intuito de

A) salientar o uso expressivo de ironia ou ambiguidade, como forma de realçar uma palavra ou expressão.
B) destacar o autor de um discurso externo, como se faz para representar nomes de livros ou obras de arte, em geral.
C) enfatizar palavras ou frases enunciadas em língua estrangeira, ou mesmo expressões fora do padrão formal da língua escrita, como neologismos e gírias.
D) marcar fala exterior ao texto, representativa de citações ou transcrições textuais, como forma de recuperar um discurso alheio.

QUESTÃO 06

Os mecanismos de coesão e coerência textuais, por vezes, utilizam-se de conectores para estabelecer a textualidade. Sobre esses recursos, analise as relações apontadas nas afirmativas.

I - *Hoje, quando morre alguém com 70, dizemos que morreu moço* → tempo
II - *O preço a pagar pelo privilégio da longevidade, no entanto, extrapola a questão da Previdência Social* → adversidade
III - *Entre nós, o custo é mais alto, porque envelhecemos mal* → causa
IV - *Nem tanto pela prevalência, (...), mas pelas consequências devastadoras, pessoais, familiares e sociais* → proporção
V - *Por outro lado, os avanços da genética levaram à identificação de mais de 250 mil variantes de genes associadas ao risco de demências* → consequência

Estão corretas as relações apontadas em

A) II, III e IV.
B) I, II e III.
C) II, IV e V.
D) I, IV e V.

QUESTÃO 07

Para a construção de sentido de um texto, podem-se utilizar diversos recursos. Leia a tira.



Na tira, foi utilizado o recurso de

A) intertextualidade.
B) metaforização.
C) contradição.
D) homonímia.

Instrução: Leia o texto e responda às questões de 08 a 10.

Chimpanzés interagem mais entre si quando assistem vídeos juntos

Assistir um filme ou uma série com alguém próximo torna praticamente impossível conter o impulso de comentar loucamente com a pessoa ao lado aquilo que acabaram de ver juntas. Toda saída do cinema a dois (ou ao fim de um episódio de série) mostra a mesma coisa: a troca de impressões e pitacos rola solta.

Cientistas descobriram agora que não são só os humanos que fazem isso – o mesmo acontece com outros grandes primatas.

Até então se pensava que o comportamento era exclusivo de nossa espécie, mas uma pesquisa constatou que chimpanzés e bonobos também apresentam maior tendência de formar laços entre si quando assistem vídeos juntos.

De sua própria maneira, é claro. Não é que eles saiam por aí tagarelando ou formando *fandoms*. A empolgação é mais física: eles se encostam mais, passam mais tempo perto um do outro e prestam mais atenção no coleguinha.

(Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 16/07/2019. Adaptado.)

QUESTÃO 08

Sobre recursos linguísticos presentes no texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) São advérbios os termos: *praticamente, agora, aí, próximo*.
( ) O pronome isso (linha 5) retoma a expressão *Assistir um filme ou uma série com alguém próximo*.
( ) O terceiro parágrafo é um exemplo de período composto misto, com orações coordenadas e subordinadas.
( ) A regência correta do verbo assistir no sentido utilizado no texto é transitiva indireta, solicitando o uso de preposição.

Assinale a sequência correta.

A) V, F, V, F
B) V, V, F, F
C) F, F, V, V
D) F, V, F, V

QUESTÃO 09

Sobre o registro linguístico marcado no texto, é correto afirmar que foi utilizado

A) registro formal de linguagem, destacando-se o uso de expressões jurídicas e restritas ao ambiente acadêmico-profissional, focando no público da revista.
B) registro informal de linguagem, abusando-se de expressões conotativas e de usos específicos de grupos linguísticos, marcando o público específico da revista.
C) registro formal de linguagem, respeitando-se as condições de produção do gênero textual e adequando-se à norma padrão culta da língua portuguesa.
D) registro informal de linguagem, recorrendo-se a recursos como gírias e uso de diminutivos, como forma de adequação social ao público da revista.

QUESTÃO 10

É exemplo de expressão conotativa utilizada no texto (com as devidas adaptações):

A) *formar laços.*
B) *comentar loucamente.*
C) *sair tagarelando.*
D) *empolgação mais física.*

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta apenas músculos que têm como função elevar a mandíbula e ocluir os dentes.

A) Pterigoideo lateral e Masseter
B) Temporal e Masseter
C) Temporal e Pterigoideo lateral
D) Masseter e Digástrico

QUESTÃO 12

O tratamento do bruxismo deve ser multidisciplinar e abrange vários aspectos. Sobre as opções de tratamento para essa desordem, considere:

I- Terapia por ajuste oclusal
II- Terapia restauradora
III- Terapia planos oclusais
IV- Fisioterapia

São opções de tratamento para o bruxismo:

A) II e IV, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 13

Sobre cimentos odontológicos, analise as afirmativas.

I- A principal característica do cimento de hidróxido de cálcio consiste em estimular a deposição de dentina.
II- O cimento de hidróxido de cálcio apresenta união química à estrutura dental através da quelação de íons cálcio.
III- Os cimentos de ionômero de vidro convencionais apresentam maior liberação de flúor que os modificados por resina.
IV- A manipulação do cimento de fosfato de zinco tem reação química exodérmica e requer cuidados para evitar agressão aos tecidos dentais.

Está correto o que se afirma em

A) II, III e IV.
B) I, II e III.
C) I, III e IV.
D) I, II e IV.

QUESTÃO 14

A respeito das causas de defeitos nas moldagens de alginato, numere as causas apresentadas na coluna da direita de acordo com os defeitos na da esquerda.

1- Rasgamento
2- Material granuloso

( ) Espessura inadequada de material
( ) Espatulação inadequada
( ) Relação água/pó muito baixa

Assinale a sequência correta.

A) 1, 2, 2
B) 1, 1, 2
C) 2, 2, 1
D) 2, 1, 2

QUESTÃO 15

Os selantes de fóssulas e fissuras compõem uma alternativa conservadora aos tratamentos restauradores. A respeito de selantes, assinale a afirmativa correta.

A) Superfícies proximais também devem receber selantes, por serem altamente susceptíveis à cárie.
B) A aplicação de ácido fosfórico que antecede o uso de selante resinoso não pode exceder 10 segundos devido à falta de maturação do esmalte.
C) A utilização de selantes deve ser feita em qualquer idade sempre que o sulco oclusal apresentar coloração escura.
D) Em dentes em erupção sobre os quais ainda há presença de tecido gengival, recomenda-se a aplicação de selante ionomérico.

QUESTÃO 16

A respeito dos agentes clareadores, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Peróxido de hidrogênio e ureia são resultantes da degradação do peróxido de carbamida no processo clareador.
( ) O peróxido de carbamida, em diferentes concentrações, pode ser usado na técnica ambulatorial e também na caseira.
( ) O perborato de sódio é usado apenas para clareamento de dentes vitalizados.
( ) Se o agente clareador ambulatorial cair sobre tecido mole, deve ser neutralizado com flúor gel.

Assinale a sequência correta.

A) F, V, V, F
B) V, F, F, V
C) V, V, F, F
D) F, F, V, V

QUESTÃO 17

Uma jovem do gênero feminino compareceu à clínica para tratamento de rotina apresentando múltiplas pápulas eritematosas no lábio superior preenchidas por líquido. Ao ser indagada, relatou que 24h antes teve como sinais e sintomas dor, ardência, prurido, formigamento e calor localizado. Esses sinais/sintomas são características de

A) Herpes simples labial.
B) Carcinoma espinocelular.
C) Ceratose actínica.
D) Panarício herpético.

QUESTÃO 18

Pacientes infectados pelo HIV podem apresentar diversas manifestações orais associadas à infecção pelo vírus. Assinale a alternativa que apresenta apenas manifestações fortemente associadas a pacientes HIV positivos.

A) Manchas de Koplik e Candidíase
B) Candidíase e Sarcoma de Kaposi
C) Sarcoma de Kaposi e Citomegalovírus
D) Leucoplasia pilosa e Aspergilose

QUESTÃO 19

Sobre cistos dentígeros, é correto afirmar

A) São pequenos, superficiais, com conteúdo de ceratina e encontrados na mucosa alveolar.
B) Surgem a partir dos restos celulares da lâmina dental.
C) Não requerem tratamento, porque se rompem espontaneamente, permitindo a erupção do dente.
D) Envolvem a coroa de um dente impactado e se conectam ao dente pela junção amelocementária.

QUESTÃO 20

A ruptura de um ducto da glândula salivar e o extravasamento de mucina para os tecidos moles causa aumento de volume mucoso em forma de cúpula, sem revestimento epitelial circundante, que pode ter tamanho variado e é conhecido por_____ e quando ocorre no soalho da boca é chamado de_____.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

A) Mucocele – Rânula
B) Sialometaplasia – Râmula
C) Mucocele – Sialolitíase
D) Rânula – Mucocele

QUESTÃO 21

Pacientes da terceira idade são frequentemente acometidos de xerostomia. Sobre o tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Por causa do elevado potencial de cáries dentárias nos pacientes com xerostomia, são recomendadas visitas frequentes ao dentista.
( ) A aplicação tópica de flúor tanto no consultório quanto em casa deve ser evitada devido a seu potencial ácido.
( ) Há aumento na prevalência da candidíase oral nesses pacientes por causa da redução na limpeza e na atividade antimicrobiana promovida pela saliva.

Assinale a sequência correta.

A) F, V, F
B) V, F, F
C) F, V, V
D) V, F, V

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que apresenta a alteração dentária de caráter hereditário que pode acometer de um a todos os dentes na dentição decídua ou permanente no qual o esmalte formado é deficiente ou tem qualidade anormal e a estrutura da dentina se apresenta normal.

A) Amelogênese imperfeita
B) Hipoplasia
C) Fluorose
D) Displasia hipocálcica

QUESTÃO 23

Durante tratamento restaurador do dente 46 em um paciente jovem, houve exposição acidental da polpa. O dente deverá ser restaurado com resina composta e, para preservar a vitalidade, o material que permanecer em contato com o tecido exposto deve ser biocompatível. Assinale a alternativa que apresenta o material com maior biocompatibilidade com a polpa dental.

A) Cimento de ionômero de vidro
B) Hidróxido de cálcio na forma de pó ou pasta
C) Sistema adesivo autocondicionante
D) Cimento de hidróxido de cálcio

QUESTÃO 24

Paciente chega à clínica odontológica queixando de dor intensa, espontânea e localizada no dente 46. Relata também que não consegue mastigar com esse quadrante porque a dor no dente é exacerbada ao contato com o antagonista, e tem ainda a sensação de o dente estar crescido. Esse quadro clínico é compatível com

A) Periodontite crônica associada à inflamação pulpar irreversível.
B) Periodontite apical aguda com inflamação pulpar irreversível.
C) Pericoronarite aguda.
D) Abcesso perirradicular crônico.

QUESTÃO 25

Sobre as anomalias de desenvolvimento dos dentes na dentição decídua, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A hipodontia é frequente, sendo mais observada nos incisivos inferiores.
( ) Dentes supranumerários ocorrem frequentemente em crianças .
( ) A anodontia é a ausência de um ou poucos dentes decíduos.
( ) Concrescência é a fusão de dois dentes apenas pelo cemento.

Marque a sequência correta.

A) F, F, V, F
B) V, V, F, V
C) F, V, F, V
D) V, F, V, F

QUESTÃO 26

Muitos são os fatores que podem afetar a cronologia e a sequência de erupção dos dentes. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta.

A) Hipotireoidismo, hipopituitarismo e carência de vitaminas A e D não alteram a cronologia de erupção dos dentes.
B) Crianças portadoras de síndrome de Down apresentam retardo na erupção de dentes permanentes devido à anquilose dos decíduos.
C) O ambiente e a região geográfica em que a criança vive não interferem na cronologia de erupção dos dentes.
D) Em relação ao gênero, na dentição permanente, a erupção dos dentes das meninas é mais precoce que a dos meninos.

QUESTÃO 27

Sobre características da dentição mista, analise as afirmativas.

I- Com a erupção dos primeiros molares permanentes ocorrem algumas alterações na dentição mista, como a formação das curvas de Spee e Wilson.
II- Quando os incisivos superiores permanentes começam a erupcionar, suas coroas têm uma posição mais lingual que seus predecessores.
III- A chamada “fase do patinho feio” ocorre com a erupção dos dentes 33 e 43, que provoca inclinação mesial da coroa dos incisivos centrais.

Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e III, apenas.

QUESTÃO 28

Durante consulta periódica, paciente jovem se queixou de importante impacção alimentar entre os dentes 36 e 37. Ao exame clínico, observou-se restauração em resina composta na face proximal do dente 36 e ainda uma lesão de face livre sem cavitação no terço cervical do dente 37. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento mais adequado nesse caso.

A) Restauração OM no dente 36 e tratamento remineralizador no 37.
B) Restauração OM no dente 36 e V no dente 37.
C) Restauração OD no dente 36 e V no 37.
D) Restauração OD no dente 36 e tratamento remineralizador no 37.

QUESTÃO 29

Paciente de 16 anos de idade compareceu à clínica odontológica relatando dor durante a ingestão de alimentos gelados e doces. Ao exame clínico, observou-se cárie oclusal na fosseta central do dente 26. O exame radiográfico mostrou que a imagem radiolúcida na dentina da lesão oclusal se estendia até a face mesial, onde o esmalte estava interrompido. Na face distal do dente 25, havia uma desmineralização no esmalte e integridade dentinária. A respeito desse caso clínico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A imagem radiográfica citada é melhor observada em radiografias interproximais.
( ) O dente 26 deve ser submetido a tratamento endodôntico por apresentar pulpite irreversível.
( ) A face distal do dente 26 deve ser restaurada com resina composta sem o rompimento da crista marginal.
( ) Higienização correta, uso de fio dental e adequada oferta de flúor favorecem a remineralização do esmalte distal do dente 25.

Assinale a sequência correta.

A) F, V, V, F
B) V, V, F, F
C) V, F, F, V
D) F, F, V, V

QUESTÃO 30

A cárie é a causa mais comum de agressão ao complexo dentino pulpar. Depois da destruição do esmalte, a dentina é exposta e os túbulos dentinários podem atuar como canais de difusão dos produtos bacterianos até a polpa. A respeito da resposta biológica do complexo dentino pulpar ao estímulo bacteriano da cárie, analise as afirmativas.

I- Com a formação de dentina terciária acontece um recuo da polpa em resposta ao avanço da lesão cariosa na dentina.
II- As reações do complexo dentino pulpar apresentam intensidade inversamente proporcional à agressão causada pelo processo carioso.
III- A polpa induz o revestimento dos túbulos comprometidos com proteínas plasmáticas e deposição de dentina esclerosada.

Está correto o que se afirma em

A) I, II e III.
B) I e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) III, apenas.

QUESTÃO 31

Paciente assintomático procurou por tratamento odontológico de rotina e ao exame radiográfico verificou-se presença de área radiolúcida bem circunscrita, de forma aproximadamente circular e perda de integridade da lâmina dura no ápice radicular do dente 13. Ao exame clínico, o dente apresentava extensa restauração em resina composta na face distal e não respondeu ao teste térmico para o frio. A descrição acima é sugestiva de _____e o tratamento indicado é _____.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

A) Abcesso agudo – Medicação via oral.
B) Granuloma – Endodôntico convencional.
C) Reabsorção radicular – Apicectomia.
D) Cisto dentígero – Remoção cirúrgica.

QUESTÃO 32

A cárie de mamadeira que acomete algumas crianças é um problema sério porque os pacientes atingidos são muito novos e as lesões evoluem de forma rápida. Sobre o tema, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) O número de *Streptococcus Mutans* e *Lactobacillus* presentes na placa de crianças com cárie de mamadeira é maior do que nas crianças livres de cárie.
( ) A primeira manifestação clínica da cárie de mamadeira é a presença de lesões de mancha branca na região cervical dos incisivos superiores.
( ) Se o processo carioso não for interrompido, depois dos incisivos superiores, os incisivos inferiores são os próximos dentes a serem atacados.
( ) Tratamentos mais agressivos, como exodontia, devem ser evitados por gerarem trauma na criança.

Marque a sequência correta.

A) F, V, V, F
B) F, V, F, V
C) V, V, F, F
D) V, F, V, V

QUESTÃO 33

Pacientes respiradores bucais apresentam alteração gengival crônica geralmente localizada na região ântero-superior. Sobre o tema, analise as afirmativas.

I- Alguns dos sinais clínicos da gengivite do respirador bucal são alteração de cor, forma e superfície da gengiva.
II- As bolsas gengivais, quando presentes, possuem tecido queratinizado, o que impede o sangramento durante a sondagem de seu interior.
III- Maloclusão, amígdalas e adenoides aumentadas, lábio superior pequeno dificultando o contato entre os lábios desenvolvem alteração gengival crônica.
IV- O uso contínuo de medicamentos anticonvulsivantes resseca a superfície gengival, levando o paciente a respirar pela boca.

Está correto o que se afirma em

A) I, II e III, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I e III, apenas.

QUESTÃO 34

A remoção cirúrgica dos freios dos lábios superior e inferior e da língua é chamada de frenectomia. A respeito de problemas relacionados a esses freios, assinale a afirmativa correta.

A) A anquiloglossia é uma anomalia congênita e acarreta interferência na amamentação, dicção e no crescimento evolutivo da mandíbula.
B) O procedimento de reposicionamento do freio labial deve ser feito imediatamente após o rompimento dos incisivos laterais decíduos.
C) Para a exérese do freio labial superior, estabiliza-se o lábio e executa-se a manobra de “dar um pique tecidual com o uso da tesoura”.
D) Para a remoção do freio, faz-se a infiltração de anestésico no tecido que será retirado, também com o objetivo de promover ligeiro aumento de volume.

QUESTÃO 35

O uso racional do flúor reduz o risco de cárie e várias são as formas de uso. Sobre o tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) O uso de dentifrícios fluoretados oferece melhores resultados quando usados também em períodos que possam permanecer maior tempo na boca.
( ) O importante para o controle do processo de cárie é que o paciente tenha um regime de alta frequência e baixa concentração de flúor na cavidade bucal.
( ) A aplicação tópica deve ser feita logo após a erupção do dente porque quanto mais jovem o dente maior sua capacidade de absorver o flúor.
( ) Adultos que mostrem atividade de cárie ou necessidade de sua prevenção também devem ter os dentes submetidos à exposição ao flúor.

Assinale a sequência correta.

A) V, F, F, V
B) V, V, F, F
C) F, F, V, F
D) V, V, V, V

QUESTÃO 36

Em tratamento restaurador de lesões de cárie oclusal profundas, a remoção da dentina amolecida é uma importante etapa e atualmente a remoção seletiva dessa dentina vem ganhando destaque na literatura científica. Sobre esse tema, assinale a afirmativa correta.

A) A invasão bacteriana pode ocorrer até em dentina saudável, por isso toda dentina amolecida deve ser removida até que se note dureza superficial.
B) A porção externa de dentina infectada não se apresenta irreversivelmente desnaturada, é passível de remineralização e deve ser mantida na cavidade.
C) Na manutenção da camada afetada, a remineralização é possível desde que a cavidade esteja totalmente selada do meio externo para que haja a inativação da lesão cariosa.
D) As bactérias remanescentes na dentina contaminada continuam a progressão da lesão mesmo que a cavidade esteja devidamente selada.

QUESTÃO 37

A "síndrome do dente rachado" é definida como a fratura incompleta de um dente posterior vital, que ocasionalmente se estende até a polpa. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta fator envolvido com esse tipo de fratura.

A) A contração de polimerização não controlada das resinas compostas, com papel determinante no aparecimento dessas fraturas.
B) As forças oclusais, principais responsáveis pela formação das fraturas incompletas, devido ao efeito cunha na relação cúspide-fossa.
C) A presença de restaurações MOD ou lesões de cárie com perda das cristas marginais, aumentando a possibilidade desse tipo de trinca.
D) Interferências oclusais e hábitos parafuncionais, como apertamento dental e bruxismo, fatores agravantes para o aparecimento dessas trincas.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que apresenta a indicação correta para a confecção de pinos de fibra de vidro anatomicamente modelados com resina composta.

A) Quando será necessária a confecção de pinos bipartidos em dentes multirradiculares.
B) Quando o conduto se apresenta amplo, muito alargado ou ovalado, especialmente nos terços médio e cervical da raiz.
C) Quando não é possível o preparo do conduto radicular até 2/3 do comprimento do remanescente dental.
D) Quando a espessura de dentina na face vestibular da raiz de dentes anteriores superiores é menor que a da face palatina.

QUESTÃO 39

Sabe-se que as respostas aos fármacos no paciente idoso diferem das do jovem, pois podem ser complicadas por múltiplas medicações, por estados patológicos, falta de adesão ao tratamento e fatores psicológicos, sociológicos e econômicos. Assinale a alternativa que apresenta as precauções apropriadas no tratamento odontológico do paciente idoso.

A) Fármacos cuja principal via de eliminação seja o rim devem ter sua dose aumentada no paciente idoso devido ao declínio da função renal nesse grupo de indivíduos.

B) A sensibilidade aos efeitos depressores dos fármacos no indivíduo idoso é menor que a no adulto jovem, podendo haver necessidade de aumentar as doses de ansiolíticos, analgésicos e anestésicos gerais.

C) É importante que o odontólogo obtenha cuidadosa história do estado clínico e farmacológico do paciente, atualizando-a em intervalos regulares nos tratamentos longos, para adequar a dose dos medicamentos, se necessário.

D) A diferença da resposta aos fármacos entre adultos jovens e idosos está relacionada à senilidade imunológica, à desnutrição e menor concentração plasmática de proteínas no indivíduo idoso.

QUESTÃO 40

Sobre a classificação dos arcos parcialmente desdentados para prótese parcial removível, numere a coluna da direta, que apresenta classificações propostas por Kennedy, de acordo com a coluna da esquerda, que apresenta imagens de tipos de arcos dentários parcialmente desidratados.

1-  ( ) Classe I

2-  ( ) Classe II

3-  ( ) Classe III

4-  ( ) Classe IV

Assinale a sequência correta.

A) 2, 4, 3, 1

B) 3, 4, 1, 2

C) 4, 1, 2, 3

D) 2, 3, 4, 1

QUESTÃO 41

A queilite angular ou estomatite angular é uma inflamação que pode acometer igualmente indivíduos adultos de ambos os gêneros e sua incidência é comum em ambas as comissuras labiais. Assinale a alternativa que apresenta **APENAS** fatores predisponentes para essa alteração.

A) Exposição exagerada ao sol; uso de próteses removíveis; perda de DVO.

B) Trauma; anemia/ hipovitaminose B; exposição exagerada ao sol.

C) Uso de próteses removíveis; perda de DVO; anemia/hipovitaminose B.

D) Predisposição genética; trauma; uso de próteses.

QUESTÃO 42

Glândulas sebáceas ectópicas contendo lipídeos neutros, similares aos encontrados nas glândulas sebáceas da pele porém não associados a folículos pilosos, que se apresentam clinicamente como pequenas partículas submucosas amareladas, de consistência amolecida, normalmente localizadas no limite entre o vermelhidão dos lábios e a mucosa. Essa descrição se refere a

A) Ceratose labial.

B) Grânulos de Fordyce.

C) Líquen plano.

D) Doença de Crohn.

QUESTÃO 43

Paciente em tratamento após diagnóstico de osteoradionecrose na mandíbula em consequência de radioterapia, devido a um carcinoma da face lateral esquerda da língua, compareceu à clínica queixando de dor na região dos dentes 37 e 38. O exame radiográfico mostrou lesão cariosa com pequeno envolvimento de dentina no dente 37 e extensa lesão comprometendo a vitalidade pulpar do dente 38. Assinale o tratamento mais adequado para esse caso.

A) Extração de ambos os dentes.
B) Extração do dente 38 e restauração do dente 37.
C) Profilaxia antibiótica.
D) Tratamento endodôntico do dente 38 e restauração de ambos os dentes.

QUESTÃO 44

A administração de anestesia local é considerada essencial sempre que se contemplem procedimentos potencialmente dolorosos. Os anestésicos locais são fármacos extremamente seguros quando usados de acordo com as recomendações, entretanto, sempre que um anestésico é usado, podem ocorrer respostas não esperadas e não desejadas. A respeito da ação e toxicidade dos fármacos/anestésicos locais, analise as afirmativas.

I- Nenhum anestésico clinicamente útil é inteiramente destituído de toxicidade.
II- Os fármacos exercem uma ação única, são específicos para produzir apenas as ações desejadas em todos os pacientes.
III- A toxicidade potencial de um fármaco depende do paciente.
IV- Os efeitos nocivos dos fármacos variam desde os que são inteiramente reversíveis até os que são fatais ao paciente.

Está correto o que se afirma em

A) I, III e IV, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) I e IV, apenas.

QUESTÃO 45

Avulsão é o deslocamento total do dente de dentro do alvéolo com o rompimento do ligamento periodontal e do feixe vásculo nervoso. Esse tipo de traumatismo alvéolo dentário é um fator etiológico responsável pela perda de grande número de dentes. Considerando os conhecimentos odontológicos a ele relacionados, assinale a afirmativa correta.

A) O reimplante deve ser feito após pulpotomia, o que evita o possível escurecimento do dente.
B) Em relação ao gênero, a prevalência desse traumatismo é maior em meninas que em meninos.
C) O tempo fora do alvéolo é fator importante para o sucesso, assim o reimplante imediato, quando possível, é a conduta mais adequada.
D) Em dentes com rizogênese incompleta, deve-se fazer contenção rígida para minimizar a possibilidade de exfoliação.

QUESTÃO 46

O manejo do paciente odontológico com alergia confirmada a anestésicos locais varia de acordo com a natureza da alergia. No caso de o paciente relatar ter alergia limitada aos anestésicos do grupo éster, o odontólogo poderá usar anestésicos do grupo amida que não contenham conservantes de parabeno, uma vez que não há alergenicidade cruzada entre eles. Assinale a alternativa que apresenta **APENAS** anestésicos do grupo amida.

A) Benzocaína, bupivacaína, articaína.
B) Lidocaína, mepivacaína, articaína.
C) Mepivacaina, procaína, tetracaína.
D) Bupivacaína, benzocaína, lidocaína.

QUESTÃO 47

Os bifosfonatos são medicamentos usados para o controle da osteoporose, doença de Paget, metástases ósseas, entre outras, e uma das reações adversas do uso intravenoso desse medicamento é a osteonecrose de maxilares. Recentemente o uso crônico via oral também foi associado à necrose óssea dos maxilares, apesar da incidência ser mais baixa. Considerando os conhecimentos necessários ao odontólogo para o atendimento de pacientes com osteonecrose, analise as afirmativas.

I- Como a necrose óssea dos maxilares é indolor, o diagnóstico em seu estágio inicial é feito com radiografias panorâmicas e periapicais.
II- Próteses removíveis devem ser muito bem ajustadas nesses pacientes, que devem ser orientados a removê-las à noite e manter rigorosa higiene oral.
III- Movimentações ortodônticas devem ser avaliadas com cautela nesses pacientes, pois envolvem a formação e reabsorção óssea.
IV- Procedimentos periodontais invasivos e exodontias aumentam o risco de morbidade nesses pacientes.

Está correto o que se afirma em
A) II e III, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) I, II, III e IV.
D) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 48

Quando administrados em excesso, todos os fármacos são capazes de produzir sinais e sintomas de superdosagem, por isso, a dose máxima recomendada (DMR) dos anestésicos locais em odontologia é comumente calculada após a consideração de vários fatores. A esse respeito, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Quanto mais pesada for a pessoa (dentro de limites), menor é o volume de distribuição do fármaco.
( ) Os indivíduos cujas idades se situam nas extremidades do espectro etário podem ser incapazes de tolerar doses normais, que devem ser reduzidas.
( ) O uso de anestésicos tópicos previamente à anestesia local deve ser considerado no cálculo da DMR devido à alta concentração de vasoconstritores que eles apresentam.

Marque a sequência correta.
A) F, V, F
B) V, F, V
C) V, V, F
D) F, F, V

QUESTÃO 49

Paciente do sexo feminino, saudável, 45 kg recebeu 2 tubetes de mepivacaína 2% + Levonordefrina a 1:20.000 em um procedimento, mas a anestesia não foi efetiva e o profissional decide trocar o anestésico para articaína a 4% + adrenalina a 1:100.000. Sabendo que: mepicavaina 2%= 36 mg/tubetes, DMR 6,6 mg/kg e articaína 4%= 72mg/kg, DMR 7mg/kg, assinale a alternativa que apresenta a quantidade máxima de tubetes de articaína 4% a ser usada pelo profissional no mesmo procedimento.
A) 5 tubetes
B) 2 tubetes
C) 3 tubetes
D) 6 tubetes

QUESTÃO 50

O tratamento periodontal de dentes com lesão de furca é desafiador, representa um dilema quanto ao diagnóstico e pode levar a um prognóstico pouco favorável. Assinale a alternativa que apresenta o instrumental usado para determinar a extensão e configuração do defeito, entrar e mensurar áreas de furca de difícil acesso.

A) Sonda de Glickman
B) Sonda de Nabers
C) Sonda de Willians
D) Cureta de Mac Call

QUESTÃO 51

A decisão por reparar ou substituir totalmente restaurações de resina composta é um desafio que vários odontólogos enfrentam no dia a dia da prática clínica. A respeito do reparo em restaurações de resina composta, analise as afirmativas.

I- O processo de reparo é mais complicado em restaurações antigas do que em recentes, porque a quantidade de ligações duplas de carbono remanescentes diminui com o tempo.
II- O condicionamento químico com ácido fosfórico a 37% na resina composta que receberá o reparo é dispensado, uma vez que ele não melhora o padrão morfológico da resina a ser reparada e reduz a energia de superfície no local.
III- Mesmo que duas ou mais indicações de reparo estiverem presentes na mesma restauração, deve-se preferir o reparo à substituição, visando à preservação da estrutura dental.
IV- Para melhorar a resistência de união entre o reparo e a restauração presente, é necessário fazer irregularidades na resina antiga para promover retenção micromecânica.

Está correto o que se afirma em

A) I e IV, apenas.
B) I, II e III, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) II e III, apenas.

QUESTÃO 52

Durante procedimento cirúrgico de urgência, o odontólogo acidentalmente sofreu uma exposição percutânea com um instrumento em que a presença de sangue era visível. A respeito dos procedimentos recomendados no caso de exposição a materiais biológicos, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Lavar exaustivamente o local exposto com água e sabão.
( ) Realizar pressão no local exposto como forma de aumentar o sangramento espontâneo.
( ) Em dúvida sobre o tipo de acidente, iniciar a quimioprofilaxia para HIV, que pode ser avaliada posteriormente.
( ) Utilizar soluções contendo éter, hipoclorito ou glutaraldeído para fazer a desinfecção do local.

Marque a sequência correta.

A) F, V, V, F
B) V, V, F, V
C) F, F, V, V
D) V, F, V, F

QUESTÃO 53

No momento de fazer o exame de imagem com radiografias periapicais em um paciente adulto, deve-se tomar alguns cuidados com o posicionamento do filme radiográfico. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta.

A) O longo eixo do filme deve ser posicionado na horizontal para radiografia dos incisivos superiores.
B) O picote do filme deve estar com sua parte elevada voltada para a exposição dos raios.
C) O longo eixo do filme deve ser posicionado na vertical para radiografia dos molares superiores.
D) O picote do filme deve estar com sua parte elevada voltada para o lado oposto à exposição dos raios.

QUESTÃO 54

É grande a possibilidade de objetos caírem na parte posterior da cavidade oral durante o atendimento odontológico. Ainda que uma situação de emergência potencialmente fatal seja muito pequena, o profissional deve reagir rapidamente. A esse respeito, analise as afirmativas.

I- O profissional deve dar golpes nas costas do paciente até que o objeto seja eliminado.
II- Se necessário, o profissional deve realizar a manobra de Heimlich.
III- O paciente com obstrução parcial deve ser estimulado a continuar forçando a tosse.
IV- Caso o paciente pare de tossir e relate ter deglutido o objeto, ele deve ser encaminhado ao médico/radiologista para assistência médica especializada.

Está correto o que se afirma em
A) II, III e IV, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e IV, apenas.

QUESTÃO 55

Durante procedimento odontológico, o paciente afirma não estar se sentindo bem, tem leve tontura e náusea, perde a cor e relata sensação de calor no pescoço e na face, suor intenso e zumbido no ouvido. O quadro prodrômico descrito é compatível com_____ e a conduta do profissional deve ser _____.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
A) Lipotímia; interromper o tratamento e manter o paciente ereto facilitando a circulação.
B) Síncope; interromper o tratamento e colocar a cabeça do paciente entre as pernas.
C) Lipotímia; interromper o tratamento e colocar o paciente em posição de Trendelenburg.
D) Síncope; interromper o tratamento e solicitar socorro móvel de urgência.

QUESTÃO 56

A cicatrização é o processo pelo qual o organismo tende a reparar uma lesão ou perda de tecido. A esse respeito, numere as características apresentadas na coluna da direita de acordo com os tipos de cicatrização na da esquerda.

1- Cicatrização por primeira intensão
2- Cicatrização por segunda intensão

( ) Mais rápida
( ) Maior quantidade de reepitelização
( ) Mais lenta
( ) Bordas coaptadas
( ) Menor risco de infecção

Assinale a sequência correta.
A) 2, 1, 2, 2, 1
B) 2, 1, 1, 1, 2
C) 1, 2, 2, 2, 1
D) 1, 2, 2, 1, 1

QUESTÃO 57

A respeito das manobras cirúrgicas fundamentais para exodontia do dente 46, assinale a afirmativa correta.
A) O procedimento em que se comprime de maneira bidigital as bordas alveolares expandidas é chamado de manobra de Chompret.
B) A sindesmotomia, também chamada de manobra de Valsalva, tem como objetivo a dilaceração das fibras gengivais que rodeiam o dente.
C) Para a síntese do local, fios de sutura 2-0 têm espessura menor que os fios 4-0.
D) O fórceps indicado para a exodontia desse dente é o 18R.

QUESTÃO 58

Sobre os direitos e deveres fundamentais dos profissionais inscritos nos CRO, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo de consultas venha prejudicar o exercício pleno da Odontologia.
( ) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
( ) Elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, incluindo os prontuários digitais.
( ) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente.

Assinale a sequência correta.

A) F, V, V, F
B) F, F, V, F
C) V, V, V, V
D) V, F, F, V

QUESTÃO 59

É responsabilidade do cirurgião-dentista a orientação e manutenção da cadeia asséptica por parte da equipe odontológica e também o respeito aos aspectos físico-estrutural, higiênico-sanitário e ergonômico do consultório. **NÃO** é conduta atribuída ao profissional responsável pelo consultório:

A) Viabilizar o serviço de controle de pragas (desinsetização e desratização) a cada semestre e registrá-lo para controle e comprovação.
B) Orientar a instalação do compressor de ar comprimido no banheiro e com proteção acústica eficiente.
C) Definir como obrigatória a desinfecção de moldagens, devido à presença de sangue ou saliva nas mesmas.
D) Disponibilizar para a lavagem/secagem das mãos da equipe sabonete líquido bactericida e toalhas de papel.

QUESTÃO 60

A boca tem vários tipos diferentes de célula e, por isso, ela pode ser atingida por diferentes tipos de câncer, e a atenção primária, como porta de entrada de todo o sistema de atenção em saúde, tem importante ação no controle dos fatores de risco e no diagnóstico precoce de alterações dos tecidos bucais.
Sobre câncer bucal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) O tabagismo em todas as suas formas (cigarro, cachimbo, charutos, rapé e fumo mascado) é o principal fator de risco para o câncer de boca.
( ) Eritroplasias levemente elevadas e assintomáticas que não saem quando raspadas estão incluídas nas lesões cancerizáveis da boca.
( ) Os locais mais comuns de câncer na boca são língua e palato e o gênero feminino é mais acometido que o masculino.
( ) Agentes bloqueadores dos canais de cálcio usados por longo prazo estão associados ao crescimento de alguns pontos da mucosa bucal, que podem ter risco aumentado de câncer bucal.

Assinale a sequência correta.

A) F, F, V, V
B) V, F, F, F
C) V, V, F, F
D) F, V, V, V

PREFEITURA DE PONTES E LACERDA

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº. 001/2019 - PMPL

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO

Questão	Alternativa
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Questão	Alternativa
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	

Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato.