

IABAS

Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

Processo Seletivo

MÉDICO PEDIATRA (NASF)

Data: 24/10/2010

Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português	Conhecimentos Gerais	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 30	31 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo:

A	B	■	D	E
---	---	---	---	---

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, acarretando a eliminação do candidato.

Somente decorridas 2 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 01 a 10.

SEXO, MENTIRAS E REMÉDIOS

A indústria farmacêutica não só financiou pesquisas como também ajudou a construir a ciência em torno de uma suposta nova condição, que foi chamada "disfunção sexual feminina", como forma de criar um mercado para novos remédios, afirma artigo publicado na edição desta semana da revista "British Medical Journal" (BMJ).

Em pesquisas para seu novo livro, "Sex, lies and pharmaceuticals" ("Sexo, mentiras e a indústria farmacêutica", em tradução livre), Ray Moynihan, da Universidade de Newcastle, na Austrália, descobriu que funcionários de laboratórios trabalharam junto com formadores de opinião pagos para desenvolverem um perfil para a doença, além de terem realizado estudos para mostrá-la como generalizada e criado ferramentas diagnósticas para convencer mulheres de que suas dificuldades sexuais tinham rotulação médica que precisavam de tratamento.

O marketing farmacêutico está se unindo à ciência médica de uma forma tão fascinante e assustadora que nos faz pensar se não devemos buscar uma nova maneira de definir as doenças – afirma ele, que cita uma funcionária como tendo dito que sua companhia estava interessada em "apressar o desenvolvimento de uma doença" por meio do financiamento de levantamentos que mostrassem que o problema era comum e poderia ser classificado como uma "desordem do desejo sexual hipotativo".

Segundo Moynihan, grande parte dos pesquisadores envolvidos ou eram empregados em laboratórios farmacêuticos ou tinham ligações financeiras com a indústria. Enquanto isso, estudos conduzidos sem o envolvimento das empresas colocavam em dúvida a existência do distúrbio. Apesar disso, as companhias lideraram uma campanha para "informar" tanto os profissionais quanto o público em geral sobre a condição.

(Jornal O Globo, 1 de outubro de 2010, com adaptações)

01. A ideia contida no primeiro parágrafo do texto pode ser resumida com a seguinte afirmativa:

- A) A indústria farmacêutica financiou pesquisas e deu ciência aos portadores de doenças graves que seus males tinham cura.
- B) A indústria farmacêutica financiou estudos, a fim de promover a existência de doença, para render tratamentos para uma manifestação letal.
- C) A indústria farmacêutica cria mercado para remédios eficazes a fim de financiar pesquisa sobre doença real, mas de causas desconhecidas.
- D) Funcionários de indústrias farmacêuticas trabalham em parceria com setores da mídia a fim de aumentar o mercado para novos remédios.
- E) Funcionários de indústrias farmacêuticas inventam perfil convincente para caracterizar doença rara, porém desconhecida.

02. Em "...sobre a condição..." (l. 29), a palavra em destaque retoma, por recurso de coesão anafórica, a expressão:

- A) "indústria" (l. 25)
- B) "distúrbio" (l. 27)
- C) "campanha" (l. 28)
- D) "dúvida" (l. 26)
- E) "público" (l. 29)

03. As aspas foram usadas como recurso expressivo de ironia em:

- A) "...disfunção sexual feminina",... (l. 3)
- B) "Sexo, mentiras e a indústria farmacêutica",... (l. 7)
- C) "...apressar o desenvolvimento de uma doença"... (l. 19/20)
- D) "...desordem do desejo sexual hipotativo". (l. 22)
- E) "...informar"... (l. 28)

04. Constitui exemplo de linguagem conotativa o emprego da expressão:

- A) ..."criar um mercado" ... (l. 4)
- B) ..."ferramentas diagnósticas" ... (l. 12)
- C) ..."marketing farmacêutico" ... (l. 15)
- D) ..."financiamento de levantamentos" ... (l. 20)
- E) ..."formadores de opinião" ... (l. 10)

05. Considerando a correção gramatical e a coerência textual, pode-se afirmar que:

- A) O verbo "precisar" em "...que precisavam de tratamento." (l. 14) pode ser flexionado no singular para concordar com "rotulação médica". (l. 13/14)
- B) A expressão "junto" (l. 10) pode ser flexionada no plural para concordar com "funcionários de laboratórios". (l. 9)
- C) O segmento "...além de terem realizado estudos..." (l. 11) poderia ser substituído por "além de terem sido realizados estudos", sem determinar alteração semântico-sintática.
- D) O termo "generalizada" (l. 12) pode ser flexionado no masculino, para concordar com o também adjetivo "criado". (l. 12)
- E) Os verbos ser e ter podem ser flexionados no singular, no segmento "...ou eram empregados em laboratórios farmacêuticos ou tinham ligações financeiras com a indústria." (l. 24/25), desde que se altere "empregados" para "empregada".

06. Constitui exemplo de regência nominal o emprego da expressão sublinhada em:

- A) "...afirma artigo publicado..." (l. 4)
- B) "...criado ferramentas diagnósticas..." (l. 12)
- C) "...financeiras com a indústria..." (l. 25)
- D) "...em dúvida a existência do distúrbio..." (l. 26/27)
- E) "...quanto o público em geral..." (l. 28/29)

07. No período "A indústria farmacêutica não só financiou pesquisas como também ajudou a construir a ciência em torno de uma suposta nova condição, que foi chamada 'disfunção sexual feminina'", (l. 1/3) a relação semântica que se estabelece entre as duas orações tem valor semântico de:

- A) oposição
- B) comparação
- C) adição
- D) consequência
- E) causa

08. A voz passiva foi empregada no segmento:

- A) "...como também ajudou a construir..." (l. 1/2)
- B) "...além de terem realizado..." (l. 11)
- C) "...está se unindo..." (l. 15)
- D) "...como tendo dito..." (l. 18)
- E) "...poderia ser classificado..." (l. 21/22)

09. A oração que mantém, com sua antecedente, relação diversa das demais é:

- A) "...que foi chamada 'disfunção sexual feminina'" (l. 3)
- B) "...que precisavam de tratamento." (l. 14)
- C) "...que cita uma funcionária..." (l. 18)
- D) "...que mostrassem..." (l. 20/21)
- E) "...que o problema..." (l. 21)

10. Em "...se unindo à ciência médica..." (l. 15), foi obrigatório o emprego do acento grave indicativo de crase. O uso do acento grave também é obrigatório na frase:

- A) Prefiro calar-me a falar de indústria farmacêutica.
- B) Dia a dia os remédios encarecem.
- C) Não permiti a ela a ingestão de alimentos gordurosos.
- D) As pessoas que amamos, sempre concedemos um pouco do nosso tempo ocioso.
- E) É penoso submeter-se a tratamento prolongado.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Em relação à dengue, é correto afirmar que:

- A) É uma doença infecciosa febril crônica.
- B) Seu curso em geral é grave.
- C) A apresentação clínica mais comum é a síndrome do choque da dengue.
- D) O período de incubação varia de 3 a 15 dias.
- E) O homem pode infectar o mosquito até o terceiro dia da doença.

12. Os sinais de alarme que indicam a possibilidade de gravidade do quadro clínico da dengue são:

- A) febre, dor abdominal intensa e contínua, e vômito persistente
- B) febre, agitação e hemorragia importante
- C) cefaleia, febre e dor abdominal
- D) cefaleia, vômito persistente e agitação
- E) dor abdominal intensa, hemorragia importante e agitação

13. Em relação à hanseníase é correto afirmar que:

- A) A classificação da hanseníase é realizada de acordo com o número de lesões cutâneas.
- B) A principal forma de contato é com a lesão de pele do paciente infectado.
- C) Pode ser transmitida hereditariamente.
- D) O período de incubação é, em média, de 5 a 10 anos.
- E) Para realizar o diagnóstico de hanseníase, é preciso encaminhar o paciente para unidades especializadas.

14. José, 32 anos, casado, desempregado, tabagista, faz uso diário de álcool. Mora com sua esposa e seus 3 filhos, Michael (7 anos), Rodrigo (5 anos) e Sthefany (2 anos). Procurou a Clínica da Família, pois há 30 dias apresenta tosse, febre vespertina e emagrecimento. A conduta em relação a essa situação é:

- A) Encaminhar o paciente José para serviço especializado de Pneumologia a fim de confirmar o diagnóstico e definir a conduta terapêutica, para, após essa definição, dar continuidade ao tratamento pela equipe da Clínica da Família.
- B) Solicitar o exame de escarro do paciente José e, caso seja positivo, encaminhá-lo para serviço de referência, para tratamento de tuberculose.
- C) Solicitar Rx de tórax do paciente e, caso haja alteração radiológica, encaminhar para serviço de referência, para tratamento de tuberculose.
- D) Solicitar exame de escarro para todas as crianças, caso se confirme o diagnóstico de tuberculose do pai, a fim de avaliar a conduta necessária.
- E) Confirmado o diagnóstico de tuberculose do pai, caso as crianças sejam assintomáticas e não tenham tomado a BCG, solicitar PPD para todas elas a fim de avaliar a conduta necessária.

15. As condições que demandam consulta médica em unidades especializadas de referência são:

- A) hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus em crianças, insuficiência renal crônica
- B) diabetes mellitus, insuficiência cardíaca congestiva e angina do peito
- C) insuficiência renal crônica, pé diabético e angina do peito
- D) hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus em gestantes e insuficiência cardíaca congestiva
- E) diabetes mellitus, insuficiência renal crônica e pé diabético.

16. Em relação às doenças cardiovasculares é correto afirmar que:

- A) A doença cardiovascular representa a segunda maior causa de mortes no Brasil.
- B) A hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus respondem por 30% dos casos de doença renal crônica terminal.
- C) Estima-se que 80% das pessoas com hipertensão arterial sistêmica desconheçam o seu diagnóstico.
- D) Estima-se que um terço dos pacientes que sabe do seu diagnóstico de diabetes mellitus faz acompanhamento nas Unidades Básicas de Saúde.
- E) O estresse psicossocial é um dos fatores de risco para doença cardiovascular.

17. Em relação às transformações ocorridas nos sistemas de saúde, é correto afirmar que:

- A) Os serviços brasileiros de assistência à saúde têm atendido às demandas sociais da população.
- B) Países com Atenção Primária à Saúde estruturada, possivelmente, terão melhores níveis de saúde.
- C) Os pacientes no Brasil estão satisfeitos com a qualidade de atenção recebida.
- D) Os profissionais de saúde no Brasil estão capacitados para enfrentar as mudanças da sociedade.
- E) O modelo biomédico é adequado para lidar com os principais problemas de saúde.

18. Em relação à organização dos sistemas de saúde, é correto afirmar que:

- A) Um sistema de saúde orientado para subespecialização garante a equidade.
- B) Os países com maior riqueza nacional garantem as melhores condições socioeconômicas para a sua população e produzem um alto nível de saúde.
- C) Quanto maior a desigualdade de renda dentro dos países, maior a desigualdade na saúde.
- D) Os países que investem em recursos de alta tecnologia orientada para as enfermidades possuem melhor nível de saúde.
- E) A atenção primária à saúde exige mais recursos financeiros do que a atenção especializada.

19. Maria, 30 anos, casada com Jorge há 7 anos, tem 3 filhos: Laura (5 anos), Carlos (3 anos) e Júlio (2 meses). Seu marido está desempregado há 1 ano. Maria procura a Clínica de Família, pois tem apresentado episódios diários de cefaleia. Em relação a problemas relacionados ao ciclo vital dessa família, é correto afirmar que:

- A) O desemprego do marido é considerado uma crise normativa.
- B) O nascimento de Júlio é considerado uma crise paranormativa.
- C) O sintoma da paciente pode estar relacionado à dificuldade de adaptação à nova situação de vida dessa família.
- D) O desemprego do marido não tem influência no ciclo vital da família.
- E) O sintoma da paciente provavelmente não tem relação com a nova situação de vida dessa família.

20. Em relação à estrutura das famílias, é correto afirmar que:

- A) Ao longo dos anos, a família manteve sua estrutura independentemente das modificações socioculturais.
- B) A família é considerada aquele grupo constituído por laços sanguíneos, com estruturas rígidas bem definidas.
- C) O divórcio não representa o fim da família, mas sua divisão em duas famílias nucleares.
- D) A família monoparental pode resultar da morte de um membro do casal.
- E) A família ampliada é comum em todas as classes sociais.

21. Em relação à dinâmica familiar, é correto afirmar que:

- A) O transtorno psicossomático de um indivíduo pode ser reflexo de uma disfunção familiar.
- B) A relação conjugal envolve a execução de uma função básica, que é satisfazer as necessidades objetivas do cônjuge.
- C) A relação conjugal pode se apresentar de duas formas: vital ou desvitalizada.
- D) Nos relacionamentos sadios entre o casal, o homem comanda a relação.
- E) Não falar sobre os problemas é uma boa forma de a família se fortalecer.

22. De acordo com a Portaria N°154, de 24 de janeiro de 2008, que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), é correto afirmar que os NASF:

- A) Respondem pela assistência dos pacientes com transtornos mentais moderados acompanhados pelas equipes de saúde da família.
- B) Constituem a porta de entrada dos pacientes com transtorno mental grave no sistema de saúde.
- C) Têm como objetivo fortalecer as práticas de referência e contrarreferência.
- D) Pretendem ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica.
- E) Atuam indiretamente no apoio às equipes de saúde da família.

23. Em relação aos princípios gerais da Atenção Básica no Brasil, é correto afirmar que:

- A) Orienta-se pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
- B) Caracteriza-se predominantemente por um conjunto de ações assistenciais de saúde, para resolver os problemas de saúde da população.
- C) Saúde da Família é a estratégia do Ministério da Saúde para reorganização da Atenção Básica no Brasil, nas áreas de baixas condições socioeconômicas.
- D) Possibilita o acesso pontual e programado aos serviços de saúde.
- E) Objetiva consolidar as práticas programáticas de saúde.

24. Na Política Nacional de Atenção Básica, são definidas as responsabilidades de cada esfera do governo em relação à Atenção Básica. As atribuições e a esfera do governo responsável por essas atribuições estão corretamente relacionadas na seguinte alternativa:

- A) inserir a estratégia de Saúde da Família na rede de serviços – estadual
- B) articular, com o Ministério da Educação, estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação na área da saúde – federal
- C) selecionar e contratar os profissionais que compõem a equipe de saúde da família – federal
- D) pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite e informar à Comissão Intergestores Tripartite a definição da utilização dos recursos para Compensação de Especificidades Regionais – municipal
- E) submeter à Comissão de Intergestores Bipartite, para a resolução acerca das irregularidades constatadas na execução do PAB fixo e variável – municipal

25. Em relação ao financiamento da Atenção Básica, é correto afirmar que:

- A) O Piso da Atenção Básica é composto de uma fração fixa e de outra, variável.
- B) O financiamento da atenção básica se dará por composição bipartite.
- C) O Piso da Atenção Básica constitui componente estadual para o financiamento da Atenção Básica.
- D) O componente fixo do Piso da Atenção Básica é destinado aos municípios com especificidades regionais.
- E) Os recursos do Piso da Atenção Básica serão transferidos trimestralmente para os Fundos Estaduais de Saúde.

26. As atribuições comuns a todos os profissionais que atuam numa equipe de saúde da família, definidas pela Política Nacional de Atenção Básica, são:

- A) planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde
- B) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário
- C) realizar ações de atenção integral, conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local
- D) solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observando as disposições legais da profissão
- E) realizar procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento de urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais

27. Um dos parâmetros que deve nortear a atenção pré-natal é:

- A) realização da primeira consulta de pré-natal até 60 dias de gestação
- B) escuta ativa da mulher e dos seus (suas) acompanhantes e esclarecimento de dúvidas
- C) realização de, no mínimo, 4 consultas de pré-natal
- D) encaminhamento para realização do pré-natal em serviços que disponham de maternidade
- E) alta do pré-natal no final da gestação, para que a paciente seja acompanhada em serviço que disponha de maternidade

28. A alternativa que apresenta contraindicação absoluta para aleitamento materno é:

- A) mastite
- B) fissuras
- C) mamas ingurgitadas
- D) mulheres com sorologia positiva para hepatite A
- E) mulheres com sorologia positiva para HIV

29. Em relação às condições de saúde da população brasileira, é correto afirmar que:

- A) Nas últimas décadas, as causas externas de mortalidade têm diminuído, totalizando 8% dos óbitos.
- B) Dentre as doenças do aparelho circulatório, as doenças cerebrovasculares e a doença isquêmica do coração representam as principais causas de óbitos.
- C) Houve um aumento da mortalidade pelas doenças infecciosas e parasitárias.
- D) As malformações congênitas são as principais responsáveis pela mortalidade infantil.
- E) Houve aumento significativo da mortalidade infantil.

30. A violência é um problema social que afeta as diversas faixas etárias. Entretanto, existem grupos mais vulneráveis à violência, como por exemplo, o dos idosos. Em relação à violência contra o idoso, é correto afirmar que:

- A) A violência familiar caracteriza-se por ação de agressão física que acontece no domicílio onde reside o idoso.
- B) Os serviços de saúde frequentemente identificam os sinais de maus-tratos contra o idoso.
- C) Os casos de suspeita de violência contra o idoso não precisam ser notificados.
- D) Apenas os casos confirmados de violência contra o idoso devem ser notificados.
- E) A violência psicológica caracteriza-se por toda ação ou omissão que causa ou visa a causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa idosa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A respeito da sinovite transitória do quadril, pode-se afirmar que:

- A) A artrite séptica deve ser afastada antes de confirmar o diagnóstico.
- B) A faixa etária mais comumente afetada é a da adolescência.
- C) Costuma evoluir com febre bastante elevada.
- D) Hipersensibilidade de origem alérgica é a causa mais comum.
- E) O tratamento de escolha é o uso de anti-inflamatórios não hormonais.

32. Em um paciente do sexo masculino, 10 anos de idade, com relato de edema recorrente em lábios, face, membros superiores e inferiores, sem urticária ou qualquer outra queixa, há quase um ano, exames complementares prioritários são:

- A) IgE sérica total e IgE específica para alimentos
- B) IgE específica para alérgenos inalatórios e alimentares
- C) C4 e inibidor de C1 esterase
- D) Fator H e inibidor de C1 esterase
- E) Autoanticorpos

33. Uma paciente do sexo feminino, 4 anos de idade, chega para atendimento na emergência com edema em face, urticária generalizada, tosse, taquidispneia e sibilância difusa, além de perfusão periférica lentificada e taquicardia. O início foi súbito, enquanto a paciente brincava no quintal de casa. A conduta imediata mais importante, no caso, é:

- A) procurar picada de himenópteros e fazer um tomiquete
- B) aplicar adrenalina por via intramuscular
- C) realizar beta2 agonista inalatório
- D) colocar a paciente em posição de Trendelenburg
- E) iniciar infusão de etapa rápida com solução cristalóide

34. A respeito da relação entre imunização ativa e imunização passiva, pode-se afirmar que:

- A) A resposta às vacinas (vivas e inativadas) aplicadas na criança menor de um ano é prejudicada pela transferência transplacentária de IgG materna.
- B) Caso o paciente receba aplicação de imunoglobulinas, não deve receber qualquer vacina por 4 meses.
- C) Caso o paciente receba transfusão de sangue total, não pode receber qualquer vacina por até 3 meses.
- D) A resposta às vacinas inativadas não é prejudicada pela imunização passiva concomitante.
- E) A replicação de vírus atenuados pós-vacinação não é prejudicada pela imunização passiva concomitante.

35. A anticoncepção na adolescência é assunto de extrema relevância e, para atuar adequadamente nesse aspecto, o pediatra deve conhecer as diretrizes relacionadas à saúde sexual e reprodutiva dessa faixa etária. Uma dessas diretrizes é:

- A) Independentemente do relato da paciente, menor de 14 anos sexualmente ativa é considerada vítima de estupro.
- B) O adolescente menor de 16 anos tem direito à privacidade, mas os pais sempre devem ser informados sobre todo o teor da consulta, independentemente de seu consentimento.
- C) A prescrição de anticoncepcionais para menores de 14 anos é vedada ao médico.
- D) Consulta médica somente com o adolescente deve ser estimulada, mesmo que não seja esse o desejo do jovem, para estimular sua autonomia.
- E) O médico pode prescrever anticoncepção de emergência a adolescentes em risco iminente de gravidez em caso de falha no método anticoncepcional em uso.

36. Em crianças pré-escolares e escolares, a principal causa de hipertensão arterial é:

- A) essencial ou primária, principalmente relacionada à obesidade
- B) secundária, relacionada a doenças renais ou renovasculares
- C) primária, relacionada à alta ingestão de sal na alimentação
- D) secundária, por doenças endócrinas, tal como hipertireoidismo
- E) secundária, ligada a cardiopatias congênitas

37. Uma paciente do sexo feminino, 7 anos de idade, apresenta duas áreas de alopecia em couro cabeludo, com intensa reação inflamatória (eritema e secreção purulenta). O diagnóstico mais provável e o tratamento de escolha são, respectivamente:

- A) alopecia areata – corticosteroide tópico
- B) kerion – griseofulvina por via oral
- C) alopecia de tração – educação quanto à forma de prender cabelos
- D) kerion – itraconazol por via oral
- E) alopecia areata – psicoterapia

38. Paciente de 2 anos de idade, com peso estimado de 14 Kg, está em parada cardiorrespiratória. Para realizar intubação orotraqueal, deve-se escolher:

- A) tubo tamanho 4,5 com laringoscópio lâmina reta
- B) tubo tamanho 3,5 com laringoscópio lâmina reta
- C) tubo tamanho 5,5 com laringoscópio lâmina curva
- D) tubo tamanho 4,5 com laringoscópio lâmina curva
- E) tubo tamanho 5 com laringoscópio lâmina reta

39. A respeito do acesso intraósseo em situação de parada cardiorrespiratória, é possível afirmar que:

- A) É útil para infusão de líquidos, mas não de medicamentos.
- B) O local mais utilizado é a crista ilíaca superior anterior.
- C) Deve ser instalado, caso o acesso venoso não seja obtido rapidamente.
- D) Implica aplicação de antibióticos profiláticos, sempre.
- E) Derivados de sangue não devem ser aplicados por essa via.

40. Um menino, com 2 meses de vida, terceiro filho, em aleitamento materno exclusivo, apresenta há pouco mais de duas semanas, vômitos diários (1 a 2 vezes), sem relação com a alimentação. Não há febre. Há dois dias, os episódios de vômitos se tornaram mais frequentes e o paciente está mamando menos. Ao exame físico, o menino está desidratado, sem outras anormalidades. Exames complementares revelam hemograma normal, com hipercalemia importante, com hiponatremia e hipocloremia, sem alcalose. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) estenose hipertrófica de piloro
- B) alergia ao leite de vaca ingerido pela mãe
- C) atresia duodenal
- D) hiperplasia adrenal congênita – defeito de 21-hidroxilase
- E) hiperplasia adrenal congênita – defeito de 11 β -hidroxilase

41. Uma menina de 5 anos de idade apresenta crescimento unilateral de glândula mamária, sem outras alterações no exame físico. Em relação ao caso, é correto dizer que:

- A) Trata-se de um caso de puberdade precoce, provavelmente idiopática.
- B) O diagnóstico mais provável é de pseudo-puberdade precoce, por hiperplasia adrenal congênita.
- C) Provavelmente, trata-se de um caso de puberdade precoce incompleta, por tumor ovariano.
- D) A principal suspeita é de tumor intracraniano com puberdade precoce verdadeira.
- E) Mais provavelmente é uma telarca precoce, uma variante do desenvolvimento puberal normal.

42. Um menino de 9 anos de idade que apresenta xantomas cutâneos em mãos, punhos, cotovelos e joelhos, apresenta colesterol total acima de 500mg/dl, com níveis normais de triglicérides e de VLDL. Nesse caso, pode-se afirmar que:

- A) Trata-se de uma hipercolesterolemia familiar homozigótica.
- B) O risco de doença cardiovascular aterosclerótica precoce é pequeno.
- C) O tratamento de escolha são as estatinas.
- D) O tratamento definitivo preconizado é o transplante de fígado.
- E) Xantomas de tendões não ocorrem nessa dislipidemia congênita.

43. Um paciente de dois anos apresentou um episódio de gastroenterite aguda com febre, diarreia e vômitos por 3 dias. Após esse período, a diarreia persistiu, sem febre ou vômitos. O paciente vem apresentando, há 3 semanas, fezes explosivas, com distensão abdominal, flatulência e dermatite perianal importante. O diagnóstico mais provável para o caso é:

- A) alergia ao leite de vaca
- B) parasitose intestinal
- C) síndrome do intestino irritável
- D) doença de Crohn
- E) intolerância à lactose

44. A esofagite eosinofílica alérgica se apresenta mais comumente na infância como:

- A) refluxo gastroesofágico crônico
- B) impação alimentar
- C) dor abdominal
- D) perda ponderal
- E) diarreia crônica

45. Em um paciente com anemia ferropriva para o qual se inicia tratamento com sal de ferro, espera-se que se inicie reticulocitose, com um pico, respectivamente, em:

- A) 12 horas / 3 a 5 dias
- B) 24 horas / 5 a 7 dias
- C) 48 horas / 5 a 7 dias
- D) 48 horas / 7 a 14 dias
- E) 24 horas / 3 a 5 dias

46. A respeito da sífilis congênita, pode-se afirmar que:

- A) A taxa de transmissão durante a gestação é de menos de 50%.
- B) Morte fetal é bastante rara.
- C) As manifestações precoces acontecem principalmente em ossos e dentes.
- D) A maioria dos pacientes é assintomático ao nascimento.
- E) A pseudoparalisia de Parrot é uma manifestação tardia comum.

47. Em paciente de 10 anos de idade com suspeita de dengue, que apresenta febre há 5 dias, e vem apresentando importante dor abdominal há 24 horas, sem evidências de sangramento, o hemograma revela 2300 leucócitos, 80000 plaquetas e hematócrito de 46% (hemograma do terceiro dia de doença mostrava 4000 leucócitos, 100000 plaquetas e 34% hematócrito). O paciente deve ser considerado como um caso de dengue na forma:

- A) atípica
- B) clássica
- C) hemorrágica grau III
- D) síndrome de choque
- E) hemorrágica grau I

48. Um paciente de 8 anos de idade, com diagnóstico de glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica há um ano, apresenta-se assintomático, mas com hematúria microscópica persistente. Nessa situação, deve-se considerar que:

- A) Nesses casos, a hematúria pode persistir por até 2 anos após o diagnóstico.
- B) Deve-se investigar uma glomerulopatia membranoproliferativa.
- C) Lúpus eritematoso sistêmico deve ser cogitado como diagnóstico.
- D) Deve-se investigar outras causas infecciosas para a glomerulonefrite aguda.
- E) Há indicação de biópsia renal.

49. Um dos critérios para que se classifique a artrite idiopática juvenil é:

- A) idade de início menor que 18 anos
- B) artrite em mais de 3 articulações, por mais de 6 semanas
- C) tipo de início definido nos primeiros 6 meses de doença
- D) artralgia(s) por mais de 6 semanas
- E) febre de moderada a elevada por mais de 6 semanas

50. Uma característica encontrada em cefaleias de origem orgânica é:

- A) aparecimento ao final do dia
- B) estar associada a sintomas visuais
- C) ocorrer logo após o despertar
- D) ser unilateral
- E) estar relacionada a estresse