

## **2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

### **PSIQUIATRIA**

21. Quatro pacientes diferentes foram atendidos no ambulatório, apresentando na consulta um conjunto de características colhidas durante o histórico feito pelo psiquiatra. Qual destes pacientes tem as características cuja soma permite, pelo psiquiatra, que se tenha uma previsão de uma boa resposta terapêutica no tratamento da esquizofrenia?

- a) Início insidioso, idade acima dos trinta anos, delírios e alucinações abundantes.
- b) Início agudo, embotamento do afeto, desorganização do pensamento.
- c) Início agudo, acima dos trinta anos, delírios e alucinações.
- d) Início insidioso, abaixo dos trinta anos, pensamento empobrecido.

22. Em relação à clozapina, é incorreto afirmar que:

- a) Sua principal indicação se encontra nos casos de esquizofrenia refrataria.
- b) Aumenta o risco de obesidade.
- c) Seu uso implica em frequente controle da glicemia.
- d) É indicada em psicoses ocorridas durante a doença de Parkinson.

23. Paciente comparece à emergência com os seguintes sintomas: medo intenso e difuso, taquicardia, sudorese, tremores e suores frios de início repentino. Com relação aos sintomas, é incorreto afirmar que:

- a) Hipertireoidismo, feocromocitoma e abstinência aos benzodiazepínicos constituem diagnóstico diferencial.
- b) Os transtornos de pânico são incomuns em pessoas acima dos trinta anos.
- c) Ansiedade antecipatória está frequentemente associada.
- d) Estes pacientes frequentemente requisitam a presença de acompanhantes para suas atividades cotidianas.

24. Paciente jovem apresentando quadro de rigidez, hipertermia, alteração da consciência e uso irregular de neurolépticos. Assinale a alternativa correta:

- a) Os testes neuropsicológicos apresentam alta sensibilidade para o esclarecimento diagnóstico.
- b) A tomografia computadorizada de crânio apresenta alta especificidade para o diagnóstico.
- c) A presença de leucocitose acima de 10.000mm afasta o diagnóstico de síndrome neuroléptica maligna.
- d) O aumento de creatino-fosfoquinase aumenta as suspeitas de síndrome neuroléptica maligna.

25. Qual é a alternativa mais correta para se caracterizar a distímia?

- a) Episódios de desesperança, fuga de ideias, ideação suicida.
- b) Apatia, tristeza, perda de interesse em períodos longos e de baixa gravidade.
- c) Alteração súbita da atenção com comprometimento cognitivo importante, irritabilidade frequente.
- d) Presença ao mesmo tempo de sintomas depressivos e ansiosos, sem predominância de um ou de outro.

26. Com relação à esquizofrenia, assinale a alternativa correta:

- a) A incidência da esquizofrenia na população geral é distribuída de modo uniforme pelo mundo.
- b) A taxa de mortalidade é a mesma que a encontrada na população geral.
- c) O risco de suicídio é o mesmo que o encontrado na população geral.
- d) O risco de esquizofrenia em indivíduos cujos pais são esquizofrênicos gira em torno de 40%.

27. Com relação aos estabilizadores do humor, assinale a alternativa correta:

- a) Um dos maiores problemas do lítio é o de exigir grande e ativa adesão ao tratamento por um período praticamente indefinido, nos pacientes assintomáticos.
- b) Comparado aos outros estabilizadores do humor, o lítio é o que apresenta o menor efeito colateral indesejável.
- c) A insuficiência hepática não é critério de contraindicação ao uso de valproato de sódio.
- d) Associação de estabilizadores do humor, em pacientes com transtorno bipolar, quando o uso de apenas um deles se mostrou insatisfatório, não evidenciou eficácia superior ao uso solado de apenas um.

28. Em relação aos transtornos da vontade, assinale a alternativa incorreta:

- a) Atos impulsivos são caracterizados por ausência de intencionalidade, irrefletidos e geralmente associados à baixa capacidade de tolerar frustração.
- b) Atos compulsivos se caracterizam como indesejável, inadequado, e ocorrem frequentemente associados às ideias obsessivas.
- c) No automatismo mental, o indivíduo age, mas não reconhece seus atos como derivados de sua vontade.
- d) No negativismo, não há envolvimento da vontade.

29. Marque a alternativa incorreta:

- a) Na anorexia nervosa, o fenômeno psicopatológico principal é a distorção da imagem corporal.
- b) O obeso grave é frequentemente descrito como um indivíduo carente de afeto, sensível a frustração e que muitas vezes se defende da sexualidade.
- c) A anorexia nervosa incide exclusivamente em garotas adolescentes e adultas jovens.
- d) O comer compulsivo é um quadro próximo à bulimia, mas dele se diferencia pela ausência de vômitos e por marcante sentimento de culpa, após ter comido de forma exagerada.

30. O bloqueio persistente de receptores de dopamina D2 por drogas antipsicóticas causa uma regulação ascendente da densidade desse subtipo de receptores de dopamina. Essa regulação ascendente de receptores de D2 está mais diretamente associada com o desenvolvimento de:

- a) Distonia aguda.
- b) Dessensibilização da dopamina no Locus Ceruleus.
- c) Hipersensibilidade à dopamina no corpo estriado.
- d) Discinesia precoce.

31. Estudos psicanalíticos do funcionamento global da personalidade e curso de vida envolveram os conceitos de defesa do ego em três níveis: maduras, intermediárias ou neuróticas e imaturas. Identifique a única defesa abaixo que não pertence ao primeiro grupo acima mencionado (maduras):

- a) Intelectualização.
- b) Humor.
- c) Antecipação.
- d) Sublimação.

32. Com relação à amnésia orgânica, não podemos afirmar que:

- a) A amnésia anterógrada é a perda de memória de eventos passados.
- b) A confabulação é uma falsa memória.
- c) Uma síndrome amnésica ocorre após a encefalopatia de Wernicke.
- d) A amnésia pode ocorrer após convulsões epilépticas.

33. No exame do estado mental, a aparência e o comportamento são áreas a serem observadas, inicialmente. A flexibilidade cêrea é um sinal que pode ser classificado como:

- a) Um tique.
- b) Um sinal extrapiramidal.
- c) Um sinal de narcolepsia.
- d) Uma estereotípia.

34. Com relação ao sistema multiaxial do DSM-IV-TR, não podemos afirmar que:

- a) Serve para o clínico planejar o tratamento e prever o resultado.
- b) O eixo II inclui os transtornos de personalidade.
- c) O eixo II inclui o retardo mental.
- d) O eixo IV trata da avaliação global do funcionamento.

35. Com relação ao diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático, segundo o DSM-IV-TR, podemos afirmar que:

- a) A duração da perturbação tem que ser igual ou superior a quinze dias.
- b) Sintomas de revivências, de embotamento emocional e de evitação são manifestações sintomáticas do transtorno.
- c) Considera-se especificador de quadro crônico a duração superior a seis meses.
- d) O início tardio é quando o início se dá após 1 ano do estressor.

36. Quanto à lamotrigina e ao topiramato, não se pode afirmar que:

- a) Parecem ter efeito estabilizador do humor.
- b) A lamotrigina está associada significativamente com o desenvolvimento de reações cutâneas graves.
- c) Quando associados a outros antiepilépticos pode surgir sonolência.
- d) Não parecem ter efeito antidepressivo.

37. Identifique a medicação que não está recomendada para o transtorno de pânico:

- a) Alprazolam.
- b) Paroxetina.
- c) Bupropiona.
- d) Ácido valpróico.

38. Os principais mecanismos de defesa nas fobias são:

- a) Antecipação.
- b) Deslocamento.
- c) Projeção.
- d) Evitação.

39. São drogas mais comumente associadas à indução de psicose, exceto:

- a) Carbamazepina.
- b) Anticolinérgicos.
- c) Cocaína.
- d) L-Dopa.

40. Com relação ao transtorno factício, segundo o DSM-IV-TR, não podemos afirmar que:

- a) Pode haver produção intencional de sintomas físicos.
- b) Pode haver simulação de sintomas psicológicos.
- c) A motivação para o comportamento consiste em assumir o papel de enfermo.
- d) Não é incomum encontrar-se incentivos externos para o comportamento (p.e. vantagens econômicas ou legais).

41. Com relação aos sinais e sintomas em psiquiatria, é possível afirmar que:

- a) A ideia supervalorizada é um tipo de delírio.
- b) O delírio é uma alteração da percepção.
- c) Acrofobia é o medo de lugares abertos.
- d) Disprosódia é a perda da melodia normal da fala.

42. A aplicação de qualquer tipo de vacina deve ser adiada em algumas circunstâncias, exceto:

- a) A amnésia dissociativa (F44.0) decorre de um quadro mental orgânico.
- b) Na fuga dissociativa (F44.1), o paciente pode chegar a assumir nova identidade temporariamente.
- c) No estupor dissociativo (F44.2), a investigação levará a uma causa física.
- d) Os transtornos de transe e possessão (F44.3) podem ser manifestações de uma epilepsia de lobo temporal ou de uma esquizofrenia.

43. Com relação aos princípios da psicofarmacologia, podemos afirmar que:

- a) Quanto à farmacocinética, os idosos têm o metabolismo mais acelerado.
- b) Nas grávidas, deve-se normalmente evitar a interrupção do fármaco a qualquer custo.
- c) A alta taxa de metabolismo das crianças requer uma razão mg/kg mais alta que a dos adultos.
- d) Aos hepatopatas e aos nefropatas são necessárias doses mais altas de psicofármacos.

44. Com relação aos transtornos específicos da forma do pensamento, podemos afirmar que:

- a) O neologismo é uma mistura incoerente de palavras ou frases.
- b) A circunstancialidade inclui um discurso que nunca chega ao objetivo.
- c) Na tangencialidade, há incapacidade de ter associações de pensamentos direcionados para objetivos.
- d) O descarrilhamento não pertence a este grupo.

45. São efeitos possíveis, mais comumente achados na prática clínica, do lítio, exceto:

- a) Tremor.
- b) Diarreia.
- c) Alteração nos hormônios da tireoide.
- d) Diminuição da contagem de leucócitos.

46. O tipo erotomaníaco é uma especificação, no DSM-IV-TR, de:

- a) Um episódio maníaco.
- b) Um transtorno maníaco.
- c) Um transtorno delirante.
- d) Um transtorno obsessivo-compulsivo.

47. Qual a correlação incorreta a respeito dos critérios para os diferentes tipos de transtornos de personalidade, segundo o DSM-IV-TR:

- a) No transtorno de personalidade esquizoide, o indivíduo tem pensamento e discurso bizarros.
- b) No transtorno de personalidade esquizotípica, o indivíduo tem afeto inadequado ou constrito.
- c) No transtorno de personalidade borderline, o indivíduo tem sentimentos crônicos de vazio.
- d) No transtorno de personalidade narcisista, o indivíduo tem ausência de empatia.

48. Identifique a afirmativa falsa sobre o suicídio:

- a) Os homens tentam mais o suicídio do que as mulheres.
- b) Os adolescentes são mais vulneráveis que os adultos jovens.
- c) Os homossexuais são mais vulneráveis que os heterossexuais.
- d) Os portadores de comportamento criminoso são mais vulneráveis do que os não portadores.

49. Relativo a interações medicamentosas do valproato com outras medicações, identifique a afirmativa falsa:

- a) Há aumento do tremor com o uso de lítio.
- b) As concentrações séricas de fenitoína aumentam.
- c) As concentrações séricas de diazepam aumentam.
- d) Aumentam os efeitos extrapiramidais com o uso de antipsicóticos.

50. O transtorno psicótico breve, segundo o DSM-IV-TR, tem como critérios diagnósticos:

- a) Duração de, no máximo, 3 meses.
- b) Possível presença de delírios.
- c) Ausência incondicional de alucinações.
- d) Melhor explicado por um episódio depressivo com sintomas psicóticos.