## 2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### UROLOGIA

21. As doenças sexualmente transmissíveis que mais frequentemente se manifestam por úlcera genital têm como causa os seguintes agentes etiológicos, exceto:

a) Treponema pallidum.
b) Haemophilus ducreyi.
c) Sarcoptes scabiei.
d) Chlamydia trachomatis.

22. Dentre as Doenças Sexualmente Transmissíveis listadas abaixo, a que geralmente apresenta como período de incubação de 07 a 28 dias é:

a) Cancro mole.
b) Cancro duro.
c) Donovanose.
d) Herpes genital.

23. Os seguintes antibióticos são recomendados para o tratamento do Cancro mole ou Cancroide, exceto:

a) Ceftriaxona.
b) Sulfametoxazol + Trimetropim.
c) Ciprofloxaxina.
d) Azitromicina.

24. Podem ser considerados como causas de cistite hemorrágica, exceto:

a) Síndrome de Fournier.
b) Adenovírus, Influenza.
c) Amiloidose.
d) Violeta Genciana, Anilina.

25. Os antibióticos listados abaixo podem ser utilizados com segurança durante a gestação e representam os agentes de primeira escolha nessa circunstância, exceto:

a) Quinolonas.
b) Penicilinas.
c) Cefalosporinas.
d) Fosfomicina.

26. Quais os hormônios que apresentam alteração dos seus níveis basais na vigência de orquite pós-parotidite pelo Paramyxovirus:

a) Alfa-feto-proteína + beta-HCG.
b) FSH + Testosterona.
c) LH + FSH.
d) LH + Testosterona.

27. Com o tratamento imunossupressor, nos casos de transplante renal, os pacientes receptores do enxerto podem desenvolver infecções oportunistas simples ou graves. Neste tópico merece destaque a infecção por _____ com pico de incidência entre o primeiro e o segundo mês pós-transplante, quando poderá ocorrer necrose ureteral por essa infecção com fístula urinária subsequente e necessidade de tratamento cirúrgico aberto.

a) Staphylococcus sp.
b) Estreptococos beta-hemolíticos.
c) Herpes.
d) Citomegalovírus.

28. Pacientes com câncer de próstata e dor por metástases ósseas devem esgotar as formas de manipulação hormonal. O uso de bifosfonados do dietilestilbestrol é uma alternativa atraente que apresenta bons resultados em 30% dos casos, mas tem morbidade elevada devido aos fenômenos:

a) Imunossupressores.
b) Hemorrágicos.
c) Tromboembólicos.
d) Nefrotóxico.

29. As doenças abaixo discriminadas fazem com que os pacientes apresentem altos riscos de toxicidade renal pelo material de contraste intravenoso, exceto:

a) Nefropatia diabética.
b) Pneumoconiose.
c) Mieloma múltiplo.
d) Amiloidose.

30. Em relação ao estadiamento do carcinoma de próstata através de tomografia computadorizada, é falso dizer que:

a) A tomografia computadorizada tem valor apenas limitado no estadiamento do carcinoma de próstata.

b) A diferenciação entre a neoplasia e o tecido glandular normal é raramente possível nos casos de doença localizada.

c) A neoplasia somente é detectada nos casos avançados com extensão extraprostática para a base da bexiga ou vesículas seminais.

d) As metástases para linfonodos pélvicos são de fácil visualização.

31. A aniridia é a ausência do desenvolvimento da maior parte da íris e a aniridia espontânea em crianças está associada à ocorrência de tumor:

a) Vesical.
b) Ureteral.
c) Renal.
d) Testicular.

32. São achados sugestivos ao exame físico de torção testicular, exceto:

a) A elevação do testículo promove alívio imediato.
b) O testículo mostra-se muito doloroso e elevado.
c) O cordão espermático torna-se espesso e de difícil distinção.
d) O reflexo cremastérico muitas vezes está abolido.

33. Cite o método definitivo para se diagnosticar torção testicular:

a) Cintilografia.
b) Ressonância magnética.
c) Ultrassonografia com doppler colorido.
d) Exploração cirúrgica.

34. Qual exame detecta com maior vantagem hidronefrose em crianças:

a) Cintilografia.
b) Ultrassonografia.
c) Tomografia computadorizada.
d) Ressonância magnética.

35. Qual o tipo histológico mais comum de câncer de bexiga:

a) Adenocarcinoma.
b) Carcinoma de células transicionais.
c) Carcinoma epidermoide.
d) Sarcoma.

36. As drogas antimuscarínicas atuam nos receptores muscarínicos responsáveis pela contração vesical. O mecanismo de ação bloqueia os receptores muscarínicos envolvidos na contração vesical. Atualmente, constituem as drogas de primeira escolha para o tratamento da hiperatividade detrusora, segundo a Agência Americana de Política de Saúde e Pesquisa (AHCPR). É exceção:

a) Brometo de propantelina.
b) Cloridrato de oxibutinina.
c) Cloridrato de tansulosina.
d) Tartarato de tolterodina.

37. O exame urológico considerado como melhor método para avaliação funcional do trato urinário inferior é:

a) Estudo urodinâmico completo.
b) Videourodinâmica.
c) Uretrocistografia miccional.
d) Ultrassonografia com estudo doppler.

38. O exame da região lombo-sacra à procura de manifestação cutânea de disrafia espinal oculta é de grande importância e obrigatória em crianças com disfunções urinárias. Oitenta a noventa por cento dos pacientes com espina bífida apresentam sinais ou estigmas lombo-sacros que direcionam o diagnóstico. Dos sinais listados abaixo é exceção:

a) Lipoma.
b) Hemangioma.
c) Verrugas cutâneas.
d) Depressões cutâneas.

39. Dentre os agentes atualmente utilizados para terapia intra-vesical dos tumores superficiais não-invasivos, aquele que tem obtido melhor resultado na prevenção de recidivas e progressão da doença, principalmente para os tumores papilíferos mais indiferenciados e CIS é:

a) Tiotepa.
b) BCG.
c) Adriamicina.
d) Mitomicina C.

40. São tumores não-germinativos dos testículos, exceto:

a) Tumores das células de Leydig.
b) Tumores das células de Sertoli.
c) Tumores de células da Teca.
d) Tumores trofoblásticos.

41. Das neoplasias malignas que acometem os pacientes submetidos a transplante de rim com maior frequência, é exceção:

a) Carcinoma basocelular.
b) Carcinoma epidermoide.
c) Linfoma.
d) Melanoma.

42. As artérias testiculares se originam mais comumente da (s):

a) Artérias renais.
b) Artérias suprarrenais.
c) Aorta abdominal acima da artéria mesentérica superior.
d) Aorta abdominal abaixo das artérias renais.

43. A glicose será detectada na urina quando o nível do soro estiver acima de:

a) 75 mg/dl.
b) 100 mg/dl.
c) 150 mg/dl.
d) 180 mg/dl.

44. Quantos "french" (Fr) são aproximadamente um milímetro de diâmetro:

a) 1 Fr.
b) 1,5 Fr.
c) 3 Fr.
d) 5 Fr.

45. Um homem com 24 anos veio recentemente da Síria e foi diagnosticado anteriormente com esquistossomose urinária. Ele não recebeu qualquer tratamento. Seus registros médicos da Síria traziam a informação de que tinha infecção causada por *S. haematobium* e uma urografia excretora demonstrou hidroureter grave à esquerda com uma lesão ureteral distal segmentar e retardo de excreção. Apresenta níveis normais de creatinina. Ele poderia ser tratado inicialmente com:

a) Cistoscopia com colocação de stent ureteral.
b) Colocação de nefrostomia percutânea seguida de tratamento clínico.
c) Ureterectomia parcial com ureteroureterostomia primária.
d) Tratameto clínico com praziquantel oral.

46. Qual é o local mais comum de drenagem de um ureter ectópico em um homem:

a) O ducto deferente.
b) A uretra anterior.
c) A vesícula seminal.
d) A uretra posterior.

47. Qual é a causa mais comum de micropênis:

a) Hipogonodismo hipogonadotrópico.
b) Deficiência do hormônio de crescimento.
c) Insuficiência testicular primária.
d) Síndrome de insensibilidade do androgênio.

48. Qual é a forma mais comum de sarcoma renal:

a) Lipossarcoma.
b) Rabdossarcoma.
c) Fibrossarcoma.
d) Leiomiossarcoma.

49. O melanoma peniano primário é considerado raro, por qual motivo:

a) A pele peniana está protegida contra a exposição ao sol.
b) O conteúdo de queratina na pele peniana é menor.
c) O suprimento sanguíneo peniano evita o desenvolvimento de tumor.
d) Há a presença de quimioterapia tópica efetiva.

50. As dificuldades em passar um ureteroscópio flexível podem ser diminuídas por todas as manobras a seguir, com exceção de qual:

a) Remoção do fio guia de segurança.
b) Esvaziamento da bexiga.
c) Dilatação do orifício ureteral.
d) Rotação do ureteroscópio de maneira que o fio guia esteja na posição 12 horas.