MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, SOB A FORMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO PARA ENFERMEIROS, NOS MOLDES DE RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM (C-EENF) DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM 2011)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL EXTRA

ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

1) Segundo Marangoni e Schechter, a hemocultura é o único teste que estabelece o diagnóstico de bacteremia. A correlação entre o volume de sangue colhido e a positividade do exame é de grande importância. Assinale a opção que corresponde ao volume de sangue mínimo, recomendado por coleta.

(A) 2ml
(B) 4ml
(C) 6ml
(D) 8ml
(E) 10ml

2) As mulheres grávidas têm risco acrescido de síndrome tromboembólica, devido às alterações fisiológicas associadas com a gestação. Em relação à síndrome tromboembólica, segundo Rezende, assinale a opção **INCORRETA**.

(A) A varicoflebite acomete o sistema profundo e determina embolia.
(B) A perna esquerda é a mais acometida em 90% dos casos.
(C) O tratamento farmacológico poderá ser feito com Warfarina.
(D) Cor pulmonale, dispnéia, escarro hemoptóico e taquicardia são os sinais torácicos da síndrome.
(E) Nas tromboflebites de membros inferiores é assídua a dor na panturrilha provocada ao executar-se a dorsiflexão do pé.

3) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração, prioritariamente, a necessidade e o direito de Assistência de Enfermagem à população e de sua organização. Em relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem assinale a afirmativa correta.

(A) É dever do profissional associar-se, exercer cargos e participar de atividades de Entidades de Classe.
(B) A multa é uma penalidade que consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator.
(C) A suspensão é uma penalidade que consiste na perda do direito do Exercício da Enfermagem.
(D) A penalidade de cassação do registro profissional é de competência do conselho regional de Enfermagem.
(E) São consideradas infrações graves as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou ainda, dano moral irremediável.

4) Um paciente do sexo masculino, de 62 anos, foi submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio. Na Unidade Coronariana, a enfermeira fez o diagnóstico de débito cardíaco diminuído relacionado à perda sanguínea e função miocárdica comprometida. Segundo Brunner, quais das ações a seguir podem ser implementadas para restaurar o débito cardíaco de acordo com o diagnóstico de enfermagem estabelecido?

(A) Auscultar o tórax para os sons respiratórios.
(B) Pesar diariamente quando o paciente está deambulando.
(C) Observar para as distorções da percepção, alucinações e desorientações.
(D) Aspirar as secreções traqueobrônquicas de acordo com a necessidade.
(E) Avaliar os pulsos periféricos (pedioso, tibial, radial, carotídeo).

5) Segundo Brunner e Suddarth, a insuficiência respiratória aguda (IRA) é definida como uma queda na pressão de oxigênio arterial (PaO2) e uma elevação na pressão de dióxido de carbono (PaCo2).Assinale a opção que indica hipoxemia e hipercapnia, respectivamente.

(A) PaO2 60 mmHg e PaCo2 30 mmHg.
(B) PaO2 70mmHg e PaCo2 20mmHg.
(C) PaO2 30mmHg e PaCo2 60mmHg.
(D) PaO2 55mmHg e PaCo2 25mmHg.
(E) PaO2 80mmHg e PaCo2 30mmHg.

6) Segundo Kaplan e Sadock, a esquizofrenia é um transtorno de causas desconhecidas, caracterizada por sintomas psicóticos. São sinais e sintomas de esquizofrenia, **EXCETO**

(A) delírios e estupor.
(B) alucinações e negativismo.
(C) discurso desorganizado e agitação.
(D) embotamento afetivo e ecolalia.
(E) dificuldade de concentração e insônia terminal.

7) As queimaduras são classificadas de acordo com a profundidade da destruição tecidual. A profundidade da queimadura determina se ocorrerá a reepitelização. Segundo Brunner, um indivíduo que apresenta uma lesão por queimadura de base avermelhada mosqueada, bolhosa, edema, dor e hiperestesia, apresenta uma queimadura de espessura

(A) parcial superficial.
(B) plena profunda.
(C) total profunda.
(D) parcial profunda.
(E) plena.

8) O término da gravidez antes da viabilidade é definido como abortamento. Segundo Ziegel, o aborto que se caracteriza pela presença de sangramento, com dilatação cervical progressiva, e frequentemente, ruptura das membranas com perda de líquido amniótico é designado

(A) incompleto.
(B) retido.
(C) habitual.
(D) inevitável.
(E) completo.

9) Segundo Kawamoto, o termo anidrose refere-se à

(A) perda da força motora dos músculos.
(B) ausência ou diminuição do suor.
(C) debilidade muscular.
(D) sensação de fraqueza.
(E) diminuição da secreção salivar.

10) Segundo Brunner e Suddarth, a calota craniana contém o tecido cerebral, sangue e líquido cefalorraquidiano. O volume e a pressão desses três componentes estão, em geral, em um estado de equilíbrio e produzem a pressão intracraniana (PIC). A PIC normal é de (em mmHg)

(A) 30 a 40
(B) 10 a 20
(C) 8 a 12
(D) 5 a 8
(E) 2 a 4

11) Analise as afirmativas abaixo, segundo Lolita Silva.

I - Após a administração do Fentanil deve-se observar a pressão arterial e frequência respiratória, pois a droga pode ocasionar hipertensão e taquicardia.
II - O gluconato de cálcio não deve ser utilizado em pacientes com intoxicação digitálica e hipercalemia.
III- A hipoglicemia é uma das reações adversas ocasionadas pela furosemida.
IV - A nitroglicerina é um agente hipotensor severo.
V - Paralisia flácida, bloqueio neuromuscular e tremores são sintomas que podem aparecer após o uso do sulfato de magnésio.

Assinale a opção correta.

(A) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.
(B) Apenas as afirmativas I, II e III são corretas.
(C) Apenas as afirmativas I, III e IV são corretas.
(D) Apenas as afirmativas II, IV e V são corretas.
(E) Apenas as afirmativas III, IV e V são corretas.

12) Segundo Sylvia Hinrichsen, o cateterismo do trato urinário é uma prática comum em todas as unidades hospitalares. As infecções associadas à sondagem vesical são, portanto, freqüentes e previníveis. Assinale a opção que contém um cuidado importante na prevenção de infecções do trato urinário.

(A) Dar preferência à sondagem vesical de demora.
(B) Trocar periodicamente a sonda vesical de demora.
(C) Realizar a lavagem do sistema quando houver obstrução.
(D) Manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga.
(E) Desconectar a sonda vesical de demora, do tubo coletor, em intervalos regulares.

13) A adrenalina é um neurotransmissor do sistema simpático e constitui-se numa das principais drogas manipuladas pela Enfermagem na terapia Intensiva. Segundo SILVA, pode-se citar como cuidado e justificativa de Enfermagem para o uso da referida droga:

(A) registrar características da função intestinal, pois pode ocorrer diarréia devido à terapêutica.
(B) registrar glicemia capilar, pois a hiperglicemia é uma das complicações associadas.
(C) observar e registrar distúrbios visuais, pois a administração da droga acarreta visão turva.
(D) observar sinais de secura na boca e narinas, pois são características de sintomas adversos.
(E) observar córnea e conjuntiva ocular, pois poderá ocorrer ressecamento de córnea devido à deposição de cristais.

14) Segundo Ziegel, o bebê pequeno para idade gestacional (PIG) é geralmente definido como aquele cujo peso é inferior a 10% do que é esperado naquela idade gestacional. Em relação às características do recém-nascido PIG, assinale a opção correta.

(A) No bebê PIG há grande risco de asfixia, porém o risco de aspiração é diminuído.
(B) Pode-se citar como causas do retardo do crescimento fetal a idade materna avançada e a nuliparidade.
(C) A hiperglicemia de rebote ocorre nos bebês PIG devido a má nutrição intra-uterina.
(D) Devido a grande reserva de glicogênio, o bebê PIG apresenta o risco aumentado de estresse ao frio.
(E) A policitemia se desenvolve nos bebês PIG como consequência da hipoxia intra-uterina crônica.

15) Segundo Sylvia Hinrichsen, na prevenção de processos infecciosos hospitalares, é fundamental que se observem as trocas de cateteres, curativos, sondas e outros materiais. Considerando-se esta afirmativa, assinale a opção correta.

(A) O macronebulizador deve ser trocado uma vez por semana.
(B) A máscara de Venturi deve ser trocada a cada 72 horas.
(C) Trocar sonda vesical e bolsa coletora somente quando apresentar obstrução, vazamento ou desconexão do circuito fechado.
(D) Trocar o equipo de macro e microgotas a cada 06 h.
(E) O curativo de subclávia deve ser trocado com 48h, o tradicional e 7 a 10 dias, película transparente.

16) Segundo Brunner e Suddarth, o diabetes Mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue decorrentes dos defeitos na secreção e/ou ação da insulina. Assinale a opção que corresponde à ação da insulina.

(A) Inibir o armazenamento de glicose no fígado e músculos.
(B) Reduzir o armazenamento de lipídios da dieta no tecido adiposo.
(C) Transportar e metabolizar a glicose para a produção de energia.
(D) Reduzir o transporte de aminoácidos para as células.
(E) Sinalizar ao fígado para manter a liberação de glicose.

17) Segundo Sylvia Hinrichsen, as doenças que requerem isolamento são as altamente contagiosas e/ou com grande ou pequena virulência que podem ser transmitidas pelo ar, por perdigotos ou pelo contato direto ou indireto. São doenças transmitidas pelo ar:

(A) sarampo e tuberculose pulmonar.
(B) herpes-Zoster Varicela (HZV) e caxumba.
(C) sarampo e caxumba.
(D) rubéola e meningite por Neisséria Meningitides.
(E) pneumonia estreptocócica e tuberculose pulmonar.

18) O Programa Nacional de Imunizações tem como objetivo, em primeira instância, o controle de doenças imunopreveníveis através de amplas coberturas vacinais. De acordo com Manual de Normas de Vacinação, **NÃO** é contra-indicada a aplicação de vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados em pessoas

(A) com imunodeficiência congênita ou adquirida.
(B) com neoplasia maligna.
(C) em tratamento com corticosteróides em esquemas imunodepressores.
(D) submetidas à radioterapia.
(E) desnutridas.

19) O processo imunológico pelo qual se desenvolve a proteção conferida pelas vacinas compreende o conjunto de mecanismos através dos quais o organismo humano reconhece uma substância como estranha. De acordo com Manual de Normas de Vacinação, em relação às vacinas, assinale a afirmativa correta.

(A) A vacina contra hepatite B apresenta seus componentes antigênicos sob forma de vírus inativado.
(B) A vacina contra raiva apresenta seus componentes antigênicos sob forma de frações de vírus.
(C) A vacina BCG apresenta seus componentes antigênicos sob forma de bactérias mortas ou avirulentas.
(D) Nas áreas endêmicas (onde há casos humanos) a idade mínima de vacinação contra a febre amarela é de um ano.
(E) Nas áreas onde há apenas casos em macacos (áreas enzoóticas ou epizoóticas) a idade mínima de vacinação contra a febre amarela é de nove meses.

20) Segundo Rezende, pode-se citar como sinais de probabilidade de gravidez:

(A) amenorréia, náuseas e congestão mamária.
(B) aumento do volume uterino, náuseas e congestão mamária.
(C) amenorréia, aumento do volume uterino e alteração da forma uterina.
(D) aumento do volume uterino, náuseas e polaciúria.
(E) amenorréia, sinal de PUZOS e alteração da forma uterina.

21) Interromper o sangramento é essencial para o cuidado e sobrevida dos pacientes em uma situação de emergência. A Hemorragia que resulta na redução do volume de sangue circulante é uma causa primária de choque. Segundo Brunner são sinais e sintomas do choque hipovolêmico, **EXCETO**

(A) pele fria e úmida.
(B) enchimento capilar acelerado.
(C) acidose metabólica.
(D) hiperpnéia.
(E) frequência de pulso crescente.

22) Segundo Brunner e Suddarth, a sobrevida das vítimas de queimadura depende da reanimação adequada com líquidos. É alteração hidroeletrolítica observada na fase de emergência/reanimação:

(A) aumento do débito urinário
(B) hemodiluição
(C) alcalose metabólica
(D) déficit de sódio
(E) aumento do volume sanguíneo.

23) A biópsia do rim é utilizada no diagnóstico e avaliação da extensão da doença renal. Segundo Brunner, um dos principais cuidados de enfermagem depois que um paciente submete-se a este procedimento é

(A) monitorar os sinais vitais a cada 5 a 15 minutos, durante a primeira hora.
(B) avaliar os padrões de micção.
(C) avaliar o nível de dor.
(D) reforçar a informação fornecida para o paciente sobre o resultado do procedimento.
(E) atentar para sinais de dispnéia.

24) Segundo Brunner e Suddarth, o choque séptico é o tipo mais comum de choque circulatório, sendo causado pela infecção disseminada. Assinale a opção que contém um dos sinais e sintomas de choque séptico na primeira fase (fase hiperdinâmica e progressiva).

(A) Frequência cardíaca diminuída.
(B) Hipotermia.
(C) Anúria.
(D) Frequência respiratória aumentada.
(E) Palidez.

25) Segundo o Manual de Normas de Vacinação, o aparecimento de cefaléia, mialgia, artralgia, diminuição do tônus muscular e parestesia plantar pode ocorrer após administração da vacina

(A) BCG.
(B) contra Sarampo e Rubéola.
(C) contra o Tétano.
(D) contra a Raiva.
(E) contra a Hepatite B.

26) Uma das complicações da Nutrição Parenteral Total é a hiperglicemia. Segundo Brunner, uma das ações de enfermagem para esta complicação é

(A) monitorar os sinais vitais.
(B) monitorar a velocidade de infusão horária.
(C) observar quanto a estupor, confusão, letargia.
(D) observar quanto a fraqueza, tremores, cefaléia.
(E) colocar o paciente em decúbito lateral.

27) Segundo Sylvia Hinrichsen, a lavagem das mãos deve ser um hábito entre os profissionais de saúde, pois é de extrema importância no controle das infecções hospitalares. Considerando-se esta afirmativa, assinale a opção correta.

(A) A lavagem das mãos com sabão antisséptico acentua a redução na carga microbiana.
(B) Lavar as mãos com água quente diminui a incidência de dermatites.
(C) É desnecessário trocar as luvas em cirurgias com duração superior a duas horas e antes do implante de próteses.
(D) O uso de luvas substitui a lavagem das mãos.
(E) Não é necessário trocar as luvas ao mudar de um local infectado para outro, enquanto com o mesmo paciente.

28) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, em relação ao tratamento da diarréia aguda em crianças, assinalando a seguir a opção correta.

( ) Um dos principais objetivos do tratamento da diarréia aguda inclui a avaliação do equilíbrio hidroeletrolítico.
( ) Na hipótese de desidratação grave devido a diarréia deve-se forçar a criança a ingerir líquidos.
( ) Os vômitos constituem uma contra-indicação a Terapia de Reidratação Oral.
( ) Os medicamentos antidiarreicos não estão recomendados no tratamento da diarréia infecciosa aguda.

(A) (V) (F) (F) (V)
(B) (V) (V) (V) (F)
(C) (V) (F) (V) (V)
(D) (F) (V) (V) (V)
(E) (F) (F) (F) (V)

29) Segundo Brunner e Suddarth, o equilíbrio hidroeletrolítico é um processo dinâmico crucial para a vida. São sinais e sintomas de déficit de volume líquido (hipovolemia):

(A) ganho agudo de peso e pulso rápido.
(B) turgor da pele diminuído e cãibras.
(C) veias jugulares distendidas e diminuição da pressão arterial.
(D) pressão venosa central elevada e estertores.
(E) edema e oligúria.

30) A vacina contra a tuberculose é o BCG (bacilo de Calmette & Guérin) liofilizado, obtido por atenuação do *Mycobacterium bovis*. Segundo o Manual de Normas de Vacinação, em relação à aplicação da BCG, assinale a opção correta.

(A) Deve ser aplicada em todos os indivíduos portadores do vírus da imunodeficiência humana.
(B) teste tuberculínico (PPD) é indispensável, antes ou depois da aplicação do BCG.
(C) Devem-se vacinar os comunicantes de casos de Hanseníase com duas doses de BCG.
(D) Se a primeira dose da vacina for aplicada com seis anos de idade ou mais, há necessidade de revacinação com 10 anos.
(E) Devem-se vacinar as gestantes comunicantes de casos de hanseníase a partir do 2° trimestre da gravidez.

31) O tumor de Wilms é o mais comum tumor maligno renal e intra-abdominal da infância. De acordo com Wong, assinale o cuidado de Enfermagem indicado no pré-operatório de criança portadora do tumor de Wilms.

(A) Medida do perímetro torácico.
(B) Medida da circunferência abdominal.
(C) Evitar a palpação do tumor.
(D) Averiguar peso diariamente.
(E) Averiguar freqüência cardíaca.

32) As drogas antineoplásicas podem ser vesicantes ou irritantes, provocando, dessa forma, reações severas, quando em contato com a pele. Segundo Kawamoto, um dos principais cuidados de enfermagem implementados quando do extravasamento desse tipo de droga é

(A) após o término da infusão, aplicar compressas geladas.
(B) diminuir o gotejamento e esperar que termine a infusão para completar a dose prescrita.
(C) interromper de imediato a infusão da droga e aplicar compressas frias.
(D) após o término da infusão, aplicar compressas quentes.
(E) retirar o acesso venoso, e manter o membro junto ao corpo, ao nível da pelve.

33) As mulheres grávidas são suscetíveis a todos os agentes infecciosos que podem afetar a população em geral. Segundo Rezende, a recomendação para que as gestantes realizem rastreamento baseado na cultura vaginal tem como objetivo detectar o microorganismo

(A) Toxoplasma gondii.
(B) Streptococcus agalactiae.
(C) Candida albicans.
(D) Treponema pallidum.
(E) Citomegaloviro.

34) No quadro de reação anafilática severa, a terapia apropriada deve ser instituída imediatamente. Segundo Brunner, na terapia com drogas, os anti-histamínicos e corticóides agem para a redução da(o)

(A) broncoespasmo e do angioedema.
(B) arritmia cardíaca e do broncoespasmo.
(C) urticária e do broncoespasmo.
(D) arritmia cardíaca e do angioedema.
(E) urticária e do angioedema.

35) Segundo Kawamoto, a posição indicada para a realização de clister e lavagem intestinal é a posição

(A) dorsal.
(B) de Fowler.
(C) de Trendelenburg.
(D) de Sim's.
(E) genupeitoral.

36) Segundo Brunner e Suddarth, a seguinte prescrição de enfermagem é indicada a pacientes que se submetem à cirurgia renal:

(A) restringir ao máximo a deambulação.
(B) manter o sistema de drenagem aberto.
(C) desencorajar respirações profundas.
(D) pesar semanalmente o paciente.
(E) fazer medições exatas da ingesta e débito.

37) Devido ao planejamento ser um processo complexo e consciente, ele pode ser prejudicado por diversos fatores. Segundo Marquis e Huston, um dos fatores que prejudicam o bom planejamento é(são)o(s)

(A) detalhes suficientes nas atividades de planejamento.
(B) uso adequado de planos e resistência à mudança por parte dos indivíduos.
(C) uso consistente de planejamento de ação e não de reação.
(D) planos utilizados para controlar e não para influenciar ou orientar.
(E) excesso de conhecimento e habilitação com relação a como planejar.

38) Semanas à meses são necessários para a consolidação da maioria das fraturas. As complicações das fraturas situam-se dentro de duas categorias - iniciais e tardias. Segundo Brunner, considerando-se as complicações iniciais das fraturas, assinale a opção que apresenta as complicações mais comuns.

(A) Dor, arritmia cardíaca, síndrome compartimental, infecção.
(B) Hemorragia, embolia gordurosa, dor, arritmia cardíaca.
(C) Síndrome compartimental, tromboembolia, trombose venosa profunda, coagulopatia vascular disseminada, infecção.
(D) Desequilíbrio eletrolítico, dor, tromboembolia, hemorragia.
(E) Infecção, arritmia cardíaca, hemorragia, desequilíbrio eletrolítico.

39) Um paciente permanece na Unidade de Recuperação Pós-Anestésica (URPA) até que tenha se recuperado plenamente do agente anestésico. Segundo Brunner, dentre as medidas empregadas para determinar a aptidão do paciente para alta desta unidade está a(o)

(A) dor mínima.
(B) náuseas e vômitos presentes.
(C) leve desorientação.
(D) hipotensão leve.
(E) débito urinário de, pelo menos, 20 ml/h.

40) Diversos tipos de deformidades cranianas são observados na primeira infância. Em relação às deformidades cranianas e suas características, assinale a opção correta.

(A) Oxicefalia é o fechamento prematuro das suturas coronais, fazendo com que o crânio seja encurtado na direção ântero-posterior.
(B) Plagiocefalia é o fechamento unilateral de uma sutura coronal ou lambdoidal, fazendo com o crânio se torne assimétrico.
(C) Escafocefalia é o fechamento prematuro de uma ou mais suturas da calota craniana.
(D) Craniossinostose é o fechamento prematuro da sutura sagital, fazendo com que o crânio se torne alongado.
(E) Braquicefalia é o fechamento prematuro de qualquer sutura craniana, acarretando deformidade facial típica (olhos espaçados e maxila hipoplásica).

41) Segundo Marangoni e Schechter, o dengue é uma doença infecciosa febril aguda, benigna na maior parte dos casos. São manifestações clínicas do dengue "clássico":

(A) febre alta e mialgia.
(B) hipertensão e oliguria.
(C) opressão torácica e prurido.
(D) poliúria e acidose metabólica.
(E) mucosite e supressão medular.

42) A teofilina é uma metilxantina usada no tratamento da asma em crianças. Segundo Wong, pode-se citar como sintomas da toxicidade da teofilina:

(A) taquicardia, taquipneia, anorexia e vômitos.
(B) bradicardia, taquipneia, anorexia e vômitos.
(C) taquicardia, irritabilidade, náusea e convulsões.
(D) bradicardia, irritabilidade, náusea e convulsões.
(E) bradicardia, letargia, náusea e convulsões.

43) Segundo Marquis e Huston, há vários tipos de planejamento. Na maioria das organizações, estes planos formam uma hierarquia. A pirâmide da hierarquia do planejamento, da base para o topo, é formada por

(A) normas, procedimentos, políticas, objetivos, metas, filosofia e missão.
(B) procedimentos, normas, objetivos, metas, políticas, filosofia e missão.
(C) missão, filosofia, metas, normas, procedimentos, políticas e objetivos.
(D) objetivos, metas, políticas, normas, procedimentos, filosofia e missão.
(E) filosofia, missão, normas, procedimentos, políticas, objetivos e metas.

44) Em uma unidade de internação foi prescrito 1,5g de Keflin, EV de 6/6 horas. A apresentação do frasco disponível na unidade é de 250 mg, em pó e a ampola com diluente de 5 ml. Quantos frascos do antibiótico serão usados nas 24 horas de internação deste paciente?

(A) 06
(B) 12
(C) 18
(D) 24
(E) 30

45) Segundo Wong, a presença de íleo meconial, deficiência de vitaminas lipossolúveis, baqueteamento dos dedos das mãos e dos pés, tosse paroxística associada à evacuações soltas e liquefeitas são manifestações clínicas da

(A) pneumonia.
(B) fibrose cística.
(C) bronquiolite.
(D) asma.
(E) coqueluche.

46) A consideração mais importante em qualquer traumatismo craniano é se o cérebro está lesado. Segundo Brunner, dentre as lesões cerebrais, a concussão pode ser definida como uma

(A) lesão mais grave na qual o cérebro é contundido, com possível hemorragia superficial.
(B) lesão difusa que envolve o comprometimento disseminado dos axônios nos hemisférios cerebrais.
(C) lesão grave na qual o cérebro é contundido, com hemorragia profunda difusa.
(D) lesão difusa que envolve o corpo caloso e tronco cerebral.
(E) perda temporária da função neurológica sem comprometimento estrutural aparente.

47) Segundo Brunner e Suddarth, as metas da diálise peritoneal são remover as substâncias tóxicas e resíduos metabólicos e restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico normal. São complicações da diálise peritoneal:

(A) náusea e vômito.
(B) peritonite e sangramento.
(C) cãibra muscular e embolia gasosa.
(D) dor torácica e hipertrigliceridemia.
(E) hipotensão e convulsões.

48) De acordo com Rezende no ciclo gestatório patológico, a presença de cetonúria, fraqueza muscular acentuada, oligúria e síndrome de KORSAKOFF caracterizam a (o)

(A) hiperêmese gravídica.
(B) toxemia gravídica.
(C) prenhez ectópica.
(D) coriocarcinoma.
(E) mola hidatiforme.

49) Segundo Brunner e Suddarth, o choque cardiogênico acontece quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para suprir a quantidade de oxigênio necessária para os tecidos. É sinal clássico de choque cardiogênico:

(A) inquietação.
(B) pressão arterial alta.
(C) pulso forte.
(D) pele quente.
(E) estertores respiratórios diminuídos.

50) O processo de enfermagem é uma abordagem de resolução de problemas deliberada para atender às necessidades de cuidado de saúde e de enfermagem de uma pessoa. Segundo Brunner, o exame físico está incluído em qual etapa deste processo?

(A) Planejamento.
(B) Diagnóstico.
(C) Implementação.
(D) Evolução.
(E) Histórico.