



# Hospital das Clínicas 2010

Médico

COD. 23

## ÁREA OBSTETRÍCIA



UFPE

### LEIA COM ATENÇÃO

- 01] Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02] Preencha os dados pessoais.
- 03] Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04] Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
- 05] Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06] Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
- 07] Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (—).

### A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

- 08] Só marque uma resposta para cada questão.
- 09] **Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-la.**
- 10] Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11] Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12] Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS**

Nome \_\_\_\_\_

Identidade \_\_\_\_\_ Órgão Exp.: \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Concurso Público



COMISSÃO DE PROCESSOS  
SELETIVOS E TREINAMENTOS  
Fone: (81) 3412-0800  
Fax: (81) 3412-0808



## Língua Portuguesa - Superior

### TEXTO 1

É exatamente o individualismo e a falta de ética predominantes na sociedade contemporânea que estão provocando uma nova corrida ao seu estudo. A ética está se tornando um tema corrente em nosso dia a dia, pois nossa sociedade precisa de visões do futuro que sejam atraentes, inspiradoras e vigorosas o bastante para levar as pessoas a deixar de lado o seu costume atual de concentrar-se nas crises imediatas e a voltar-se com esperança para o futuro - um futuro em que a saúde e o bem-estar da Terra e dos seus habitantes estejam assegurados.

Estamos mais sensíveis às questões de conservação, ao caráter sagrado da vida e à cooperação global. As inúmeras conferências internacionais sobre ecologia, fome e direitos humanos são exemplos significativos da necessidade de uma mudança ética em todos os campos da vida social. O debate sobre a Ética na política, nas questões sociais e econômicas, ressurgiu com muita força nos últimos anos. O estudo e a preocupação com questões éticas também passaram a ser assunto de discussão nos meios empresariais. Já existe uma grande bibliografia sobre "Ética nas Empresas" e muitos cursos de Gestão de Negócios estão incluindo em seus currículos a disciplina "Ética".

A sociedade industrial cresceu arraigada ao materialismo e à supremacia do homem sobre a natureza. Vem daí a ênfase na competição, na autopreservação e no consumo, que levou a problemas atuais como a poluição, o armazenamento de resíduos sólidos, o crime, a violência familiar, o terrorismo internacional, a destruição de espécies animais, a devastação das florestas, os buracos na camada de ozônio e as milhares de pessoas que morrem de inanição todos os dias por conta do crescimento populacional fora de controle e de uma perversa distribuição de riquezas. Parece que perdemos a capacidade de agir eticamente e as aplicações irresponsáveis da ciência e tecnologia estão ameaçando a vida no planeta.

Só teremos chances de sobrevivência se dedicarmos algum tempo a olhar por cima de nossos próprios ombros, se de fato nos preocuparmos com os outros e vivermos além dos limites de nossas próprias famílias e instituições. As necessidades de mudanças que nos conduzam a uma nova visão de mundo são urgentes e, de certa forma, já estão ocorrendo. Hoje em dia, por exemplo, as exigências do cidadão não são apenas por produtos ou serviços de qualidade, mas são também de natureza ética. Ou seja: se vai comprar um carro, um sabonete, uma vasilha de refrigerante ou um serviço financeiro quer saber se aquela empresa recolhe seus impostos, remunera dentro do padrão de mercado seus empregados, polui o meio ambiente, trata a concorrência com lealdade, atende os eventuais reclamos da sua clientela e participa de forma positiva de sua comunidade.

Muitas pessoas, em especial jovens, estão dispostas a contribuir com boas causas, e existirá uma procura crescente por empresas não apenas voltadas para a produção e o lucro, mas que também estejam preocupadas com a solução de problemas mais amplos, como preservação do meio ambiente e bem-estar social.

*Ética e trabalho.* Disponível em:  
<http://tpd2000.vilabol.uol.com.br/eticae.htm>.  
Acesso em 10/4/10. Excerto adaptado.

01. Do ponto de vista temático, é correto afirmar que o Texto 1, primordialmente, aborda:

- A) a ocorrência, cada vez mais frequente, de conferências sobre temas como ecologia, fome e direitos humanos, dentro e fora do país.
- B) a iminente ameaça à vida no planeta causada pela incapacidade de agir eticamente por parte dos que lidam com a ciência e tecnologia.
- C) as novas exigências do cidadão, que, além de qualidade dos produtos e serviços, cobram um comportamento ético de quem os produz.
- D) a premente necessidade de uma mudança ética em todos os campos da vida social, com vistas a assegurar um futuro promissor para todos.
- E) a corrida a novos estudos sobre a sociedade contemporânea, motivada pelo individualismo e pela falta de ética nela predominantes.

02. Analise as informações apresentadas a seguir.

- 1) Em comparação ao passado, vê-se que hoje as pessoas estão mais sensíveis a questões que envolvem a preservação da vida e à cooperação global.
- 2) Nossa necessidade de visões atraentes do futuro é um dos fatores que estão fazendo da ética um tema recorrente, na atualidade.
- 3) Alguns dos sérios problemas atuais advêm da forte ênfase na competição, na autopreservação e no consumo, que são características da sociedade industrial.
- 4) A sobrevivência da espécie humana está na dependência de mudanças que nos conduzam a uma nova visão de mundo, aí incluída a capacidade de nos esquecer um pouco de nós mesmos e enxergar os outros.

Estão em consonância com o Texto 1:

- A) 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

03. No que se refere ao sentido de alguns termos e expressões utilizados no Texto 1, analise as proposições a seguir.

- 1) O trecho: "*um futuro em que a saúde e o bem-estar da Terra e dos seus habitantes estejam assegurados.*" teria seu sentido preservado se a expressão destacada fosse substituída por 'no qual'.
- 2) No trecho: "*as pessoas que morrem de inanição todos os dias por conta do crescimento populacional fora de controle e de uma perversa distribuição de riquezas.*", o termo destacado nos remete à ideia de uma distribuição de riquezas 'injusta' e 'maléfica'.
- 3) No trecho: "*as exigências do cidadão não são apenas por produtos ou serviços de qualidade, mas são também de natureza ética. Ou seja: se vai comprar um carro [...]*", a expressão sublinhada introduz uma autocorreção, e equivale semanticamente a 'aliás'.
- 4) O trecho: "*Muitas pessoas, em especial jovens, estão dispostas a contribuir com boas causas*", teria seu sentido alterado se a expressão destacada fosse substituída por 'sobretudo'.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 2, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 2 e 4, apenas.

04. Assinale a alternativa na qual a palavra sublinhada está em relação de sinonímia com a palavra colocada entre parênteses.

- A) “É o individualismo e a falta de ética predominantes (prevalentes) na sociedade contemporânea que estão provocando uma nova corrida ao seu estudo.”
- B) “nossa sociedade precisa de visões do futuro que sejam atraentes, inspiradoras e vigorosas (categóricas) o bastante para [...]”
- C) “As inúmeras conferências internacionais [...] são exemplos significativos (redundantes) da necessidade de uma mudança ética em todos os campos da vida social.”
- D) “A sociedade industrial cresceu arraigada ao materialismo e à supremacia (superveniência) do homem sobre a natureza.”
- E) “que levou a problemas atuais como a poluição, [...] e as milhares de pessoas que morrem de inanição (inapetência) todos os dias [...]”

“Só teremos chances de sobrevivência se dedicarmos algum tempo a olhar por cima de nossos próprios ombros, se de fato nos preocuparmos com os outros e vivermos além dos limites de nossas próprias famílias e instituições.”

05. Nesse trecho do Texto 1, a relação semântica mais relevante é a de:

- A) conclusão.
- B) condição.
- C) causalidade.
- D) consequência.
- E) conformidade.

06. Analise a concordância verbal dos enunciados abaixo.

- 1) Já faz muitos anos que a sociedade clama por mudanças em todas as áreas.
- 2) Não é mais possível que haja pessoas contra a necessidade de preservar a natureza.
- 3) O ideal é que não existisse mudanças de atitude por imposição, e, sim, por conscientização.
- 4) No que se refere ao futuro do planeta, não falta discussões, mas são poucas as ações.

Está(ão) de acordo com a norma padrão da língua:

- A) 3, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

07. Assinale a única alternativa que está em desacordo com a norma padrão da língua, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

- A) Os vários tipos de discriminação são atitudes contra as quais todos devemos lutar.
- B) O palestrante, de cujo nome me esqueci, enfatizou a necessidade de uma mudança ética.

- C) Não sabia aonde se dirigir para denunciar as aplicações irresponsáveis da ciência e tecnologia.
- D) O público perante o qual discursou ficou animado com a possibilidade de mudanças éticas.
- E) As autoridades prometem solucionar em breve o problema que todos estávamos preocupados.

## TEXTO 2

### Herdeiros do futuro

A vida é uma grande amiga da gente  
Nos dá tudo de graça pra viver  
Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar...  
Somos os herdeiros do futuro  
E pra esse futuro ser feliz  
Vamos ter que cuidar bem desse país  
Vamos ter que cuidar bem desse país  
Será que no futuro haverá flores?  
Será que os peixes vão estar no mar?  
Será que os arco-íris terão cores?  
E os passarinhos vão poder voar?  
Será que a terra vai seguir nos dando  
O fruto, a folha, o caule e a raiz?  
Será que a vida acaba encontrando  
Um jeito bom da gente ser feliz?  
Vamos ter que cuidar bem desse país  
Vamos ter que cuidar bem desse país...

Toquinho/Elifas Andreatto (interpretação de Toquinho).  
Disponível em: <http://letras.terra.com.br/toquinho/87255>.  
Acesso em 10/04/2010. Excerto adaptado.

08. Ao selecionar o tema do Texto 2, seu autor vem confirmar a seguinte afirmação feita no Texto 1:

- A) “Estamos mais sensíveis às questões de conservação, ao caráter sagrado da vida e à cooperação global.”
- B) “É exatamente o individualismo e a falta de ética predominantes na sociedade contemporânea que estão provocando uma nova corrida ao seu estudo.”
- C) “O estudo e a preocupação com questões éticas também passaram a ser assunto de discussão nos meios empresariais.”
- D) “existirá uma procura crescente por empresas não apenas voltadas para a produção e o lucro, mas que também estejam preocupadas com a solução de problemas mais amplos”.
- E) “Hoje em dia, as exigências do cidadão não são apenas por produtos ou serviços de qualidade, mas são também de natureza ética.”

09. “Somos os herdeiros do futuro / E pra esse futuro ser feliz / Vamos ter que cuidar bem desse país”. O segmento destacado desse trecho expressa uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) condição.
- C) finalidade.
- D) tempo.
- E) consequência.

10. “Vamos ter que cuidar bem desse país”. Com a expressão destacada, o autor pretendeu indicar:

- A) probabilidade.
- B) obrigatoriedade.
- C) exatidão.
- D) conformidade.
- E) possibilidade.

## Conhecimentos Específicos

11. O sinal de Piscacek corresponde a:

- A) sinal de presunção de gravidez; refere-se à congestão mamária relatada pela paciente no início da gestação.
- B) sinal de presunção de gravidez; refere-se ao aumento da frequência urinária habitual entre o 2º e o 3º mês de gestação.
- C) sinal de probabilidade; refere-se ao crescimento assimétrico do útero, mais notadamente na zona de implantação.
- D) sinal de certeza de gravidez; é o rechaço fetal que se obtém impulsionando o feto com os dedos dispostos no fundo do saco anterior.
- E) sinal de probabilidade; refere-se ao aumento do volume abdominal.

12. Em relação à idade da gestação, é correto afirmar que:

- A) a regra de Nagele consiste em adicionar à data da última menstruação 07 dias e mais 09 meses (ou menos 03 meses, quando se faz o cálculo retrógrado).
- B) segundo Knaus, a duração habitual da prenhez humana é de 286 dias.
- C) com 20 semanas de gestação, o fundo uterino estará a meia distância entre a sínfise púbica e o umbigo.
- D) a margem de erro da ultrassonografia (USG) na determinação da idade gestacional é menor no terceiro trimestre da gestação.
- E) a utilização da medida do diâmetro biparietal (DBP) na ultrassonografia é mais fidedigna no primeiro trimestre de gestação.

13. Na assistência pré-natal, os indicadores de risco gestacional são, EXCETO:

- A) mães solteiras.
- B) peso inferior a 60kg.
- C) história familiar de doenças hereditárias.
- D) sedentarismo.
- E) estilo e qualidade de vida.

14. Em relação à estática fetal, é correto afirmar que:

- A) apresentação é a região fetal que se localiza na área do estreito inferior.
- B) insinuação ou encaixamento é a passagem pelo estreito superior, do maior plano perpendicular à linha de orientação.
- C) a ausência da flexão lateral, mantendo-se a sutura sagital equidistante do sacro e do púbis, condiciona o sinclitismo.
- D) assinclitismo posterior (obliquidade de Litzmann) refere-se ao fato de a sutura sagital estar próxima ao púbis e o parietal posterior ser o primeiro a penetrar na escavação pélvica.
- E) segundo a escola alemã, é posição fetal a relação do dorso com o lado direito ou esquerdo materno.

15. Paciente de 30 anos, gesta 1 para 0, amenorreica de 37 semanas, é atendida na Urgência Obstétrica queixando-se de cefaleia. Ao exame, constatou-se feto com ausculta de 120bpm, tônus uterino fisiológico, colo sem dilatação, tensão arterial de 160/110mmHg, proteinúria de fita de 3+. Trata-se de um quadro de:

- A) pré-eclâmpsia leve, e deve-se ter conduta expectante.
- B) pré-eclâmpsia leve, e deve-se ter conduta resolutive, por se tratar de uma gestação a termo.
- C) pré-eclâmpsia grave, e deve-se ter conduta expectante, por a paciente não se encontrar em trabalho de parto.
- D) pré-eclâmpsia grave e deve-se ter conduta resolutive; como prevenção da eclâmpsia, utilizar o sulfato de magnésio no esquema de Zuspan (dose de ataque: 4 a 6 gramas IV em 20 a 30min seguido de uma dose de manutenção de 1 a 2 gramas/hora).
- E) pré-eclâmpsia grave e deve-se ter conduta resolutive; prevenir a eclâmpsia com o sulfato de magnésio no esquema de Pritchard (dose de ataque: 4 gramas IV lento + 10 gramas intramuscular, seguido de manutenção de 5 gramas intramuscular a cada 8 horas).

16. Aumentam as chances de uma mulher desenvolver pré-eclâmpsia, EXCETO ela:

- A) estar na primeira gravidez.
- B) ser da raça caucasiana.
- C) ter problemas renais.
- D) ter história familiar de pré-eclâmpsia.
- E) ser portadora de lúpus.

17. O risco de transmissão vertical do HIV é elevado em casos de:

- A) carga viral elevada.
- B) presença de outra DST.
- C) fetos de peso elevado.
- D) recontaminação.
- E) tempo de ruptura prolongado das membranas.

18. O tratamento da sífilis secundária com menos de 01 ano de evolução e controle de cura consiste em utilizar:

- A) penicilina G benzatina 2.400.000UI em dose única e realizar exame de VDRL mensal.
- B) penicilina G bezatina em duas séries, dose total de 4.800.000UI, intervalo entre as doses de uma semana e realizar exame de VDRL a cada dois meses.
- C) penicilina G benzatina em três séries, dose total de 7.200.000UI, intervalo entre as doses de uma semana e realizar exame de VDRL a cada três meses.
- D) penicilina G benzatina em duas séries, dose total de 4.800.000UI, intervalo entre as doses de uma semana e realizar exame de VDRL mensal.
- E) penicilina procaína 5.000.000UI, intra-venosa, em dose única e realizar exame de VDRL no início e final do pré-natal.

19. Mulher com quadro clínico de abortamento infectado, gesta 1 para 0, apresenta febre de 38°C, toque vaginal com útero doloroso à mobilização, colo aberto com presença de restos embrionários com odor fétido, paramétrios livres e sem sinais de irritação peritoneal. A melhor conduta para este caso é:
- A) curetagem uterina imediata.
  - B) avaliação do estado geral, antibioticoterapia e curetagem imediata.
  - C) avaliação do estado geral, antibioticoterapia com curetagem 2-4 horas após.
  - D) avaliação do estado geral, antibioticoterapia, com curetagem 2-4 horas após e uso de ocitocina.
  - E) histerectomia.
20. No caso de suspeita de perda de líquido amniótico não visualizado ao exame clínico as seguintes técnicas estão corretamente descritas e podem ser utilizadas, EXCETO:
- A) medida do pH vaginal, um resultado maior ou igual a 6 (seis) sugere a presença de líquido amniótico na vagina.
  - B) teste de azul do Nilo (Kittrich) consiste na pesquisa de células orangiófilas no conteúdo vaginal.
  - C) teste de ianeta consiste em espalhar a secreção coletada sobre uma lâmina e aquece-la com uma chama. Ela permanecerá incolor na presença de líquido amniótico.
  - D) teste LCS, consiste na introdução de contraste radiopaco (Hypaque) na cavidade amniótica e realização de um RX de abdome após cinco minutos da introdução.
  - E) cristalização do conteúdo vaginal só ocorre na presença de líquido amniótico.
21. Gestante que apresenta um diagnóstico de toxoplasmose aguda no primeiro trimestre tem um risco de contaminação fetal de cerca de:
- A) 15%
  - B) 40%
  - C) 60%
  - D) 70%
  - E) 80%
22. Gestante com amenorreia de 38 semanas é atendida na Emergência Obstétrica com fortes dores tipo cólica, com uma dinâmica uterina de 01 contração de 45 segundos a cada 02 minutos; ausculta fetal de 156bpm. Ao exame, observou-se dilatação de 10cm, apresentação no segundo plano de Hodge e com deflexão de terceiro grau. A conduta mais adequada para o caso é:
- A) aguardar evolução natural do parto.
  - B) utilizar ocitocina para acelerar o parto.
  - C) utilizar ocitocina e aplicar fórceps de alívio.
  - D) realizar operação cesariana.
  - E) aguardar o parto natural com dupla episotomia.
23. Paciente com suspeita de prenhez ectópica apresenta beta-HCG positivo, dosagem inicial de 1.000mUI/ml e aumento não linear no seguimento; USG não detecta, a presença de saco gestacional intrauterino e em anexos; hemodinamicamente estável. A melhor conduta é:
- A) laparotomia.
  - B) utilização de metrotexate.
  - C) realização de dosagem de beta-HCG e de USG uma vez por semana.
  - D) realização de dosagem de beta-HCG e de USG em dias alternados; caso essas medidas não esclareçam deve ser indicado laparoscopia.
  - E) aguardar, pois se trata de uma gestação normal.
24. No estagio II da pós-maturidade (Clifford), não é frequente encontrar:
- A) mecônio verde.
  - B) sofrimento fetal.
  - C) melhor prognóstico fetal.
  - D) fácies alerta.
  - E) ausência de vérnix.
25. Nas gestações monozigóticas, dicoriônicas, diamnióticas, a divisão embrionária ocorre:
- A) antes do 4º dia.
  - B) do 4º ao 8º dia.
  - C) do 9º ao 13º dia.
  - D) do 13º ao 15º dia.
  - E) depois do 15º dia.
26. Em relação ao risco de trabalho de parto prematuro (TPP), é incorreto afirmar que:
- A) o ponto de corte do comprimento cervical, medido pela ultrassonografia, para o aumento do risco do TPP, é de 40mm.
  - B) a pesquisa de fibronectina fetal na secreção cervicovaginal prediz com maior exatidão do que a ultrassonografia o aumento do risco de TPP.
  - C) concentrações séricas maiores ou iguais a 8pg/ml no soro materno durante a 24ª semana de gestação tem risco significativamente elevado de parto antes da 32ª semana.
  - D) a pesquisa da interleucina 8 na secreção cervical permite a identificação não invasiva de pacientes com maior risco de TPP.
  - E) concentrações iguais ou superiores a 50mg/ml são usadas para paciente com risco elevado para TPP.
27. Gestante atendida no pré-natal queixa-se de secreção vaginal amarelada, poliartralgia, tenossinovite e dermatite. Provavelmente, trata-se de:
- A) donovanose.
  - B) tricomoníase.
  - C) gonorréia.
  - D) infecção por HPV.
  - E) herpes genital.

28. O local mais frequente de lesões metastáticas do coriocarcinoma é:
- A) pulmão.
  - B) vagina.
  - C) fígado.
  - D) rim.
  - E) cérebro.
29. No diagnóstico da síndrome Hellp, o decréscimo da haptoglobina sérica é o sinal mais sensível para:
- A) presença de hematoma subcapsular hepático.
  - B) isquemia placentária.
  - C) plaquetopenia.
  - D) hemólise intravascular.
  - E) iminência de eclâmpsia.
30. De acordo com o artigo 46 do Código de Ética Médica, "é vedado ao médico efetuar qualquer procedimento sem o esclarecimento e o consentimento prévio do paciente ou de seu responsável legal salvo em iminente perigo de vida." O texto do termo de consentimento informado deve ser desprovido de tecnicismo, de detalhes excessivos, permitindo que possa haver mudança de opinião antes da realização do procedimento. Em linhas gerais, o modelo proposto deveria conter, EXCETO:
- A) nome do procedimento.
  - B) nome dos pais.
  - C) possíveis insucessos.
  - D) descrição da anestesia.
  - E) assinatura de testemunhas.
31. No partograma, tem-se que:
- A) a dilatação cervical localiza-se à direita.
  - B) a descida da apresentação localiza-se à esquerda.
  - C) para a descida da apresentação, considera-se o plano zero de DeLee ou o correspondente plano III de Hodge.
  - D) acima do plano zero de DeLee, na representação gráfica, estão os valores positivos.
  - E) no eixo X (abscissa), cada divisória corresponde a 30 minutos.
32. Em relação ao mecanismo de parto nas apresentações cefálicas fletidas, é incorreto afirmar que:
- A) ocorre em 95% dos partos.
  - B) a variedade de posição OEA responde por 60% dos casos.
  - C) o movimento de flexão da cabeça, no início do trabalho de parto, apresenta o diâmetro suboccipitobregmático ao estreito superior da bacia.
  - D) o feto apresenta rotação interna para OP.
  - E) o diâmetro biacromial é de 12cm durante o desprendimento.
33. São condições de risco para uma melhor avaliação do bem-estar fetal anteparto, EXCETO:
- A) gestação múltipla.
  - B) obesidade mórbida.
  - C) aloimunização RH.
  - D) história obstétrica de natimorto.
  - E) altura da paciente < 1,55m.
34. Em relação à cardiocografia (CTG), é correto afirmar que:
- A) em fetos com < 32 semanas, considera-se normal a aceleração com amplitude  $\geq 15$ bpm e duração  $\geq 10$  segundos.
  - B) o tempo mínimo de registro é de 40 minutos.
  - C) quando o traçado é normal e não há alteração das condições clínicas maternas, um bom prognóstico perinatal é esperado em até uma semana.
  - D) a variabilidade ou oscilação da frequência cardíaca basal normal situa-se entre 15 e 25bpm.
  - E) nas pacientes diabéticas em uso de insulina, recomenda-se uma CTG semanal.
35. Na avaliação do bem-estar fetal anteparto, é correto afirmar que:
- A) a aceleração dos batimentos cardíacos é decorrente da acidose metabólica fetal.
  - B) a contagem diária dos movimentos fetais a partir de 32 semanas não apresenta correlação com o bem-estar fetal.
  - C) o índice de líquido amniótico (ILA) apresenta melhor valor diagnóstico do que a medida do diâmetro vertical do maior bolsão de líquido amniótico.
  - D) o perfil biofísico fetal (PBF) de Manning é composto de seis variáveis.
  - E) o Doppler uterino anormal associa-se a risco 4-8 vezes maior de pré-eclâmpsia e crescimento intrauterino restrito.
36. Que proporção de gestantes tem o quadro asmático piorado durante a gravidez?
- A) 5%
  - B) 10%
  - C) 15%
  - D)  $\frac{1}{3}$
  - E)  $\frac{1}{4}$
37. Em relação ao tratamento da gestante asmática, considera-se que:
- A) os corticoides por inalação só podem ser usados no último trimestre gestacional.
  - B) a adrenalina não é recomendada.
  - C) a budesonida é um glicocorticosteroide com pequena ação anti-inflamatória local.
  - D) o uso sistêmico de corticosteroide no primeiro trimestre associa-se ao envelhecimento precoce da placenta.
  - E) uma saturação < 95% na oximetria de pulso, reflete uma  $\text{PaO}_2 < 70$ mmHg.
38. Não é pré-requisito para a aplicação do fórceps baixo:
- A) diâmetro biparietal da cabeça fetal no plano das espinhas ciáticas.
  - B) bolsa das águas rota.
  - C) cérvix com dilatação completa.
  - D) ausência de obstruções no canal mole do parto.
  - E) reto e bexiga esvaziados.

39. É característica do fórceps de *Simpson*:
- A) ser composto de um ramo cruzado.
  - B) a colher possuir uma curvatura.
  - C) o espaço coclear situar-se entre as duas colheres.
  - D) a articulação ser por deslizamento.
  - E) o pedículo unir o cabo ao jumélio.
40. Em relação à farmacocinética de antibióticos para o tratamento da infecção do trato urinário durante a gestação, é incorreto afirmar que:
- A) o ácido clavulânico, a ceftriaxona e a cefuroxima apresentam o mesmo percentual de eliminação por via renal.
  - B) o incremento da filtração glomerular favorece uma maior concentração de antibióticos na urina.
  - C) 30%-40% da concentração plasmática da penicilina e da gentamicina atravessam a barreira placentária.
  - D) o rim elimina os antibióticos hidrossolúveis e de escassa polaridade.
  - E) devem ser sempre avaliados os efeitos secundários sobre a gestante e as repercussões sobre o feto, como também a toxicidade fetal.
41. Assinale a alternativa que contém a substância cujo uso é contraindicado durante toda a gravidez (classe X-FDA).
- A) Etambutol.
  - B) Diidroergotamina.
  - C) Zidovudina.
  - D) Digoxina.
  - E) Warfarin.
42. É droga de escolha para a profilaxia estreptocócica do grupo B, na paciente alérgica à penicilina:
- A) claritromicina.
  - B) eritromicina.
  - C) clindamicina.
  - D) azitromicina.
  - E) cefalotina.
43. Associa-se à presença de gemelaridade imperfeita e com defeitos no sistema nervoso central o uso de:
- A) nistatina.
  - B) captopril.
  - C) cefazolina.
  - D) anfotericina B.
  - E) griseofulvina.
44. Respondem pela maior parte das doenças cardíacas na gestação:
- A) as anomalias congênicas.
  - B) os estados hipertensivos.
  - C) a febre reumática.
  - D) a doença isquêmica.
  - E) passado de infarto do miocárdio.
45. A coagulação intravascular disseminada pode ser encontrada nos seguintes casos, EXCETO:
- A) placenta prévia.
  - B) embolia do líquido amniótico.
  - C) descolamento precoce de placenta.
  - D) abortamento retido.
  - E) óbito fetal intrauterino.
46. Assinclitismo significa:
- A) a descida dificultosa da cabeça fetal.
  - B) a insinuação em um dos diâmetros oblíquos.
  - C) um movimento da cabeça fetal do tipo alavanca.
  - D) a descida de um parietal adiante do outro.
  - E) a não descida da cabeça por inclinação da bacia.
47. Caracteriza o sinal de Homans na gravidez:
- A) dor provocada pela palpação da região de junção do tendão de Aquiles com os músculo gêmeos.
  - B) compressão da face interna da coxa e da região dos adutores.
  - C) dor provocada pela dorsoflexão do pé.
  - D) aspecto pálido do tegumento, com manchas cianóticas.
  - E) dor à palpação da face posterior da perna.
48. A dose recomendada pelo Ministério da Saúde para a introdução da insulina durante a gestação com diabetes é de:
- A) 0,8UI de NPH pela manhã.
  - B) 0,3 a 0,5UI/Kg de peso atual, em mais de uma dose diária.
  - C) 0,2UI/Kg/dia de insulina NPH pela manhã.
  - D) 0,5UI/Kg de peso para o primeiro trimestre gestacional.
  - E) 1,2UI de insulina NPH pela manhã.
49. Em relação às trombofilias hereditárias, é correto afirmar que:
- A) associam-se a abortamentos de repetição, perdas fetais tardias e à restrição do crescimento fetal.
  - B) a anticoagulação profilática com heparina não parece trazer benefícios na prevenção de resultados perinatais adversos.
  - C) as mutações do fator V e do fator II (protrombina) são as formas mais raras.
  - D) a deficiência da antitrombina apresenta o menor risco de tromboembolismo.
  - E) comumente, os fenômenos tromboembólicos se manifestam independentemente da presença de outros fatores de risco.
50. De acordo com a técnica Misgav-Ladach para realização de cesárea, é correto afirmar que:
- A) há redução de oito para três planos a serem suturados.
  - B) há maior morbidade materna e maior risco de hematoma em comparação à técnica clássica de cesárea.
  - C) o peritônio parietal é aberto longitudinalmente.
  - D) o peritônio parietal e os músculos reto-abdominais são suturados.
  - E) a aponeurose é suturada com pontos separados.