



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO



Agosto/2014

Concurso Público para provimento de cargos de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado Especialidade Odontologia

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'I09', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

000000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

PROVA

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Discursiva - Redação

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva - Redação.
- Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
- Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: **(A) ● (C) (D) (E)**
- Ler o que se pede na Prova Discursiva - Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva - Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva - Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



Fundação Carlos Chagas

CONHECIMENTOS GERAIS**Português**

Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 8.

O caldo cultural do Nordeste, particularmente do sertão, foi primordial na formação do paraibano Ariano Suassuna. A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com temas e formas de expressão artística que mais tarde viriam a influenciar o seu universo ficcional, como a literatura de cordel e o maracatu rural. Não só histórias e casos narrados foram aproveitados para o processo de criação de suas peças e romances, mas também todas as formas da narrativa oral e da poesia sertaneja foram assimiladas e reelaboradas por Suassuna. Suas obras se caracterizam justamente por isso, pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina.

Com apenas 19 anos, Suassuna ligou-se a um grupo de jovens escritores e artistas. As atividades que o grupo desenvolveu apontavam para três direções: levar o teatro ao povo por meio de apresentações em praças públicas, instaurar entre os componentes do conjunto uma problemática teatral e estimular a criação de uma literatura dramática de raízes fixadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina.

No final do século XIX, surgiu no Nordeste a chamada literatura de cordel. A primeira publicação de folheto no Nordeste, historicamente comprovada, aconteceu em 1870.

O nome cordel originou-se do fato de os folhetos serem expostos em cordões, quando vendidos nas feiras livres. O principal nome do cordel foi Leandro Gomes de Barros, considerado por Ariano Suassuna “o mais genial de todos os poetas do romanceiro popular do Nordeste”.

A peça Auto da Comadecida, de Suassuna, é uma releitura do folclore nordestino em linguagem teatral moderna. O enredo da peça é um trabalho de montagem e moldagem baseado em uma tradição muito antiga, que remonta aos autos medievais e mais diretamente a inúmeros autores populares que se dedicaram ao gênero do cordel.

As apropriações de Suassuna tanto do folheto nordestino quanto de outras fontes literárias são possíveis porque a palavra imitação, usada por Suassuna, remete-nos ao conceito aristotélico de mimesis, cujo significado não representa apenas uma repetição à semelhança de algo, uma cópia, mas a representação de uma realidade. Suassuna já fez diversos elogios da imitação como ato de criação e costuma dizer que boa parte da obra de Shakespeare vem da recriação de histórias mais antigas.

Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultura popular a noção de que a história, uma vez contada, torna-se patrimônio universal e transfere-se para o domínio público. Autoral é apenas a forma textual dada à história por cada um que a reescreve.

(Adaptado de FOLCH, Luiza. Disponível em: www.omarara-re.uerj.br/numero15. Acesso em 17/05/2014)

1. Depreende-se do contexto que o autor lança mão do conceito de “mimesis” para
 - (A) explicitar que, em sua obra, Suassuna se apropria da literatura sertaneja, reelaborando-a com um estilo próprio.
 - (B) enaltecer a erudição de autores como Suassuna, capazes de revelar a essência de uma realidade por meio da literatura de cordel.
 - (C) diferenciar o plágio do processo por meio do qual se parte de uma forma artística já existente para parodiá-la, como fez Shakespeare.
 - (D) sugerir que Suassuna valoriza autores do romanceiro nacional que, diferentemente de Shakespeare, foram consagrados pelo gosto popular.
 - (E) retratar a obra de Suassuna como pertencente a um modelo literário propenso a ser reproduzido em si-mulacros do folclore nacional.
2. Considerado o contexto, há relação de causa e efeito, nessa ordem, entre
 - (A) o elogio de Suassuna à imitação como ato de criação / a intenção de Suassuna de levar o teatro ao povo por meio de apresentações em praças públicas.
 - (B) a disseminação do nome literatura de “cordel” / o fato de folhetos literários serem expostos em cordões nas feiras livres.
 - (C) a ligação de Ariano Suassuna a um grupo de jovens escritores e artistas aos 19 anos / a influência do maracatu rural na peça Auto da Comadecida.
 - (D) a noção existente na cultura popular de que uma história é um patrimônio universal / a originalidade conferida por cada autor a sua história.
 - (E) a infância passada no sertão / a influência da literatura de cordel no estilo do escritor Ariano Suassuna.
3. Uma redação alternativa para um segmento do texto em que se respeitam as normas de concordância encontra-se em:
 - (A) Tanto histórias e casos narrados, como a narrativa oral e a poesia, tratam-se de processos de criação que Ariano Suassuna usa em seus romances.
 - (B) A recriação de histórias mais antigas configuram-se como a base de boa parte da obra de Shakespeare.
 - (C) Cada um que reescreve uma história alheia atribui-lhe uma forma textual que pode ser considerada autoral.
 - (D) Embora devam haver histórias anteriores, a primeira publicação de que se tem comprovação de um folheto de cordel aconteceu em 1870, no Nordeste.
 - (E) O fato de os folhetos serem expostos em cordões, quando vendidos nas feiras livres, deram origem ao nome “cordel”.



4. Considere o que se afirma abaixo sobre a pontuação do texto.
- I. Sem prejuízo do sentido original, uma vírgula pode ser colocada imediatamente após “atividades” no segmento *As atividades que o grupo desenvolveu apontavam para três direções...* (2º parágrafo)
- II. No segmento *Suas obras se caracterizam justamente por isso, pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina*, a vírgula colocada imediatamente após “isso” pode ser corretamente substituída por dois-pontos, uma vez que a ela se segue uma explicação. (1º parágrafo)
- III. Sem prejuízo para a correção gramatical, uma vírgula pode ser colocada imediatamente após “sertão”, no segmento *A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com os temas e formas de expressão artística...* (1º parágrafo)
- Está correto o que se afirma APENAS em
- (A) I.
(B) II e III.
(C) II.
(D) I e II.
(E) I e III.
-
5. *Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultura popular a noção de que...* (7º parágrafo)
- Sem prejuízo da correção e do sentido original, e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, o elemento sublinhado acima pode ser corretamente substituído por
- (A) ainda que.
(B) conquanto.
(C) à medida que.
(D) se bem que.
(E) na medida em que.
-
6. O estímulo I criação de uma literatura dramática II raízes estivessem fincadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina, era um dos objetivos do grupo III Ariano Suassuna se juntou.
- Preenchem, correta e respectivamente, as lacunas I, II e III da frase acima:
- (A) à – em que – por que
(B) a – as quais – no que
(C) a – das quais – com o qual
(D) à – cujas – ao qual
(E) à – nas quais – em que
-
7. *A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com temas e...* (1º parágrafo)
- O verbo que, no contexto, exige o mesmo tipo de complemento que o grifado na frase acima está empregado em:
- (A) *O caldo cultural do Nordeste (...) foi primordial na formação do paraibano Ariano Suassuna.*
(B) *...levar o teatro ao povo por meio de apresentações...*
(C) *...que remonta aos autos medievais...*
(D) *...existe na cultura popular a noção de que a história...*
(E) *...surgiu no Nordeste a chamada literatura de cordel.*
-
8. Considerando-se o contexto, a palavra **que** no segmento
- (A) ... *que remonta aos autos medievais...* (5º parágrafo) é um pronome com a função de objeto indireto.
- (B) *As atividades que o grupo desenvolveu...* (2º parágrafo) é uma conjunção que equivale a “conforme”.
- (C) ... *temas e formas de expressão artística que mais tarde viriam a influenciar...* (1º parágrafo) é uma conjunção que introduz o predicativo do sujeito.
- (D) ... *mais diretamente a inúmeros autores populares que se dedicaram ao gênero do cordel.* (5º parágrafo) é um pronome com a função de sujeito.
- (E) ... *e costuma dizer que boa parte da obra de Shakespeare...* (6º parágrafo) é um pronome que introduz um objeto direto.
-
- Atenção: Para responder às questões de números 9 e 10, considere o poema abaixo.
- Foi bem saber-se que o Sertão
não só fala a língua do não
(...)*
- Os escritores que do Brejo,
ou que da Mata, têm o sestro
de só dar a vê-lo no pouco,
no quando em que o vê, sertão-osso.*
- Para o litoral, o esqueleto
é o ser, o estilo sertanejo,
que pode dar uma estrutura
ao discurso que se discursa.*
- Tu, que conviveste o Sertão
quando no sim esquece o não,
e sabes seu viver ambíguo,
vestido de sola e de mitos,*
- a quem só o vê retirante,
vazio do que nele é cante,
nos deste a ver que nele o homem
não é só capaz de sede e fome.*
- Sertanejo, nos explicaste
como gente à beira do quase,
que habita caatingas sem mel,
cria os romances de cordel:*
- o espaço mágico e o feérico,
sem o imediato e o famélico,
fantástico espaço suassuna,
que ensina que o deserto funda*
- (Trecho de: A pedra do reino. NETO, João Cabral de Melo)*
-
9. No poema, reforça-se a ideia de que, por meio da obra de Suassuna, fica demonstrado que há um vigoroso caldo cultural no sertão nordestino. Tal ideia se encontra no verso que está em:
- (A) *Tu, que conviveste o Sertão*
(B) *que ensina que o deserto funda*
(C) *vazio do que nele é cante*
(D) *que habita caatingas sem mel*
(E) *a quem só o vê retirante*

10. Sem prejuízo do sentido original, substitui-se corretamente, no poema,

- (A) *o sestro* por a mania.
- (B) *o feérico* por o humilde.
- (C) *o famélico* por o famigerado.
- (D) *fantástico* por legítimo.
- (E) *caatingas* por brenhas.

Noções de Direito Administrativo

11. O Tribunal Regional do Trabalho pretende modernizar seus processos de trabalho, ampliando o processamento eletrônico de várias etapas e instituindo uma solução integrada de informática. Necessita, ainda, adquirir uma significativa quantidade de computadores com tecnologia e capacidade de processamento compatíveis com a solução a ser adotada. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, a autoridade competente

- (A) poderá adquirir os computadores com inexigibilidade de licitação, optando, desde que justificadamente, por marca de sua preferência.
- (B) poderá contratar, conjuntamente, o desenvolvimento da solução de informática e a aquisição dos computadores, com dispensa de licitação, se comprovar a economicidade da contratação.
- (C) deverá realizar pré-qualificação das empresas prestadoras de serviço e fornecedoras de equipamentos, para fins de escolha das propostas mais vantajosas.
- (D) poderá contratar a aquisição dos computadores com inexigibilidade de licitação, se comprovar que somente podem ser fornecidos por representante comercial exclusivo.
- (E) poderá contratar os serviços e fornecimentos com inexigibilidade de licitação, desde que comprove que os mesmos não possuem natureza comum.

12. Determinado órgão do Poder Judiciário contratou, mediante prévio procedimento licitatório, a prestação de serviços de vigilância, pelo prazo de 12 meses. O edital de licitação e o respectivo contrato previram a prorrogação do prazo originalmente estabelecido para a prestação dos serviços em questão. Referida previsão, à luz das disposições da Lei nº 8.666/93,

- (A) possibilita a prorrogação por períodos iguais e sucessivos, limitada a 60 meses e, em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, por mais 12 meses.
- (B) obriga o contratado a anuir com a prorrogação, por igual período, salvo comprovada impossibilidade de manutenção das condições originalmente pactuadas.
- (C) condiciona-se à anuência do contratado e à comprovação de economicidade da prorrogação, observado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses.
- (D) possibilita, apenas, uma prorrogação, por igual período, eis que se trata de serviço de natureza contínua, condicionada à anuência do contratado.
- (E) viola as disposições legais que atrelam a contratação à vigência dos créditos orçamentários, sendo possível, contudo, a prorrogação mediante aditamento contratual, observado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses.

13. Ana, servidora pública federal, titular de cargo efetivo e investida da função de chefia de determinada repartição pública, recusou-se a assinar certidão de contagem de tempo de serviço solicitada por servidor público em face de desavenças pessoais com o requerente, recusando fé a referido documento público. De acordo com as disposições da Lei nº 8.112/90, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos federais, Ana sujeita-se à penalidade de

- (A) advertência, cabendo suspensão no caso de reincidência.
- (B) suspensão, cabendo demissão no caso de reincidência.
- (C) demissão.
- (D) cassação da função de chefia, cabendo demissão no caso de reincidência.
- (E) suspensão, conversível em multa.



14. A respeito dos atos administrativos, considere:

- I. Apenas os atos discricionários são passíveis de revogação, mantidos os efeitos anteriormente produzidos.
- II. Os atos vinculados, quando eivados de vício de competência são passíveis de convalidação, salvo em matérias de competência exclusiva.
- III. Os atos vinculados podem ser anulados, retroagindo a anulação à data da edição do ato, ou revogados, com efeitos a partir da revogação.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) I e III.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) I.
- (E) II.

15. Determinado Tribunal pretende contratar consultoria especializada para desenvolver indicadores de desempenho e aplicar programa de desenvolvimento de competências gerenciais voltado a seu quadro de pessoal. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, o procedimento licitatório para a contratação em questão

- (A) deverá se dar na modalidade pregão.
- (B) deverá ser do tipo melhor técnica, que é o procedimento obrigatório para a contratação de serviços técnicos especializados.
- (C) poderá ser na modalidade convite, independentemente do valor.
- (D) será, obrigatoriamente, na modalidade concorrência, independentemente do valor.
- (E) poderá ser do tipo técnica e preço, em se tratando de atividade predominantemente intelectual.

16. O *Balanced Scorecard* – BSC, cujos mentores são Robert Kaplan e David Norton, é

- (A) um sistema de avaliação de desempenho organizacional que contempla apenas indicadores financeiros.
- (B) um mecanismo para formulação da estratégia da instituição voltado à missão de futuro e visão de longo prazo.
- (C) um modelo de gestão estratégica que alinha missão, visão e estratégias a um conjunto de indicadores financeiros e não financeiros.
- (D) uma metodologia para avaliação e desenvolvimento de competências individuais orientada pelo denominado mapa estratégico.
- (E) uma metodologia de avaliação de desempenho organizacional e não individual, baseada em guias operacionais.

17. O Ciclo PDCA inclui as seguintes etapas sequenciais:

- (A) diagnóstico; definição de metas; monitoramento; avaliação.
- (B) planejamento; execução; controle/verificação; ação avaliativa/corretiva.
- (C) priorização; definição de objetivos, capacitação; ação avaliativa/corretiva.
- (D) planejamento; desenvolvimento; capacitação; avaliação.
- (E) programação; direcionamento; controle/verificação; avaliação de resultados.

18. O *Project Management Institute* – PMI tornou-se referência como uma das principais associações profissionais em gerenciamento de projetos. O PMBOK é uma das principais publicações do instituto e envolve nove áreas do conhecimento, dentre as quais,

- (A) a pesquisa de satisfação do cliente.
- (B) a certificação de qualidade.
- (C) as ferramentas de auditoria.
- (D) o gerenciamento de escopo.
- (E) o mapeamento estratégico.

19. De acordo com as disposições contidas na Resolução nº 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário,

- (A) os Tribunais deverão elaborar seus respectivos planejamentos estratégicos, com abrangência, mínima, de 2(dois) anos.
- (B) são estabelecidos os objetivos estratégicos do Poder Judiciário, entre os quais se inserem imparcialidade e celeridade.
- (C) o Plano Estratégico Nacional fixa, para os Tribunais, as metas de curto, médio e longo prazo.
- (D) constitui missão do Poder Judiciário, fixada no Plano Estratégico Nacional, ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça e equidade.
- (E) os planejamentos estratégicos dos Tribunais deverão conter, pelo menos, um indicador de resultado para cada objetivo estratégico.

20. Considere que a implementação de uma ação governamental foi concluída no prazo estabelecido, com custos reduzidos e de acordo com o escopo idealizado, porém não foi considerada pela sociedade como promotora dos benefícios esperados. Essa ação foi

- (A) eficaz, porém não eficiente.
- (B) efetiva, porém não eficaz.
- (C) eficiente, porém não efetiva.
- (D) efetiva, porém não eficiente.
- (E) econômica, porém não eficiente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. No exercício da Odontologia, os profissionais da equipe de saúde bucal estão expostos a alguns fatores de risco relacionados ao trabalho, como a repetição de movimentos, a vibração, as posturas incorretas e a aplicação de forças excessivas. Na prevenção dos distúrbios osteomusculares são indicados alguns procedimentos como

- (A) o trabalho a quatro mãos, com visão direta.
- (B) os exercícios de alongamento diariamente, nos intervalos entre as consultas.
- (C) a substituição de instrumentos ultrassônicos por instrumentos manuais em procedimentos prolongados.
- (D) a postura que mantém os cotovelos elevados durante o trabalho.
- (E) a exposição das mãos a temperaturas frias.

22. Durante o atendimento odontológico a um paciente com 29 anos de idade, sexo feminino, em que se executava o procedimento de preparo cavitário para a restauração do dente 22, o cirurgião-dentista sofreu uma perfuração com a broca em sua mão esquerda, que estava devidamente enluvada.

Considere:

- I. Os acidentes com exposição a material biológico devem ser tratados como casos de emergência médica, já que a profilaxia, quando indicada, deve ser iniciada logo após o acidente.
- II. Não existe quimioprofilaxia para reduzir o risco de transmissão do HCV após exposição ocupacional.
- III. Medidas de proteção individual e coletiva visando à prevenção das exposições ocupacionais a material biológico são ineficazes.
- IV. Não há casos comprovados de transmissão de HBV, HCV e HIV durante o atendimento odontológico.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

23. O conhecimento contemporâneo sobre a associação de algumas formas do vírus HPV (papilomavírus humano) com lesões na cavidade bucal ressalta a importância que o cirurgião-dentista deve conferir à observação de lesões

- (A) vermelhas-azuladas.
- (B) pigmentadas.
- (C) verrucosas-papilíferas.
- (D) extravasculares.
- (E) vésico-bolhosas.

24. O autoexame da boca integra o autocuidado em saúde e tem como finalidade identificar alterações na mucosa bucal, visando à detecção precoce de lesões cancerizáveis na boca, alertando a pessoa para a necessidade de procurar um cirurgião-dentista, ou outro profissional de saúde. Dentre os sinais e sintomas a que se deve estar atento, com esse objetivo, estão:

- I. sangramento na gengiva.
- II. caroços.
- III. aftas.
- IV. dentes amolecidos ou quebrados.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) II e IV.
- (E) I e II.

25. Paciente com 63 anos de idade, sexo masculino, relata estar aposentado, após trabalhar na construção civil, como pedreiro. O paciente refere o consumo eventual de álcool, além de fumar "mais de um maço" de cigarros por dia. O exame clínico mostra o uso de prótese total superior e a necessidade de prótese total inferior. No assoalho da boca, observa-se uma lesão com cerca de 2,0 cm de diâmetro, em forma de placa branca, rugosa e granulosa, com bordas mal delimitadas. O diagnóstico diferencial é feito por meio de

- (A) exame citológico por raspagem da superfície da lesão.
- (B) remoção total da lesão.
- (C) citologia exfoliativa.
- (D) excisão em cunha.
- (E) biópsia incisional.

26. A radiografia periapical de paciente com 43 anos de idade, sexo feminino, mostra uma área radiolúcida homogênea unilocular com bordas bem delimitadas, entre as raízes dos dentes 44 e 45. A lâmina dura dos dentes 44 e 45 apresenta-se intacta. A paciente não refere qualquer sintoma relacionado a esta região. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de cisto

- (A) periapical.
- (B) folicular.
- (C) residual.
- (D) periodontal lateral.
- (E) mandibular mediano.



Atenção: Para responder às questões de números 27 e 28, considere o enunciado a seguir:

Paciente com 18 anos de idade, sexo feminino, relata ter febre, fotofobia e corrimento nasal. O exame físico mostra sinais de conjuntivite e o exame da cavidade bucal mostra máculas eritematosas e vesículas com centro branco na mucosa jugal. Na face, observa-se uma erupção eritematosa maculopapular na pele.

27. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de

- (A) varicela.
- (B) rubéola.
- (C) mononucleose infecciosa.
- (D) herpangina.
- (E) eritema multiforme.

28. Para lidar com quadros infecciosos como este na prática odontológica, a imunização é uma importante barreira para quebrar a cadeia epidemiológica. Algumas medidas devem ser adotadas para proteção da equipe de saúde bucal e incluem a vacina

- (A) tríplice viral em dose única.
- (B) dupla adulto, em três doses no esquema básico.
- (C) dupla adulto, requerendo uma dose de reforço em caso de gravidez.
- (D) contra hepatite B, em duas doses de reforço.
- (E) contra pneumococos, requerendo uma dose de reforço anual.

29. Paciente com 21 anos de idade, sexo feminino, relata estar passando por um período de estresse emocional, tendo desenvolvido, recentemente, o hábito de "ranger os dentes". O exame clínico mostra pontos planos, brilhantes e lisos na superfície oclusal do esmalte dos dentes posteriores. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de

- (A) erosão.
- (B) fluorose dentária.
- (C) hipoplasia de esmalte.
- (D) abrasão.
- (E) atrição.

Atenção: Para responder às questões de números 30 e 31, considere o enunciado a seguir:

Paciente com 11 anos de idade, sexo feminino, apresenta a superfície oclusal do dente 85 mais baixa em relação ao plano oclusal. A percussão deste dente produz um som mais agudo que aquele produzido pela percussão dos dentes adjacentes. A radiografia mostra ausência de continuidade do ligamento periodontal do dente 85, além da presença do germe do dente 45, alojado entre as raízes de seu antecessor. Há indicação ortodôntica de exodontia do elemento 85.

30. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de

- (A) hipercentrose do dente 85 e anquilose do dente 45.
- (B) impacção do dente 85 e concrescência do dente 45.
- (C) anquilose do dente 85 e impacção do dente 45.
- (D) dilaceração do dente 85 e hipercentrose do dente 45.
- (E) concrescência do dente 85 e dilaceração do dente 45.

31. A extração do dente 85 deve ser

- (A) postergada, aguardando a rizólise do dente 45 comitante à rizogênese do dente 85.
- (B) realizada por técnica fechada, utilizando a via alveolar com o cuidado de evitar movimentos de luxação.
- (C) realizada com osteotomia na cortical vestibular e odontoseção aplicada junto à furca radicular.
- (D) realizada por técnica de extração dentária vertical atraumática, que se baseia no efeito da roldana fixa.
- (E) evitada, devido às dificuldades de execução de técnica aberta, visando proteger o germe do dente 45.

Atenção: Para responder às questões de números 32 a 34, considere o enunciado a seguir:

Paciente com 31 anos de idade, sexo feminino, foi submetida a extração dos dentes 36 e 37 há dois dias. A paciente relata dor latejante, que não cessa com o uso de analgésicos. O exame clínico mostra uma ferida alveolar óssea exposta, com odor fétido.

32. Durante a anamnese com a paciente, deve-se conduzir a entrevista com o objetivo de identificar a presença de alguns fatores associados a este quadro clínico, como

- (A) a hipertensão arterial.
- (B) o consumo frequente de bebidas alcoólicas.
- (C) o uso continuado de corticosteroides.
- (D) o uso de contraceptivos orais.
- (E) diabetes mellitus não controlado.

33. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de

- (A) hematoma.
- (B) alveolite.
- (C) osteomielite.
- (D) edema.
- (E) trismo.

34. O tratamento nesta condição requer

- (A) compressas de calor úmido na região por 24 horas e prescrição de anti-inflamatórios.
- (B) anestesia terminal infiltrativa, curetagem e sutura.
- (C) encaminhamento para atendimento hospitalar.
- (D) aplicação de raios infravermelhos e antibioticoterapia por 48 horas.
- (E) anestesia por bloqueio regional, curetagem, irrigação com soro fisiológico e sutura.

35. Paciente com 29 anos de idade, sexo masculino, foi submetido a anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior, para a execução de procedimentos restauradores nos dentes 45 e 47. Durante o preparo cavitário no dente 47, o paciente referiu dor no dente. Em seguida, o paciente relatou sentir os músculos do lado direito da face paralisados. Esta condição foi ocasionada pela deposição do anestésico em localização muito

- (A) atrás do forame da mandíbula, atingindo os ramos terminais do nervo facial.
- (B) acima do forame da mandíbula, atingindo o nervo auriculotemporal.
- (C) atrás do forame da mandíbula, alcançando o nervo laríngeo recorrente.
- (D) abaixo do forame da mandíbula, alcançando o nervo laríngeo recorrente.
- (E) à frente do forame da mandíbula, alcançando os ramos terminais do nervo facial.

36. Paciente com 8 anos de idade, sexo feminino, com massa corporal de 30 kg, é trazida pela mãe ao consultório odontológico com dor aguda nos dentes 74 e 75. Há indicação para pulpotomia nos dentes 74 e 75. Frente à necessidade de tratamento dos dois dentes na mesma sessão clínica, a escolha do anestésico local recai sobre a
- (A) mepivacaína a 3%, que não apresenta vasoconstritor em sua composição, com dosagem máxima de 3,2 tubetes.
 (B) lidocaína a 2% com epinefrina a 1:100.000, que tem um tempo de latência de 2 a 4 minutos, com dosagem máxima de 3,6 tubetes.
 (C) prilocaina a 3% com felpressina a 0,03 UI/mL, que não tem contra indicações em casos de discrasias sanguíneas, com dosagem máxima de 3,8 tubetes.
 (D) articaína a 4% com epinefrina a 1:200.000, que tem indicação para crianças a partir de 3 anos de idade, com dosagem máxima de 2,7 tubetes.
 (E) bupivacaína a 5% com epinefrina a 1:200.000, que apresenta longa duração de ação, com dosagem máxima de 2 tubetes.
37. Paciente com 61 anos de idade, sexo feminino, tem histórico de infarto agudo do miocárdio, ocorrido há 8 meses. A paciente tem indicação para extração do dente 24, por motivos protéticos. O controle da dor pós-operatória deve ser feito, por 24 horas, com a prescrição de
- (A) diclofenaco sódico, 50 mg, a cada 8 horas.
 (B) diclofenaco potássico, 100 mg, a cada 6 horas.
 (C) ibuprofeno, 200 mg, a cada 4 horas.
 (D) dipirona sódica, 500 mg, a cada 4 horas.
 (E) nimesulida, 100 mg, a cada 6 horas.
38. A escolha de um antibiótico com ação biológica bactericida, mecanismo de ação sobre a síntese da parede celular e espectro de ação similar contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas recai sobre
- (A) a rifampicina.
 (B) as tetraciclinas.
 (C) a clindamicina.
 (D) o cloranfenicol.
 (E) as cefalosporinas.
39. O surgimento de cepas resistentes aos antibióticos, em ambiente hospitalar, é mais frequente
PORQUE
 embora os antibióticos não causem mutação em microorganismos, eles induzem o aparecimento de novas características na bactéria.
 Considerando as asserções apresentadas,
- (A) a primeira é falsa e a segunda verdadeira.
 (B) as duas são verdadeiras mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
 (C) a primeira é verdadeira e a segunda falsa.
 (D) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
 (E) tanto a primeira quanto a segunda são falsas.
40. Paciente com 61 anos de idade, sexo feminino, apresenta história prévia de endocardite bacteriana e relata ser alérgica à penicilina. Diante da indicação de extração do dente 15, a antibioticoprofilaxia deve ser realizada com a prescrição de
- (A) clindamicina, 600 mg, por via oral, uma hora antes do início do procedimento.
 (B) azitromicina, 600 mg, por via oral, duas horas antes do início do procedimento.
 (C) ampicilina, 2 g, por via oral, uma hora antes do início do procedimento.
 (D) amoxicilina, 500 mg, por via oral, duas horas antes do início do procedimento.
 (E) claritromicina, 2g, por via oral, duas horas antes do início do procedimento.
41. Paciente com 15 anos de idade, sexo feminino, tem indicação para procedimento restaurador no dente 27, que apresenta coroa clínica curta. O grampo para isolamento do campo operatório caiu na porção posterior da cavidade bucal, durante o procedimento de escolha e adaptação do grampo. É possível visualizar o grampo na orofaringe da paciente, que está consciente. A conduta para evitar a aspiração do grampo consiste em
- (A) reclinar a cadeira odontológica e pressionar o terço médio do osso esterno até a paciente expelir o grampo.
 (B) orientar a paciente a inclinar-se sobre o braço da cadeira com a cabeça para baixo e encorajá-la a tossir.
 (C) colocar a paciente em posição supina e efetuar compressões abdominais até que o grampo seja removido pelo profissional.
 (D) solicitar à paciente que fique em pé e dar tapas em suas costas até desobstruir as vias aéreas.
 (E) colocar a paciente em posição sentada e solicitar que a mesma respire profundamente.

Atenção: Para responder às questões de números 42 a 44, considere o enunciado a seguir:

Paciente com 16 anos de idade, sexo masculino, queixa-se da aparência de seus dentes após a conclusão de tratamento ortodôntico com o uso de bráquetes. O exame clínico mostra lesões com aspecto amarelado, polido e mais liso que rugoso nas superfícies vestibulares dos incisivos superiores e lesões com aspecto sombreado por baixo do esmalte intacto nas superfícies oclusais dos molares superiores. Após a remoção do esmalte da superfície oclusal dos dentes 26 e 27, a dentina apresenta coloração marrom clara e amolecida à sondagem no dente 26 e, no dente 27, a dentina tem consistência um pouco mais endurecida que no dente 26.

42. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de cárie dentária
- (A) inativa em esmalte nos incisivos superiores, ativa em dentina no dente 26 e inativa em dentina no dente 27.
 (B) ativa em dentina nos incisivos superiores, inativa em dentina no dente 26 e inativa em dentina no dente 27.
 (C) ativa em esmalte nos incisivos superiores, ativa em dentina no dente 26 e inativa em dentina no dente 27.
 (D) ativa em esmalte nos incisivos superiores, inativa em dentina no dente 26 e ativa em dentina no dente 27.
 (E) inativa em esmalte nos incisivos superiores, inativa em dentina no dente 26 e ativa em dentina no dente 27.



43. A opção pelo uso do ionômero de vidro como material restaurador para os dentes 26 e 27 apresenta algumas limitações, como
- o recarregamento de flúor quando outras fontes de flúor entram em contato com o material restaurador.
 - a suscetibilidade à pigmentação e rugosidade superficial após a aplicação de gel de flúor acidulado.
 - o coeficiente de expansão térmica linear do material similar ao do esmalte, provocando recidiva de cárie dentária.
 - a liberação de flúor para o meio bucal nas primeiras 72 horas após o procedimento restaurador.
 - o uso em superfícies oclusais de dentes permanentes, devido à baixa resistência do material à tração.
44. Tendo em vista o risco de cárie dentária apresentado por este paciente, indica-se o uso de dentífrico fluoretado, que promove a interferência do fluoreto na desmineralização por meio de alguns processos, como a
- reação do flúor com a superfície dentária, formando uma pequena quantidade de fluoreto de sódio.
 - liberação de fluoreto a partir da ionização em contato com a água do dentífrico contendo monofluorofostato de sódio.
 - reação do flúor com o biofilme dental, formando uma pequena quantidade de fluoreto de cálcio.
 - formação de reservatórios de fluoreto quando o flúor, em associação com o cálcio, se deposita no biofilme residual não removido.
 - liberação de fluoreto a partir da ação de enzimas fosfatases presentes na cavidade bucal pelo uso de dentífrico contendo fluoreto de sódio.
- Atenção: Para responder às questões de números 45 e 46, considere o enunciado a seguir:
- Paciente com 49 anos de idade, sexo masculino, apresenta fratura da restauração de amálgama em cavidade simples na superfície oclusal do dente 46. A remoção da restauração mostrou uma cavidade com 1,5 mm de profundidade e cerca de 3 mm de extensão vestibulolingual, sem tecido cariado subjacente.
45. A restauração de amálgama é mais suscetível à fratura quando há
- manutenção da parede pulpar paralela ao plano oclusal.
 - ângulos internos arredondados.
 - variações na profundidade da parede pulpar.
 - escultura rasa.
 - espessura igual ou superior a 1,5 mm.
46. Alguns cuidados devem ser tomados para o gerenciamento de restos e fragmentos de amálgama, até o momento do descarte, o que inclui o armazenamento em
- solução química para a revelação de radiografias, sob luz solar.
 - recipiente de vidro fechado, sem luz solar direta, em local com alta temperatura.
 - solução química para a fixação de radiografias, em um recipiente fechado.
 - água, em um recipiente fechado, mantido em local com alta temperatura.
 - recipiente aberto, contendo água, mantido em local à baixa temperatura.
47. A mãe de paciente com 5 anos de idade, sexo masculino, relata que a criança "come doces várias vezes ao dia, mas escova os dentes logo depois". Para que o autocuidado seja feito com base na melhor evidência científica, é importante que a mãe seja informada que o controle da cárie dentária é
- promovido ao reduzir a quantidade de sacarose ingerida, sobretudo na consistência pegajosa.
 - resultante da dissolução de mineral na superfície do esmalte quando o pH do biofilme dental fica abaixo de 6,5.
 - prejudicado pelo tempo necessário para a queda do pH do biofilme a níveis críticos, estimado em 10 minutos.
 - efetuado quando há ativação da reposição dos minerais perdidos durante os desafios cariogênicos.
 - assegurado pelo hábito de escovar os dentes sem dentífrico após a ingestão de sacarose.
48. Paciente com 22 anos de idade, sexo feminino, vive em cidade sem fluoretação das águas de abastecimento público e relata estar no segundo mês de gestação. A paciente solicita uma prescrição de "vitaminas com cálcio e flúor", tendo em vista seus cuidados para que o bebê "tenha os dentes fortes e saudáveis". Com relação à suplementação individual de flúor durante a gestação, considere:
- É indispensável ingerir flúor durante o período de formação dos dentes, devido ao efeito anticárie do flúor ocorrer por via sistêmica.
 - Em complexos vitamínicos que contêm cálcio e flúor, ocorre a reação entre o cálcio e o flúor, diminuindo a absorção de ambos.
 - A ingestão do flúor no período pré-natal não promove a redução da cárie dentária na dentição decídua.
 - O uso do flúor no período pré-natal não traz benefícios à dentição permanente, devido à barreira placentária.
- Está correto o que consta APENAS em
- II e III.
 - I e III.
 - I e II.
 - II e IV.
 - III e IV.
49. Durante um breve descuido da equipe de saúde bucal, paciente com 5 anos de idade, sexo feminino, com peso corpóreo estimado em 20 kg, ingeriu, accidentalmente, cerca de 2,5 g de gel fluoretado, dosado para preencher uma moldeira. Estima-se que a quantidade de flúor ingerido foi de 1,53 mg/kg. O atendimento imediato desta criança requer
- administração de glicose para aumentar a excreção de fluoreto.
 - indução ao vômito e internação hospitalar.
 - injeção intravenosa de gluconato de cálcio a 20%.
 - monitoramento cardíaco para prevenção de colapso cardiovascular.
 - administração de cálcio por via oral e observação por uma hora.

<p>50. Paciente com 4 anos de idade, sexo feminino, apresenta biofilme visível nas superfícies dentárias e manchas brancas ativas nos incisivos superiores e inferiores. A mãe relata que a criança "gosta muito de bolachas e chocolate" e que realiza a escovação dos dentes sem dentífrico, para "evitar a fluorose" nos dentes. O uso de dentífrico com 1000 ppm F é</p> <p>(A) contraindicado para crianças com menos de 5 anos de idade, ainda que seja feita a orientação para a criança não deglutar o dentífrico.</p> <p>(B) limitado a condições de alto risco à cárie dentária em crianças abaixo de 6 anos de idade.</p> <p>(C) permitido para crianças com mais de 3 anos de idade, utilizando grande quantidade de dentífrico, desde que haja orientação para a criança expectorar o dentífrico.</p> <p>(D) indicado devido ao efeito anticárie, sendo recomendado o uso de pequenas quantidades do dentífrico, seguido de enxágue da cavidade bucal.</p> <p>(E) recomendado para crianças a partir dos 4 anos de idade, utilizando média quantidade de dentífrico após as refeições.</p>	<p>52. Para o diagnóstico da condição pulpar do dente 11, nesta consulta de urgência, os testes térmicos</p> <p>I. indicam a presença ou ausência de circulação sanguínea no interior da polpa.</p> <p>II. apresentam resultados falsos-negativos quando a capacidade de condução das terminações nervosas está desordenada, inibindo o impulso derivado de um estímulo térmico.</p> <p>III. constituem testes de sensibilidade para avaliar a função nervosa no interior da polpa.</p> <p>IV. definem a condição de vitalidade da polpa após o traumatismo.</p> <p>Está correto o que consta APENAS em</p> <p>(A) II e III.</p> <p>(B) II e IV.</p> <p>(C) III e IV.</p> <p>(D) I e IV.</p> <p>(E) I e III.</p>
<p><u>Atenção:</u> Para responder às questões de números 51 a 53, considere o enunciado a seguir:</p> <p>Paciente com 66 anos de idade, sexo feminino, queixa-se de dor no dente 11 após ter sofrido uma queda cerca de duas horas antes desta consulta de urgência. A paciente relata ter hipertensão arterial e estar sob acompanhamento médico. A aferição da pressão arterial mostra valores de 160 mmHg e 90 mmHg para a pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente. O histórico médico da paciente registra ausência de outras complicações sistêmicas, como alterações coronárias, acidente vascular encefálico, arritmias, insuficiência cardíaca congestiva ou diabetes. Ao exame clínico observa-se fratura no dente 11 com exposição pulpar e o exame radiográfico revela que a fratura atingiu a porção coronária do dente 11.</p>	<p>53. O tratamento pulpar requer anestesia local, observando-se que o volume de anestésico não ultrapasse o limite de</p> <p>(A) 5,5 tubetes de lidocaína a 2% com epinefrina 1:200.000.</p> <p>(B) 2 tubetes de prilocaina a 3% com felipressina a 0,03 UI/mL.</p> <p>(C) 8,3 tubetes de mepivacaína a 2% com norepinefrina a 1:100.000.</p> <p>(D) 2 tubetes de lidocaína a 3% com norepinefrina a 1:50.000.</p> <p>(E) 4 tubetes de articaína a 4% com epinefrina 1:100.000.</p>
<p>51. Diante da necessidade de evitar um aumento da pressão arterial, a sedação da paciente, antes do atendimento clínico, é</p> <p>(A) contraindicada, uma vez que o estresse provocado pela dor aliado à descarga de adrenalina produz efeitos paradoxais quando da ingestão de benzodiazepínicos com ação ansiolítica e hipnótica.</p> <p>(B) necessária, pois o estresse provocado pelo ambiente do consultório aumenta a liberação de adrenalina pelas suprarrenais, requerendo a prescrição de diazepam 10 mg.</p> <p>(C) indicada, uma vez que o estresse provocado pelo traumatismo aumenta a liberação de epinefrina e norepinefrina pelas suprarrenais, requerendo a prescrição de midazolam 15 mg.</p> <p>(D) necessária, pois o estresse provocado pelo ambiente do consultório aumenta a liberação de cortisol pelas suprarrenais, requerendo a prescrição de alprazolam 1 mg.</p> <p>(E) recomendada, uma vez que o estresse provocado pela dor aumenta a liberação de epinefrina e norepinefrina pelas suprarrenais, o que requer a prescrição de lorazepam 1 mg.</p>	<p><u>Atenção:</u> Para responder às questões de números 54 a 56, considere o enunciado a seguir:</p> <p>Paciente com 26 anos de idade, sexo masculino, relata fumar cerca de 15 cigarros por dia. O exame clínico mostra sangramento na margem da gengiva na região dos dentes 31, 32 e 33, após a realização da sondagem periodontal.</p> <p>54. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de gengivite, que</p> <p>(A) promove destruição tecidual irreversível, resultando em periodontite na presença de biofilme subgengival.</p> <p>(B) provoca uma resposta adaptativa do hospedeiro suscetível, evitando a destruição tecidual.</p> <p>(C) constitui uma resposta universal do hospedeiro à presença de biofilme supragengival.</p> <p>(D) representa uma resposta inflamatória inicial do hospedeiro suscetível à presença de biofilme subgengival.</p> <p>(E) leva ao estabelecimento da periodontite, independente da condição da suscetibilidade do hospedeiro.</p>



55. Durante o tratamento odontológico, o cirurgião-dentista tem oportunidades de aconselhar e orientar o paciente a parar de fumar, pois o tabagismo afeta a saúde periodontal ao promover alterações na
- resposta imune imediata.
 - função celular endotelial.
 - microbiota.
 - microcirculação periférica.
 - atividade das metaloproteinases da matriz.
- Está correto o que consta APENAS em
- I, II e V.
 - I, III e IV.
 - I, II e IV.
 - II, III e V.
 - III, IV e V.
-
56. Para realizar o controle mecânico do biofilme supragengival em áreas proximais, preconiza-se o uso de
- escova interdental em áreas com envolvimento de furca.
 - fita dental na ausência de área de contato.
 - escova unitufo na presença de concavidades nos sítios proximais.
 - escova unitufo na presença de pontos de contato.
 - escova interdental na presença de recessões gengivais.
-
57. Paciente com 54 anos de idade, sexo feminino, apresenta abscesso na região apical do dente 12, com a presença de fistula. A sondagem periodontal indica maior profundidade ao redor do dente 12 que nos demais dentes anteriores. O exame radiográfico mostra um defeito ósseo angular na face mesial da raiz do dente 12. Em casos como este, a lesão endoperiodontal resulta da difusão de bactérias entre os tecidos pulpar e periodontal
- pela fistula.
 - pela furca.
 - pelos canais acessórios laterais.
 - pelo forame apical.
- Está correto o que consta APENAS em
- I e III.
 - II e IV.
 - II e III.
 - III e IV.
 - I e II.
-
58. Paciente com 18 anos de idade, sexo masculino, relata sentir "fortes dores na face". Exames neurológicos e otorrinolaringológicos mostram não haver alterações que justifiquem tais dores faciais. No exame clínico odontológico, a manipulação funcional permite identificar que a dor referida tem origem no músculo
- esternoclidomastoideo quando, ao prostrar a mandíbula contra uma resistência aplicada pelo examinador, a dor diminui.
 - pterigoideo lateral superior quando, ao prostrar a mandíbula contra uma resistência aplicada pelo examinador, a dor aumenta.
 - pterigoideo medial quando, ao efetuar uma abertura ampla da boca, a dor aumenta.
 - trapézio quando, ao morder um abaixador de língua colocado entre os dentes posteriores, a dor aumenta.
 - pterigoideo lateral inferior quando, ao morder um abaixador de língua colocado entre os dentes posteriores, a dor diminui.

Atenção: Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir:

Durante o procedimento de raspagem subgengival, paciente com 67 anos de idade, sexo masculino, refere "dor profunda no peito", que se irradia para o ombro, face interna do braço e mão esquerda. O paciente apresenta sudorese e dificuldade para respirar e, após queixar-se de náusea, vomita.

59. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de

- taquicardia sinusal.
- bradicardia sinusal.
- infarto agudo do miocárdio.
- insuficiência adrenal aguda.
- acidente vascular encefálico.

60. O protocolo de atendimento ao paciente consiste em providenciar um serviço de socorro médico, aliado a algumas medidas, como

- administrar 2 a 3 comprimidos de ácido acetilsalicílico, visando inibir a agregação plaquetária.
- não administrar oxigênio, pois a oxigenação pode ocasionar vasoconstricção na área afetada e aumentar a isquemia.
- colocar o paciente em posição supina, de forma a desobstruir as vias aéreas e facilitar os movimentos respiratórios.
- promover ventilação do ambiente, evitando o aumento da temperatura corporal do paciente.
- solicitar ao paciente para descer da cadeira odontológica, reduzindo os riscos de fratura devido a uma queda.

DISCURSIVA - REDAÇÃO**Atenção:**

- Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
- Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva – Redação, na Folha Definitiva, que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
- Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação.

Os transtornos mentais são comuns demais para continuemos a vê-los com preconceito. São doenças como quaisquer outras, mas que têm a peculiaridade de afetar o órgão do corpo que nos diz quem somos.

(...)

O diagnóstico de um transtorno mental grave é frequentemente entendido como uma sentença de comprometimento da vida em sociedade. A ciência mostra, porém, que o diagnóstico é o eixo articulador de estratégias terapêuticas para a remissão de sintomas e a reabilitação das pessoas à vida profissional.

(Adaptado de BRESSAN, Rodrigo. **Folha de S.Paulo**, 18/05/2014)

Considerando o que se afirma acima, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema:

As questões suscitadas pelas doenças mentais no universo do trabalho

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	