

RASCUNHO

Texto

O amor acaba
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentencia imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
 - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
 - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
 - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
 - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
 - dois períodos compostos.
 - apenas uma frase nominal.
 - um período simples e um composto.
 - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
 - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
 - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
 - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
 - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu.”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
 - técnica
 - objetiva
 - popular
 - informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, **como tentáculos saciados**, e elas se movimentam no escuro **como dois polvos de solidão**.”*

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
 - Comparação
 - Metáfora
 - Metonímia
 - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:
- R\$ 2.500,00
 - R\$ 2.357,14
 - R\$ 3.771,43
 - R\$ 3.000,00
 - R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa INCORRETA nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

26) Paciente feminina, 25 anos, refere dor precordial de início súbito, do tipo pleurítica, no hemitórax direito há 3 horas. Nega cardiopatia, hipertensão arterial sistêmica ou diabetes. Hábitos e vícios: tabagista 10 maços/ano. Medicações crônicas: anticoncepcional oral há 2 anos. Ao exame: REG, taquidispnéica, descorada +/4+, desidratada +/4+. Ausculta cardíaca: Bulhas rítmicas, desdobramento fixo de B2 no foco pulmonar, taquicárdicas 100 bpm. Nega dor à palpação no hemitórax direito, porém com queixa de dor à inspiração profunda. Apresenta cianose de extremidades.

Assinale a alternativa que apresenta os exames complementares a seguir seriam melhores para a elucidação diagnóstica:

- Eletrocardiograma, CKMB, ecocardiograma.
- Eletrocardiograma, CKMB, tomografia de tórax com contraste para angiografia (angiotomo).
- Eletrocardiograma, D-dímero, tomografia de tórax com contraste para angiografia (angiotomo).
- Eletrocardiograma, coagulograma e ecocardiograma.
- Eletrocardiograma, troponina e ecocardiograma.

Texto para questões 27 e 28

Paciente de 65 anos, hipertenso, diabético e dislipidêmico, mal controlado, procura o pronto atendimento com dor na região da articulação metacarpo falangeana do primeiro dedo do pé direito. Ao exame, apresenta-se obeso, PA 200X120 mmHg, inquieto e agitado. Na região do hálux do pé direito, edema e hiperemia importante. Dor importante à mobilização do dedo.

27) Assinale a alternativa que apresenta os exames complementares, indicados para elucidação diagnóstica:

- Hemograma, VHS, PCR, Doppler de Membros inferiores;
- Radiografia do pé afetado, ácido úrico, Ultrassonografia do pé direito.
- Hemograma, FAN, Fator reumatoide, anti DNA.
- Doppler do membro inferior direito, punção do derrame articular para bioquímica e citologia, sorologia para sífilis e gonorreia;
- Ressonância nuclear magnética do membro inferior direito, ácido úrico e FAN.

28) Com relação ao caso acima, assinale a alternativa que apresenta o tratamento correto na fase aguda:

- Colchicina, anti-inflamatórios não hormonais, corticoide.
- Opióide, fentanil transdérmico, anti-inflamatório não hormonal.
- Dipirona, Paracetamol, anti-inflamatório não hormonal.
- Antibiótico (cefalosporina de 3ª geração), anti-inflamatório não hormonal e opióide.
- Enoxaparina, anti-inflamatório não hormonal, corticóide.

29) Com relação ao tratamento da dor crônica, assinale a alternativa que apresenta as categorias de tratamento:

Escolha a melhor alternativa:

- Tratamento cirúrgico, tratamento farmacológico, tratamento psicológico, tratamento comportamental, tratamento holístico, tratamento multiprofissional.
- Tratamento multidisciplinar, tratamento farmacológico, tratamento físico, tratamento psicológico, tratamento invasivo, tratamento alternativo.
- Tratamento multiprofissional, tratamento multidisciplinar, tratamento comportamental, tratamento holístico, tratamento cirúrgico, tratamento psicológico.
- Tratamento farmacológico, medicina física, Tratamento comportamental, neuromodulação, tratamento intervencionista e Tratamento cirúrgico.
- Tratamento com anti-inflamatório não hormonal, opióides, eletro-estimulação transcutânea, acupuntura, corticoide e infiltração com anestésico.

30) Com relação às recomendações da Organização Mundial de Saúde para o tratamento de dor crônica, escolha a alternativa **incorreta**:

- A medicação para dor precisa ser administrada através da via mais efetiva e confortável possível para o paciente, para atingir o máximo de controle.
- Analgésicos para dores crônicas moderada e grave devem ser dadas com horários previamente estabelecidos e não no esquema "se necessário".
- A abordagem do tipo "degrau acima" para a medicação para dor crônica obedece a essa sequência: medicação não opióide (± adjuvantes), seguido o uso de opióides (codeína) para dor nociceptiva leve a moderada ± adjuvantes, ± não-opioides. Para dor persistente, opióides (morfina) ou dor moderada para grave ± adjuvantes, ± não-opioides.
- Adjuvantes são usados para aumentar o poder dos analgésicos para controlar possíveis efeitos colaterais e controlar outros sintomas associados com a dor crônica, como náusea, depressão, ansiedade, sedação e insônia.
- Para evitar a dependência química, devemos sempre começar com uma dose menor de opióides e aumentar com muita parcimônia, não devendo aumentar a dose porque o paciente pediu. Não há variação de dosagens e variações interpessoais de tolerância a opióides.

31) Com relação à dor neuropática, **não podemos afirmar (escolha a alternativa incorreta)**:

- A abordagem inicial necessita se concentrar no diagnóstico da causa de dor neuropática.
- Para a maioria dos pacientes com dor neuropática, a abordagem inicial é com opióide.
- Para a maioria dos pacientes com dor neuropática crônica, a abordagem inicial geralmente é com antidepressivo (tricíclico ou inibidor de recaptção de serotonina).
- Para a maioria dos pacientes com dor neuropática crônica, o uso de α_2 delta ligando do canal de cálcio é bem indicado.
- O uso de opióide pode ser indicado em dor neuropática crônica, quando a abordagem inicial não surte o resultado esperado.

32) Com relação à dor nociceptiva, podemos afirmar (escolha a alternativa correta):

- a) A abordagem inicial é com analgésico não narcóticos, e opióides são reservados para um estágio posterior de tratamento.
- b) Não podemos usar anti-inflamatórios não esteroides para tratar de dor nociceptiva.
- c) O uso de tratamento físico não apresenta evidências na literatura para a dor nociceptiva.
- d) Não há risco de abuso em opióides em pacientes com dor nociceptiva, uma vez que não é o agente inicial de tratamento.
- e) Entre os analgésicos não opióides, paracetamol é um agente que não se deve ser usado, devido à sua pouca potência analgésica.

33) Paciente de 70 anos, feminino, vai ao ambulatório com queixas de dor na região do joelho direito. Após exame, constata-se, joelho com deformidade, sem sinais de inflamação e sem derrame. Assinale a alternativa que apresenta a medicação de escolha para iniciar o tratamento farmacológico: Escolha a melhor alternativa:

- a) Prednisona 40 mg por via oral uma vez ao dia, reavaliar em 7 dias.
- b) Hidroxi-cloroquina 400mg via oral, reavaliar em 30 dias.
- c) Paracetamol 500 mg via oral, 2 a 3 vezes por dia, reavaliar em 3 dias.
- d) Tramadol 50mg via oral, 3 vezes ao dia, reavaliar em 7 dias.
- e) Codeína 30 mg via oral, 3 vezes ao dia, reavaliar em 14 dias.

34) Paciente 45 anos, feminina, portadora de artrite reumatóide, em uso de metotrexato 20mg. Procura o ambulatório com queixa de dor importante, rigidez matinal de 15 minutos. Após exame, observam-se, as mãos com dedos em pescoço de cisne, especialmente as 2º e 3º falanges da mão direita. Não apresenta calor, rubor e edema local. Para a abordagem inicial, assinale a alternativa que apresenta a melhor alternativa:

- a) Codeína 30 mg Codeína 30 mg via oral, 3 vezes ao dia, reavaliar em 14 dias.
- b) Tramadol 50 mg, via oral, 4 vezes ao dia, reavaliar em 7 dias.
- c) Prednisona 60 mg, via oral uma vez ao dia, reavaliar em 7 dias.
- d) Leflunomida 20mg, via oral uma vez ao dia, reavaliar em 30 dias.
- e) Naproxeno 500mg, via oral, 2 vezes ao dia, reavaliar em 7 dias.

35) Com relação aos efeitos colaterais de anti-inflamatório não esteroide, podemos afirmar (escolha a alternativa correta):

- a) De uma maneira geral, os anti-inflamatórios não esteroides não interferem com a agregação plaquetária.
- b) De uma maneira geral, os anti-inflamatórios não esteroides do tipo inibidor de COX-2 apresentam menor nefrotoxicidade que os inibidores de COX-1.
- c) De uma maneira geral, o efeito colateral gastrointestinal de anti-inflamatórios não esteroides não são importantes, não devem ser levados em consideração quando há queixa do paciente, é mais importante atingir a analgesia.
- d) Quando há queixa de dispepsia por pacientes que usam anti-inflamatórios não esteroides, o uso de inibidor de bomba de prótons pode aliviar bem os sintomas.
- e) De uma maneira geral, os anti-inflamatórios não esteroides não interferem com o uso de aspirina com intuito cardio-protetor.

36) Com relação ao uso de anticonvulsivantes em dor crônica, podemos afirmar (escolha alternativa correta):

- a) A indicação é para dor neuropática.
- b) Entre os efeitos adversos dos anticonvulsivantes, a tontura e vertigem não fazem parte.
- c) Topiramato é anticonvulsivante de primeira escolha para tratamento de dor neuropática e cefaleia de qualquer origem.
- d) Pregabalina normalmente leva mais tempo do que gabapentina para o início de ação analgésica.
- e) Entre os efeitos colaterais da pregabalina está o humor deprimido.

37) Com relação ao uso de antidepressivos no tratamento de dor crônica, não podemos afirmar (escolha a alternativa incorreta):

- a) Os antidepressivos possuem efeito analgésico.
- b) Os antidepressivos podem ser prescritos para tratar farmacologicamente fibromialgia.
- c) Os antidepressivos não são efetivos no tratamento de dor neuropática.
- d) Os antidepressivos apresentam, aparentemente, efeito analgésico separadamente de efeito antidepressivo.
- e) Os antidepressivos aparentemente apresentam efeito analgésico em paciente que não sofre de depressão.

38) Sobre os efeitos colaterais do antidepressivo no tratamento de dor crônica. Escolha a alternativa incorreta.

- a) Náusea.
- b) Taquicardia.
- c) Arritmia.
- d) Ataxia.
- e) Perda de apetite.

39) Com relação à indicação de opióide no tratamento de dor crônica, podemos afirmar (escolha a alternativa correta):

- a) Opióide só pode ser indicado em caso de dor crônica provocada por neoplasia.
- b) Deve-se optar por iniciar o tratamento na dor crônica de moderada a grave.
- c) O início de tratamento com opióide deve ser realizado sem considerar a indicação, em etapa anterior, de anticonvulsivante e antidepressivo.
- d) A ação analgésica de opióide é muito superior ao uso de agentes não opióides em tratamento de dor lombar crônica.
- e) Constipação não é um efeito colateral do opióide.

40) Com relação aos termos dependência física, tolerância e adição no uso de opióides, podem afirmar (escolha a alternativa correta):

- a) A descontinuação brusca após o uso prolongado de opióide, trazendo sintomas como sudorese, ansiedade e labilidade de humor é adição.
- b) O aumento de dose cada vez maior para controle da dor crônica é dependência física.
- c) A dependência física acontece quando um paciente procura o consumo de opióide mesmo não necessitando da droga.
- d) Os sintomas como sudorese, ansiedade e labilidade de humor fazem parte da manifestação de dependência física.
- e) A tolerância é um fenômeno muito raramente observado em uso crônico de opióides.

41) Paciente de 25 anos, com dor crônica após um trauma na coluna lombar, resultante de um acidente automobilístico há 2 anos, toma Naproxeno 500mg 12/12 hs, amitriptilina 75 mg, adesivo transcutâneo de fentanil 5 mg 8/8hs, em esquema de retirada de opióide via oral. Procura o pronto socorro, queixando-se de dor de forte intensidade na região lombar e pede ao plantonista para prescrever opióide. Ao exame, queixa de forte dor na região lombar ao toque. PA= 130 X 75 mmHg, Frequência cardíaca=78/min. Eupnéico, Qual a melhor conduta? Escolha a alternativa correta.

- a) Morfina 20mg via oral.
- b) Morfina 5mg via endovenosa.
- c) Colocar mais um adesivo de fentanil 5mg.
- d) Introduzir morfina uso epidural.
- e) Trata-se de adição, não usar opióide.

Texto para questões 42 e 43

Paciente de 24 anos, masculino, deu entrada no pronto socorro com queixas de dor em membros inferiores, de instalação aguda, há 4 horas. Estava hígido, quando há cerca de um dia, começou um quadro gripal após ter pego uma "friagem" (sic). A dor é em pontada, em forte intensidade. Ao exame: descorado 3+/4, taquipnéico (20 rpm) e taquicárdico (120 bmp). Membros inferiores com dor importante à palpação.

42) Assinale a alternativa que apresenta qual exame(s) complementar(es) faria o diagnóstico do quadro da dor, mais apropriadamente. Escolha a melhor alternativa:

- a) VHS.
- b) PCR.
- c) Hemograma.
- d) Prova de falcização.
- e) D dímero.

43) Com relação ao caso acima, assinale a alternativa que apresenta os primeiros passos do tratamento (escolha a melhor alternativa):

- a) Oseltamivir, Dipirona e Prednisona.
- b) Oxigênio suplementar, hidratação e opióide.
- c) Oxigênio suplementar, transfusão e Oseltamivir.
- d) Cefalosporina de 2ª geração, Dipirona e Prednisona.
- e) Oxigenação suplementar, heparina e prednisona.

Texto para questões 44 e 45

Paciente de 75 anos, procurou o pronto socorro com queixas de dor na região lombar de início recente, de instalação insidiosa. Trabalhava como pedreiro e tinha sobrecarga de peso importante. Ao exame: descorado 3+/4, desidratado 1+/4, desorientado espacialmente. Ausculta cardíaca com 3 bulha e taquicárdico. Ausculta pulmonar com crepitações finas em base direita. Anasarca. Alguns exames de laboratório mostram: Hemoglobina 7,5 g%, Calcio total= 11mg/dL, Creatinina 3mg/dL.

44) Assinale a alternativa que apresenta os exames que você vai pedir para melhor elucidação diagnóstica (escolha a melhor alternativa):

- a) Eletroforese de proteína, Urina tipo I e ressonância nuclear magnética de coluna lombar.
- b) Eletroforese de hemoglobina, radiografia da coluna lombar e Urina tipo I.
- c) Alfa feto proteína, tomografia computadorizada de coluna lombar e HLA B27.
- d) Urina tipo I, ultrassonografia de vias urinárias e ácido úrico.
- e) Eletroforese de imunoglobulinas, FAN e mielograma.

45) Com relação ao caso acima, assinale a alternativa que apresenta a melhor opção para o tratamento da dor:

- a) Hidratação, bifosfonado e iniciar anti-inflamatório não esteroide.
- b) Fosfato, oxigênio suplementar e fisioterapia.
- c) Bicarbonato, paracetamol e cefalosporina de 2ª geração.
- d) Plasmaferese, agulhamento seco para vertebral, opióide.
- e) Opióide, antidepressivo e bicarbonato.

Texto para questões 46 e 47

Paciente de 21 anos, feminino, refere dor tipo pleurítica no hemitórax D. A dor iniciou há menos de 2 horas, com uma sensação de pontada forte e súbita. Nega traumatismo local. Refere ser asmática leve e não usa medicação atualmente, pois estava assintomática. Queixa-se também de dispneia. Ao exame: corada, hidratada, dispneica. Saturação de oxigênio no oxímetro de pulso= 90% em ar ambiente. Ausculta pulmonar: MV abolido no hemitórax D.

46) Escolha a melhor alternativa para o teste diagnóstico do quadro:

- a) Gasometria arterial.
- b) Radiografia de tórax PA e Perfil.
- c) Eletrocardiograma.
- d) D-dímero.
- e) Tomografia computadorizada de tórax protocolo para tromboembolismo pulmonar.

47) Com relação ao caso acima, assinale a alternativa que apresenta a melhor opção para o tratamento de dor da paciente:

- a) Oxigênio suplementar.
- b) Heparina de baixo peso molecular.
- c) Isossorbida.
- d) Drenagem de tórax.
- e) Warfarina.

Texto para questões 48 a 50

Paciente masculino, 54 anos, procurou o pronto socorro queixando-se de cefaleia importante. Refere que a dor se apresenta apenas no lado esquerdo. Já havia procurado outro serviço que o examinou e dispensou com dipirona. A medicação não melhorou de forma significativa a dor. Por isso procurou outro serviço. Nega antecedente de cefaleia crônica. Nega hipertensão arterial, familiar refere que ao se levantar bruscamente, ele havia batido a cabeça no armário, há dois dias. Na ocasião, não apresentou vômito e não perdeu a consciência. Ao exame: PA= 180X120mmHg.

48) Paciente masculino, 54 anos, procurou o pronto socorro queixando-se de cefaleia importante. Refere que é só olado esquerdo. Já havia procurado outro serviço que o examinou e dispensou com dipirona. A medicação não melhorou de forma significativa a dor. Por isso procurou outro serviço. Nega antecedente de cefaleia crônica. Nega hipertensão arterial, familiar refere que ao se levantar bruscamente, ele havia batido forte a cabeça no armário, no lado esquerdo, há dois dias. Na ocasião, não apresentou vômito e não perdeu a consciência. Mas de lá para cá, tem apresentado sonolência e a constante queixa de cefaleia hemicrania do lado esquerdo. Ao exame: PA= 220X140 mmHg. Discreta Que parte específica do exame físico você realizaria? Escolha a melhor alternativa

- a) Palpação da região nucal.
- b) Ausculta das carótidas.
- c) Fundo de olho.
- d) Manobra para verificar a rigidez nucal.
- e) Otoscopia.

49) Com relação ao caso acima, assinale a alternativa que apresenta o melhor exame complementar (escolha a melhor alternativa):

- a) Audiometria.
- b) Radiografia da coluna cervical.
- c) Eletroencefalograma.
- d) Tomografia computadorizada de crânio com contraste..
- e) Arteriografia cerebral.

50) Ainda com relação ao caso acima, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta:

- a) Dipirona EV.
- b) Derivados de ergotamina.
- c) Hidrocortisona.
- d) Anti-inflamatório não esteroide.
- e) Abordagem neurocirúrgica.