

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA

EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – CIRURGIA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFGA

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSEERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSEERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSEERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Quanto aos fatores que tornam o recém-nascido, de maneira geral, mais suscetível à hipotermia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Centro termorregulador imaturo, incompetente para manter a temperatura corpórea.
- (B) Anabolismo intenso.
- (C) Tecido celular subcutâneo escasso, com menor isolamento à perda de calor.
- (D) Superfície corporal menor, com maior perda de calor.
- (E) Circulação sanguínea cutânea superficial possibilitando maior perda de calor.

QUESTÃO 27

Em relação às fissuras lábio-palatinas, malformações congênitas do lábio e do palato, conhecidas como "lábio leporino", é correto afirmar que

- (A) é um defeito raro dentre as malformações faciais congênitas, correspondente à solução de continuidade do lábio e/ou palato.
- (B) o lado direito do lábio é mais acometido, seguido do lado esquerdo e do bilateral.
- (C) a fissura unilateral é mais frequente no sexo feminino.
- (D) sua etiologia, de um modo geral, é genética multifatorial e influenciada por fatores ambientais, que tem sido apontados em estudos, como medicamentos, fatores alimentares, alcoolismo, dentre outros.
- (E) na classificação de Spina, que se baseia nas classificações de Kernahan e Stark e Harkins, o princípio considerado é embriológico, tendo como referência o forame incisivo posterior, limite entre o palato primário e secundário.

QUESTÃO 28

Paciente de 7 anos, com história de tumoração cervical, sobre o osso hioide, de localização mediana, com crescimento lentamente progressivo, acompanhado de episódios de infecção e supuração local. Sobre o possível diagnóstico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Trata-se, provavelmente, de cisto tireoglosso, e deve ser feito diagnóstico diferencial com tireoide ectópica e cisto dermoide de linha média.

- (B) Trata-se, provavelmente, de cisto tireoglosso, com tratamento cirúrgico consistindo na excisão do cisto com o corpo do osso hioide – cirurgia de Sistrunk.
- (C) Trata-se, provavelmente, de cisto tireoglosso, com risco de recidiva grande, podendo ocorrer em, aproximadamente, 70% dos casos, mesmo realizando a cirurgia adequada.
- (D) Trata-se, provavelmente, de cisto tireoglosso, cuja transformação maligna, em crianças, é rara
- (E) Trata-se, provavelmente, de cisto tireoglosso, resultante da falha no desenvolvimento normal da tireoide.

QUESTÃO 29

Um recém-nascido apresenta insuficiência respiratória logo após o nascimento, com dispneia, cianose e tiragem. Ao exame físico, o abdome encontra-se escavado e o tórax em “tonel”. Na ausculta, não se ouve murmúrio vesicular à Esquerda. Ao raio-x, encontra-se pobreza de alças intestinais em abdome, deslocadas para o tórax. Sobre essa afecção, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico geralmente é feito após o nascimento, já que existem poucos métodos diagnósticos passíveis de serem feitos no período pré-natal.
- (B) No atendimento inicial, pré-operatório, utiliza-se uma sonda nasogástrica calibrosa para descomprimir o trato digestivo e possibilitar melhor ventilação pulmonar.
- (C) A melhor via de acesso para o tratamento cirúrgico é a torácica e consiste em ressecar as alças que ocupam o tórax preservando as que estão na região abdominal.
- (D) A Hérnia de Bochdalek é o defeito menos grave, que praticamente não causa distúrbios respiratórios.
- (E) É causada por um defeito diafragmático que ocorre com mais frequência à direita.

QUESTÃO 30

Sobre a atresia de esôfago, é correto afirmar que

- (A) o tipo mais frequente é a atresia de esôfago com fístula do esôfago distal na traqueia.
- (B) o tipo mais frequente é a atresia de esôfago com fístula do esôfago proximal ou de ambos os cotos na traqueia.
- (C) é rara a associação desse defeito com outras malformações.
- (D) o sinal mais precoce dessa malformação ocorre ao nascimento, caracterizado por secreção

salivar espumosa, sem possibilidade de suspeição no período pré-natal.

- (E) a dieta via oral só deverá ser introduzida após 30 dias de pós-operatório, devido às possíveis complicações da introdução dietética precoce.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa correta quanto às malformações congênitas do trato respiratório.

- (A) O enfisema lobar congênito trata-se de uma hiperexpansão global pulmonar, com resolução espontânea em pouco tempo.
- (B) A malformação adenomatoide cística (MAC) caracteriza-se por crescimento excessivo e desordenado dos bronquíolos terminais e seu tratamento, que consiste na ressecção do lobo comprometido, não é recomendado para todos os pacientes – apenas para os imunossuprimidos.
- (C) O sequestro pulmonar é definido pela presença de tecido pulmonar não funcionante que recebe toda ou parte de sua irrigação sanguínea através de ramos da aorta. Pode ser classificado em 3 tipos: intralobar, interlobar e extralobar.
- (D) O cisto broncogênico consiste em cistos esféricos de paredes finas revestidas por mucosa de origem gastrointestinal.
- (E) No cisto mediastinal, há indicação cirúrgica imediata após o diagnóstico pelo risco de compressão traqueal.

QUESTÃO 32

Um recém-nascido prematuro apresentou vômitos biliosos ao nascimento, associados à distensão abdominal epigástrica. Ao Raio-X simples de abdome, evidenciou-se duas regiões repletas de ar em região de abdome superior e ausência de ar no restante do abdome. Diante desse quadro clínico, é correto afirmar que, possivelmente, trata-se de um caso de

- (A) hérnia diafragmática.
- (B) atresia de esôfago.
- (C) enterocolite necrotizante.
- (D) megacólon congênito.
- (E) atresia duodenal.

QUESTÃO 33

Um recém-nascido não apresentou eliminação de mecônio nas primeiras 24h de vida e passou a ter vômitos biliosos associados à distensão abdominal. Ao toque retal, houve deflação explosiva de gases e fezes líquidas. O diagnóstico mais provável para esse recém-nato é de

- (A) atresia de esôfago.
- (B) estenose hipertrófica de piloro.
- (C) doença de Hirschsprung.
- (D) atresia duodenal.
- (E) enterocolite necrotizante.

QUESTÃO 34

Criança eutrófica apresentando fortes cólicas abdominais, encolhendo as pernas durante os períodos de dor e quieta no intervalos. Depois de algum tempo, fica letárgica. Apresenta, ainda, vômitos e evacuação com muco avermelhado. Esse caso, provavelmente, corresponde ao diagnóstico de

- (A) apendicite aguda.
- (B) doença de Hirschsprung.
- (C) displasia vascular.
- (D) intussuscepção intestinal.
- (E) enterocolite necrotizante.

QUESTÃO 35

Lactente vem apresentando episódios de vômitos não biliosos em jato, de coloração amarronzada, associados à peristalse gástrica visível em quadrante superior esquerdo indo para o epigástrio, sem massas palpáveis. O próximo passo na investigação e a possível patologia associada ao caso são

- (A) ultrassonografia ou estudo contrastado esôfago-estômago-duodeno; estenose hipertrófica de piloro.
- (B) manometria; estenose hipertrófica de piloro.
- (C) tomografia de abdome; atresia duodenal.
- (D) ultrassonografia ou estudo contrastado esôfago-estômago-duodeno; atresia de esôfago.
- (E) radiografia simples de abdome; estenose hipertrófica de piloro.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao diversos tumores intra-abdominais na infância.

- (A) Tumor originário da placa neural primitiva, o neuroblastoma tem comportamento imprevisível, sendo que quanto menor a criança, maior a chance de cura, já que grande parte das crianças maiores de 1 ano apresentam-se ao diagnóstico com doença avançada, de mau prognóstico.
- (B) A subunidade beta na gonadotrofina coriônica humana (β -hCG) é um marcador sorológico de Tumores de células germinativas malignos que contêm elementos trofoblásticos, como no coriocarcinoma e germinoma.
- (C) O tumor primário renal mais frequente na infância é chamado de Tumor de Wilms ou nefroblastoma, que acomete, geralmente, crianças em torno de 5 anos de idade, sendo raro no adulto e no recém-nascido, com hematúria presente em 10-20% dos casos, mas sem valor prognóstico.
- (D) Baixo peso ao nascimento e prematuridade tem uma clara associação com os hepatoblastomas, sendo o risco de desenvolvimento em crianças com menos de 1000g ao nascer em torno de 15 vezes maior que das crianças com 2500g.
- (E) Os tumores do córtex da adrenal são muito comuns e representam em torno de 40% de todos os tumores em crianças, com 95% dos maiores de 5 anos apresentando virilização no carcinoma de adrenal.

QUESTÃO 37

Recém-nascido com uma semana apresenta quadro súbito de distensão abdominal, abdome aparentemente doloroso à palpação, letargia, hipotermia e sangramento intestinal em pequena quantidade. Após radiografia simples de abdome, constatou-se grande distensão intestinal e sinais de “alças fixas”. Além disso, pode-se notar imagens de gás abaixo da serosa das alças. Diante desse quadro clínico, é correto afirmar que

- (A) esse paciente, muito provavelmente, possui diagnóstico de intussuscepção intestinal, já que apresenta sangramento intestinal.
- (B) é provável que esse paciente esteja apresentando um quadro de enterocolite necrotizante, a qual tem um tratamento essencialmente clínico, sendo o tratamento cirúrgico reservado para as complicações.
- (C) provavelmente esse paciente esteja apresentando um quadro de doença de Hirschsprung, confirmado pelo sinal de “alças fixas” à radiografia.

- (D) esse paciente, provavelmente, possui diagnóstico de enterocolite necrotizante, no entanto, é necessário um exame tomográfico do abdome para definir o diagnóstico, já que os sintomas são inespecíficos.
- (E) é provável que esse seja um caso de atresia duodenal, devido à distensão abdominal importante.

QUESTÃO 38

Logo após o nascimento, foi verificada, à inspeção de um recém-nato, a presença de vísceras fora da cavidade abdominal, totalmente expostas, de localização paraumbilical com presença de cordão umbilical lateralmente ao defeito da parede abdominal. Sobre essa malformação, é correto afirmar que

- (A) trata-se de gastrosquise e é importante fazer o diagnóstico de outras malformações antes da cirurgia, já que essa concomitância é comum.
- (B) trata-se de onfalocele e é importante fazer o diagnóstico de outras malformações antes da cirurgia, já que essa concomitância é comum.
- (C) trata-se de onfalocele, condição que necessita de atenção quanto à reposição volêmica, proteção das vísceras herniadas, sondagem nasogástrica e antibioticoterapia na abordagem inicial, antes da correção cirúrgica.
- (D) trata-se de gastrosquise, condição que necessita de atenção quanto à reposição volêmica, proteção das vísceras herniadas, sondagem nasogástrica e antibioticoterapia na abordagem inicial, antes da correção cirúrgica.
- (E) trata-se de onfalocele, cujas perdas insensíveis são maiores do que na gastrosquise.

QUESTÃO 39

Sobre as anomalias da região inguinal, assinale a alternativa correta.

- (A) A hérnia inguinal é uma afecção cirúrgica rara na criança, com incidência em torno de 3%.
- (B) A hérnia inguinal congênita nas meninas é justificada por um defeito na descida do ligamento suspensor do ovário em sua fixação nos grandes lábios.
- (C) A hérnia inguinal encarcerada é a causa mais frequente de obstrução intestinal no recém-nascido e no lactente.
- (D) Após o diagnóstico de hérnia inguinal, deve-se aguardar até a puberdade para indicar a correção cirúrgica.
- (E) O tratamento clássico da hérnia inguinal consiste em herniorrafia por via abdominal mediana.

QUESTÃO 40

Um lactente, previamente saudável e de bom peso ao nascimento, aos 15 dias de vida, começou a apresentar acolia fecal e colúria progressivas e persistentes por mais de 10 dias, com níveis de bilirrubina direta crescentes e fígado aumentado e duro ao exame físico. Sobre essa provável afecção, é correto afirmar que

- (A) a incidência de malformações associadas é variável, sendo a síndrome da poliesplenia a mais frequente.
- (B) as principais características histopatológicas dessa doença incluem espaço porta pequeno, com infiltrado de predomínio eosinofílico.
- (C) a visualização do “triângulo fibroso” junto à bifurcação portal associado à redução de tamanho ou ausência da vesícula à ultrassonografia são sinais pouco sensíveis para o diagnóstico de atresia de via biliar.
- (D) o tratamento cirúrgico tem como objetivo operar o paciente mais tardiamente, adiando-se o mesmo enquanto for passível o tratamento clínico.
- (E) a cirurgia de escolha é a cirurgia de Kasai, que preconiza a técnica cirúrgica em 2 tempos, com colecistectomia realizada em primeiro tempo e nova reabordagem após recuperação pós-operatória com uso de prótese de via biliar.

QUESTÃO 41

Em relação à extrofia vesical, é correto afirmar que

- (A) trata-se de uma malformação rara, predominante no sexo feminino, com maior risco de ocorrência familiar.
- (B) em meninas pode estar associada à vagina anteriorizada e clitóris bifido.
- (C) o defeito apresenta-se ao nascimento como uma falha na parede posterior na região suprapúbica com a bexiga invertida e mucosa exposta.
- (D) nessa patologia o cordão umbilical, geralmente, possui inserção mais alta e é acompanhada de hipospádia.
- (E) a deterioração da função renal é rara e ocorre, na maioria das vezes, nos casos continentais.

QUESTÃO 42

O nascimento de um bebê com genitália ambígua configura uma verdadeira emergência social no período neonatal, sendo necessária a participação de uma equipe multidisciplinar para adequada orientação do caso. Diante disso, é de grande importância que o profissional médico também tenha conhecimento sobre as anomalias da genitália externa que configuram a ambiguidade sexual. Sobre esse assunto, é correto afirmar que

- (A) o pseudo-hermafrodita feminino é o indivíduo com cariótipo XX, gônadas masculinas e genitália externa virilizada em graus variáveis.
- (B) o pseudo-hermafrodita masculino é o indivíduo com cariótipo XX, gônadas masculinas e genitália externa não virilizada ou parcialmente virilizada.
- (C) o hermafroditismo verdadeiro inclui indivíduos, na sua maioria, com cariótipo 46XY, alguns 46XX e mosaicos, com genitália externa variando em graus de virilização.
- (D) o pseudo-hermafrodita masculino é o indivíduo com cariótipo XX, gônadas femininas e genitália externa não virilizada ou parcialmente virilizada.
- (E) o hermafroditismo verdadeiro inclui indivíduos, na sua maioria, com cariótipo 46XX, alguns 46XY e mosaicos, com genitália externa variando em graus de virilização.

QUESTÃO 43

As anomalias anorretais representam um conjunto de malformações da região anal e retal de diferentes complexidades, com múltiplas variações anatômicas, desde as mais simples às mais complexas. Considerando as particularidades desses distúrbios, assinale a alternativa correta.

- (A) Em meninos, a variação anatômica mais frequente é a fístula retouretral seguida da fístula perineal, com defeitos altos, como as fístulas retovesicais, representando apenas 10% dos casos.
- (B) Crianças portadoras de ânus imperfurado sem fístula estão presentes em ambos os sexos e representam a maioria dos casos, com maior prevalência na Síndrome de Down.
- (C) A persistência de cloaca resulta da parada do desenvolvimento das porções mais distais dos aparelhos urinários e genitais e da porção terminal do intestino, que permanecem unidos em um único canal. As dificuldades cirúrgicas nesses casos são grandes, porém menores quanto mais alta for a malformação.

- (D) A fístula retoperineal tem sua abertura externa circundada por pele e, apesar de ser uma malformação baixa, sua correção cirúrgica está entre as mais difíceis de serem executadas.
- (E) A persistência de cloaca é um defeito grave, congênito, que só existe no sexo masculino e que consiste na persistência da parte urinária e do reto em uma mesma estrutura terminal.

QUESTÃO 44

Uma criança de 9 anos foi admitida no serviço hospitalar com história de vômitos associados à dor em fossa ilíaca direita, iniciados concomitantemente há 3 dias, e tenesmo. Apresenta abdome globoso, com renitência em fossa ilíaca direita, doloroso à palpação da mesma região e sinal de Rovsing presente. Considerando-se o quadro clínico descrito, assinale a alternativa correta.

- (A) É provável que seja um caso de apendicite aguda com um apêndice localizado na região retrocecal ou próxima ao reto.
- (B) É provável que seja um caso de diverticulite de Meckel, necessitando-se de uma tomografia de abdome para firmar o diagnóstico.
- (C) É provável que seja um caso de gastroenterocolite, devido à dor abdominal e tenesmo associado.
- (D) É provável que seja um caso de intussuscepção intestinal, devido ao tenesmo.
- (E) É provável que seja um caso de enterocolite necrotizante, devido à dor abdominal intensa.

QUESTÃO 45

Sobre o torcicolo congênito, assinale a alternativa correta.

- (A) A alta frequência de parto pélvico das crianças acometidas sugere que a fibrose do músculo esternocleidomastoideo altera a posição do feto na cavidade uterina, impedindo a inserção da cabeça no canal de parto.
- (B) Tem uma incidência alta nos recém-nascidos, notando-se uma tumoração dura e indolor no nível do músculo esternocleidomastoideo, com rotação da face para o lado do tumor.
- (C) O diagnóstico é feito por meio de tomografia computadorizada da região cervical.
- (D) Na minoria dos casos, ocorre remissão espontânea.
- (E) O tratamento cirúrgico deve ser indicado em torno do segundo ou terceiro mês de vida, mesmo quando não há assimetria facial, consistindo em secção parcial das fibras do músculo esternocleidomastoideo em seu terço distal.

QUESTÃO 46

O teratoma é uma neoplasia embrionária derivada de células germinativas com múltiplas apresentações em relação ao seu local de acometimento. Sobre esse assunto, é correto afirmar que

- (A) o mediastino é o local mais frequente de apresentação dessa neoplasia e uma pequena parte das crianças acometidas têm alterações citogenéticas compatíveis com a síndrome de Klinefelter.
- (B) o acometimento retroperitoneal é mais comum no sexo feminino e, na maioria dos casos, apresenta-se em estádios avançados ao diagnóstico, provavelmente porque só produz sintomas quando atingem grandes volumes.
- (C) representam uma raridade dentre os tumores intracranianos em menores de dois meses, geralmente malignos em neonatos e sem predileção por sexo.
- (D) os teratomas maduros, ou cistos dermoides, são tumores de ovário raros em crianças e quando o componente histológico predominante é tecido tireoidiano, o teratoma é denominado *struma ovarii*.
- (E) o teratoma sacrococcígeo possui uma relação direta entre a idade, o diagnóstico e o seu risco de malignidade, sendo que os tumores diagnosticados antes dos dois meses de vida são malignos em cerca de 80% dos casos, enquanto nos diagnosticados após dois meses o índice de malignidade cai para 3%.

QUESTÃO 47

Em relação às anomalias relacionadas à localização do meato uretral, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A posição do meato uretral médio-peniana é o tipo mais frequente de hipospádia.
- () A etiologia da hipospádia está possivelmente associada à falta de fusão das pregas uretrais ou falhas na canalização da uretra glandar devido à ação deficiente da testosterona fetal.
- () A complicação mais comum da correção cirúrgica da hipospádia é a estenose da neo-uretra.
- () A epispádia é uma anomalia rara, mais comum no sexo feminino.
- () O tratamento cirúrgico da epispádia no sexo masculino consiste na

uretroplastia com correção do encurvamento dorsal peniano e reconstrução do colo vesical quando há incontinência urinária.

- (A) V - F - F - V - F.
- (B) V - F - V - F - V.
- (C) V - F - V - V - V.
- (D) F - V - F - F - V.
- (E) F - V - V - F - V.

QUESTÃO 48

Sobre as duplicidades do tubo digestivo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () As duplicidades do tubo digestivo são afecções congênitas incomuns e aparecem exclusivamente no intestino delgado.
- () Possuem apenas túnicas mucosa e muscular, sem camada serosa como revestimento.
- () Assumem forma esférica ou tubular, com localização mais comum associada ao íleo terminal.
- () Frequentemente apresentam mucosa gástrica em seu interior e, nessa circunstância, a secreção ácida produzida provoca ulceração do intestino adjacente.
- () Os pacientes, em geral, são submetidos à cirurgia com diagnóstico de obstrução intestinal, invaginação, hemorragia digestiva e apendicite aguda por não haver manifestação clínica específica que direcione ao diagnóstico.

- (A) V - F - F - V - F
- (B) V - F - V - F - V
- (C) F - F - V - V - V
- (D) F - V - F - F - V
- (E) F - V - V - F - V

QUESTÃO 49

A mãe de uma criança de 2 anos leva seu filho até um serviço médico relatando ter notado uma pequena mancha superficial avermelhada, parecida com picada de pernilongo, que surgiu após duas semanas do nascimento da filha, com crescimento rápido, lembrando um “morango”, em região frontal, e que diminuiu de tamanho nos últimos meses. Diante desse caso, é correto afirmar que a lesão

- (A) corresponde, provavelmente, a um hemangioma, que tem crescimento desproporcional até 1 ano de idade e, geralmente, regride espontaneamente antes da adolescência.
- (B) corresponde, provavelmente, a um teratoma, que tem crescimento desproporcional até 1 ano de idade e, geralmente, regride espontaneamente antes da adolescência.
- (C) corresponde, provavelmente, a um hemangioma e necessita de uma tomografia da região para melhor complementação diagnóstica.
- (D) corresponde, provavelmente, a um hemangioma e precisa ser excisado cirurgicamente o mais rápido possível, pelo risco de malignização.
- (E) corresponde, provavelmente a um hemangioma e o tratamento mais adequado, nesse caso, é feito com corticoide sistêmico e interferon-alfa-2 por período prolongado, associado à excisão cirúrgica.

QUESTÃO 50

Uma criança de 8 anos foi vítima de trauma abdominal fechado em acidente de moto x auto e apresenta-se com dor abdominal importante, taquicárdica e hipotensa à admissão na sala de emergência. Após o primeiro atendimento, com tentativa de compensação clínica, o próximo passo mais adequado é

- (A) realizar tomografia computadorizada de abdome, mesmo que o exame demore algumas horas, mantendo o paciente sob observação clínica.
- (B) realizar Radiografia simples de abdome – se não houver sinal de pneumoperitônio, manter sob observação clínica.
- (C) realizar exame diagnóstico como o FAST – mesmo se for positivo para líquido livre, realizar tomografia computadorizada de abdome para melhor diagnóstico.
- (D) manter sob observação clínica.
- (E) realizar exame diagnóstico como o FAST - se positivo para líquido livre, indicar laparotomia exploradora.

