



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS  
DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O  
ANO DE 2017 (QOS/2017)**

**QOS/2017 - ENFERMAGEM**

(Edital DRH/CRS n. 05/2017, de 18 de abril de 2017).

*Língua Portuguesa, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos.*

**NOME:** \_\_\_\_\_.

**CPF:** \_\_\_\_\_ **IDENTIDADE:** \_\_\_\_\_.

**CIDADE/PROVA:** \_\_\_\_\_ **SALA:** \_\_\_\_\_

**ESCOLA:** \_\_\_\_\_ **DATA: 20/08/2017.**

**ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:**

1. Prova sem consulta.
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta esferográfica (tinta azul ou preta), de corpo transparente.
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas, em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos será de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. Início às 08:30 horas e término às 11:30 horas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseiras e similares, além de borracha durante a realização da prova, bem como a sua utilização durante o horário previsto para a resolução da prova.
9. É também vedado o porte/posse de aparelhos e equipamentos eletrônicos, telefones celulares, computadores, relógios de qualquer tipo, alarme de veículo e similares.
10. Iniciada a prova, o candidato somente poderá deixar a sala e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouro, após transcorrido o tempo mínimo 01h (uma hora), e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas devidamente preenchidos e assinados.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do candidato

## LÍNGUA PORTUGUESA

### SEGURANÇA

O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia acima de tudo, segurança. Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com muitos guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados.

Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e assaltavam as casas.

Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto. Nos quatro lados. As inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. Agora não só os visitantes eram obrigados a usar crachá. Os proprietários e seus familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda. Nem as babás. Nem os bebês.

Mas os assaltos continuaram.

Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. O mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de guardas com ordem de atirar para matar.

Mas os assaltos continuaram.

Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros, e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, e a segunda cerca, de arame farpado, erguida dentro do perímetro, não conseguiriam entrar nas casas. Todas as janelas foram engradadas.

Mas os assaltos continuaram.

Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. Dois assaltantes tinham entrado no condomínio no banco de trás do carro de um proprietário, com um revólver apontado para a sua nuca. Assaltaram a casa, depois saíram no carro roubado, com crachás roubados. Além do controle das entradas, passou a ser feito um rigoroso controle de saídas. Para sair, só com exame demorado do crachá e com autorização expressa da guarda, que não queria conversa nem aceitava suborno.

Mas os assaltos continuaram.

Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira cerca. As famílias de mais posses, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Ninguém pode entrar no condomínio. Ninguém. Visitas, só num local predeterminado pela guarda, sob sua severa vigilância e por curtos períodos.

E ninguém pode sair.

Agora, a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às grades de sua casa, olhando melancolicamente para a rua.

Mas surgiu outro problema.

As tentativas de fuga. E há motins constantes de condôminos que tentam de qualquer maneira atingir a liberdade.

A guarda tem sido obrigada a agir com energia.

VERÍSSIMO, Luís Fernando. *Comédias para se ler na escola*; RJ: Objetiva, 2001.

## COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

**1ª QUESTÃO** – Dentre as alternativas abaixo, assinale a que pode ser comprovada por informações explícitas no texto “Segurança”.

- A. ( ) Um dos pontos altos de venda do condomínio era a beleza das casas, superada apenas pela perfeição dos playgrounds.
- B. ( ) Apesar de toda segurança, os assaltos continuavam e só minimizaram após a implantação de recursos tecnológicos eficazes.
- C. ( ) Havia jardins e piscinas, mas o ponto forte era, justamente, a segurança e os recursos utilizados para tornar o condomínio bem guardado.
- D. ( ) Além do muro alto e das torres com guardas, decidiram eletrificar os muros impedindo assim a entrada de assaltantes.

**2ª QUESTÃO** - Em relação à sequência dos fatos e ao processo de organização das ideias, no texto, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) No sétimo parágrafo, as medidas de segurança evidenciam a apreensão dos moradores do condomínio com a falta de liberdade causada pelas janelas que foram engradadas.
- B. ( ) A sequência narrativa é acrescida, gradativamente, de informações relacionados à segurança de um local mencionado, no início do texto, como muito seguro.
- C. ( ) No décimo primeiro parágrafo, a preocupação com a segurança dos moradores chega ao extremo, e todos, incluindo os visitantes, são impedidos de entrar no condomínio.
- D. ( ) Ao final do texto, um novo problema é apresentado: a guarda é obrigada a agir com energia contra moradores e criminosos envolvidos em motins constantes.

**3ª QUESTÃO** – Pode-se deduzir da leitura do texto “Segurança” que:

- A. ( ) Inversamente ao esperado, a guarda responsável pela proteção dos condôminos foi controlada e vencida pelos incansáveis assaltantes.
- B. ( ) Extremamente eficaz, a equipe responsável pela segurança do condomínio pôs fim aos assaltos, assim que os moradores passaram a respeitar os limites e as regras impostas pela guarda.
- C. ( ) Paralelamente aos assaltos que eram constantes, o sistema de vigilância do condomínio foi aprimorado. A vida dos moradores tornou-se mais segura e tranquila.
- D. ( ) Ironicamente, houve uma inversão de valores, e os moradores tornaram-se reféns da guarda e dos excessivos recursos utilizados para manutenção da segurança no condomínio.

### **O MEDO QUE DIVIDE OS DOIS BRASIS**

A primeira reação à estridência em torno do banditismo é o medo. Do medo à defesa pessoal o passo é pequeno. E da defesa vai-se aos exageros de segurança – aos condomínios fechados e guaritas, às cancelas, aos guarda-costas e carros blindados. E dos exageros ao delírio de ter medo de todos os desconhecidos.

Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. Que em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o medo tem razão de ser. O que não se explica é como será o país que se pretende construir, no qual se quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca e constrói muros cada vez mais altos para se defender de uma outra categoria de brasileiros que considera ameaçadora. Não existe país viável baseado na exclusão de uma categoria de cidadãos. [...] A segregação e a exclusão não podem ser as vigas mestras para fazer uma civilização democrática.

As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para a noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes, não deixando que se criem guetos – sejam eles de miseráveis ou de triliardários. Os problemas das grandes cidades do Brasil não são simplesmente policiais ou urbanos. São problemas sociais. A concentração de renda, os desníveis nas condições de vida, os extremos de riqueza e pobreza abrem um fosso dividindo o país. Fazendo com que uma parte tenha medo da outra. O desafio, portanto, é de outra natureza: em vez de separar com muros, é preciso juntar os Brasís, fazê-lo justo e democrático.

*Revista Veja*, 23/11/1994.

**4ª QUESTÃO** – Identifique a ideia, ou as ideias, do texto “O medo que divide os dois Brasis” que tem/têm relação com o texto “Segurança”.

- I - “E da defesa vai-se aos exageros de segurança – aos condomínios fechados e guaritas, às cancelas, aos guarda-costas e carros blindados. E dos exageros ao delírio de ter medo de todos os desconhecidos. ”
- II - “Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. Que em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o medo tem razão de ser.”
- III - “O que não se explica é como será o país que se pretende construir, no qual se quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca e constrói muros cada vez mais altos para se defender de uma outra categoria de brasileiros que considera ameaçadora. ”
- IV - “As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para a noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes, não deixando que se criem guetos...”

São ideias do texto “O medo que divide os dois Brasis” relacionadas ao texto “Segurança”.

- A. ( ) Apenas I, II e III.
- B. ( ) Apenas I, II, IV.
- C. ( ) Apenas II e III.
- D. ( ) Apenas I, III e IV.

**5ª QUESTÃO** - O texto, “O medo que divide os dois Brasis”, é quanto ao gênero textual classificado como:

- A. ( ) Argumentativo.
- B. ( ) Expositivo.
- C. ( ) Injuntivo.
- D. ( ) Narrativo.

## GRAMÁTICA

**6ª QUESTÃO** – Na oração: *As janelas da guarita olham e vigiam todos que entram e saem do condomínio.* Observa-se que uma característica humana é atribuída a um ser inanimado, personificando-o. A figura de linguagem presente, na oração, é:

- A. ( ) Prosopopeia.
- B. ( ) Anáfora.
- C. ( ) Antítese.
- D. ( ) Comparação.

**7ª QUESTÃO** - Complete as frases com mau ou mal:

- I - Os guardas responsáveis pela segurança do condomínio atuaram muito \_\_\_\_\_ na execução dos serviços.  
II - Um \_\_\_\_\_ terrível abateu-se sobre o condomínio.  
III - O \_\_\_\_\_ tempo acabou com a temporada de sol, conseqüentemente, as piscinas do condomínio ficaram vazias.

Marque a sequência **CORRETA**:

- A. ( ) Mau – mau – mal.  
B. ( ) Mal – mal – mau.  
C. ( ) Mal – mau – mal.  
D. ( ) Mal – mal – mal.

**8ª QUESTÃO** - Indique, nos grupos de palavras destacadas, a alternativa **INCORRETA** quanto à acentuação:

- A. ( ) “**Polícia** liberta **refém** em ônibus.” (Jornal do Brasil online, 19 jun 2002)  
B. ( ) “O que **será** que **será**?” (Chico Buarque)  
C. ( ) A **idéia** do Grupo folclórico **polonês** é apresentar hoje.  
D. ( ) A Serra do **Cipó** é o local onde há maior biodiversidade por **quilômetro** quadrado do mundo.

**9ª QUESTÃO** - Faça a correspondência da primeira com a segunda coluna e identifique a sequência cujo processo de formação de palavras foi devidamente observado:

- |                   |     |              |
|-------------------|-----|--------------|
| (1) Banditismo    | ( ) | Onomatopeia  |
| (2) Desconhecer   | ( ) | Aglutinação  |
| (3) Coaxar        | ( ) | Hibridismo   |
| (4) Televisão     | ( ) | Justaposição |
| (5) Guarda-costas | ( ) | Sufixação    |
| (6) Hidrelétrico  | ( ) | Prefixação   |

- A. ( ) 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
B. ( ) 3, 6, 4, 5, 1, 2.  
C. ( ) 3, 6, 5, 2, 1, 4.  
D. ( ) 1, 3, 5, 4, 2, 6.

## DIREITOS HUMANOS

**10ª QUESTÃO** – Com base na **Lei 11.340/2006**, a qual cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Não é possível a configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher caso esta não coabite com o agressor.
- B. ( ) A mulher não poderá ser abrigada pelos mecanismos de proteção da Lei 11.340/2006 caso o relacionamento seja com outra mulher.
- C. ( ) Cabe apenas à família e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos estabelecidos na Lei 11.340/2006.
- D. ( ) Uma mulher que vai a uma festa utilizando roupas curtas ou decotadas, caso seja vítima de uma forma de violência abrangida pela Lei 11.340/2006, poderá fazer jus às proteções ali previstas.

**11ª QUESTÃO** – Uma mulher acionou a polícia afirmando ter sido vítima de violência. No local, a autoridade policial verificou tratar-se de um caso de violência doméstica. Nesse sentido, com base na **Lei 11.340/2006**, assinale a alternativa **INCORRETA** quanto às providências a serem adotadas pela autoridade policial:

- A. ( ) Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
- B. ( ) Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal.
- C. ( ) Acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar, caso necessário.
- D. ( ) Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, independente de risco à vida.

**12ª QUESTÃO** – Em todas as alternativas constam características utilizadas para caracterizar os **Direitos Fundamentais**. Marque a alternativa que contém uma ou mais características que **NÃO** caracterizam os Direitos Fundamentais.

- A. ( ) Historicidade, inalienabilidade, universalidade, indivisibilidade, interdependência.
- B. ( ) Inalienabilidade, imprescritibilidade, universalidade, indivisibilidade, interdependência.
- C. ( ) Imprescritibilidade, renunciabilidade, universalidade, indivisibilidade, interdependência.
- D. ( ) Historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, inerência, universalidade, indivisibilidade.

**13ª QUESTÃO** – Com relação ao tema **Direitos e Garantias Fundamentais** previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) As normas que definem os direitos fundamentais necessitam de outras normas para sua aplicação imediata.
- B. ( ) No Brasil, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos caso aprovados conforme procedimento previsto na Constituição serão equivalentes às emendas constitucionais.
- C. ( ) Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
- D. ( ) Não será concedida a extradição de brasileiro nato por crime político ou de opinião, nem de estrangeiro na mesma hipótese.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**14ª QUESTÃO** – A otimização hemodinâmica perioperatória ou terapia guiada por metas (TGM) é uma intervenção terapêutica com o intuito de maximizar a oferta de oxigênio (DO<sub>2</sub>) durante condições críticas, antes de apresentar déficits perfusionais, na tentativa de preveni-los ou repará-los precocemente. Durante condições clínicas adversas, é necessário que a DO<sub>2</sub> permaneça adequada às demandas metabólicas (VO<sub>2</sub>). Em relação a estas assertivas, é **CORRETO** afirmar que:

- A.( ) Todos os tipos de hipóxia tecidual podem ser prevenidos ou minimizados pela otimização de DO<sub>2</sub> ou por redução no VO<sub>2</sub> para manter o equilíbrio dessa relação.
- B.( ) O padrão ouro para a avaliação da resposta a fluido é a avaliação direta da resposta do volume sistólico ou débito cardíaco (DC) para um desafio de fluido com o uso de monitoramento hemodinâmico invasivo que permite a maximização do DC sem a infusão excessiva de fluidos.
- C.( ) Monitorização das pressões de enchimento cardíaco é confiável para avaliar a pré-carga cardíaca em pacientes sob ventilação mecânica e deve ser usada para guiar a reposição volêmica.
- D.( ) A dobutamina é um inotrópico utilizado para alcançar níveis mais elevados de DO<sub>2</sub> durante cirurgia prolongada e pode causar hipertensão e taquicardia em pacientes hipovolêmicos.

**15ª QUESTÃO** – As bactérias, vírus, micoplasmas, outros agentes infecciosos como fungos e corpos estranhos, podem causar pneumonia. **Marque a alternativa cujo patógeno é causador da pneumonia típica:**

- A.( ) *Mycoplasma pneumoniae*.
- B.( ) Vírus influenza.
- C.( ) Espécies de *Legionella*.
- D.( ) *Streptococcus pneumoniae*.



**16ª QUESTÃO** – No cuidado de um paciente vítima de lesão por queimadura, foi estabelecido o diagnóstico de enfermagem “*Comprometimento da troca gasosa relacionada com a intoxicação por monóxido de carbono, inalação de fumaça e obstrução das vias aéreas superiores*”. **Marque a alternativa que NÃO representa uma intervenção de enfermagem para o diagnóstico estabelecido acima:**

- A.( ) Monitorar os valores de gasometria arterial e oximetria de pulso pois o aumento de PaCO<sub>2</sub> e a diminuição da PaO<sub>2</sub> e saturação de O<sub>2</sub> podem indicar a necessidade de ventilação mecânica.
- B.( ) Fornecer oxigênio umidificado em alto fluxo proporcionando umidade aos tecidos lesionados e aumentando a oxigenação alveolar.
- C.( ) Monitorar os sinais vitais, a hemodinâmica e o equilíbrio hídrico pois a hipovolemia constitui um importante risco imediatamente após a lesão por queimadura.
- D.( ) Observar sinais que indicam possíveis lesões por inalação e risco de disfunção respiratória como por exemplo queimaduras da face, pescoço ou tórax.

**17ª QUESTÃO** – Existe um reconhecimento cada vez maior de que cuidados sistemáticos pós-parada cardiorrespiratória (PCR) após o retorno da circulação espontânea (RCE), podem aumentar a probabilidade de sobrevivência do paciente com boa qualidade de vida. **Em relação aos cuidados pós-PCR, é CORRETO afirmar:**

- A.( ) Deve-se evitar e corrigir imediatamente a hipotensão arterial (pressão arterial sistólica inferior a 90 mmHg, pressão arterial média inferior a 65 mmHg) realizando reposição volêmica adequada ou utilizando fármacos vasopressores.
- B.( ) Todos os pacientes adultos comatosos com RCE após PCR devem ser submetidos ao controle direcionado da temperatura, tendo como temperatura alvo entre 32° e 36°, mantida constantemente durante 12 a 24 horas.
- C.( ) É recomendado o resfriamento pré-hospitalar rotineiro de pacientes com infusão rápida de fluidos endovenosos frios após RCE, pois o início precoce do resfriamento traz maiores benefícios neurológicos.
- D.( ) O prognóstico de todos os pacientes pós-PCR deve ser avaliado em um prazo superior a 72 horas após o RCE.

**18ª QUESTÃO** – A **pancreatite aguda** é comumente descrita como a autodigestão do pâncreas pelas próprias enzimas exócrinas que ele produz, principalmente a tripsina. **Sobre esta doença, é INCORRETO afirmar que:**

- A.( ) Observa-se a ocorrência de depressão miocárdica, hipercalcemia, hipoglicemia e coagulação intravascular disseminada.
- B.( ) O paciente pode desenvolver infiltrados pulmonares, dispnéia, taquipnéia e valores anormais de gasometria.
- C.( ) O Sinal de Cullen pode ser observado nestes pacientes e pode indicar pancreatite hemorrágica grave.
- D.( ) A dor é frequentemente aguda no início (24 a 48 horas após uma refeição copiosa ou após o consumo de bebida alcoólica); pode ser mais intensa depois das refeições e não é aliviada pelo uso de antiácidos.

**19ª QUESTÃO** – A **cirrose hepática** é uma doença crônica na qual houve destruição difusa e regeneração fibrótica das células hepáticas. **Em relação à fisiopatologia e etiologia desta doença, é CORRETO afirmar:**

- A.( ) A cirrose pós-necrótica resulta de uma lesão biliar crônica e obstrução do sistema biliar intra ou extra-hepático.
- B.( ) A cirrose macronodular geralmente ocorre devido à toxicidade crônica do álcool e à desnutrição.
- C.( ) Na cirrose micronodular a obstrução parcial ou total dos ductos biliares pode resultar em colangite infecciosa.
- D.( ) A cirrose de Laënnec ocorre em virtude de uma hepatite viral aguda prévia ou da necrose hepática maciça induzida por medicamentos.

**20ª QUESTÃO** – O desequilíbrio hormonal decorrente de **tumores hipofisários** provoca **manifestações clínicas** específicas. De acordo com esta assertiva, é **INCORRETO** afirmar:

- A.( ) Doença de Cushing – Hormônio Adrenocorticotrópico.
- B.( ) Acromegalia (adultos) e Gigantismo (crianças) – Hormônio do Crescimento.
- C.( ) Infertilidade e galactorréia – Hormônio Luteinizante e Foliculoestimulante.
- D.( ) Hipertireoidismo – Hormônio Tireoestimulante.

**21ª QUESTÃO – NÃO** constitui uma **intervenção de enfermagem** no cuidado de um paciente com **leucemia aguda** com o diagnóstico de *“Risco de infecção relacionado com granulocitopenia secundário ao tratamento com quimioterapia”*:

- A.( ) Pesquisar a ocorrência de alterações no estado mental (agitação, irritabilidade, confusão ou mudança no nível de consciência).
- B.( ) Monitorar os sinais vitais periodicamente e obter a leitura basal da oximetria.
- C.( ) Evitar a exposição a todas as fontes de água estagnada e plantas.
- D.( ) Avaliar a função respiratória intermitentemente e incentivar o repouso no leito.

**22ª QUESTÃO –** Diferentes posições no leito promovem o conforto do paciente, minimizam sintomas, promovem expansão pulmonar, melhoram o acesso durante determinados procedimentos dentre outras aplicações. **Em relação às posições comuns do leito, é CORRETO afirmar:**

- A.( ) A posição de Fowler consiste no leito com a cabeceira elevada até aproximadamente 30 graus e promove a expansão pulmonar, principalmente para os pacientes assistidos por ventilador.
- B.( ) A posição horizontal é utilizada para pacientes com lesões vertebrais, em tração cervical e para facilitar o retorno venoso nos pacientes com perfusão periférica ruim.
- C.( ) A posição de Trendelenburg é utilizada para a drenagem postural, sendo contra-indicada para pacientes hipotensos.
- D.( ) A posição de Trendelenburg reversa raramente é utilizada. Promove o esvaziamento gástrico e evita o refluxo gastroesofágico.

**23ª QUESTÃO –** Os diagnósticos de enfermagem feitos no pré-operatório permitem que o enfermeiro tome precauções e ações de modo que os cuidados oferecidos durante as fases intra e pós-operatória sejam compatíveis com as necessidades dos pacientes. Permite também que o enfermeiro se concentre nos potenciais riscos que o paciente pode enfrentar após a cirurgia. **Marque a alternativa abaixo que NÃO é um diagnóstico de enfermagem comum, relevante para o paciente que será submetido a uma cirurgia:**

- A.( ) Risco de obstrução de vias aéreas.
- B.( ) Risco de volume de líquidos deficiente.
- C.( ) Risco de dor crônica.
- D.( ) Risco de lesão perioperatória por posicionamento.

**24ª QUESTÃO** – As infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) estão entre as mais comumente relacionadas à assistência à saúde. **De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, constitui uma recomendação para prevenção de IPCS:**

- A.( ) Não utilizar pomadas contendo PVPI a 10% ou polisorina tripla como recurso para redução de IPCS em pacientes de hemodiálise devido ao risco de desenvolvimento de resistência microbiana.
- B.( ) Utilizar transdutor descartável para a monitorização da pressão arterial invasiva e trocá-lo a cada 4 dias, juntamente com os seus acessórios e soluções para *flush*.
- C.( ) Cateteres umbilicais venosos devem ser removidos quando não mais necessários, podendo permanecer por até 21 dias desde que mantidos por meio de técnica asséptica.
- D.( ) Realizar a troca da cobertura do cateter central de curta permanência com gaze estéril a cada 24 horas, ou antes e para cobertura estéril transparente a cada 7 dias, ou antes.

**25ª QUESTÃO** – O abuso sexual é um problema de saúde generalizado que tem efeitos de longo alcance sobre as funções físicas e psicológicas. **Em relação ao manejo do atendimento de vítimas de atos sexuais forçados, é CORRETO afirmar que:**

- A.( ) Um consentimento livre e esclarecido por escrito e com testemunhas deve ser obtido da vítima para o exame e realização de fotografias.
- B.( ) Lesões que se encontram em diversos estágios de cicatrização são achados clínicos nestas vítimas.
- C.( ) Os itens de vestimentas deverão ser colocados separadamente em sacolas plásticas com a finalidade de evitar possível destruição das evidências.
- D.( ) Proporcionar à vítima a realização de higiene oral e corporal com o objetivo de fornecer apoio apropriado.

**26ª QUESTÃO** – A transfusão de hemoderivados pode resultar em efeitos adversos categorizados como reações agudas e tardias. **Em relação à causa da reação transfusional, é CORRETO afirmar:**

- A.( ) Reação alérgica – as causas mais comuns são erros na rotulagem do hemocomponente sanguíneo e na identificação do paciente.
- B.( ) Hemossiderose – deposição de ferro no coração, órgãos endócrinos, fígado, baço, pele e outros órgãos importantes como resultado de múltiplas transfusões.
- C.( ) Reação não hemolítica febril – causada pela interação entre os anticorpos do doador e os leucócitos do receptor.
- D.( ) Mieloplasia e paraparesia espástica tropical associada ao vírus linfotrópico de células T – Transmissão do vírus Epstein-Barr através de hemoderivados infectados.

**27ª QUESTÃO – Em relação às medidas de prevenção das pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAV), é INCORRETO afirmar que:**

- A.( ) A higiene oral realizada com clorexidine 0,12% reduz a ocorrência de PAV.
- B.( ) A pressão do cuff do tubo orotraqueal ou da traqueostomia deve permanecer entre 18 a 22 cmH<sub>2</sub>O.
- C.( ) Deve-se evitar a extubação não programada e a reintubação.
- D.( ) O decúbito elevado (30 - 45°) diminui a incidência de PAV.

**28ª QUESTÃO – A parada cardiorrespiratória (PCR) é a cessação súbita e inesperada das atividades ventricular útil e ventilatória, passível de reversão, em indivíduo não portador de doença intratável ou em fase terminal. Nesse contexto, define-se a ressuscitação cardiorrespiratória e cerebral (RCPC) como o conjunto de manobras realizadas com o objetivo de manter, artificialmente, o fluxo arterial ao cérebro e a outros órgãos vitais, até que ocorra a recuperação da circulação espontânea (RCE). Em relação à qualidade da RCPC, é CORRETO afirmar:**

- A.( ) As compressões torácicas devem ser de 100 a 120 por minuto no adulto, com 30 compressões para duas ventilações, enquanto o paciente estiver sendo ventilado com bolsa-valva-máscara (método assíncronico).
- B.( ) Permitir o retorno completo do tórax à posição natural ou neutra após cada compressão é uma ação fundamental para manter uma boa pressão de perfusão coronariana, que deverá ser no mínimo de 25 mmHg para que ocorra a RCE.
- C.( ) O cálculo da fração de compressão torácica é obtido através da razão entre o tempo em que as compressões torácicas foram executadas durante toda PCR pelo tempo total da RCPC e idealmente deve estar próximo a 80% e não menos que 60%.
- D.( ) Realizar mais de 10 ventilações por minuto durante a RCPC promove diminuição da pressão de perfusão coronariana. As ventilações devem ser realizadas a cada 5 segundos.

**29ª QUESTÃO – Constitui um indicador obrigatório de avaliação que permite acompanhar a eficácia do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) implantado na instituição:**

- A.( ) Taxa de acidentes com resíduo perfurocortante.
- B.( ) Variação da proporção de resíduos do Grupo F.
- C.( ) Taxa de ocupação hospitalar.
- D.( ) Índice de quilo de roupa lavada por paciente-dia.

**30ª QUESTÃO – Em relação às medidas de prevenção de infecção cirúrgica preconizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é CORRETO afirmar que:**

- A.( ) Os sistemas de drenagem aberta (por exemplo, drenos penrose ou tubular) devem ser mantidos ocluídos com bolsa estéril por 7 dias.
- B.( ) A conduta para realização de curativo em paciente com fixador externo consiste na limpeza dos locais de inserção dos pinos com soro fisiológico 0,9% e após, realizar toque de álcool 70% primeiro na área periférica, depois na inserção dos pinos e por último, no fixador.
- C.( ) É recomendada a descolonização dos portadores nasais de *Staphylococcus aureus* com mupirocina intranasal e banho de clorexedina uma vez por dia por 5 dias consecutivos.
- D.( ) O controle da temperatura corpórea intra-operatória reduz a incidência de sangramento no pós-operatório, infecções e eventos cardíacos.

**31ª QUESTÃO – A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Segundo a Resolução 311/2007, que trata do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é INCORRETO afirmar que:**

- A.( ) Mesmo em situações de emergência, o profissional de enfermagem não poderá praticar ato cirúrgico ou prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional.
- B.( ) O profissional deverá levar ao conhecimento do Conselho Regional de Enfermagem, de forma escrita, os fatos que envolvam demissão de emprego, quando o motivo determinante for o cumprimento dos preceitos éticos e legais da profissão.
- C.( ) A modificação do endereço ou do estado civil do profissional, por exemplo, deverá ser informada ao Conselho Regional de Enfermagem.
- D.( ) Durante o exercício da profissão, é permitida a aposição do número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem na assinatura, não sendo obrigatório o uso do carimbo.

**32ª QUESTÃO** – O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde constitui-se em um conjunto de procedimentos adotados pelos serviços de saúde com o objetivo de minimizar a produção de resíduos, encaminhar de forma eficiente e segura os resíduos gerados, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. **Em relação às etapas do manejo, é CORRETO afirmar que:**

- A.( ) ACONDICIONAMENTO - Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura.
- B.( ) DISPOSIÇÃO FINAL - Consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento ambiental de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT.
- C.( ) IDENTIFICAÇÃO - Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos.
- D.( ) ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO - Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores.

**33ª QUESTÃO** – A vacina BCG (bacilo de Calmette e Guérin) é apresentada sob a forma liofilizada em ampola multidose, acompanhada da ampola do diluente específico para a vacina. **Esta vacina está indicada para:**

- A.( ) Imunizar as crianças definitivamente contra a tuberculose.
- B.( ) Prematuros ou crianças com peso inferior a 2 kg ao nascer.
- C.( ) Prevenir as formas graves da tuberculose.
- D.( ) Contatos intradomiciliares com menos de 1 ano de idade comprovadamente vacinados.

**34ª QUESTÃO** – De acordo com a RDC n. 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, **competem ao Núcleo de Segurança do Paciente (NSP):**

- A.( ) Monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos serviços de saúde.
- B.( ) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela instituição.
- C.( ) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 (quarenta e oito) horas a partir do ocorrido.
- D.( ) Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde.

**35ª QUESTÃO – Em relação às definições dos termos relacionados à segurança do paciente, correlacione corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA:**

- |                              |     |   |
|------------------------------|-----|---|
| 1- Circunstância notificável | ( ) | Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou em dano desnecessário ao paciente. |
| 2- Evento adverso            | ( ) | Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde.       |
| 3- Incidente                 | ( ) | Incidente com potencial dano ou lesão.  |
| 4- Segurança do Paciente     | ( ) | Incidente que não atingiu o paciente.   |
| 5- Near Miss                 | ( ) | Incidente que resulta em dano a saúde.  |

- A.( ) 3, 5, 1, 4, 2.  
B.( ) 3, 4, 1, 5, 2.  
C.( ) 2, 4, 3, 5, 1.  
D.( ) 2, 5, 3, 4, 1.

**36ª QUESTÃO – Com relação às lesões cutâneas primárias é CORRETO afirmar que:**

- A.( ) Pápula - massa sólida não palpável que se estende além da epiderme.  
B.( ) Cisto - massa sólida elevada e palpável com bordas transitórias.  
C.( ) Vesícula - massa circunscrita, elevada e palpável que contém líquido seroso e mede menos de 0,5 cm.  
D.( ) Úlcera - perda da pele que se estende além da epiderme.

**37ª QUESTÃO – Para o diagnóstico e manejo da hipertensão intra-abdominal e da síndrome compartimental abdominal é fundamental a mensuração da pressão intra-abdominal (PIA). Em relação à técnica de mensuração de PIA no adulto, marque a alternativa INCORRETA:**

- A.( ) O paciente deve estar na posição supina completa com o transdutor colocado no zero na linha axilar média, ao nível da crista ilíaca.  
B.( ) A determinação da PIA deve ser realizada 30 a 60 segundos após a infusão de soro vesical para permitir o relaxamento do músculo detrusor da bexiga e evitar sua influência nos valores obtidos.  
C.( ) Um volume de infusão máximo de 25 mL de solução salina deve ser utilizado para a técnica de mensuração intravesical intermitente.  
D.( ) A PIA deve ser sempre expressa em mmHg (1 mmHg = 1,36 cmH<sub>2</sub>O) e medida no final da inspiração depois de garantir que as contrações do músculo abdominal estejam ausentes.



**38ª QUESTÃO** – De acordo com a portaria MS/GM n. 529/2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, **constitui um dos protocolos básicos** definidos pela Organização Mundial de Saúde **a ser elaborado e implantado pelos serviços de saúde:**

- A.( ) Recomendação para prevenção de infecção do trato urinário.
- B.( ) Identificação do paciente.
- C.( ) Medidas de prevenção de infecção cirúrgica.
- D.( ) Vigilância epidemiológica e indicadores.

**39ª QUESTÃO** – As complicações relacionadas à administração de **nutrição parenteral total** (NPT) podem ser divididas em 3 categorias principais: metabólicas, infecciosas e mecânicas. **Em relação às complicações metabólicas, marque a alternativa INCORRETA:**

- A.( ) Quando uma solução de NPT não está temporariamente disponível, a administração de soro glicosado a 50% é recomendada para evitar a hipoglicemia.
- B.( ) A síndrome de realimentação é uma das complicações mais críticas que ocorrem com o início da NPT caracterizada por alterações rápidas nos eletrólitos, glicose e estado volumétrico dentro de horas a dias da implementação da nutrição.
- C.( ) Enzimas hepáticas anormais podem ocorrer em até 40 a 70% dos pacientes. Isso é muitas vezes relacionado com a quantidade e a velocidade da infusão da NPT.
- D.( ) Alguns distúrbios metabólicos podem ser prevenidos pela verificação da bolsa de solução da nutrição parenteral para a precisão da transcrição, controle preciso da bomba de infusão venosa e monitoramento da resposta do paciente à terapia.

**RASCUNHO**

**RASCUNHO**

**40ª QUESTÃO** – A infecção do trato urinário é uma das causas prevalentes de infecções relacionadas à assistência à saúde de grande potencial preventivo. **Em relação ao manuseio do cateter urinário, marque a alternativa CORRETA:**

- A.(    ) Para exame de urina, coletar pequena amostra através da aspiração de urina com agulha estéril após desinfecção do dispositivo de coleta e encaminhar a amostra ao laboratório em até 1 hora após a coleta.
- B.(    ) É necessário limpar rotineiramente o meato uretral com soluções antissépticas.
- C.(    ) Não desconectar o cateter ou tubo de drenagem, exceto se a irrigação for necessária.
- D.(    ) O cateter deve ser fechado previamente antes de ser removido do paciente.

**RASCUNHO**

-----corte aqui-----

**RASCUNHO DO GABARITO**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40