

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, julgue os itens seguintes, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.

- 41 O enfermeiro participa de bancas de concursos para o provimento de cargos de técnico ou auxiliar de enfermagem, exceto no recrutamento e seleção para o graduado em enfermagem.
- 42 Cabe ao enfermeiro, privativamente, a execução de partos com ou sem distocias.
- 43 O enfermeiro está autorizado a prescrever medicamentos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde em que exerce suas atividades.
- 44 O enfermeiro poderá exercer cargos de direção e chefia nas instituições de saúde pública; nas instituições privadas de saúde, entretanto, os cargos de direção e chefia de enfermagem estão subordinados ao diretor médico.
- 45 O enfermeiro tem o dever de cuidar de pacientes graves com risco de vida.

Julgue os itens a seguir, utilizando uma análise crítica dos aspectos bioéticos e dilemas relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem.

- 46 Deontologicamente, o aborto é proibido por esse código de ética, embora o Código Penal o permita nos casos de estupro e risco de vida para a mãe.
- 47 O Código de Ética e Deontologia da Enfermagem permite a prática da eutanásia, a fim de antecipar a morte em pacientes submetidos a cuidados paliativos oncológicos.
- 48 De acordo com os códigos de ética das profissões de saúde, a reprodução humana deve observar a defesa à vida e o respeito à dignidade e à autonomia do ser humano.
- 49 De acordo com o caráter ético das pesquisas, o Código de Ética e Deontologia da Enfermagem permite aos seus membros a participação e realização de pesquisas que ponham em risco a saúde e a integridade do ser humano.
- 50 Os profissionais de enfermagem estão livres de responsabilidades civis e penais quando executam, mesmo contra sua vontade, uma transfusão sanguínea em uma situação de risco de vida.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem.

- 51 Considera-se infração ética a inobservância das normas prescritas pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais de enfermagem.
- 52 Considera-se infração disciplinar a ação, omissão ou convivência que implique em desobediência e(ou) inobservância das disposições do Código de Ética e Deontologia da Enfermagem.
- 53 É proibido ao profissional de enfermagem delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde que não seja enfermeiro.
- 54 É direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar, exceto em situações de urgência e emergência, prescrição medicamentosa e terapêutica com base em documentos e formulários nos quais não constem a assinatura e o número de registro do profissional.

A respeito do estudo dos sinais vitais como fundamento básico para o profissional de enfermagem, julgue o próximo item.

- 55 Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial são os sinais das funções orgânicas básicas que refletem o equilíbrio ou o desequilíbrio resultante das interações entre os sistemas do organismo e uma determinada doença; a dor aparece como o quinto sinal vital, tornando-se um desafio para a assistência em enfermagem.

Acerca de administração dos serviços de enfermagem, julgue os itens a seguir, com fundamentação na legislação e na normatização em vigor.

- 56 A anotação de responsabilidade técnica é um documento por meio do qual se materializa o ato administrativo do Conselho Regional de Enfermagem de concessão de responsabilidade técnica.
- 57 Um técnico de enfermagem somente poderá ser indicado como responsável técnico se os serviços de enfermagem prestados pela empresa ou instituição se limitarem à execução de ações de enfermagem que lhe caibam, por lei, executar.
- 58 O profissional de enfermagem que exerça responsabilidade técnica em uma empresa ou instituição poderá fazê-lo como empregado ou servidor dessa pessoa jurídica ou como prestador de serviços autônomo.

A respeito do posicionamento do enfermeiro como líder e agente de mudança, julgue os itens subsequentes, tendo como referência a legislação e a normatização em vigor.

- 59 Nos casos de suspensão das atividades profissionais motivadas por reivindicações da categoria, o enfermeiro, ainda que seja um agente de mudança, deve garantir a continuidade da assistência de enfermagem, desde que em condições que ofereçam segurança.
- 60 No papel de liderança, o enfermeiro, em caso de emergência, poderá realizar serviços que, por sua natureza, competiriam a outro profissional.
- 61 É dever do enfermeiro responsabilizar-se por falta cometida no exercício da profissão, ainda que tenha sido praticada coletivamente.

Com referência às concepções teórico-práticas da assistência em enfermagem em políticas públicas, julgue os itens subsequentes.

- 62 A humanização da assistência em enfermagem pressupõe a separação de fatores humanos — como acolhimento e boas condições de trabalho — e fatores físicos — tais como novas tecnologias e melhores ambientes de cuidado.
- 63 A assistência humanizada em enfermagem deve se integrar ao trabalho em equipe multiprofissional, com valorização da transdisciplinaridade.
- 64 Uma das razões pelas quais se devem definir protocolos clínicos para a assistência humanizada em enfermagem é a de eliminar ações e intervenções desnecessárias.
- 65 Usuário com quadro clínico de alta vulnerabilidade deve receber atenção especial quanto à elaboração de plano terapêutico de forma conjunta por equipe multiprofissional.

Julgue os itens que se seguem, acerca da sistematização da assistência de enfermagem.

- 66 A operacionalização do processo de enfermagem é possibilitada pela sistematização da assistência de enfermagem, que organiza o trabalho profissional.
- 67 Na atuação domiciliar, o processo de saúde de enfermagem difere da consulta de enfermagem: o primeiro é metodologicamente sistematizado, ao passo que a segunda, não.
- 68 A primeira etapa do processo de enfermagem é o planejamento, em que se delineiam os resultados esperados das ações ou intervenções de enfermagem.
- 69 O suporte teórico que fundamenta o processo de enfermagem deve ser capaz tanto de fornecer a base para a avaliação dos resultados quanto de orientar o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem.
- 70 O registro formal de execução do processo de enfermagem será desnecessário quando o trabalho for realizado somente pelo enfermeiro responsável.

Julgue os itens seguintes, relativos à política nacional de atenção às urgências e à rede de atenção às urgências derivadas dessa política.

- 71 O atendimento a usuário com quadro agudo deve ser feito pelos níveis secundário e terciário de atenção, cabendo ao nível primário a transferência do usuário para os demais níveis.
- 72 A política nacional de atenção às urgências se baseia em dados que apontam alta morbimortalidade associada a doenças do aparelho circulatório na faixa etária acima dos quarenta anos de idade.
- 73 Fundamentada em dados nacionais, a política nacional de atenção às urgências não considera as diferenças regionais de perfis epidemiológicos.
- 74 Um dos critérios considerados na implantação da rede de atenção às urgências é o da densidade populacional.
- 75 São prioritárias para a rede de atenção às urgências as três seguintes linhas de cuidados: doenças infectocontagiosas, doenças cerebrovasculares e doenças cardiovasculares.

A respeito do processo social de mudança das práticas sanitárias no SUS e na enfermagem, julgue os itens seguintes.

- 76 A integralidade dos processos assistenciais é discutida e realizada no Brasil desde os primeiros séculos da existência do país, mas tornou-se evidente na vertente de educação sanitária com as campanhas sanitárias ocorridas no início do século XX e com a garantia da assistência médica à população fornecida pela legislação previdenciária.
- 77 O exercício da integralidade na atenção básica foi construído ao longo do tempo e atualmente pressupõe um perfil do profissional enfermeiro com conhecimentos, habilidades e atitudes direcionados para as diretrizes da atenção básica, mais responsáveis, mais atentos à humanização, ao acolhimento e mais sensíveis às dimensões do processo de cuidar.
- 78 A crise econômica e a previdenciária ocorridas nos anos 80 do século passado foram desencadeadoras de mudanças na área da saúde, dando origem às políticas de Programa de Pronta Ação (PPA) e ao Sistema Nacional de Saúde (SNS), que se caracterizavam como um movimento de construção de um sistema integrado de assistência à saúde, de corte descentralizado e de cobertura universal.

79 Atualmente a gestão é considerada o elemento central no processo de operacionalização do SUS; e o planejamento, uma ferramenta indispensável, que, a partir de um de seus instrumentos, o plano de saúde, tem tornado possível realizar uma análise situacional orientada, entre outros componentes, pelos oito temas trabalhados no mapa da saúde.

80 Após a criação do SUS, o mercado de trabalho dos enfermeiros passou a se expandir à medida que foi sendo implantada a municipalização, uma vez que gradualmente esses profissionais foram sendo incorporados aos serviços de saúde, com a função de executar programas de extensão de cobertura do Ministério da Saúde, como o Programa Saúde da Família.

Julgue os itens que se seguem, acerca das complicações após intervenções coronarianas percutâneas.

- 81 A isquemia do miocárdio manifesta-se por dor torácica, com a presença de arritmias e alterações isquêmicas no eletrocardiograma, e pode decorrer de reestenose da artéria coronária.
- 82 O extravasamento arterial de sangue para dentro do espaço retroperitoneal provoca o hematoma retroperitoneal, que pode ser detectado a partir de queixas de dor nas costas ou no flanco, hipotensão arterial, taquicardia e agitação.
- 83 Pseudoaneurisma ou fístula arteriovenosa são complicações tardias que provocam diminuição do pulso distal ao local de inserção da bainha, com extremidade fria, cianótica e dolorosa.

Com relação às vias de acesso para o cateterismo cardíaco, julgue os itens a seguir.

- 84 O acesso femoral, quando comparado ao acesso radial, proporciona menores riscos de sangramento no local, exige uma exposição estimada à radiação mais longa e tem uma curva de aprendizagem maior.
- 85 A artéria braquial é a primeira escolha para essa abordagem por estar livre de estruturas nervosas, ser menos móvel e apresentar menor chance de espasmos.
- 86 Para procedimentos radiais, deve-se avaliar a situação vascular periférica de base a partir de testes de fluxo ulnar para o arco palmar, a exemplo do teste de Barbeau, no qual a canulação poderá prosseguir com as classificações A, B ou C.

Um homem de setenta anos de idade, com hipertensão arterial e diabetes melito, buscou atendimento médico com relato de dor torácica, retroesternal, desencadeada por esforços moderados. Relatou uso contínuo de inibidor da enzima conversora de angiotensina e metformina. Como o resultado do seu teste ergométrico mostrou-se inconclusivo, foi indicada a realização de angiografia coronariana. No dia seguinte ao desse procedimento, ele retomou as atividades laborais e o uso dos medicamentos de rotina. Dois dias depois do cateterismo, esse paciente apresentou náuseas, vômitos e redução do volume urinário. Após avaliação e realização de exames, foi diagnosticada insuficiência renal aguda (IRA).

A respeito desse quadro clínico, julgue os itens seguintes.

- 87 A IRA desenvolvida pode estar associada ao contraste utilizado na angiografia coronariana, que pode causar toxicidade direta no epitélio tubular renal e isquemia da medula renal.
- 88 A idade avançada, o diabetes melito e os dois medicamentos de uso contínuo foram fatores predisponentes à nefrotoxicidade associada ao uso do contraste.
- 89 A suspensão do uso de metformina até 48 h após o cateterismo deveria ter sido realizada como medida de prevenção à nefropatia induzida por contraste.

Acerca da angiografia coronariana, julgue os itens subsequentes.

- 90 Poderá haver espasmo induzido da artéria coronariana por cateter, que pode ser resolvido com o reposicionamento deste ou a administração de nitroglicerina intracoronariamente via cateter.
- 91 O cateter *pigtail* é comumente utilizado para coronariografia.

Tendo em vista que procedimentos de intervenções coronarianas percutâneas são realizados na presença de doença da artéria coronária, julgue os próximos itens.

- 92 No planejamento, um resultado esperado corretamente formulado é a compressão vigorosa do local após a retirada do introdutor.
- 93 Nas referidas intervenções, é contraindicada a administração de antitrombóticos antes do procedimento.
- 94 Após o procedimento por abordagem femoral, deve-se aplicar curativo semioclusivo com muitas gazes e observar a movimentação do membro nas primeiras horas, avaliando-se flexão e extensão.
- 95 A inserção de um *stent* — dispositivo que fornece suporte estrutural para a artéria comprometida — é feita com o uso do balão de angioplastia, a fim de prevenir a reestenose. Ao fim desse procedimento, é recomendável administrar medicamentos antiplaquetários ao paciente.

Julgue os itens subsequentes, acerca da montagem da mesa para realização de procedimentos no laboratório de cateterismo cardíaco.

- 96 Os materiais estéreis, como cateteres, pinças, soluções, seringas, válvulas de pressão e tubos de conexão, devem ser organizados sobre a mesa, que deverá estar protegida por campos estéreis, manipulados por uma pessoa já devidamente paramentada, de modo que a esterilidade permaneça preservada.
- 97 Agulhas, lâminas e bainha devem estar organizadas sem os protetores e dispostas no canto proximal do médico, e o balde de lixo deve estar à frente, de modo que as gazes utilizadas possam ser jogadas por cima da mesa.

Com respeito à história da hemodinâmica, julgue o item que se segue.

- 98 O primeiro relato de realização de coronariografia seletiva em humano ocorreu no século passado, nos Estados Unidos da América. Na época, acreditava-se que a injeção direta de contraste em uma coronária acarretaria arritmia fatal ao paciente.

No que se refere à anatomia coronariana, julgue os itens a seguir.

- 99 Na maioria das pessoas, o tronco da coronária esquerda bifurca-se, formando as artérias descendente anterior (DA) e circunflexa (CX); entretanto, em alguns indivíduos, esse tronco trifurca-se, e, nesse caso, a artéria que se posiciona entre a DA e a CX recebe o nome de artéria descendente posterior.
- 100 Na maioria das pessoas, o nó sinoatrial (sinusal) é irrigado por um ramo atrial que se origina na artéria descendente anterior.

Espaço livre