



Ministério da Educação
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Pró-Reitoria de Recursos Humanos

CONCURSO PÚBLICO
CARGO: MÉDICO/ÁREA: PSIQUIATRIA
EDITAL Nº 03/2019
PROVA OBJETIVA – 10/03/2019

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

01. Você recebeu uma FOLHA DE RESPOSTAS e um CADERNO DE PROVA.
02. Confira seu nome, documento de identidade e número de inscrição e assine a FOLHA DE RESPOSTAS. Qualquer divergência chame o fiscal.
03. Não amasse, não dobre nem rasure a sua FOLHA DE RESPOSTAS.
04. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída.
05. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
06. Este caderno contém 50 (cinquenta) questões seguidas de 4 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C, D).
07. Neste momento confira este CADERNO DE PROVA com muita atenção, observando o total de questões e verificando se há falhas de impressão. Qualquer problema chame o fiscal.
08. Aguarde a autorização do Fiscal de Sala para iniciar a prova.
09. NÃO será permitido o uso de calculadoras e de aparelhos eletrônicos (telefones celulares, agenda eletrônica ou similares) ou qualquer material de consulta durante a realização da prova.
10. Leia cuidadosamente todas as questões e preencha a FOLHA DE RESPOSTAS, assinalando a alternativa escolhida com caneta esferográfica azul ou preta. Cubra toda a área da letra correspondente a cada resposta, conforme modelo abaixo:



11. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, emenda ou rasura.
12. Evite deixar questão sem resposta.
13. Ao término do preenchimento e após 2 (duas) horas do início da prova, caso tenha terminado a prova, entregue ao fiscal de sala SOMENTE o CARTÃO DE RESPOSTAS. O candidato poderá levar consigo o CADERNO DE PROVA.
14. Use as respostas do seu CADERNO DE PROVA para conferir seu desempenho a partir do gabarito oficial, que será disponibilizado no endereço eletrônico: www.uftm.edu.br
15. Até que você saia do prédio, todas as orientações continuam válidas.

BOA SORTE!

CONHECIMENTOS GERAIS**PORTUGUÊS****A saúde mental dos jovens brasileiros: Como prevenir?**

A ocorrência de vários suicídios de adolescentes em curto espaço de tempo não é um fenômeno restrito à atualidade. No século 18, um famoso livro, *Os Sofrimentos do Jovem Werther*, tornou-se um marco do Romantismo e uma febre entre os jovens. Nele conta-se a história de um adolescente que vive uma paixão impossível por uma mulher na casa dos trinta anos.

A estratégia adotada pelo autor do livro, Johann Wolfgang von Goethe – ele deixou para o exame do leitor as cartas trocadas pelo casal de amantes –, fez a narrativa parecer muito crível. Adolescentes passaram a se matar vestidos como nas ilustrações do livro, tendo-o em mãos e usando o mesmo método letal – um tiro de pistola. Ensinado nos cursos de Jornalismo, o Efeito Werther acabou por reforçar o tabu social de evitar o assunto, e nada se publicava sobre suicídio.

Os tempos mudaram. Nos dias atuais, a internet tornou-se a nova ameaça a angariar jovens para a morte. O suicídio é assunto nas redes sociais virtuais e seriados, caso do *13 Reasons Why*, que gira em torno do suicídio de uma adolescente. Mas, com certeza, a natureza do suicídio juvenil da atualidade muito se distancia dos suicídios românticos [no quesito literatura] de três séculos atrás. O que estaria acontecendo? Como compreender melhor esse fenômeno? Como evitar que jovens vulneráveis o cometam?

Precisamos conversar sobre isso, pois a mortalidade por suicídio vem crescendo no Brasil. Diariamente, 32 pessoas tiram a própria vida, segundo estatísticas do Ministério da Saúde. De 2005 a 2016, de acordo com os últimos dados oficiais disponíveis, o suicídio de adolescentes entre 10 e 14 anos aumentou 31%; e entre aqueles que estão na faixa dos 15 aos 19 anos o aumento é de 26%. Na população indígena, há uma tragédia silenciosa: metade do elevado número de suicídios é cometido por adolescentes.

No espectro do comportamento autoagressivo, o suicídio é a ponta de um iceberg. Estima-se que o número de tentativas de suicídio supere o de suicídios em pelo menos dez vezes. O grau variável da intenção letal é apenas um dos componentes da tentativa de tirar a própria vida. O ato também representa uma comunicação, que pode funcionar como denúncia, grito de socorro, vingança ou a fantasia de renascimento. Por isso, ideias, ameaças e tentativas – mesmo aquelas que parecem calculadas para não resultarem em morte – devem ser encaradas com seriedade, como um sinal de alerta a indicar sofrimento e atuação de fenômenos psíquicos e sociais complexos. Não devemos banalizá-las.

O mundo psíquico de um adolescente está em ebulição, ainda não atingiu a maturidade emocional. Há maior dificuldade para lidar com conflitos interpessoais, término de relacionamentos, vergonha ou humilhação e rejeição pelo grupo social. A tendência ao imediatismo e à impulsividade implica maior dificuldade para lidar com a frustração e digerir a raiva. Perfeccionismo e autocritica exacerbada, problemas na identidade sexual, bem como bullying, são outros fatores que se combinam para aumentar o risco.

Um adolescente pode ter centenas de likes na rede social virtual, mas pouquíssimos, ou nenhum, seres humanos reais com quem compartilhar angústias. O mundo adulto, como um ideal cultural alcançável por pequena parcela de vencedores, fragiliza a autoestima e a autoconfiança de quem precisa encontrar o seu lugar em uma sociedade marcada pelo individualismo, pelo exibicionismo estético, pela satisfação imediata e pela fragilidade dos vínculos afetivos.

Quando dominados por sentimentos de frustração e desamparo, alguns adolescentes veem na autoagressão um recurso para interromper a dor que o psiquismo não consegue processar. Quando o pensar não dá conta de ordenar o mundo interno, o vazio e a falta de sentido fomentam ainda mais o sofrimento, fechando-se assim um círculo vicioso que pode conduzir à morte. Nos suicídios impulsivos, a ação letal se dá antes de haver ideias mais elaboradas capazes de dar outro caminho para a dor psíquica. O ato suicida ocorre no escuro representacional, como um curto-circuito, um ato-dor.

Há, também, os suicídios que se vinculam a transtornos mentais que incidem na adolescência, como a depressão, o transtorno afetivo bipolar e o abuso de drogas. Diagnóstico tardio, carência de serviços de atenção à saúde mental e inadequação do tratamento agravam a evolução da doença e, em consequência, o risco de suicídio.

Continua na próxima página

Continuação

Pensamentos suicidas são frequentes na adolescência, principalmente em épocas de dificuldades diante de um estressor importante. Na maioria das vezes, são passageiros; por si só não indicam psicopatologia ou necessidade de intervenção. No entanto, quando os pensamentos suicidas são intensos e prolongados, o risco de levar a um comportamento suicida aumenta.

Prevenção do suicídio entre os adolescentes não quer dizer evitar todos os suicídios, e sim uma só morte que possa ser evitada, a do adolescente que está ao seu lado. O que fazer? De modo simplificado, sugerimos três passos. Memorize o acrônimo ROC: Reparar no Risco, Ouvir com atenção, Conduzir para um atendimento.

A prevenção do suicídio, ainda que não seja tarefa fácil, é possível. Não podemos silenciar sobre a magnitude e o impacto do suicídio de adolescentes em nossa sociedade. Não todas, mas considerável porção de mortes pode ser evitada.

(BOTEGA, Neury José. **A saúde mental dos jovens brasileiros: Como prevenir?** - Adaptado. Disponível em https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12517_A+SAUDE+MENTAL+DOS+JOVENS+BRASILEIROS. Acessado em 03/01/2019)

1. De acordo com o texto, pode-se inferir que:
 - a) Se houver um trabalho de prevenção ao suicídio entre os adolescentes, é possível evitar que tirem a própria vida.
 - b) Só será possível evitar que a taxa de suicídio entre os jovens continue a crescer, se as causas forem identificadas.
 - c) O número elevado de suicídios entre os adolescentes se deve aos inúmeros e difíceis problemas da vida moderna.
 - d) É preciso enfrentar o fenômeno do suicídio entre os adolescentes, o mais rápido possível.

2. A estruturação do texto pode ser definida como:
 - a) Didática, pois se dedica à organização de conhecimentos.
 - b) Argumentativa, pois apresenta uma tese e argumentos.
 - c) Publicitária, pois reúne uma série de fatos da atualidade.
 - d) Narrativa, pois mostra uma sequência cronológica de ações.

3. Tendo em vista que, no texto, algumas expressões têm a função de acrescentar uma explicação ao conteúdo de outras, assinale a opção em que o primeiro trecho apresentado é uma explicação do segundo:
 - a) “nada se publicava sobre suicídio” / “o Efeito Werther acabou por reforçar o tabu social de evitar o assunto” (2º parágrafo).
 - b) “pode funcionar como denúncia” / “o ato também representa uma comunicação” (5º parágrafo).
 - c) “a mortalidade por suicídio vem crescendo no Brasil” / “Precisamos conversar sobre isso” (3º parágrafo).
 - d) “um curto-circuito, um ato-dor” / “o ato suicida ocorre no escuro representacional” (8º parágrafo).

4. A coesão referencial é aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a outro elemento nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual. Assinale a opção em que o mecanismo de coesão referencial por elipse foi empregado para a construção da textualidade:
- a) “Pensamentos suicidas são frequentes na adolescência, principalmente em épocas de dificuldades diante de um estressor importante. Na maioria das vezes, são passageiros; por si só não indicam psicopatologia ou necessidade de intervenção.”
 - b) “A estratégia adotada pelo autor do livro, Johann Wolfgang von Goethe – ele deixou para o exame do leitor as cartas trocadas pelo casal de amantes –, fez a narrativa parecer muito crível.”
 - c) “Nos dias atuais, a internet tornou-se a nova ameaça a angariar jovens para a morte. O suicídio é assunto nas redes sociais virtuais e seriados, caso do 13 ReasonsWhy, que gira em torno do suicídio de uma adolescente.”
 - d) “No espectro do comportamento autoagressivo, o suicídio é a ponta de um iceberg. Estima-se que o número de tentativas de suicídio supere o de suicídios em pelo menos dez vezes.”
5. Como elemento coesivo, verifica-se várias vezes, no texto, o emprego do recurso da substituição lexical, em que uma palavra substitui outra para retomar o mesmo referente. São exemplos desse recurso:
- a) “intenção letal” e “tentativa de tirar a própria vida” (5º parágrafo).
 - b) “suicídio juvenil” e “esse fenômeno” (3º parágrafo).
 - c) “ameaças” e “tentativas” (5º parágrafo).
 - d) “diagnóstico tardio” e “doença” (9º parágrafo).
6. Assinale a opção correta acerca do emprego de vírgulas, no texto:
- a) Caso fosse suprimida a vírgula empregada logo após “Nos dias atuais” (3º parágrafo), seriam preservados a correção gramatical e o sentido do texto.
 - b) Se a vírgula empregada após o travessão, depois da expressão “casal de amantes” (2º parágrafo) fosse omitida, seria preservada a correção gramatical, mas haveria prejuízo ao sentido do texto.
 - c) As vírgulas que isolam o trecho “quando os pensamentos suicidas são intensos e prolongados” (10º parágrafo) são de uso facultativo.
 - d) As vírgulas para isolar o trecho “Os Sofrimentos do Jovem Werther” podem ser substituídas por travessão, sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido do texto.

7. Releia o trecho “Por isso, ideias, ameaças e tentativas – **mesmo** aquelas que parecem calculadas para não resultarem em morte – devem ser encaradas com seriedade”, no 5º parágrafo, e assinale a opção em cuja frase se repete o mesmo significado do vocábulo sublinhado:
- Mesmo** o caso sendo difícil, a decisão foi rápida.
 - A **mesma** resolução foi citada em outros casos.
 - Os juízes **mesmos** decidiram imediatamente a questão.
 - O empregador decidiu **mesmo** quem seria demitido.
8. Os elementos coesivos são responsáveis pelas relações de sentido construídas no texto. Sobre esses elementos, analise as afirmativas a seguir:
- No trecho “A estratégia adotada pelo autor do livro, Johann Wolfgang von Goethe – **ele** deixou para o exame do leitor as cartas trocadas pelo casal de amantes –, fez a narrativa parecer muito crível”, o pronome “**ele**” estabelece uma relação referencial com “**livro**”.
 - Em “Precisamos conversar sobre **isso**”, o pronome sublinhado retoma o trecho “O que estaria acontecendo? Como compreender melhor esse fenômeno? Como evitar que jovens vulneráveis o cometam?”.
 - No fragmento “Prevenção do suicídio entre os adolescentes não quer dizer evitar todos os suicídios, e sim uma só morte que possa ser evitada, a do **adolescente** que está ao **seu** lado”, o pronome “**seu**” refere-se ao termo “**adolescente**”.
 - O conector “**no entanto**”, em “**no entanto**, quando os pensamentos suicidas são intensos e prolongados, o risco de levar a um comportamento suicida aumenta”, estabelece relação semântica com a ideia anterior, de forma a estabelecer uma oposição ao que foi dito.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- II, III e IV, apenas.
- I, II, III e IV.
- II e IV, apenas.
- I e III, apenas.

9. Releia o trecho “A tendência ao imediatismo e **à** impulsividade implica maior dificuldade para lidar com a frustração e digerir a raiva”, no 6º parágrafo, e assinale a opção em que o acento indicativo de crase ocorreu pelo mesmo motivo:
- Quero tudo **às** claras, os motivos, as intenções, tudo.
 - A praça fica paralela **à** rua onde todos os filhos nasceram.
 - A população não tem mais tolerância **à** inflação.
 - Fecha-se, assim, um círculo vicioso que pode conduzir **à** morte.

10. Observe o emprego do elemento **que**, nos trechos a seguir:

- I. “Nele conta-se a história de um adolescente **que** vive uma paixão impossível por uma mulher na casa dos trinta anos.”
- II. “Como evitar **que** jovens vulneráveis o cometam?”
- III. “Estima-se **que** o número de tentativas de suicídio supere o de suicídios em pelo menos dez vezes.”
- IV. “Perfeccionismo e autocrítica exacerbada, problemas na identidade sexual, bem como bullying, são outros fatores **que** se combinam para aumentar o risco.”
- V. “A prevenção do suicídio, ainda **que** não seja tarefa fácil, é possível.”

Assinale a alternativa que aponta os trechos em que o elemento **que** exerce função diferente da que desempenha em “... o vazio e a falta de sentido fomentam ainda mais o sofrimento, fechando-se assim um círculo vicioso **que** pode conduzir à morte”:

- a) I, III e V.
- b) I, II e IV.
- c) III e IV.
- d) II, III e V.

LEGISLAÇÃO

11. De acordo com a Constituição Federal de 1988, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
- b) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, não havendo expressa previsão para os estrangeiros.
- c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- d) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

12. Analise os itens:

- I. O servidor poderá ausentar-se do serviço por 1 (um) dia, para doação de sangue.
- II. O servidor poderá ausentar-se do serviço por 8 (oito) dias úteis em razão de casamento.
- III. O servidor poderá ausentar-se do serviço pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias.
- IV. Será concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, mediante compensação de horário.

Considerando o disposto na Lei nº 8.112/90, estão **CORRETOS** os itens:

- a) II e III.
- b) I e III.
- c) I, III e IV.
- d) Somente o item I.

13. Paula é servidora pública na UFTM, tendo entrado em exercício em 15 de março de 2017. Segundo o que dispõe a Lei nº 8.112/90, atualmente Paula tem direito aos seguintes afastamentos e licenças, **EXCETO**:

- a) Licença para desempenho de mandato classista.
- b) Licença para atividade política.
- c) Afastamento para estudo ou missão no exterior.
- d) Licença por motivo de doença em pessoa da família.

14. De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- a) Em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
 - b) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
 - c) A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
 - d) A acumulação de cargos, se lícita, independe de comprovação da compatibilidade de horários.
15. De acordo com a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, o “conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade” é o conceito de:
- a) Nível de classificação.
 - b) Padrão de vencimento.
 - c) Cargo.
 - d) Plano de carreira.
16. De acordo com o Código de Ética na Administração Pública, o Decreto nº 1.171/1994, qual a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética?
- a) Censura.
 - b) Advertência.
 - c) Suspensão.
 - d) Demissão.
17. Conforme a Constituição Federal de 1988, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo de prefeito, aplica-se, com relação a remuneração:
- a) Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
 - b) Será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
 - c) Havendo compatibilidade de horários, receberá a remuneração do cargo eletivo.
 - d) Será afastado do cargo, recebendo a remuneração do cargo eletivo.

18. Nos termos do disposto na Lei nº 8.112/90 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, as formas de provimento de cargo público são, **EXCETO**:

- a) Nomeação.
- b) Recondução.
- c) Redistribuição.
- d) Reintegração.

19. Segundo o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, com relação à posse e exercício do servidor público federal, complete as lacunas a seguir:

A posse ocorrerá no prazo de _____ dias contados da publicação do ato de provimento.

É de _____ dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.

- a) quinze – quinze.
- b) sessenta – trinta.
- c) trinta – trinta.
- d) trinta – quinze.

20. Tendo em vista o disposto na Lei nº 8.112/90, são deveres do servidor, **EXCETO**:

- a) observar as normas legais e regulamentares.
- b) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
- c) cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestadamente ilegais.
- d) atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre os mecanismos de ação dos antipsicóticos, julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso):

- I. () O bloqueio dos receptores dopaminérgicos na via tuberoinfundibular pode provocar piora de sintomas negativos e cognitivos.
- II. () O bloqueio dos receptores dopaminérgicos da via mesocortical pode ocasionar disfunção sexual e interferir na fertilidade.
- III. () O bloqueio constante dos receptores dopaminérgicos na via nigroestriatal pode provocar supra-regulação dos receptores D2, levando à ocorrência de discinesia tardia
- IV. () O bloqueio dos receptores dopaminérgicos na via mesolímbica pode provocar apatia, anedonia e falta de motivação.

A sequência **CORRETA** é:

- a) F - F - V - F
- b) F - F - V - V
- c) F - V - F - V
- d) F - V - V - V

22. Sobre os mecanismos de ação dos antipsicóticos atípicos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A ligação ao receptor D2 não é a propriedade mais potente de qualquer um dos antipsicóticos atípicos.
- b) O agonismo/antagonismo parcial dos receptores 5HT_{1A} é um dos mecanismos responsáveis pela menor ocorrência de sintomas extrapiramidais, se comparados aos antipsicóticos típicos.
- c) O antagonismo dos receptores 5HT_{2A} pelos antipsicóticos atípicos é um dos mecanismos responsáveis pela menor ocorrência de sintomas extrapiramidais, se comparados aos antipsicóticos típicos.
- d) O antagonismo dos receptores 5HT_{2C} bloqueia a liberação de dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal, levando à piora de sintomas cognitivos.

23. Sobre os mecanismos de ação dos estabilizadores de humor, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A ação da carbamazepina inclui bloqueio dos canais de cálcio sensíveis à voltagem.
- b) A lamotrigina age sobre os canais de sódio sensíveis à voltagem.
- c) O lítio atua inibindo a enzima inositol monofosfatase; a modulação de proteínas G e regulação da expressão gênica para fatores de crescimento e plasticidade neuronal.
- d) Possíveis ações do valproato incluem inibição dos canais de sódio sensíveis à voltagem e reforço das ações do GABA.

24. Julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso):

- I. () A lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, descreve três tipos de internação psiquiátrica: internação voluntária; internação involuntária e a internação compulsória.
- II. () A lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, descreve quatro tipos de internação psiquiátrica: internação voluntária; internação involuntária; internação voluntária que se torna involuntária e a internação compulsória.
- III. () A lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, estabelece que a internação sem consentimento do paciente só é permitida quando o mesmo for considerado incapaz, seja de forma temporária ou permanente.
- IV. () A lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, estabelece que a presença de transtorno mental que acarrete em risco de suicídio e heteroagressividade são condições que justificam internação contra a vontade do paciente.

A sequência **CORRETA** é:

- a) V - F - F - F
- b) V - F - F - V
- c) V - F - V - F
- d) V - F - V - V

25. Assinale a alternativa que descreve situação em que se justifica a quebra de sigilo médico:

- a) Quando a manutenção do sigilo acarreta risco a terceiros ou à saúde pública.
- b) Quando o fato seja de conhecimento público.
- c) Quando o paciente for falecido.
- d) Quando o paciente for menor de idade.

26. Assinale a opção **CORRETA**:

- a) A internação compulsória é aquela realizada a pedido do juiz e sem laudo médico.
- b) A internação psiquiátrica visa à proteção e cuidados intensivos do doente mental quando em situação de alta vulnerabilidade.
- c) Sendo a internação voluntária "aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro", somente é possível solicitar internação psiquiátrica àquele paciente acompanhado por um responsável legal.
- d) Somente o psiquiatra tem respaldo legal para indicar uma internação psiquiátrica involuntária.

27. Julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso):

- I. () Algumas características da insônia psicofisiológica incluem preocupações excessivas a respeito da dificuldade de dormir e sintomas de ansiedade e tensão muscular ao ir para a cama.
- II. () É atribuída disfunção no processo de homeostase do sono e nos mecanismos neurológicos que governam o ciclo sono-vigília como causa da insônia idiopática.
- III. () Algumas características da insônia paradoxal incluem a ausência de queixas sobre o tempo e a qualidade do sono, na presença de queixas sobre os sintomas diurnos da insônia, como sonolência, perda de concentração e irritabilidade.
- IV. () Algumas características da insônia comportamental da infância incluem horários irregulares para adormecer e acordar, refeições pesadas próximas ao horário de dormir e ingestão excessiva de bebidas cafeinadas.

A sequência **CORRETA** é:

- a) V - F - F - V
- b) V - F - V - F
- c) V - V - F - F
- d) V - V - V - F

28. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a síndrome da apneia-hipopneia obstrutiva do sono:

- a) Hipertensão, depressão, disfunção cognitiva, doença arterial coronariana, AVC, diabetes melito tipo 2 são algumas condições que justificam necessidade de apenas 5 ou mais eventos de apneia-hipopneia por hora como critério diagnóstico.
- b) O tratamento invariavelmente incluirá terapia de pressão positiva através de CPAP ou BIPAP.
- c) Sintomas clínicos incluem sonolência excessiva, roncos, engasgos e apneia testemunhada.
- d) Um dos critérios diagnósticos é a presença de 15 ou mais eventos de apneia-hipopneia por hora na ausência de sintomas e comorbidades clínicas.

29. Qual das seguintes prescrições é a mais adequada para tratamento de agitação psicomotora, com risco iminente de agressividade, em um paciente em episódio maníaco agudo, sem histórico de sintomas extrapiramidais graves com antipsicótico e sem histórico de uso de drogas ilícitas?

- a) Haloperidol 5mg IM + diazepam 10mg IM + fenergan 50mg IM.
- b) Haloperidol 5mg IM + midazolam 15mg IM.
- c) Midazolam 15mg IM + diazepam 10mg IM + fenergan 50mg IM.
- d) Olanzapina 5mg IM + midazolam 15mg IM.

30. Julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso):

- I. () Indivíduos com transtorno do ciclo circadiano do subtipo fase do sono adiantada se sentem mais alertas pela manhã e sonolentos no final da tarde e início da noite.
- II. () O sonambulismo ocorre tipicamente na fase de sono REM.
- III. () Episódios de terror noturno são tipicamente reportados pelo próprio paciente, podendo ser confundido com ataque de pânico.
- IV. () Anemia ferropriva é uma causa secundária de síndrome das pernas inquietas.

A sequência **CORRETA** é:

- a) V - F - F - V
- b) V - F - V - F
- c) V - V - F - F
- d) V - V - V - F

31. Sobre a catatonia, julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso):

- I. () O tratamento de escolha para a catatonia sem complicações é a combinação de benzodiazepínicos com antipsicóticos atípicos.
- II. () A eletroconvulsoterapia (ECT) pode ser indicada quando não há resposta adequada com tratamento medicamentoso, na síndrome neuroléptica maligna e na catatonia maligna.
- III. () Sintomas da catatonia incluem atividade motora excessiva, ecolalia, ecopraxia e maneirismos.
- IV. () Investigação etiológica com solicitação de exames laboratoriais é dispensável quando há forte suspeita de etiologia psiquiátrica, como transtorno de humor ou esquizofrenia.

A sequência **CORRETA** é:

- a) F - F - V - F
- b) F - V - F - F
- c) F - V - V - F
- d) V - F - F - V

32. Sobre a síndrome de abstinência alcoólica e suas complicações, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A Encefalopatia de Wernicke deve ser tratada com reposição niacina endovenosa.
- b) As convulsões decorrentes da síndrome de abstinência alcoólica devem ser tratadas, preferencialmente, com fenitoína.
- c) Deve ser prescrito diazepam IM quando o paciente apresenta vômitos, não aceita medicação VO ou quando há risco de aspiração.
- d) Fenotiazídicos são contraindicados devido aos seus efeitos colaterais como hipotensão ortostática, sedação excessiva e redução do limiar convulsivo.

33. Assinale a opção **INCORRETA**:

- a) Segundo a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, as comunidades terapêuticas são um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial.
- b) Segundo a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, as portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro são um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial.
- c) Segundo a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, as unidades de acolhimento adulto e infanto-juvenil são um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial.
- d) Segundo a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, o ambulatório especializado de psiquiatra é um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial.

34. São constituintes da rede de atenção psicossocial na atenção básica os seguintes serviços, **EXCETO**:

- a) Centro de convivência.
- b) Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de caráter transitório.
- c) Serviço residencial terapêutico.
- d) Equipe de consultório de rua.

35. Assinale a alternativa que cita um dos direitos dos portadores de transtornos mentais citados na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001:

- a) Ter direito a vagas para deficientes em concursos públicos.
- b) Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis.
- c) Ter direito ao benefício de prestação continuada (BPC) quando comprovada incapacidade permanente para o trabalho.
- d) Ter liberdade de escolha quanto ao tratamento alopático, psicoterápico ou medicina alternativa.

36. Segundo Paulo Dalgarrondo, a anedonia é a incapacidade total ou parcial de obter e sentir prazer com determinadas atividades e experiências da vida. A anedonia pode ocorrer nos seguintes quadros, **EXCETO**:

- a) Hipomania
- b) Algumas formas graves de neuroses.
- c) Depressão.
- d) Esquizofrenia.

37. Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e assinale a alternativa **CORRETA**:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Acomete igualmente homens e mulheres. | |
| 2. Acomete mais homens do que mulheres. | A. Esquizofrenia |
| 3. Acomete mais mulheres do que homens. | B. Depressão |
| 4. Parentes biológicos em primeiro grau têm um risco 10 vezes maior de desenvolver a doença do que a população em geral. | C. Ansiedade |
| 5. Tem a prevalência ao longo da vida de aproximadamente 17%. | D. Transtorno por uso de substâncias |

A relação **CORRETA** é:

- a) 1: A / 2: B,C / 3: D / 4: A / 5: A
b) 1: B / 2: D / 3: A,C / 4: A / 5: B
c) 1: A / 2: D / 3: B,C / 4: A / 5: B
d) 1: C / 2: D / 3: A,B / 4: B / 5: C

38. Com relação aos seguintes estabilizadores de humor, correlacione os dois medicamentos da coluna da esquerda com o seu mecanismo de ação na coluna da direita e assinale a alternativa que corresponde a essa correlação:

MEDICAMENTO

AÇÃO

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ácido Valpróico | A. Inibe a enzima inositol monofosfatase. |
| | B. Potencializa as ações do GABA. |
| | C. Modulação das proteínas G. |
| 2. Carbonato de Lítio | D. Inibição da GSK-3. |
| | E. Inibição dos canais de sódio sensíveis à voltagem. |

A relação **CORRETA** é:

- a) 1: A, B, E / 2: A, C, D
b) 1: B, D, E / 2: A, C, E
c) 1: D, E / 2: A, B, D
d) 1: B, D, E / 2: A, C, D

39. Prochaska e DiClemente identificaram um modelo com cinco (5) estágios da motivação para mudança comportamental entre pessoas que estão em tratamento para transtorno por uso de substâncias.

Assinale a alternativa que melhor represente esses estágios:

1	Negação
2	Pré-Contemplação
3	Ação
4	Raiva
5	Contemplação
6	Negociação
7	Preparação
8	Aceitação
9	Manutenção
10	Depressão

A sequência **CORRETA** é:

- a) 1, 2, 5, 6, 8
- b) 2, 5, 7, 3, 9
- c) 2, 5, 8, 3, 9
- d) 6, 7, 8, 3, 9

40. Segundo Rosana Onocko e Gastão Wagner Campos, com relação ao conceito de Clínica Ampliada, julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso):

- I. () A centralidade da clínica ampliada é desenvolver mudanças.
- II. () A clínica ampliada incorpora as técnicas da clínica *strictu sensu* no seu conjunto de ações.
- III. () Na clínica ampliada, para reconstruir o modelo manicomial, somos convidados a alargar nosso foco de visão e nos dar conta da multiplicidade que é a vida.
- IV. () A clínica ampliada é fundamentada no paradigma flexneriano.

A sequência **CORRETA** é:

- a) V - F - V - F
- b) V - V - F - F
- c) V - V - F - V
- d) V - V - V - F

41. Assinale a alternativa **CORRETA**.

Segundo o Código de Ética Médica, o médico:

- a) O médico deverá manter sigilo para os menores de idade que tenham poder de discernimento e não estejam colocando sua vida em risco.
- b) Na investigação de suspeita de crime, o médico necessita revelar segredo para contribuir com o processo penal.
- c) Se o paciente consentir, o médico poderá exibir retratos em anúncios profissionais.
- d) Se o paciente faleceu, não há necessidade de manter o sigilo.

42. Analise o caso a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**.

Um rapaz de 25 anos estava caminhando por uma trilha com um guia e outras pessoas, quando se deparou com uma cobra que deu um bote e quase o acertou. O guia logo a afugentou e ela fugiu; o rapaz olhou para trás e viu algumas pessoas “congeladas”. Quando isso aconteceu, o rapaz sentiu muito medo, o coração acelerou, não enxergava mais nada, a boca estava seca e sentia as pernas tremerem. Após 20 minutos, estava relativamente bem, porém, permanecia com medo e vontade de ir embora; ficava atento à vegetação ao redor, com a impressão de que a cobra pudesse aparecer novamente. Após uma semana, o rapaz procurou o serviço de saúde da universidade, pois não conseguia parar de pensar no ocorrido, evitava ficar lembrando, porém, os pensamentos voltavam para sua mente, mesmo contra sua vontade; não conseguia passar perto de lugares com a vegetação alta e tinha crises intensas de medo, se tivesse que passar por tais lugares. Por conta dos sintomas, tinha muito sofrimento para ir à faculdade, pois no caminho precisava passar por um lugar com o mato muito alto. Além desses sintomas, teve alguns lapsos de memória, não se lembrava de como tinha chegado em sua casa naquele dia, passou a dormir mal, acordava com taquicardia e muito medo, porém, não se lembrava de ter pesadelos.

O que está acontecendo com ele e qual a melhor conduta?

- a) Trata-se de Transtorno do Estresse Agudo. Deverá permanecer em observação e, se isso continuar, deverá fazer terapia e, quem sabe, entrar com medicação (inibidor da receptação de serotonina).
- b) Trata-se de Transtorno do Estresse Pós-Traumático. Necessita de medicação (inibidor da receptação de serotonina) e psicoterapia.
- c) Uma crise de pânico, com muitos sintomas físicos. Deverá procurar um terapeuta e, se não se recuperar, um psiquiatra.
- d) Uma reação muito exagerada a uma ameaça que não representava risco nenhum para ele e para ninguém que estava próximo.

43. Com relação às vias dopaminérgicas, correlacione a coluna da esquerda com a da direita e assinale a alternativa **CORRETA**:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Mesolímbica | A. Faz parte do sistema nervoso extrapiramidal. |
| 2. Mesocortical | B. Controla a secreção de prolactina. |
| 3. Tuberoinfundibular | C. Envia axônios para áreas do córtex pré-frontal. |
| 4. Nigro estriatal | D. Projeta-se da área tegmental ventral do mesencéfalo para o <i>nucleus accumbens</i> . |

A relação **CORRETA** é:

- a) 1: B / 2: C / 3: D / 4: A
- b) 1: C / 2: D / 3: B / 4: A
- c) 1: D / 2: C / 3: A / 4: B
- d) 1: D / 2: C / 3: B / 4: A

44. Correlacione a coluna da esquerda com a coluna da direita e assinale a alternativa **CORRETA**:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ciclagem rápida | A. Episódios maníacos |
| 2. Ciclotimia | B. Episódios mistos |
| 3. Transtorno bipolar I | C. Hipomania |
| 4. Transtorno bipolar II | D. Hipotimia |
| | E. Pelo menos quatro episódios de humor por ano |

A relação **CORRETA** é:

- a) 1: A / 2: E, D / 3: E, B / 4: C
- b) 1: E / 2: C, D / 3: A, B / 4: C
- c) 1: E / 2: C, D, B / 3: A / 4: C
- d) 1: E / 2: C, D / 3: E, B / 4: A

45. Preocupação excessiva com não conseguir dormir; esforçar-se demais para dormir; ruminação; incapacidade de esvaziar a mente ao tentar dormir; tensão muscular aumentada ao tentar dormir; outras manifestações somáticas de ansiedade; conseguir dormir melhor longe da própria cama; e ser capaz de dormir quando não tenta (p. ex. assistindo à televisão) são características de:

- a) Insônia psicofisiológica.
- b) Narcolepsia.
- c) Parassonia.
- d) Síndrome de apneia obstrutiva do sono.

46. Analise o caso a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**.

A.J.C., sexo feminino, 25 anos, em consulta ambulatorial, relata que há 3 semanas iniciou abruptamente sintomas de tristeza, aumento do tempo de sono, ingestão excessiva de alimentos, ansiedade excessiva, retardo motor, labilidade do humor e tem planos de cometer suicídio, o que já tentou diversas vezes; somente nesta semana, foram duas tentativas, sendo que ambas foram interrompidas por sua mãe. Não está em tratamento, atualmente. Relata que apresentou episódios depressivos anteriores quando tinha 12, 17 e 22 anos, e que tinha rápida recuperação dos sintomas. Nessas ocasiões, teve efeitos colaterais como insônia, agitação e ansiedade com os antidepressivos, o que a fez não aderir aos medicamentos de forma adequada. Ao se levantar a necessidade de internação com a paciente e com sua mãe, ambas foram contra e assinaram um termo de responsabilidade.

Qual seria a melhor conduta neste caso?

- a) Administrar ISRS e encaminhar ao pronto socorro, pois necessita de melhores cuidados.
- b) Dar alta do tratamento, pois ambas não respeitam a decisão médica.
- c) Pensar em administrar lítio e orientar a mãe para realizar internação domiciliar.
- d) Pensar em transtorno obsessivo compulsivo, pois a labilidade de humor, a ingestão excessiva de alimentos e os pensamentos de morte podem ser pensamentos intrusivos.

47. Escolha a alternativa que melhor preenche as lacunas a seguir.

A quetiapina apresenta uma estrutura química relacionada com _____, é um antagonista dos receptores _____ e de _____. Em doses baixas é utilizada _____, em doses intermediárias, _____ e em doses altas, _____.

- a) a clorpromazina / de serotonina 5HT_{2A} / dopamina D₂ / como antidepressivo / como antimaníaco / como antipsicótico.
- b) a clorpromazina / de serotonina 5HT_{2C} / dopamina D₂ / como antimaníaco / como antidepressivo / como antipsicótico.
- c) a clozapina / de serotonina 5HT_{2A} / dopamina D₂ / como antidepressivo / como sedativo hipnótico / como antipsicótico.
- d) a clozapina / de serotonina 5HT_{2A} / dopamina D₂ / como sedativo hipnótico / como antidepressivo / como antipsicótico.

48. Escolha a alternativa que melhor preenche as lacunas a seguir.

Segundo Kaplan e Sadock, no compêndio de psiquiatria: “Otto Kernberg descreveu o mecanismo de defesa de _____, que ocorre em pacientes com transtorno da personalidade *borderline*. Nesse mecanismo de defesa _____, aspectos intoleráveis do *self* _____; O terapeuta deve estar ciente desse processo a fim de poder agir de forma _____ com esse tipo de paciente.”

- a) identificação projetiva / primitivo / são projetados no outro / neutra.
- b) negação / neurótico / são negados / empática.
- c) repressão / primitivo / projetados no outro / empática e acolhedora.
- d) sublimação / primitivo / são introjetados / distante.

49. Com relação ao suicídio, julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso):

- I. () Quanto maior o nível social do indivíduo, menor o risco de suicídio.
- II. () Uma queda do nível social aumenta o risco de suicídio.
- III. () Pessoas solteiras que nunca se casaram registram quase o dobro do índice de suicídio de pessoas casadas.
- IV. () Embora representem apenas 13% da população total, idosos respondem por 16% dos suicídios.
- V. () O índice de suicídio não é preocupante entre jovens.

A sequência **CORRETA** é:

- a) F - F - F - V - F
- b) F - F - V - V - F
- c) F - V - V - V - F
- d) V - V - V - V - V

50. Analise o caso a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**.

Um estudante de 20 anos, refugiado de outro país em guerra, nega ter passado por situação violenta ou traumática intensa. Teve que sair do seu país, pois o pai estava sendo ameaçado. Foi para a universidade há 2 meses e passou em consulta com psiquiatra, pois estava chateado, estressado, não conseguia dormir bem, sentia muita raiva e estava triste. Conta que, desde que chegou, começou a beber todos os dias, tem discutido muito com seus familiares e está com dificuldades de relacionamento com os colegas e professores, preferindo ficar isolado. Além disso, tem dificuldade com a nova língua. Devido a todos esses fatores, pensa em tirar sua vida, apesar de nunca ter tentado.

Qual o provável diagnóstico e tratamento?

- a) reação normal ao estresse, não necessita de tratamento específico, apenas escuta e acolhimento.
- b) transtorno de adaptação; psicoterapia.
- c) transtorno de estresse agudo; fluoxetina e psicoterapia.
- d) transtorno do estresse pós-traumático; sertralina e psicoterapia.

FOLHA DE RESPOSTAS

(RASCUNHO)

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

ATENÇÃO:

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA VIRAR O

CADERNO DE PROVA.