

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ODONTOPEDIATRIA

Questão nº: 21

Em relação à dentição mista, o ciclo definido para o grau de sobremordida que aumenta dos 09 aos 12 anos de idade e indicam uma redução após os 12 anos de idade está relacionada, de acordo com GUEDES-PINTO (2010), ao crescimento:

- a) Do ramo da mandíbula.
- b) Da maxila.
- c) Da abertura da fenda palatina.
- d) Da curva de Spee.

Questão nº: 22

De acordo com GUEDES-PINTO (2010), em relação aos pacientes com necessidades especiais, qual a síndrome que tem como característica principal o bruxismo?

- a) Rett
- b) Pierre-Robin
- c) Goldemar
- d) Turner

Questão nº: 23

Sobre os “efeitos hipotéticos” do flúor na formação do esmalte, escritos por FEJERSKOV et al , assinale a opção correta, de acordo com GUEDES-PINTO (2010):

- a) Efeitos na fase de maturação dos ameloblastos, acarretando aumento da remoção de proteínas e água.
- b) Efeitos na nucleação e crescimento dos cristais em todos os estágios de formação do esmalte.

- c) Efeitos na homeostase do fósforo.
- d) Efeitos na fase secretora dos odontoblastos, acarretando diminuição da produção de matriz, mudança na sua composição e no mecanismo de transporte de íons.

Questão nº: 24

De acordo com GUEDES-PINTO (2010), sobre a erupção dentária, é correto afirmar que:

- a) A fase eruptiva vai desde a chegada do dente ao plano oclusal até a sua queda ou extração.
- b) Os incisivos e caninos permanentes ocupam uma posição lingual aos decíduos, antes de os decíduos erupcionarem, porém em criptas ósseas diferentes.
- c) A fase pré-eruptiva tem início com a diferenciação dos germes dos dentes e termina com a completa formação da coroa.
- d) Na fase eruptiva, os maxilares crescem em altura, comprimento e em largura, realizando os germes dentários movimentos de corpo e excêntrico.

Questão nº: 25

De acordo com GUEDES-PINTO (2010), sobre a fase de erupção pré-oclusal, podemos afirmar que:

- a) Ocorre no instante que as cúspides em desenvolvimento alcançam a altura da crista alveolar.
- b) Tem 3 fases: eruptiva, pós-eruptiva e de maturação.
- c) O germe dentário sucessor desenvolve-se primeiro dentro da mesma cripta que seu antecessor decíduo e o osso envolve os mesmos germes dentários, mas não está completamente fechado sobre eles.
- d) Com o início do movimento eruptivo do dente, é criado espaço para a raiz em formação, e a reabsorção não ocorre mais no assoalho da cripta.

Questão nº: 26

Em relação à calcificação e erupção do Incisivo Central Superior Permanente, pode-se afirmar, de acordo com GUEDES-PINTO (2010), que:

- a) A calcificação da coroa ocorre por volta de 3 a 4 anos e a erupção ocorre por volta de 8 a 9 anos.
- b) A calcificação da coroa ocorre por volta de 1 a 2 anos e a erupção ocorre por volta de 6 a 7 anos.
- c) A calcificação da coroa ocorre por volta de 4 a 5 anos e a erupção ocorre por volta de 7 a 8 anos.
- d) A calcificação da coroa ocorre por volta de 18 a 21 meses e a erupção ocorre por volta de 7 a 8 anos.

Questão nº: 27

De acordo com GUEDES-PINTO (2010), em relação a anestesia local, para quanto deve-se reduzir a dose total máxima do anestésico local, com finalidade de evitar a toxicidade, em crianças e pacientes debilitados?

- a) Reduzir para 1/2.
- b) Reduzir para 1/3.
- c) Reduzir para 1/6.
- d) Reduzir para 1/8.

Questão nº: 28

De acordo com GUEDES-PINTO (2010), com relação à técnica radiográfica interproximal, é incorreto afirmar:

- a) A angulação vertical deve estar entre 8 e 10 graus.
- b) A angulação horizontal deve ser paralela às faces proximais dos dentes.
- c) A angulação vertical deve ser de 0 a 5 graus.
- d) A angulação da criança na cadeira deve ser com a linha trágus-asa do nariz paralela ao plano horizontal.

Questão nº: 29

Em relação a anquilose dentária, o grau de infraoclusão moderada refere-se , segundo CORRÊA (2010) :

I-Quando a superfície oclusal está localizada aproximadamente 1 mm abaixo do plano oclusal dos dentes adjacentes.

II-Quando a superfície oclusal está localizada no nível ou abaixo do tecido gengival interproximal de um ou de ambos os dentes adjacentes.

III-Quando a superfície oclusal e ambas as cristas marginais estão localizadas no nível do ponto de contato ou ligeiramente abaixo do ponto de contato dos dentes adjacentes.

Está (ão) correta (s):

- a) Somente a I.
- b) Somente a II.
- c) Somente a III.
- d) Somente I e II.

Questão nº: 30

Segundo CORRÊA (2010), em relação ao óxido nitroso, a analgesia relativa pode acontecer com concentração, em percentual de:

- a) 35% a 65% de óxido nitroso.
- b) 30% a 60% de óxido nitroso.
- c) 25% a 45 %de óxido nitroso.
- d) 45% a 65% de óxido nitroso.

Questão nº: 31

Em relação à seleção das resinas utilizadas para restauração em dentes decíduos, estão sendo usadas as que possuem tamanho de partículas inferiores a um micrômetro e níveis de carga elevados, variando de 75% a 86% em peso. Essas resinas segundo CORRÊA (2010) são muito usadas, tem indicação universal, no entanto, não são indicadas para que tipos de preparos?

- a) Classe I ou II pequenas.
- b) Classe II ou IV extensas.
- c) Classe I ou IV extensas.
- d) Classe II ou V pequenas.

Questão nº: 32

A Prometazina é uma fenotiazina com propriedades sedativas e anti-histamínicas. Ela é bem absorvida após a ingestão oral. Com relação às fenotiazinas empregadas como drogas sedativas para paciente odontopediátrico, é correto afirmar de acordo com McDONALD (2011), que:

- a) São indicadas em crianças com histórico de asma e apnéia noturna.
- b) Podem ser utilizadas em crianças propensas à convulsão.
- c) O início da ação ocorre dentro de 15 a 60 minutos, com um pico em 1 a 2 horas.
- d) Tem duração de 1 a 3 horas.

Questão nº: 33

Em relação aos selantes de cicatrículas e fissuras, podemos definir um selante “sem carga” e um selante “com carga” apresentando menos e mais resistência respectivamente. De acordo com CORRÊA (2010), qual a alternativa correta respectivamente para cada tipo de selante em relação às partículas inorgânicas?

- a) 19% ou menos / 20% ou mais.
- b) Entre 17% e 19% / 20% a 22%.
- c) 19% ou mais / 20% ou mais.
- d) 18% ou mais / 20% ou mais.

Questão nº: 34

Em relação aos padrões de erupção anormal dos primeiros molares permanentes, molares ectópicos irreversíveis que permanecem não irrompidos, se não tratados, podem causar, de acordo com McDONALD (2011):

- a) Retenção prolongada do segundo molar decíduo.
- b) Deslocamento assimétrico do primeiro molar superior em direção a um posicionamento de classe III.
- c) Extrusão do molar antagonista com a distorção da curva inferior de Spee.
- d) Perda precoce do segundo molar decíduo com um resultante acréscimo de comprimento do arco do quadrante.

Questão nº: 35

Segundo McDONALD (2011), em relação à Amelogênese Imperfeita, é incorreto afirmar:

- a) Afeta ambas as dentições, decídua e permanente.
- b) O esmalte apresenta rugosidades e permeabilidade aumentada.
- c) Pode ser classificada em 3 tipos : hipocalcificado, hipomaturado e hipoplásico.
- d) No tipo hipoplásico a espessura do esmalte é normal, mas a calcificação é deficiente e o esmalte é amolecido.

Questão nº: 36

Segundo McDONALD (2011), de acordo com a cronologia da dentição humana estabelecida por LOGAN & KRONFELD, o incisivo central superior permanente apresenta início da formação do tecido duro e esmalte completo, respectivamente de:

- a) 2 a 3 meses e 3 a 4 anos.
- b) 3 a 4 meses e 4 a 5 anos.
- c) 4 a 5 meses e 6 a 7 anos.
- d) 6 a 7 meses e 5 a 6 anos.

Questão nº: 37

Segundo McDONALD (2011), o padrão ideal para a face frontal de uma criança de 7 anos de idade deve incluir os seguintes critérios, com exceção de:

- a) A distância entre o subnasal e a borda inferior do lábio superior representa um terço de distância entre o subnasal e o mento.
- b) A borda do incisivo central superior é 3 mm abaixo da borda inferior do lábio superior.
- c) Largura da base das asas do nariz igual à largura entre os cantos internos dos olhos.
- d) Distância entre a glabella e o subnasal igual à distância do subnasal ao mento.

Questão n°: 38

Segundo McDONALD (2011), mordidas cruzadas posteriores funcionais:

- a) Mostram contatos transversais cúspide a cúspide bilateralmente com um arco maxilar constricto de largura insuficiente para confinar a dentição inferior no contato inicial.
- b) São um dos problemas de oclusão mais comuns observados nas dentições mista e decídua, com um taxa de incidência de 15 a 18% das crianças.
- c) Envolvem um deslocamento protrusivo da mandíbula durante o fechamento.
- d) São causadas exclusivamente por interferências caninas primárias verticais.

Questão n°: 39

Após o fechamento cirúrgico primário do palato fissurado de bebês entre 12 meses e 2 anos de idade, aproximadamente, qual é o percentual de pacientes que demonstram algum grau de deficiência velofaríngea, segundo McDONALD (2011)?

- a) 10%
- b) 14%
- c) 25%
- d) 42%

Questão n°: 40

A causa de mancha verde, observada com mais frequência nos dentes de pessoas jovens é desconhecida, embora se acredite que resulte da ação de bactérias cromogênicas sobre o esmalte. Com relação a este tipo de mancha extrínseca, de acordo com McDONALD (2011), podemos afirmar que:

- a) As meninas são mais frequentemente afetadas que os meninos.
- b) O depósito é mais frequente no terço médio da superfície vestibular dos dentes posteriores.
- c) A respiração bucal não interfere no acúmulo das manchas.
- d) A cor da mancha varia de verde-escuro a um verde-amarelado claro.

Questão nº: 41

Embora a adoção da terapia mecânica para controle do biofilme possa proporcionar excelentes resultados, é evidente que muitos pacientes são incapazes, pouco propensos ou não treinados para a execução de tal prática efetivamente. Além disso, certos pacientes com doenças periodontais, por exemplo, ou imunocomprometidos, necessitam de assistência adicional, além de mecanoterapia para manter a condição normal de saúde bucal. Em função destas evidências, foram desenvolvidos agentes quimioterápicos como adjuvantes no controle da placa. Segundo McDONALD (2011), dentre estes agentes quimioterápicos, podemos citar:

- a) Agentes de interferência na adesão da placa: mucinas e protease.
- b) Agentes modificadores de placa: ácido polivinilfosfórico de sódio e perfluoralquil.
- c) Agentes fenólicos neutros: clorexidina e alexidina.
- d) Agentes de oxigenação: peróxidos e perborato.

Questão nº: 42

Segundo McDONALD (2011), parafusos expansores do tipo Hyrax fixos são preferidos para mordidas cruzadas posteriores bilaterais com pronunciada constrição maxilar que exigem:

- a) 9 a 12 mm de expansão para correção da discrepância transversal.
- b) 3 a 5 mm de expansão para correção da discrepância transversal.
- c) 6 a 8 mm de expansão para correção da discrepância transversal.
- d) Expansão superior a 12 mm para correção da discrepância transversal.

Questão nº: 43

Pacientes com anemia falciforme têm uma desordem hemolítica autossômica recessiva. Com relação ao tratamento odontológico destes pacientes, de acordo com McDONALD (2011), é incorreto afirmar:

- a) O uso de anestesia local com vasoconstritores não é contraindicado em pacientes com anemia falciforme.
- b) A restauração do dente, incluindo as pulpotomias, é preferível às extrações.
- c) As pulpectomias em dentes não vitais são sempre contraindicadas.
- d) O uso de óxido nítrico não é contraindicado para esses pacientes.

Questão nº: 44

Com relação às fraturas radiculares, assinale a alternativa incorreta, de acordo com DUQUE (2013).

- a) A conduta diante de fraturas no terço cervical é a exodontia.
- b) A exodontia de dentes decíduos e permanentes é indicada em casos de fraturas longitudinais e oblíquas.
- c) Nos casos de fraturas transversais no terço apical, com justaposição dos segmentos, o acompanhamento clínico e radiográfico é indicado.
- d) O acompanhamento clínico e radiográfico recomendado é: 1 dia, 7 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses e 12 meses.

Questão nº: 45

Dentre os anti-inflamatórios esteroidais existem a dexametasona e a betametasona. Em odontopediatria, segundo DUQUE (2013), a betametasona é preferível porque:

- a) Possui melhor efeito dose- resposta.
- b) É o único disponível em solução gotas.
- c) Tem sabor agradável.
- d) Possui menos efeitos colaterais.

Questão nº: 46

O filme deve ser posicionado no sentido transversal e a criança deve ocluir com cuidado para não danificá-lo. O filme deve formar um ângulo de 30% com o plano horizontal, e o cilindro, um ângulo de 65 a 90°. A técnica radiográfica descrita, segundo DUQUE (2013) é a:

- a) Técnica Periapical Anterior Modificada Superior.
- b) Técnica Periapical Posterior Superior.
- c) Técnica Periapical Superior.
- d) Técnica Casati Alvares.

Questão nº: 47

Em bebês, a cárie dentária pode apresentar-se de duas formas. A primeira forma está associada à presença de um ou mais dentes cariados, extraídos ou restaurados; a segunda forma, mais agressiva, ocorre quando padrões atípicos rampantes da doença são observados. As duas formas são designadas, segundo DUQUE (2013), respectivamente:

- a) Cárie de mamadeira e cárie severa da infância.
- b) Cárie da primeira infância e cárie severa da infância.
- c) Cárie severa da infância e cárie de mamadeira.
- d) Cárie pré-escolar e cárie de mamadeira.

Questão nº: 48

Segundo TOLEDO (2012), no método sistêmico de utilização do flúor, este é ingerido passando pela cavidade bucal, onde tem efeito tópico e após seu metabolismo, retorna à cavidade bucal pela saliva e pelo fluido crevicular. Na utilização sistêmica, de acordo com o autor citado, o flúor fica presente na saliva total na seguinte concentração:

- a) 0,01-0,05 ppm F
- b) 0,05-0,10 ppm F

- c) 0,10-0,20 ppm F
- d) 0,20-0,50 ppm F

Questão nº: 49

Segundo TOLEDO (2012), as lesões cariosas não cavitadas, são lesões subsuperficiais que mantêm uma camada superficial mais mineralizada que sua subsuperfície. Esta camada externa , segundo o autor, apresenta:

- a) De 0,5 a 2,0 μm de espessura.
- b) De 5,0 a 10,0 μm de espessura.
- c) De 10,0 a 20,0 μm de espessura.
- d) De 20,0 a 50,0 μm de espessura.

Questão nº: 50

Quanto a rizólise, marque a alternativa que corresponde as doenças associadas ao seu atraso, de acordo com GUEDES-PINTO (2010):

- I- Hipotireoidismo**
- II- Hipopituitarismo**
- III- Disostose Cleidocraniana**
- IV- Diabetes**
- V- Anemia falciforme**

- a) Somente I e II.
- b) Somente I, II e III.
- c) Somente I, IV e V.
- d) Somente IV e V.

FIM DA 2ª PARTE