

1ª PARTE – CONHECIMENTOS GERAIS

MEDICINA

Questão nº: 1

Paciente com mais de 50 anos tem um maior risco de hemorragia por angiodisplasia de cólon, a qual acontece com maior frequência no:

- a) Cólon transverso
- b) Cólon esquerdo
- c) Cólon ascendente
- d) Sigmóide

Questão nº: 2

A causa mais comum de hemorragia maciça no trato gastrointestinal baixo é:

- a) Câncer
- b) Diverticulose
- c) Diverticulite
- d) Pólipo

Questão nº: 3

Um paciente procurou atendimento médico apresentando paresia aguda em dimídio direito. Esse déficit focal poderá ser considerado um ataque isquêmico transitório caso esteja completamente revertido num período máximo de:

- a) 60 minutos
- b) 30 minutos
- c) 24 horas
- d) 48 horas

Questão nº: 4

O tratamento da colite pseudomembranosa inclui o uso da seguinte medicação abaixo:

- a) Clindamicina
- b) Ampicilina
- c) Ceftriaxone
- d) Metronidazol

Questão nº: 5

Qual das seguintes hepatites é a que mais cronifica?

- a) Hepatite A
- b) Hepatite C
- c) Hepatite B
- d) Hepatite E

Questão nº: 6

O exame padrão ouro para o diagnóstico da cirrose é:

- a) Biópsia hepática
- b) Hemograma completo
- c) Hepatograma
- d) Coagulograma

Questão nº: 7

Qual o melhor método para o diagnóstico da tuberculose pulmonar?

- a) PCR do escarro
- b) PCR do lavado broncoalveolar
- c) BAAR do escarro
- d) Dosagem do ADA no escarro

Questão nº: 8

Todas as patologias abaixo podem causar hipertensão porta, EXCETO:

- a) Trombose de veia porta
- b) Síndrome de Budd-Chiari
- c) Colangite
- d) Insuficiência cardíaca grave

Questão nº: 9

A propriedade de um Teste Diagnóstico detectar a proporção de verdadeiros negativos entre todos os indivíduos sadios, define:

- a) Prevalência
- b) Sensibilidade
- c) Especificidade
- d) Valor Preditivo Positivo

Questão nº: 10

As medidas de frequência de doença são definidas a partir de dois conceitos epidemiológicos fundamentais, são eles:

- a) Incidência e Prevalência
- b) Epidemia e Notificação
- c) Expectativa de vida e Natalidade
- e) Medidas relativas e Medidas absolutas

Questão nº: 11

NÃO é considerada doença e/ou agravo de notificação imediata:

- a) Poliomielite
- b) Coqueluche
- c) Peste
- d) Tularemia

Questão nº: 12

Qual das opções abaixo NÃO é uma contraindicação para o aleitamento materno?

- a) HIV
- b) Mastite
- c) HTLV
- d) Nenhuma das opções anteriores

Questão nº: 13

Qual das situações abaixo NÃO é considerada fator de risco estabelecido para câncer de mama?

- a) Diagnóstico prévio de hiperplasia atípica.
- b) História familiar positiva em parentes de primeiro grau.

- c) Menarca precoce e menopausa tardia.
- d) Uso de contraceptivo hormonal oral.

Questão nº: 14

Puérpera com 15 dias de parto procurou atendimento médico com o quadro de febre, mastalgia e sinais flogísticos em mama direita. O diagnóstico foi mastite lactacional. Qual o agente mais comum?

- a) *Proteus mirabilis*.
- b) *Staphylococcus aureus*.
- c) *Staphylococcus epidermidis*.
- d) *Streptococcus agalactiae*.

Questão nº: 15

São exemplos comuns de síndrome de febre hemorrágica (FH), EXCETO:

- a) Febre amarela
- b) Chikungunya
- c) Dengue
- d) Síndrome pulmonar por Hantavirus

Questão nº: 16

Correlacione e marque a opção certa:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Exantema poupa palmas e plantas,
Duração > 3 dias. Manchas de KOPLIK | W) Exantema súbito |
| 2) Exantema desaparece a medida
que se espalha. Manchas de FORSCHHEIMER | X) Eritema infeccioso |

3) Aspecto de “bochecha esbofetada”,
Síndrome pápulo-purpúrea nas mãos e pés em
“luva e meia”

Y) Rubéola

4) Erupção maculopapulosa difusa
(poupando a face), resolução em dois dias

Z) Sarampo

- a) 1W; 2Y; 3Z; 4X
- b) 1X; 2W; 3Y; 4Z
- c) 1Z; 2Y; 3X; 4W
- d) 1Y; 2Z; 3X; 4W

Questão nº: 17

Mulher de 31 anos procura posto de saúde com queixa de uma úlcera na região genital, dolorosa, linfadenopatia inguinal e relata que iniciou um namoro há 5 dias. Qual o provável agente etiológico?

- a) *Treponema pallidum*
- b) *Chlamydia tracomatis*
- c) *Haemophilus ducrey*
- d) *Calymmatobacterium granulomatis*

Questão nº: 18

NÃO constitui manifestação clínica na Intoxicação Crônica por Chumbo:

- a) Nefropatia
- b) Degeneração gordurosa do fígado
- c) Alterações da memória
- d) Diminuição da fertilidade

Questão n°: 19

As medidas de frequência de doença são definidas a partir de dois conceitos epidemiológicos fundamentais, são eles:

- a) Incidência e Prevalência
- b) Epidemia e Notificação
- c) Expectativa de vida e Natalidade
- d) Medidas relativas e Medidas absolutas

Questão n°: 20

Expressar o número de casos existentes de uma doença, em determinado período de tempo, é definição para:

- a) Período de incubação
- b) Prevalência
- c) Incidência
- d) Sobrevida

FIM DA 1ª PARTE