

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CIRURGIA DE MÃO

Questão nº: 21

No tratamento cirúrgico da instabilidade carpal crônica, a capsulodese de BLATT é realizada com um retalho de base:

- a) Volar no rádio
- b) Dorsal no rádio
- c) Volar no escafoide
- d) Dorsal no escafoide

Questão nº: 22

Na avaliação da lesão de nervo periférico no membro superior, a discriminação de dois pontos na região palmar das falanges distal e proximal dos dedos é testada para um intervalo normal de, respectivamente:

- a) 3-5mm e 3-8mm.
- b) 3-6mm e 5-8mm.
- c) 3-5mm e 4-7mm.
- d) 4-7mm e 5-8mm.

Questão nº: 23

No tratamento da pseudartrose do escafoide, a técnica de Fernandez é realizada com colocação de enxerto:

- a) Corticoesponjoso retangular por acesso volar.
- b) Corticoesponjoso retangular por acesso dorsal.
- c) Corticoesponjoso trapezoidal por acesso volar.
- d) Corticoesponjoso trapezoidal por acesso dorsal.

Questão n°: 24

A anastomose entre os nervos ulnar e mediano na mão é denominada:

- a) MARTIN-GRUBER
- b) RICHE-CANNIEU
- c) LOREN-PARK.
- d) BERRITINI

Questão n°: 25

Na paralisia cerebral, de acordo com a classificação de ZANCOLLI, a extensão dos dedos somente com o punho em flexão superior a 30° e a extensão ativa do punho caracterizam o tipo:

- a) I
- b) IIA
- c) IIB
- d) III

Questão n°: 26

Na histologia da pele, a espessura da derme em relação à espessura cutânea total é de cerca de:

- a) 5%
- b) 15%
- c) 25%
- d) 35%

Questão n°: 27

O percentual da superfície do escafoide coberta por cartilagem corresponde a cerca de:

- a) 20%
- b) 40%
- c) 60%
- d) 80%

Questão n°: 28

Após transferências tendinosas do antebraço e da mão, segundo OMER, ocorre redução da força muscular em:

- a) Um grau na escala de HIGHET
- b) Dois graus na escala de HIGHET
- c) Três graus na escala de HIGHET
- d) Quatro graus na escala de HIGHET

Questão n°: 29

A etiopatogenia da Síndrome de POLAND tem sido atribuída à:

- a) Interrupção do fluxo sanguíneo na artéria subclávia.
- b) Aumento do fluxo sanguíneo na artéria subclávia.
- c) Interrupção do fluxo sanguíneo na artéria axilar.
- d) Aumento do fluxo sanguíneo na artéria axilar.

Questão n°: 30

Na macrodactilia, de acordo com a classificação de FLATT, a associação entre gigantismo e neurofibromatose ocorre no tipo:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

Questão nº: 31

A infecção que mais frequentemente acomete a mão é:

- a) A foliculite.
- b) O impetigo.
- c) A paroníquia.
- d) O granuloma piogênico.

Questão nº: 32

O cisto sinovial volar do punho se desenvolve mais frequentemente na articulação:

- a) Escafossemlunar
- b) Semilunopiramidal
- c) Escafotrapezoidal
- d) Semilunocapitato

Questão nº: 33

As fraturas da base volar da falange média são consideradas instáveis se envolverem a superfície articular (IFP) em:

- a) Menos de 10%
- b) Menos de 30%
- c) Entre 30% e 40%
- d) Mais de 40%

Questão nº: 34

No tratamento do polegar em gatilho, deve ser liberada a polia:

- a) A1
- b) A2
- c) Oblíqua
- d) Transversa

Questão nº: 35

Na síndrome dolorosa complexa regional, a causalgia corresponde ao tipo:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Questão nº: 36

Na sindactilia complexa, a fusão total dos dedos é mais frequentemente associada a:

- a) Ausência de comprometimento ósseo.
- b) Fusão das falanges distais.
- c) Fusão de todas as falanges.
- d) Fusão das falanges distais e médias.

Questão nº: 37

Na doença de KIENBÖCK, o tratamento cirúrgico com encurtamento do capitato está indicado na presença de:

- a) Variante ulnar neutra
- b) Artrose radiossemilunar
- c) Artrose semilunocapitato
- d) Rotação fixa do escafoide

Questão nº: 38

Na doença de DUPUYTREN, o dedo mais frequentemente acometido é o:

- a) polegar
- b) indicador
- c) anelar
- d) mínimo

Questão nº: 39

O encondroma na mão acomete mais frequentemente:

- a) A falange distal
- b) A falange média
- c) A falange proximal
- d) O metacarpo

Questão nº: 40

O tumor maligno primário do osso que mais frequentemente acomete a mão é o:

- a) Osteossarcoma
- b) Condrossarcoma
- c) Sarcoma de Ewing
- d) Fibrohistiocitoma maligno

Questão n°: 41

Na hanseníase, os nervos da extremidade superior mais e menos acometidos são respectivamente:

- a) Ulnar e o mediano.
- b) Ulnar e o radial.
- c) Mediano e o radial.
- d) Mediano e o ulnar.

Questão n°: 42

Os ligamentos de GRAYSON e de CLELAND estão localizados em relação ao feixe vâsculo nervoso digital, respectivamente:

- a) Volarmente e dorsalmente
- b) Dorsalmente e volarmente
- c) Volarmente e volarmente
- d) Dorsalmente e dorsalmente

Questão n°: 43

A frequência do ligamento retinacular oblíquo de LANDSMEER é inferior 50%, EXCETO na face ulnar do dedo:

- a) Anelar, onde está presente em mais de 90%.
- b) Mínimo, onde está presente em mais de 90%.
- c) Anelar, onde está presente em cerca de 70%.
- d) Mínimo, onde está presente em cerca de 70%.

Questão nº: 44

Na deformidade em botoeira crônica, de acordo com a classificação de BURTON, a presença de contratura fixa, fibrose articular e contratura dos ligamentos colaterais e da placa volar ocorrem no estágio:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

Questão nº: 45

Na mão torta radial, de acordo com a classificação de BAYNE e KLUG, a deficiência de crescimento em ambas as epífises, caracterizando um rádio em miniatura, ocorre no tipo:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

Questão nº: 46

Na artrite reumatoide, a lesão de MANNERFELT corresponde à ruptura do tendão:

- a) Flexor superficial do dedo mínimo.
- b) Extensor próprio do dedo mínimo.
- c) Extensor longo do polegar.
- d) Flexor longo do polegar.

Questão nº: 47

Na deformidade de MADELUNG no paciente esqueleticamente imaturo, a técnica cirúrgica mais bem indicada para o tratamento é:

- a) Liberação do ligamento de VICKERS.
- b) Osteotomia de fechamento radial.
- c) Encurtamento da ulna.
- d) Osteotomia em cúpula.

Questão nº: 48

Na fratura da base do 1º metacarpiano, de acordo com a classificação de GREEN e O'BRIEN, a fratura-luxação de BENETT corresponde ao tipo:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

Questão nº: 49

Na lesão ligamentar escafossesmilunar, de acordo com a classificação artroscópica, a lesão com afastamento suficiente entre os ossos para penetração do artroscópio corresponde ao grau:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

Questão nº: 50

Na síndrome do desfiladeiro torácico, os pacientes se queixam de parestesias no território das raízes:

- a) C4 e C5.
- b) C6 e C7.
- c) C8 e T1.
- d) T2 e T3.

FIM