

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CIRURGIA TORÁCICA

Questão nº: 21

Em um paciente que tem estenose traqueal relacionada a intubação traqueal, e que apesar de traqueostomizado prossegue com sintomas obstrutivos podemos concluir que qual das afirmativas está CORRETA:

- a) A cânula de traqueostomia cedeu à estenose cicatricial.
- b) A cânula de traqueostomia está aquém da estenose cicatricial.
- c) A cânula de traqueostomia agravou a estenose traqueal cicatricial.
- d) As alternativas A e C estão corretas.

Questão nº: 22

Na estenose traqueal pós-intubação os doentes inválidos, que não podem fazer o mínimo de esforço, têm ao redor de quantos milímetros de lume traqueal?

- a) 5 mm
- b) 4 mm
- c) 3 mm
- d) 2 mm

Questão nº: 23

Os sinais e sintomas de estenose traqueal pós-intubação iniciam quando o diâmetro interno da traqueia diminuiu mais de:

- a) 70%
- b) 60%
- c) 50%
- d) 80%

Questão nº: 24

Geralmente os doentes adultos com sinais e sintomas iniciais de estenose traqueal pós-intubação têm o diâmetro interno do lume traqueal menor que:

- a) 10 mm
- b) 9 mm
- c) 8 mm
- d) 7 mm

Questão nº: 25

Após a obtenção do percentual de traqueia que será ressecado para tratamento da estenose, classificamos as estenoses em curtas, intermediárias e longas conforme que percentuais respectivos:

- a) 20%; entre 20% e 40%; maior de 40%.
- b) 15%; entre 15% e 50%; maior de 50%.
- c) 25%; entre 25% e 40%; maior de 40%.
- d) 30%; entre 30% e 50%; maior de 50%.

Questão nº: 26

A localização da estenose traqueal no pré-operatório é muito útil porque auxilia na escolha da via de acesso. Para o acesso cervical qual a afirmativa mais CORRETA?

- a) Adequada somente para tratar o terço proximal.
- b) Adequada somente para tratar o terço médio.
- c) Adequada somente para tratar o terço proximal e o terço médio.
- d) Inadequada para tratar o terço médio.

Questão nº: 27

Por quanto tempo o tubo T de Montgomery deve permanecer no paciente para tratar a estenose traqueal?

- a) 3 meses
- b) 4 meses
- c) 5 meses
- d) 6 meses

Questão n°: 28

Qual das condições abaixo é necessário para exposição da cavidade pleural a pressão atmosférica?

- a) Estabilização das costelas
- b) Pleurostomia
- c) Fixação do mediastino
- d) Traqueostomia

Questão n°: 29

Das fases que classificam o empiema pleural, qual abriga o maior número de opções terapêuticas:

- a) Fase transudativa
- b) Fase exudativa
- c) Fase crônica
- d) Fase fibrinopurulenta

Questão n°: 30

A utilização de substâncias fibrinolíticas no tratamento do empiema na fase de transição propícia:

- a) Nenhuma das afirmativas abaixo.
- b) Redução da morbidade e mortalidade.

- c) Redução do período de hospitalização.
- d) Redução da necessidade de outro método cirúrgico.

Questão nº: 31

Qual dos fatores abaixo NÃO é fator de mau prognóstico?

- a) Abscesso com parede muito espessa
- b) Cavidade > 4cm
- c) Aspiração recorrente
- d) Idade avançada

Questão nº: 32

Qual das opções abaixo é uma complicação do abscesso pulmonar?

- a) Todas as opções abaixo.
- b) Abscesso cerebral.
- c) Amiloidose secundária.
- d) Afogamento por aspiração de vômito.

Questão nº: 33

Qual das opções abaixo NÃO deve ser usada como meio para realizar a anestesia da árvore brônquica:

- a) O próprio aparelho de broncoscopia.
- b) Punção traqueia
- c) Utilização da cânula de Hollinger.
- d) Nenhuma das opções acima.

Questão nº: 34

Na sala de emergência, qual a escolha preferencial da via de acesso inicial ao tórax caso haja indicação?

- a) Toracotomia lateral
- b) Toracotomia póstero-lateral
- c) Toracotomia anterior
- d) Toratotomia ântero-lateral

Questão nº: 35

Diante do achado cirúrgico de rotura no diafragma em uma toracotomia exploradora podemos:

- a) Realizar todas as opções abaixo.
- b) Realizar sutura primária inabsorvível em “u”.
- c) Realizar sutura primária inabsorvível em “x”.
- d) Realizar uma esplenectomia pela toracotomia.

Questão nº: 36

Dos bócios cervicais que descem para o tórax podemos afirmar:

- a) Comumente estende-se atrás da traqueia
- b) Comumente envolve o compartimento médio e posterior do mediastino.
- c) Geralmente descem para a direita no mediastino ântero-superior.
- d) Nenhuma das alternativas acima.

Questão nº: 37

Qual dos achados radiológicos são encontrados no linfagioma mediastinal?

- a) Lobulação
- b) Infiltração de planos teciduais
- c) Multicístico
- d) Todas as opções acima

Questão nº: 38

Sobre as mediastinotomias podemos afirmar o seguinte, EXCETO:

- a) Implicam na não abertura da cavidade pleural.
- b) Serve para abordagem pericárdica subxifoidea.
- c) Serve para abordagem do lobo superior esquerdo do pulmão.
- d) Serve para abordagem do timo.

Questão nº: 39

As esternotomias proporcionam as seguintes vantagens, EXCETO:

- a) Abordagem dos lobos inferiores.
- b) Menor interferência na ventilação.
- c) Acesso simultâneo ao mediastino anterior e as cavidades pleurais.
- d) Todas as afirmativas acima.

Questão nº: 40

Qual das opções abaixo NÃO corresponde a um tipo de toracoplastia?

- a) Toracoplastia anterior
- b) Toracoplastia interna
- c) Toracoplastia externa
- d) Plumbagem

Questão n°: 41

Infrequentes são os relatos de corpos estranhos pulmonares causando erosão e entrada na árvore brônquica. Qual dos itens abaixo NÃO evidencia esta erosão?

- a) Pneumonia
- b) Pneumotórax
- c) Hemoptise
- d) Formação de abscesso

Questão n°: 42

Nos traumas onde há roturas diafragmáticas à direita, nas quais a mobilização hepática por via abdominal é mais difícil, pratica-se qual incisão?

- a) Laparotomia paramediana
- b) Toracofrenolaparotomia
- c) Laparotomia subcostal bilateral
- d) Toracotomia em separado

Questão n°: 43

Qual das condições abaixo é necessária ser admitida para que utilizemos a fórmula de NAKARRARA (cálculo de VEF1 ppo)?

- a) Paciente onde a ventilação pulmonar e a troca gasosa ocorrem de modo homogêneo em todo parênquima pulmonar.
- b) Paciente portador de doença intersticial pulmonar difusa.
- c) Paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica.
- d) Nenhuma das respostas acima.

Questão nº: 44

Qual das medidas abaixo é a mais importante no tratamento da atelectasia no pós-operatório?

- a) Broncoscopia
- b) Ventilação com pressão positiva intermitente (VPPI)
- c) Respiração com pressão expiratória final positiva (PEEP)
- d) Mudança de decúbito

Questão nº: 45

Sobre a herniação cardíaca, uma complicação rara, mas usualmente fatal após pneumonectomia com ligadura intrapericárdica dos vasos, qual das afirmativas abaixo é CORRETA?

- a) A incidência é igual após pneumonectomia direita ou esquerda.
- b) Se a complicação ocorrer à direita, 60% dos pacientes apresentam síndrome compressiva da veia cava superior.
- c) Nos pacientes com herniação esquerda, o fechamento do pericárdio deve ser evitado e proceder-se a pericardiectomia total.
- d) Todas as afirmativas acima estão corretas.

Questão nº: 46

Qual das afirmativas abaixo é INCORRETA?

- a) O sequestro pulmonar extralobar pode apresentar degeneração cística.
- b) O sequestro pulmonar intralobar pode apresentar degeneração cística.
- c) O sequestro pulmonar intralobar pode originar insuficiência respiratória.
- d) Apesar de não existir comunicação direta com a árvore traqueobrônquica, as infecções ocorrem por via hematogênica.

Questão nº: 47

O tratamento médico conservador é efetivo em 80% a 90% dos pacientes com abscesso pulmonar. As indicações para cirurgia de ressecção pulmonar incluem os seguintes itens, EXCETO:

- a) Suspeita de neoplasia
- b) Falência do tratamento médico
- c) Hemorragia
- d) Impossibilidade de drenagem brônquica

Questão nº: 48

Baseado no estadiamento do timoma sugerido por MASAOKA, a radioterapia pós-operatória deve ser proposta nos seguintes estágios, EXCETO:

- a) IV B
- b) IV A
- c) III
- d) II

Questão nº: 49

Qual das afirmativas abaixo é INCORRETA?

- a) Os tumores neurogênicos em crianças representam cerca de 35% a 40% dos tumores mediastinais.
- b) 2/3 dos tumores mediastinais em crianças são sintomáticos.
- c) Cerca de 30% dos tumores neurogênicos do mediastino posterior em crianças são malignos.
- d) Dentre os pacientes sintomáticos devido a tumores neurogênicos, cerca de 50% destes possuem neoplasias malignas.

Questão n°: 50

Marque a afirmativa CORRETA:

- a) Alfa-fetoproteína e beta-HCG são em geral elevadas nos seminomas puros.
- b) Alfa-fetoproteína, desidrogenase lática e beta-HCG são bem elevadas nos tumores não seminomatosos.
- c) Alfa-fetoproteína e beta-HCG são em geral elevadas nos tumores seminomatosos e não seminomatosos.
- d) Todas as afirmativas anteriores estão corretas.

FIM