

## **2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

### **PATOLOGIA**

#### **Questão nº: 21**

**Paciente masculino, 47 anos, com queixa de dor testicular há 4 dias. Ultrassom escrotal evidenciando massa hipoeecóica, localizada no testículo direito e medindo aproximadamente 4,0 x 3,8 cm. Após orquiectomia, o exame microscópico evidência lesão constituída por células de núcleo redondo e citoplasma denso, pleomórficas, com alto índice mitótico. Qual o provável diagnóstico?**

- a) Seminoma espermatocítico
- b) Coriocarcinoma
- c) Teratocarcinoma
- d) Tumor de células germinativas

#### **Questão nº: 22**

**Considerando-se as neoplasias primárias das glândulas de Bartholin, qual dentre elas apresenta maior incidência?**

- a) Carcinoma urotelial
- b) Coriocarcinoma
- c) Teratocarcinoma
- d) Tumor de células germinativas

#### **Questão nº: 23**

**Dentre os carcinomas com origem no epitélio superficial da cavidade oral, qual apresenta áreas de diferenciação escamosa ao lado de áreas com diferenciação glandular?**

- a) Carcinoma de células fusiformes (sarcomatóide)
- b) Carcinoma adenoescamoso
- c) Carcinoma de células claras
- d) Carcinoma de células escamosas basalóide

**Questão nº: 24**

**Considerando-se as variantes especiais do carcinoma epidermóide primário do pulmão, qual a principal característica histológica do tipo papilífero bem diferenciado?**

- a) Ilhotas tumorais apresentando paliçada periférica.
- b) Espaços císticos contendo material mucoide ou hialino.
- c) Ausência de invasão estromal e necrose.
- d) Células pequenas com queratinização focal.

**Questão nº: 25**

**Paciente feminina, 63 anos, previamente assintomática. Após realização de Raio X de tórax de rotina, foi evidenciado nódulo solitário, sólido, bem circunscrito, medindo 3,5 cm e localizado no lobo superior direito. A biópsia da lesão evidenciou células poligonais com citoplasma eosinofílico, notando-se ainda intensa reação granulomatosa e deposição de hemossiderina. Qual o provável diagnóstico?**

- a) Hemangioma esclerosante
- b) Hemangiopericitoma
- c) Paraganglioma
- d) Linfangioma

**Questão nº: 26**

**Produto de tireoidectomia total, apresentando ao exame microscópico intenso infiltrado inflamatório linfocitário, ao lado de reação granulomatosa gigantocitária tipo corpo estranho, notando-se ainda áreas de fibrose adjacente. As características histológicas acima citadas ocorrem na:**

- a) Tireoidite linfocítica
- b) Tireoidite de Quervain
- c) Tireoidite de Hashimoto
- d) Tireoidite de Riedel

**Questão n°: 27**

**Lesão nodular de aspecto lobulado e consistência gelatinosa, localizada na glândula parótida direita. O exame microscópico revela numerosos folículos linfóides apresentando hiperplasia linfóide reacional, envolvidos por células epiteliais apresentando citoplasma oncocítico. Qual o diagnóstico?**

- a) Adenoma pleomórfico
- b) Tumor de células granulares
- c) Tumor de Warthin
- d) Adenoma de células basais

**Questão n°: 28**

**Qual das patologias hepáticas abaixo citadas apresenta histologicamente em seus estágios iniciais esteatose, fibrose septal progressiva e infiltrado inflamatório linfocitário periportal, podendo ser facilmente confundida com hepatite crônica?**

- a) Fibrose hepática congênita
- b) Síndrome de Gilbert
- c) Amiloidose
- d) Doença de Wilson

**Questão n°: 29**

**Considerando-se as neoplasias endócrinas primárias do pâncreas, qual dentre elas apresenta padrão sólido ou glandular, e apresenta-se comumente associada à síndrome de Zollinger-Ellison?**

- a) Tumores de células alfa.
- b) Tumores de células beta.
- c) Tumores de células G.
- d) Carcinoma de pequenas células.

**Questão nº: 30**

**Paciente feminina, 17 anos, apresentando quadro de queda do estado geral associada a leucopenia. Evoluiu com síndrome nefrótica, proteinúria e perda progressiva da função renal. A biópsia renal evidenciou glomerulonefrite segmentar proliferativa, acompanhada de intenso infiltrado inflamatório linfocitário, associada a áreas de necrose, afetando cerca de 40% dos glomérulos da amostra. Qual o provável diagnóstico?**

- a) Granulomatose de Wegener
- b) Nefrite Lúpica
- c) Nefropatia por deposição de IgA
- d) Síndrome de Churg-Strauss

**Questão nº: 31**

**Qual a importância de se referir a presença de camada muscular própria em RTU de tumor vesical diagnosticado como o carcinoma urotelial:**

- a) Garantir que a lesão foi totalmente excisada.
- b) Permitir avaliação de infiltração angiolinfática e perineural.
- c) Estabelecer o estadiamento patológico.
- d) Definir o grau histológico.

**Questão nº: 32**

**Sobre o adenocarcinoma seroso do endométrio, é CORRETO afirmar que:**

- a) A graduação histológica depende da atipia arquitetural da neoplasia.
- b) Sempre apresentam atipias de alto grau.
- c) Está relacionado com diagnóstico de câncer em mulheres jovens.
- d) Seus critérios de estadiamento patológico diferem daqueles usados para adenocarcinoma endometriode nos tumores endometriais primários.

**Questão n°: 33**

**A graduação histológica dos gliomas depende dos seguintes fatores, EXCETO:**

- a) Pleomorfismo nuclear
- b) Presença de necrose
- c) Neoformação vascular
- d) Infiltrado linfocitário

**Questão n°: 34**

**Criança de 5 anos de idade apresentou linfadenomegalia cervical unilateral com duas semanas de evolução. A biópsia revelou centros germinativos proeminentes com numerosos imunoblastos. Esses aspectos clínicos e patológicos permitem concluir que o provável diagnóstico é:**

- a) Linfoma não hodgkin
- b) Doença da arranhadura do gato
- c) Linfadenopatia reacional de provável origem viral
- d) Doença fagocítica histiocitária

**Questão n°: 35**

**A forma virchowiana da hanseníase caracteriza-se por:**

- a) Presença de poucos bacilos.
- b) Presença de granulomas.
- c) Presença de linfócitos ao redor de sebáceas.
- d) Presença de macrófagos xantomatosos.

**Questão n°: 36**

**Qual dos achados abaixo correlaciona-se mais especificamente com a morfologia da hepatite viral B?**

- a) Hepatócitos em vidro fosco
- b) Fibrose porta-porta

- c) Corpúsculos hialinos de Mallory
- d) Folículos linfoides peri-ductais

**Questão nº: 37**

**Qual das seguintes alternativas encontra-se mais relacionada com a presença de *H. pylori* na mucosa gástrica?**

- a) Pólipo hiperplásico
- b) Linfoma não-hodgkin
- c) Gastrite aguda
- d) Tumor carcinóide

**Questão nº: 38**

**Qual das alternativas abaixo melhor se relaciona com diagnóstico de Dermatofibrossarcoma Protuberans?**

- a) Histiócitos xantomatosos
- b) Focos de degeneração mixóide
- c) Células gigantes multinucleadas
- d) Macrófagos com hemossiderina

**Questão nº: 39**

**Pode-se afirmar que o HPV está relacionado com qual das seguintes alterações cervicais?**

- a) Pólipo endocervical
- b) Metaplasia tubária
- c) Hiperplasia microglandular
- d) Adenocarcinoma *in-situ*

**Questão n°: 40**

**As fibras de Rosenthal São tipicamente encontradas em qual tumor?**

- a) Astrocitoma pilocítico
- b) Ependimoma
- c) Oligodendrioma
- d) PNET

**Questão n°: 41**

**São padrões específicos de necrose, do ponto de vista morfológico, EXCETO:**

- a) Necrose caseosa
- b) Necrose gordurosa
- c) Necrose liquefativa
- d) Necrose fibrinóide

**Questão n°: 42**

**Os mastócitos são elementos importantes na resposta inflamatória, e são fontes dos seguintes mediadores da inflamação, EXCETO:**

- a) Histamina
- b) Leucotrienos
- c) Óxido nítrico
- d) Prostaglandinas

**Questão n°: 43**

**O aspecto macroscópico denominado “fígado em noz-moscada” é atribuído a qual fenômeno patológico?**

- a) Congestão hepática passiva crônica
- b) Cirrose hepática
- c) Esteatohepatite não-alcoólica
- d) Congestão hepática aguda

**Questão nº: 44**

**Sobre a Síndrome de Marfan, é CORRETO afirmar que:**

- a) Decorre da falha na síntese do colágeno tipo III.
- b) Decorre da falha na síntese de fibrilina-1, que causa problemas na síntese de fibras elásticas.
- c) Decorre de falha na síntese de colágeno tipo VI.
- d) É adquirida e está relacionada ao vírus HHV-8.

**Questão nº: 45**

**A técnica de coloração especial indicada para o diagnóstico de depósitos de amiloide nos tecidos é:**

- a) Tricrômico de masson
- b) Sudan red
- c) Pas com diástase
- d) Vermelho congo

**Questão nº: 46**

**Sobre os aspectos morfológicos da tuberculose, assinale a assertiva CORRETA:**

- a) O Complexo de Ghon corresponde ao foco de consolidação existente no parênquima pulmonar quando da implantação de bacilos inalados.
- b) A tuberculose pulmonar miliar é fruto da disseminação pelo sangue arterial dos bacilos, de volta ao pulmão.
- c) O aspecto microscópico do granuloma tuberculoso é caseação circunscrita por células epitelióides e células gigantes multinucleadas.
- d) Pacientes imunossuprimidos desenvolvem forma não granulomatosa da doença com massas de macrófagos espumosos e sem microrganismos demonstráveis através de colorações ácido-resistentes.



**Questão nº: 47**

**Sobre o linfoma folicular e seu imunofenótipo, assinale o marcador que NÃO é expresso pelas células neoplásicas:**

- a) CD5
- b) CD10
- c) CD20
- d) BLC-6

**Questão nº: 48**

**Sobre os tumores malignos de glândulas salivares, o tumor que possui tropismo por espaços neurais, característica infiltrativa e deficientemente encapsulada, tem morfologia tubular, sólida ou cribriforme, com núcleos compactos, escuros e monocromáticos, com escasso citoplasma é o:**

- a) Carcinoma mucoepidermóide de baixo grau
- b) Carcinoma de células acinares
- c) Carcinoma ex-adenoma pleomórfico
- d) Carcinoma adenóide cístico

**Questão nº: 49**

**Lesões melanocíticas com morfologia celular marcadamente dendrítica, com pigmentação exuberante, e infiltração dérmica difusa e associada a fibrose são características do:**

- a) Nevo displásico
- b) Nevo halo
- c) Nevo congênito
- d) Nevo azul

**Questão nº: 50**

**Sobre as doenças priônicas, assinale a alternativa ERRADA:**

- a) A forma mais comum é a doença de creutzfeld-jakob.
- b) O achado patognomônico é a transformação espongiforme do córtex cerebral ou de estruturas profundas da substância cinzenta.
- c) Não têm caráter transmissível.
- d) É caracterizada pela mudança conformacional da proteína priônica em sua isoforma “scrapie”.

**FIM**