

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PSIQUIATRIA

Questão nº: 21

Todas as alternativas incluem características verdadeiras acerca do sistema de recompensa cerebral, EXCETO:

- a) Ativação da via mesolímbica dopaminérgica.
- b) Reforço de comportamentos hedônicos.
- c) Área tegmental ventral.
- d) A potência de estímulos naturais e substâncias psicoativas é comparável.

Questão nº: 22

A embriaguez patológica caracteriza-se por:

- a) Ingestão compulsiva de grandes quantidades de álcool em fases bem delimitadas de tempo com preservação da lucidez e consciência.
- b) A ingestão de pequenas doses de álcool, crepuscularização da consciência e amnésia lacunar.
- c) Ingestão de pequenas doses de álcool, alucinação tipo macrozoopsia concomitante e convulsão subentrante.
- d) Ingestão de grande quantidade de álcool, acompanhada de euforização do humor seguida da fase comatosa, com relaxamento esfínteriano.

Questão nº: 23

A complicação emergencial mais grave pelo uso de antipsicóticos é a Síndrome Neuroléptica Maligna. Como tratar?

- a) Cessação dos antipsicóticos, dantrolene, bromocriptina, benzodiazepínicos e medidas de resfriamento e hidratação.
- b) Cessação dos antipsicóticos, biperideno e prometazina.

- c) Diminuição dos antipsicóticos, biperideno, prometazina e medidas de resfriamento.
- d) Diminuição dos antipsicóticos, biperideno, mantidan e medidas de resfriamento e hidratação.

Questão nº: 24

Assinale a frase inteiramente INCORRETA:

- a) A forma hebefrênica da esquizofrenia caracteriza-se por degradação maciça da vida mental, delírios de ruína bem estruturado e tem péssimo prognóstico.
- b) Os sintomas fundamentais da esquizofrenia são: mobilidade catatônica, delírios de expansão do Eu, afetividade hipoestésica e ambivalência.
- c) A forma menos grave da esquizofrenia é a forma catatônica e a mais grave é a forma paranoide.
- d) Os sintomas acessórios da esquizofrenia (na terminologia de Bleuler) têm significado de restauração da integridade do Eu pelo processo psicótico.

Questão nº: 25

As características centrais dos transtornos do controle dos impulsos segundo o DSM-IV-TR são:

- a) Risco, tensão e alívio.
- b) Exagero, risco e arrependimento.
- c) Frequência elevada, risco e arrependimento.
- d) Risco, tensão e afetos negativos.

Questão nº: 26

Todas as alternativas são falsas a respeito do *delirium*, EXCETO:

- a) Trata-se de uma síndrome neurocomportamental crônica, decorrente da quebra da homeostase cerebral.
- b) Invariavelmente evolui para a demência, independente da causa do *delirium*.

- c) Deve-se, invariavelmente, a perturbações sistêmicas ou do sistema nervoso central.
- d) Não está associada a maior tempo de permanência hospitalar e pior recuperação funcional.

Questão n°: 27

Em relação aos transtornos psiquiátricos em crianças, assinale a INCORRETA:

- a) A depressão em crianças apresenta-se por humor disfórico ou irritável, o que dificulta o diagnóstico.
- b) O diagnóstico de transtorno bipolar em crianças é dificultado pela presença de sintomas atípicos e episódios mistos.
- c) No autismo, de maneira geral, a inteligência encontra-se preservada.
- d) A esquizofrenia é um transtorno raro na infância, tendo o seu pico de incidência no adulto jovem.

Questão n°: 28

Considerando as alternativas abaixo, assinale a alternativa FALSA:

- a) As terapias psicodinâmicas apóiam-se na teoria de que sentimentos, vontades e ações, não são diretamente regulados pela consciência.
- b) A teoria psicodinâmica obedece a um modelo científico nos moldes da medicina baseada em evidências.
- c) A transferência é um fenômeno inconsciente de direcionamento das pulsões do paciente ao analista.
- d) A contratransferência é um fenômeno inconsciente do terapeuta em resposta à transferência do paciente.

Questão n°: 29

Em relação à epidemiologia da esquizofrenia, é correto afirmar:

- a) É igualmente prevalente em homens e mulheres.
- b) O início é mais precoce em mulheres.

- c) As idades de pico do início são entre 25 e 35 anos para os homens e entre 10 e 25 anos para as mulheres.
- d) O início da esquizofrenia antes dos 10 anos de idade ou após os 60 anos é extremamente comum.

Questão nº: 30

É CORRETO afirmar sobre anorexia nervosa:

- a) A medida que fica mais profunda, aparecem sinais físicos, como hipertermia, taquicardia e lanugem.
- b) Estima-se que a anorexia nervosa ocorra em aproximadamente 15% das meninas adolescentes.
- c) Não necessariamente um medo intenso de ganhar peso e ficar obeso está presente, sendo estas condições consideradas raras.
- d) Fatores biológicos, sociais e psicológicos estão implicados nas causas de anorexia nervosa.

Questão nº: 31

Sobre sono normal e transtornos do sono-vigilância, é INCORRETO afirmar:

- a) O sono é composto de dois estados fisiológicos: sono não REM e sono REM.
- b) A insônia é definida como uma dificuldade de iniciar ou manter o sono.
- c) A síndrome de Kleine-Levin é um tipo de hipersonia, consistindo em períodos recorrentes de sono prolongado com períodos intercalados de sono normal e vigília alerta.
- d) A narcolepsia é considerada um tipo de epilepsia.

Questão nº: 32

Sobre transtorno esquizoafetivo, é INCORRETO afirmar:

- a) A causa é desconhecida.
- b) Como um grupo, pacientes com transtorno esquizoafetivo tem melhor prognóstico do que os afetados por esquizofrenia.
- c) A idade de início para mulheres é mais precoce do que para homens, o contrário da esquizofrenia.
- d) A prevalência do transtorno esquizoafetivo ao longo da vida é de menos de 1%.

Questão nº: 33

Em relação a fibromialgia, marque a opção CORRETA:

- a) Afeta homens e mulheres em proporção equivalente.
- b) Não há comorbidade relevante entre pacientes com fibromialgia e problemas reumatológicos, como artrite reumatoide, lúpus sistêmico e outros.
- c) Antidepressivos não costumam ser usados no tratamento da fibromialgia.
- d) As áreas cervical e torácica são as mais afetadas, mas a dor pode se localizar nos braços, nos ombros, na região lombar ou nas pernas.

Questão nº: 34

Em indivíduos com bulimia nervosa, qual dos seguintes comportamentos é considerado purgação?

- a) Comer grandes quantidades de comida.
- b) Exercício excessivo.
- c) Jejum.
- d) Uso de laxante.

Questão nº: 35

Qual dos seguintes aspectos é característico de indivíduos com transtorno de despersonalização?

- a) Predominância no sexo masculino.
- b) Produção voluntária de sintomas psiquiátricos graves.
- c) Experiência de sentir-se desligado de si próprio.
- d) Maior insight psicológico.

Questão nº: 36

Qual dos seguintes transtornos da personalidade está mais comumente associado à fuga dissociativa?

- a) Esquiva
- b) Histriônica
- c) Narcisista
- d) Esquizotípica

Questão nº: 37

Uma mulher de 24 anos é atendida no setor de emergência após ter cortado superficialmente ambos os antebraços. Sua explicação é que estava triste após término de relacionamento. Quando questionada sobre outros relacionamentos, diz que teve diversos parceiros sexuais, todos em relacionamentos que não duraram mais do que algumas semanas. A que grupo de transtornos da personalidade pertence esse transtorno?

- a) Grupo A
- b) Grupo B
- c) Grupo C
- d) Grupo D

Questão nº: 38

Uma mulher de 33 anos com transtorno bipolar está grávida de 22 semanas. Ela tem tomado ácido valpróico para seus sintomas. É mais provável que um exame de ultrassonografia mostre qual das seguintes anormalidades?

- a) Microcefalia fetal.
- b) Defeito no tubo neural.
- c) Defeito na parede abdominal fetal.
- d) Displasia renal fetal.

Questão n°: 39

Qual o tipo de demência em que se pode encontrar a reação catastrófica de Kurt Goldstein?

- a) Arteriosclerótica
- b) De Creutzfeld – Jacob
- c) De Alzheimer
- d) De Pick

Questão n°: 40

Alguns pacientes podem vir a se queixar de que o seu intestino foi destruído e nunca mais poderá evacuar. Já outros pacientes podem acreditar que sua família deixou de existir e que eles mesmos estão mortos. Nestes casos, podemos estar diante de qual das síndromes abaixo?

- a) Síndrome de Ekbom
- b) Síndrome de Capgras
- c) Síndrome de Fregoli
- d) Síndrome de Cotart

Questão n°: 41

A distímia é conceituada como depressão com sintomatologia de intensidade leve a moderada, que deve ter a duração de, no mínimo:

- a) Vinte e quatro semanas
- b) Trinta dias
- c) Sessenta dias
- d) Um semestre

Questão nº: 42

Os principais neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDHA) são:

- a) Glutamato e Acetil Colina.
- b) Noradrenalina e Dopamina.
- c) Gaba e Dopamina.
- d) Glutamato e Gaba.

Questão nº: 43

Em relação ao estado mental dos pacientes com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), é INCORRETO afirmar que:

- a) As alterações da vontade ou psicomotricidade mais notáveis em pacientes com TOC são compulsões, definidas como comportamentos repetitivos realizados em resposta às obsessões ou de acordo com regras rígidas.
- b) Os tiques são essencialmente fônicos, como pigarrear, ou falar determinadas sílabas ou palavras, incluindo palavrões ou o que acabou de ser falado por outros.
- c) A afetividade de pacientes com TOC caracteriza-se por uma miríade de alterações, incluindo afetos que resultam diretamente das obsessões ou alterações do humor mais globais.
- d) Tiques complexos, que são aqueles que envolvem vários grupos musculares de forma orquestrada, podem ser difíceis de diferenciar de compulsões.

Questão nº: 44

Homem de 24 anos, diagnosticado com esquizofrenia. Entre os sintomas de esquizofrenia, destacam-se: Alucinações, delírios persecutórios e embotamento afetivo. Qual dos seguintes antipsicóticos deve ser EVITADO neste paciente?

- a) Olanzapina
- b) Clorpromazina
- c) Risperidona
- d) Haloperidol

Questão nº: 45

Um paciente de 20 anos de idade, portador de esquizofrenia paranóide, vai ao pronto-socorro levado pela mãe. Ela relata que o filho recusa-se a tomar as medicações há duas semanas. O paciente refere à equipe médica que os remédios são uma forma da mãe envenená-lo. Este fenômeno psicopatológico consiste em:

- a) Alterações do humor
- b) Alterações no curso do pensamento
- c) Alucinação
- d) Alterações no conteúdo do pensamento

Questão nº: 46

A respeito da síndrome de abstinência alcoólica pode-se afirmar que:

- a) O sintoma mais comum é a agitação psicomotora.
- b) O pico da sintomatologia, nos casos não complicados, ocorre entre cinco e sete dias após a parada do consumo alcoólico.
- c) As convulsões repetidas ocorrem em aproximadamente 40% dos dependentes.
- d) No *delirium tremens*, a taxa de mortalidade diminuiu consideravelmente, comparando-se com a taxa de 20% em anos anteriores.

Questão nº: 47

Um jovem de 19 anos é levado ao hospital por “vontade de se matar”. Familiares contam que ele estava bem no dia anterior e acordou “bastante angustiado” no final da manhã. O paciente apresenta-se inquieto e choroso, descrevendo tristeza profunda. Qual a hipótese diagnóstica mais plausível para o caso?

- a) Depressão bipolar
- b) Episódio depressivo grave
- c) Síndrome de abstinência de cocaína
- d) Transtorno dissociativo

Questão nº: 48

O transtorno bipolar difere fundamentalmente do transtorno depressivo recorrente:

- a) Pelas características fenomenológicas distintas das depressões bipolares.
- b) Pela ocorrência de episódios maníacos e/ou hipomaníacos no curso da doença.
- c) Pela resposta ao tratamento profilático: o transtorno bipolar responde aos estabilizadores do humor, e o transtorno depressivo recorrente, somente a antidepressivo.
- d) Não há diferença importante, pois ambos os transtornos se enquadram no antigo conceito de sanidade maníaco-depressiva.

Questão nº: 49

Marque V(verdadeiro) ou F (falso) nas frases abaixo. Em seguida assinale a sequência CORRETA:

- () Delírios e alucinações eram considerados “sintomas acessórios” – não essenciais para o diagnóstico – na esquizofrenia por Eugen Bleuler.
- () Com o advento dos antipsicóticos atípicos, a presença dos chamados “sintomas negativos” não apresenta mais um pior prognóstico na esquizofrenia.

() Aproximadamente 25% dos transtornos afetivos psicóticos apresentam-se com os “sintomas de primeira ordem” descritos por Kurt Schneider.

() Evidências recentes sugerem que a condição de minoria étnica seja um fator de risco mais importante do que baixo nível socioeconômico para o desenvolvimento da esquizofrenia.

a) V, F, V, V

b) F, F, V, F

c) F, V, F, V

d) F, V, V, F

Questão nº: 50

Sobre a tricotilomania, é INCORRETO afirmar:

a) É considerada de etiologia multideterminada.

b) A forma mais grave e crônica do transtorno começa na idade adulta.

c) Existe comorbidade entre tricotilomania e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

d) Se necessário, o diagnóstico clínico de tricotilomania pode ser confirmado por biópsia da pele do escalpo.

FIM