

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

REUMATOLOGIA

Questão nº: 21

São associações significativas entre antígeno leucocitário humano (HLA) dos seguintes tipos e doenças, EXCETO:

- a) HLAB27 e artrite reativa.
- b) HLADR4 e Síndrome de Sjogren.
- c) HLADR4 e artrite reumatoide.
- d) HLAB27 e uveíte anterior aguda.

Questão nº: 22

São mecanismos de autoimunidade, EXCETO:

- a) Mimetismo molecular.
- b) Estimulação por super-antígenos.
- c) Substituição do receptor em linfócito autorreativos.
- d) Adjuvanticidade associada a micróbio e à lesão tecidual.

Questão nº: 23

Os anticorpos podem ocasionar dano tecidual na doença auto-imune. São exemplos de doenças em que esse é o mecanismo patológico envolvido, EXCETO:

- a) Artrite reumatoide
- b) Granulomatose com poliangeíte
- c) Síndrome de Goodpasture
- d) Tireoidite de Hashimoto

Questão nº: 24

São exemplos de doenças auto-ímmunes, EXCETO:

- a) Dermatite herpetiforme
- b) Pênfigo vulgar
- c) Lúpus eritematoso sistêmico
- d) Talassemia major

Questão nº: 25

Dentre os mecanismos patogênicos envolvidos no lúpus eritematoso sistêmico é correto afirmar, EXCETO:

- a) Ativação anômala de imunidade inata.
- b) Inativação anômala de imunidade inata.
- c) Limiars baixos de ativação de imunidade adaptativa.
- d) Eliminação reduzida de imunocomplexos.

Questão nº: 26

A classificação da nefrite lúpica pela *International Society of Nephrology* e a *Renal Pathology Society* incluem, EXCETO:

- a) Nefrite lúpica mesangial mínima.
- b) Nefrite lúpica focal proliferativa.
- c) Nefrite lúpica proliferativa segmentar difusa.
- d) Nefrite lúpica aterosclerótica.

Questão nº: 27

Dentre os critérios neurológicos para diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico da *Systemic Lupus International Collaborating Clinic* (SLICC) NÃO está incluído:

- a) Disfunção cognitiva
- b) Estado confusional agudo
- c) Psicose
- d) Mielite

Questão n°: 28

Podem ser complicações da artrite reumatoide grave, como manifestações extra-articulares, EXCETO:

- a) Mielopatia cervical
- b) Uveíte
- c) Periodontite
- d) Amiloidose

Questão n°: 29

Dentre as complicações do uso crônico de glicocorticoides NÃO está incluída:

- a) Osteoporose
- b) Diabetes
- c) Osteonecrose
- d) Osteopetrose

Questão n°: 30

Correlacione corretamente a EXCEÇÃO na toxicidade descrita abaixo e os fármacos envolvidos:

- a) Oftalmopatia e hidroxicloroquina
- b) Granulocitopenia e sulfassalazina
- c) Leucocitose e sulfassalazina
- d) Hepatopatia e sulfassalazina

Questão n°: 31

Dentre os agentes biológicos utilizados nos tratamentos de doenças das articulações estão incluídos, EXCETO:

- a) Rituximabe.
- b) Tocilizumabe.

- c) Infiximabe.
- d) Alefacepte.

Questão nº: 32

Para diagnosticar febre reumática é necessário que os pacientes apresentem, por exemplo, poliartrite e 3 ou mais manifestações MENORES listadas abaixo (Critérios de Jones, revisados em 1992). Dentre essas manifestações menores NÃO está incluído:

- a) Intervalo P-R aumentado no eletrocardiograma
- b) Hemossedimentação elevada
- c) Leucocitose
- d) Coréia

Questão nº: 33

São características da esclerose sistêmica difusa, EXCETO:

- a) Rara crise renal.
- b) Crise renal comum.
- c) Presença de anticorpo anti topoisomerase I (Scl-70).
- d) Comprometimento cutâneo generalizado.

Questão nº: 34

A síndrome de Sjogren pode causar manifestações extra-glandulares e complicações. As neoplasias mais comumente associadas à doença são:

- a) Melanoma
- b) Glioblastoma
- c) Linfoma
- d) Osteossarcoma

Questão nº: 35

As espondiloartrites são um grupo de enfermidades com manifestações clínicas em comum. Paciente com idade menor de 45 anos, e relato de 4 meses de dor lombar, havendo HLAB27 positivo se pode classifica-lo como espondiloartrite associando um dos elementos abaixo, EXCETO:

- a) Entesite
- b) Psoríase
- c) Sacroileíte ao raio X
- d) Pitting ungueal

Questão nº: 36

Dentre as vasculites pode haver diversas causas para as manifestações clínicas. Podem ser enfermidades em que ocorre deposição de imunocomplexos, EXCETO:

- a) Vasculite lúpica
- b) Vasculite por IgA
- c) Arterite de takayasu
- d) Vasculite crioglobulinemica

Questão nº: 37

O diagnóstico de arterite de takayasu pode ser suspeitado havendo:

- a) Hipotensão
- b) Lesão muscular inflamatória
- c) Ganho de peso
- d) Claudicação de membro superior

Questão nº: 38

A presença de úlceras orais recorrentes e a associação de manifestação clínica abaixo descrita sugere o diagnóstico de doença de Behçet:

- a) Hipertensão
- b) Lesão muscular inflamatória

- c) Perda de peso
- d) Teste de patergia positivo

Questão n°: 39

Dentre os diagnósticos mais frequentes de MONOARTRITES estão:

- a) Artrite reativa
- b) Artrite psoriásica
- c) Gota
- d) Artrite reumatóide

Questão n°: 40

Podem ser agentes farmacológicos indutores de crise de GOTA, EXCETO:

- a) Glicocorticóides
- b) Acido acetil salicílico
- c) Ciclosporina
- d) Hidroclorotiazida

Questão n°: 41

Qual item abaixo tem potencial correlação com complicação grave em paciente com artrite reumatoide em curto prazo?

- a) VHS e PCR persistentemente elevados.
- b) Líquido sinovial com até 20.000 células.
- c) Anti-CCP e fator reumatoide em níveis elevados.
- d) Dor cervical alta.

Questão n°: 42

Homem de 65 anos, com lombalgia crônica, cuja radiografia de coluna lombar evidenciou artrose facetária, discopatia degenerativa, alargamento de corpo de L1 e lesões mistas osteolíticas e osteoblásticas na bacia. Qual melhor hipótese diagnóstica?

- a) Metástase de neoplasia de próstata
- b) Metástase de neoplasia renal
- c) Mieloma múltiplo
- d) Doença de Paget

Questão nº: 43

Em relação as vasculites sistêmicas, qual das doenças apresenta acometimento predominante de vasos de médio calibre?

- a) Vasculite por IgA
- b) Crioglobulinemia
- c) Doença de Kawasaki
- d) Doença do anticorpo anti-MBG (Síndrome de Goodpasture)

Questão nº: 44

Sobre a Policondrite Recidivante, é CORRETO afirmar:

- a) A mielite transversa é a manifestação mais comumente associada.
- b) A condrite nasal é frequente, mas não faz parte dos critérios de classificação.
- c) A condrite auricular é o sítio de manifestação mais comum e atinge 85% dos pacientes em algum momento da doença.
- d) A inflamação auricular de repetição é fator de risco para a perda auditiva progressiva.

Questão nº: 45

A respeito das manifestações extra-articulares da espondilite anquilosante, é correto afirmar que:

- a) Alterações de condução cardíaca são as complicações cardíacas mais comuns.
- b) Síndrome da cauda equina é a mais comum e de maior gravidade.
- c) Amiloidose AL é a causa mais frequente de comprometimento renal.
- d) Espondilodiscite ou lesão de Anderson ocorre preferencialmente na coluna cervical.

Questão nº: 46

A disfagia no lúpus eritematoso sistêmico é geralmente causada por:

- a) Varizes do esôfago
- b) Úlceras do esôfago
- c) Hipomotilidade do esôfago
- d) Candidíase do esôfago

Questão nº: 47

Em relação a manifestação cardíaca na Esclerose sistêmica a fibrose miocárdica está mais comumente relacionada à:

- a) Necrose em banda do músculo cardíaco.
- b) Disfunção sistólica do ventrículo direito.
- c) Hipertensão arterial pulmonar.
- d) Doença pulmonar intersticial.

Questão nº: 48

A manifestação oftalmológica mais comum no LES é:

- a) Episclerite
- b) Uveíte anterior
- c) Esclerite
- d) Ceratoconjuntivite seca

Questão nº: 49

Em relação as causas conhecidas de eritema nodoso, marque a alternativa ERRADA:

- a) Estreptococcia
- b) Anticoncepcionais
- c) Behçet
- d) Febre reumática

Questão n°: 50

A maior causa de mortalidade nos pacientes com doença mista do tecido conectivo, diretamente relacionada à DMTC, é:

- a) Miocardite
- b) Fibrose pulmonar
- c) Vasculite
- d) Hipertensão pulmonar

FIM