



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

044. PROVA OBJETIVA

MÉDICO UROLOGISTA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **08**.

Elas vão substituir você

Quando, em 1956, o cientista da computação americano John McCarthy cunhou o termo “inteligência artificial”, durante uma conferência na universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, a intenção já era desenvolver máquinas capazes de livrar os seres humanos de tarefas de alguma complexidade, porém largamente enfadonhas.

“A proposta é usar todo o nosso conhecimento para construir um programa de computador que saiba e, também, conheça”, resumiu McCarthy, expressando uma ambição que vem de muito antes de ele proferir tais palavras. Uma narrativa mitológica judaica, por exemplo, já apresentava, milênios atrás, a ideia de um ser artificial pensante, o Golem, feito de barro e que serviria os humanos. Na Idade Média, alquimistas chegaram a sonhar em dar vida à criatura por eles batizada de Homunculus. Era apenas um devaneio que o tempo e a ciência se encarregaram de trazer para o plano das realidades.

E a inteligência artificial (IA) de hoje em dia, tal como foi formulada por McCarthy, é a concretização dessa aspiração que se confunde com a história. No entanto, no momento em que a humanidade parece estar perto de construir um robô capaz de substituir o homem em um sem-número de atividades – o Golem do século XXI –, o que poderia ser motivo de unânime comemoração arrasta consigo o pavor de que tais softwares deixem milhões de seres humanos desempregados. A preocupação é tamanha que o tema ganhou lugar de destaque na agenda do Fórum Econômico Mundial – evento anual que reúne líderes políticos e empresariais em Davos. Segundo levantamento feito pela organização do fórum, a soma de empregos perdidos para a IA será de 5 milhões nos próximos dois anos. No estudo, as áreas de negócios mais afetadas serão as administrativas e as industriais.

Um estudo publicado pela consultoria americana McKinsey avalia que em torno de 50% das atividades tidas como repetitivas serão automatizadas na próxima década. Nesse período, no Brasil, 15,7 milhões de trabalhadores serão afetados pela automação. Em todo o mundo, o **legado** da mecanização avançada será de até 800 milhões de pessoas à procura de oportunidades de trabalho. Desse total, boa parte terá de se readaptar, mas 375 milhões deverão aprender competências inteiramente novas para não cair no desemprego.

Nem tudo, entretanto, é pessimismo. Os economistas ingleses Richard e Daniel Susskind, ambos professores de Oxford, defendem a ideia de que quando atribuições são extintas, ou modificadas, os seres humanos se transformam no mesmo ritmo. “O benefício é que os profissionais farão mais, em menos tempo”, defendem. Para eles, a **bonança** tecnológica levará à criação de novos tipos de emprego.

(Veja, 31.01.2018. Adaptado)

- 01.** É correto deduzir, a partir do texto, que o advento de máquinas providas de inteligência apresenta perspectivas negativa e positiva para os humanos, respectivamente:
- (A) o crescimento do desemprego entre os profissionais não especializados; a extinção de atribuições na indústria.
 - (B) a mecanização de processos em ritmo acelerado; a necessidade de readaptação a novas exigências tecnológicas.
 - (C) a possibilidade de os profissionais produzirem mais em menos tempo; a exigência de rápida transformação do trabalhador.
 - (D) a possibilidade de se reduzirem drasticamente postos de trabalho; a criação de novas especialidades.
 - (E) prejuízos às áreas administrativas e de produção industrial; a mudança de comportamentos arraigados.
- 02.** As referências ao Golem judaico e ao Homunculus dos alquimistas são uma forma de o autor
- (A) contextualizar a contemporânea Inteligência Artificial no quadro de um histórico ideal criativo da humanidade.
 - (B) expressar a magnitude da conquista humana de novas tecnologias para substituir velhos padrões.
 - (C) apontar as contradições entre a modernidade e as visões de mundo que acreditavam no sobrenatural.
 - (D) esclarecer ao leitor que o desejo de criar substitutos eletrônicos para o homem é inconcebível e ilusório.
 - (E) estabelecer parâmetros que delimitem a idealização excessiva, afirmando a prevalência do cientificismo.
- 03.** O trecho iniciado pela conjunção “que”, destacado na passagem – A preocupação é tamanha **que o tema ganhou lugar de destaque na agenda do Fórum Econômico Mundial** –, expressa, em relação ao trecho que o precede, o sentido de
- (A) causa.
 - (B) consequência.
 - (C) modo.
 - (D) lugar.
 - (E) concessão.

04. Assinale a alternativa que reescreve livremente passagem do texto de acordo com a norma-padrão de concordância e de regência.
- (A) Afirmam-se que resultados que poderiam resultar a uma unânime comemoração seja capaz de arrastar consigo o medo que tais softwares ocasionem desemprego.
 - (B) Desejos humanos, que existe fazem séculos e até se confundem com a história, concretiza-se pela Inteligência Artificial.
 - (C) Entre as narrativas mitológicas judaicas que haviam, uma já mencionava ao Golem, ao qual se concebiam como ser artificial pensante feito de barro.
 - (D) Tanto o tempo quanto a ciência tratou de apontar como devaneio a ideia dos alquimistas da Idade Média, de gerar a uma criatura chamada Homunculus.
 - (E) Realizam-se em Davos as reuniões do Fórum Econômico Mundial; trata-se de reuniões das quais participam líderes políticos e empresariais.
05. Considere o sentido das palavras destacadas – **legado** da mecanização (4º parágrafo) e **bonança** tecnológica (5º parágrafo) – nos contextos em que se encontram. É correto afirmar que
- (A) ambas estão empregadas em sentido próprio, significando, respectivamente, *testamento* e *avanço*.
 - (B) ambas em sentido próprio, significando, respectivamente, *posses* e *avanço*.
 - (C) ambas estão empregadas em sentido figurado, significando, respectivamente, *aquilo que é transmitido, como efeito, e boa fase*.
 - (D) a primeira está empregada em sentido próprio, significando *bens materiais*; a segunda, em sentido figurado, significando *fase posterior*.
 - (E) a primeira está empregada em sentido figurado, significando *bens transmitidos*; a segunda, em sentido próprio, significando *bondade*.
06. Na passagem – ... a intenção já era desenvolver máquinas capazes de livrar os seres humanos de tarefas de alguma complexidade, **porém** largamente enfadonhas. – a conjunção destacada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:
- (A) não obstante.
 - (B) ademais.
 - (C) caso.
 - (D) contanto que.
 - (E) visto que.
07. Assinale a alternativa em que a expressão posta entre colchetes substitui corretamente a destacada no trecho, segundo a norma-culta de emprego e colocação do pronome.
- (A) ... um ser artificial pensante, o Golem, feito de barro e que **serviria os humanos**. [serviria-os]
 - (B) Uma narrativa mitológica judaica, por exemplo, já **apresentava a ideia...** [a apresentava]
 - (C) ... alquimistas chegaram a sonhar em **dar vida à criatura...** [dá-la vida]
 - (D) ... construir um robô capaz de **substituir o homem...** [substituir-lhe]
 - (E) ...evento anual que **reúne líderes políticos...** [lhes reúne]
08. Assinale a alternativa em que a relação de sentido que existe entre as palavras *pessimismo* (5º parágrafo) e *otimismo* está presente também entre as palavras destacadas nas expressões.
- (A) arrasta o **pavor** / arrasta a **repulsão**.
 - (B) atribuições **extintas** / atribuições **extensivas**.
 - (C) **concretização** dessa aspiração / **corporificação** dessa aspiração.
 - (D) expressando uma **ambição** / expressando um **alento**.
 - (E) tarefas **enfadonhas** / tarefas **estimulantes**.



(Quino, *Toda Mafalda.*)

09. O comentário de Mafalda à resposta de sua mãe revela que, para a menina,

- (A) a mãe tem a expectativa de fazer Mafalda crer em ideais nobres para construir o futuro.
- (B) rir do futuro é uma boa maneira de enfrentar as rotinas e melhorar as relações afetivas.
- (C) as convicções da mãe baseiam-se em uma concepção de vida que desafia o senso comum.
- (D) a afirmação de valores e propósitos, na fala da mãe, não é algo que deva ser levado a sério.
- (E) o destino de cada um está sujeito a reveses, que acabam se transformando em piada.

10. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho.

Empresas brasileiras estão ____ venda e vários grandes grupos já saíram ____ caça de bons alvos para aquisição. Em 16 de março foi anunciada ____ fusão da X com ____ Y, operação que deu origem ____ maior empresa de celulose do mundo.

- (A) à ... à ... a ... à ... a
- (B) a ... à ... à ... a ... à
- (C) à ... à ... a ... a ... à
- (D) a ... a ... a ... à ... a
- (E) à ... a ... a ... à ... à

11. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que

- (A) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar especificamente os direitos relativos à assistência social.
- (B) a seguridade social não pode ser confundida com ações de benemerência ou caridade, assim, seu financiamento não é de responsabilidade da sociedade, mas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (C) em função da sua relevância social é excepcionalmente permitido, desde que regulamentado por lei, que benefício ou serviço da seguridade social seja criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- (D) o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção.
- (E) a organização da seguridade social é de caráter democrático e descentralizado, garantido mediante gestão bipartite, com participação dos trabalhadores e do Governo nos órgãos colegiados.

12. A Constituição Federal estabelece que as políticas que devem garantir que a saúde seja um direito de todos e dever do Estado são de natureza

- (A) social e assistencial.
- (B) social e econômica.
- (C) individual e coletiva.
- (D) ambulatorial e hospitalar.
- (E) assistencial e preventiva.

13. Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. De acordo com a legislação que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, a proporção dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos nesses conselhos deve ser de:

- (A) 10%
- (B) 25%
- (C) 33%
- (D) 50%
- (E) 75%

14. De acordo com a história natural e as formas de prevenção da febre amarela, é correto afirmar que
- (A) a sua vacina pode ser aplicada a partir dos 9 meses de idade, sendo contraindicada apenas para imunodeprimidos e pessoas alérgicas a gema de ovo.
 - (B) cerca de 50% dos casos apresentam a forma mais grave da doença, com insuficiências hepática e renal, icterícia, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso.
 - (C) na modalidade urbana da doença, a única forma de prevenção é a vacina.
 - (D) essa doença é exclusiva das Américas Central e do Sul.
 - (E) os vetores de transmissão da doença, na modalidade silvestre, são os mosquitos dos gêneros *Haemagogus* e *Sabethes*.
15. De acordo com a legislação, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é correto afirmar que
- (A) compete à Secretaria de Estado da Saúde pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.
 - (B) o processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o local, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
 - (C) as únicas portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde devem ser os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência e de atenção psicossocial.
 - (D) a cada dois anos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.
 - (E) o acesso universal e igualitário aos medicamentos da RENAME pressupõe, dentre outros quesitos, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
16. O conjunto de ações que abrange o controle de bens de consumo e o controle da prestação de serviços, que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde, está compreendido no campo da
- (A) medicina preventiva.
 - (B) seguridade sanitária.
 - (C) vigilância sanitária.
 - (D) vigilância epidemiológica.
 - (E) vigilância ambiental.
17. São de notificação semanal no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan
- (A) todos os acidentes de trabalho.
 - (B) os acidentes de trabalho com exposição a material biológico.
 - (C) os acidentes de trabalho ocorridos em crianças e adolescentes.
 - (D) os acidentes por animal peçonhento.
 - (E) os acidentes por animal potencialmente transmissor da raiva.
18. Epizootia significa
- (A) doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde pública.
 - (B) morte de seres humanos causada por animal peçonhento.
 - (C) surto ou epidemia de doença causada por vetor animal.
 - (D) estudo dos vetores animais causadores de doença em seres humanos.
 - (E) doença causada por inseto ou qualquer outro tipo de artrópode.
19. O Calendário Nacional de Vacinação – 2018, do Ministério da Saúde, propõe, no tocante à população adulta (20 a 59 anos), a verificação da situação vacinal e a aplicação, se for o caso, das seguintes vacinas:
- (A) Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral e Dupla Adulto.
 - (B) Hepatite A, Hepatite B, Tríplice Viral e Dupla Adulto.
 - (C) Hepatite A, Febre Amarela, VIP/VOP e Dupla Adulto.
 - (D) Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral e Pneumocócica 10 V (conjugada).
 - (E) Hepatite A, VIP/VOP, Pneumocócica 10 V (conjugada) e Dupla Adulto.
20. Ao longo de 1 ano, foram registrados 5 acidentes de trabalho numa empresa com 100 trabalhadores (empresa A) e, no mesmo período de tempo, foram registrados 20 acidentes de trabalho em outra empresa com 200 trabalhadores (empresa B).
- Com base nesses dados, é correto afirmar que
- (A) não é possível calcular o risco de acidente de trabalho nas duas empresas.
 - (B) o cálculo do risco depende da comparação da prevalência de acidentes nas duas empresas.
 - (C) o risco de acidente de trabalho na empresa B é duas vezes maior que na empresa A.
 - (D) o risco de acidente de trabalho na empresa A é quatro vezes menor que na empresa B.
 - (E) o risco de acidente de trabalho é igual nas duas empresas.

ATUALIDADES

21. O governo anunciou nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, o general da reserva do Exército Joaquim Silva e Luna como novo ministro da Defesa. Ele substituirá Raul Jungmann, deslocado para o recém-criado Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

(Exame, fev. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/FL9oUo>>. Adaptado)

O anúncio chamou a atenção

- (A) pelo fato de ter sido a primeira vez que um militar assume o Ministério da Defesa.
- (B) pelos inúmeros processos e denúncias de corrupção que recaem sobre o indicado.
- (C) pela falta de familiaridade do indicado com os temas da Defesa e da segurança pública.
- (D) pelas declarações polêmicas, favoráveis à ditadura, feitas recentemente pelo indicado.
- (E) pelo perfil militarista e beligerante que a pasta assumiu após a sua troca de comando.

22. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse nesta terça-feira (17 de abril) que o Brasil vai entrar com uma ação na Organização Mundial do Comércio (OMC) por causa do embargo às importações brasileiras.

(Época, abr. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/YmQKKB>>. Adaptado)

A notícia trata do embargo à importação

- (A) pela Rússia da carne de vaca produzida na região Centro-Oeste, sob a alegação de haver uso excessivo de conservantes como o ácido ascórbico, comprometendo a qualidade da carne.
- (B) pela China da soja produzida por alguns conglomerados, sob a alegação de estarem desmatando áreas de proteção ambiental para dedicar à pecuária e à produção agrícola.
- (C) pelos EUA do suco de laranja produzido no interior de São Paulo, sob a alegação de haver uma alta concentração de agrotóxicos que aumenta o problema da toxicidade do produto.
- (D) pela Índia da carne de porco produzida em pequenas e médias propriedades, sob a alegação de não respeitarem os procedimentos exigidos pelos indianos hindus para o consumo de suínos.
- (E) pela União Europeia da carne de frango produzida por alguns frigoríficos, sob a alegação de terem descumprido a regra relacionada à presença de salmonelela.

23. Roraima virou o principal destino no Brasil de quem foge da crise econômica e política na Venezuela. Nos registros da Polícia Federal, mais de 24 mil entraram no estado nos dois primeiros meses deste ano. A prefeitura de Boa Vista calcula que 40 mil estejam vivendo na capital, inclusive em abrigos e praças. O governo de Roraima afirma que não tem condições de lidar com a entrada de tantos venezuelanos no estado.

(G1, abr. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/zf44Ca>>. Adaptado)

A situação descrita no trecho levou o governo estadual de Roraima a solicitar

- (A) a transferência dos imigrantes para outros estados.
- (B) o fechamento da fronteira com a Venezuela.
- (C) uma intervenção militar na segurança pública.
- (D) a expulsão dos venezuelanos atualmente no país.
- (E) a autorização de uso da moeda venezuelana no Brasil.

24. Os Estados Unidos e seus aliados anunciaram na noite desta sexta-feira (13 de abril) que lançaram um ataque em conjunto contra estabelecimentos de armas químicas na Síria, em resposta ao suposto ataque químico no dia 7 de abril. O regime sírio nega o uso de armas químicas, que são proibidas por convenções da ONU. As forças aéreas e marinhas dos três países lançaram os primeiros ataques por volta das 21h de Washington (22h, no horário de Brasília).

(G1, abr. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/o7QujL>>. Adaptado)

Os EUA foram responsáveis pelo ataque junto com

- (A) a Turquia e a Rússia.
 - (B) o Canadá e a Irlanda.
 - (C) o Reino Unido e a França.
 - (D) a Alemanha e a Áustria.
 - (E) a Austrália e o Japão.
25. O candidato governista no Paraguai, Mario Abdo Benítez, venceu as eleições presidenciais no domingo com a promessa de manter o rumo econômico e atrair mais investimentos ao país.

(Terra, abr. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/7Zpoki>>. Adaptado)

Mario Abdo Benítez é um

- (A) líder oriundo das camadas populares e ligado à esquerda.
- (B) político tradicional que luta por pautas da centro-esquerda.
- (C) militante dos povos nativos que luta pela reforma agrária.
- (D) jovem conservador com laços com a última ditadura do país.
- (E) religioso ligado aos católicos e defensor do conservadorismo moral.

26. A partir do Microsoft Windows 7, em sua configuração original, um usuário com permissão de acesso para leitura e gravação em todas as pastas abriu a pasta C:\ARQUIVOS, selecionou o arquivo Projetos.txt e pressionou as teclas CTRL+C. Em seguida, abriu a pasta C:\TEMPORARIO e pressionou as teclas CTRL+V. Finalmente, abriu a pasta C:\PROJETOS e pressionou as teclas CTRL+V novamente. Considerando que as pastas C:\TEMPORARIO e C:\PROJETOS estavam originalmente vazias, assinale a alternativa correta.

- (A) O arquivo Projetos.txt existe apenas nas pastas C:\ARQUIVOS e C:\TEMPORARIO.
- (B) O arquivo Projetos.txt existe apenas nas pastas C:\ARQUIVOS e C:\PROJETOS.
- (C) O arquivo Projetos.txt existe apenas na pasta C:\PROJETOS.
- (D) O arquivo Projetos.txt existe nas 3 pastas mencionadas no enunciado.
- (E) O arquivo Projetos.txt existe apenas na pasta C:\TEMPORARIO.


27. Um usuário copiou e colou uma relação de cidades do estado de SP com códigos de um determinado sistema, para uma planilha do Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, na coluna A. O conteúdo é o código e a cidade, separados por um traço, como é exibido na imagem a seguir.

	A	B
1	Código-Cidade	
2	5-São Paulo	
3	55-Guarulhos	
4	741-Campinas	
5	37-São Bernardo do Campo	
6	51-Santo André	
7	628-São José dos Campos	
8	98-Osasco	
9	35-Ribeirão Preto	
10	80-Sorocaba	
11	72-Mauá	
12	6-São José do Rio Preto	






Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula que deve ser aplicada na célula B2 para que seja exibido apenas o código numérico da cidade da célula A2 que está antes do traço.

- (A) =ESQUERDA(A2;3)
- (B) =ESQUERDA(A2;3) & = LOCALIZAR("-",A2;1)
- (C) =LOCALIZAR("-",A2;1)
- (D) =LOCALIZAR("-",ESQUERDA(A2);1)
- (E) =ESQUERDA(A2; LOCALIZAR("-",A2;1)-1)


28. A partir do Microsoft Word 2010, em sua configuração original, um usuário está editando o seguinte documento e clicou uma vez com o botão principal do mouse sobre o número 1 da lista numerada, deixando esse marcador selecionado e os demais destacados, conforme a imagem a seguir.




Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto quando o usuário pressiona a tecla DEL.



29. Usando o Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original, um usuário criou a seguinte apresentação, com um Botão de Ação no slide 1, configurado com o comando Hiperlink para Último slide.



Algum tempo depois, o usuário incluiu nessa apresentação um novo slide, com um triângulo. Em outro momento, incluiu mais um slide, com uma estrela. Finalmente, movimentou o slide 2, do quadrado, para a última posição, ficando a apresentação com o seguinte aspecto.



Assinale a alternativa que indica corretamente qual slide será exibido quando o usuário clicar no botão de ação do slide 1, no modo de apresentação.

- (A) 2, o slide com o círculo.
- (B) 3, o slide com o triângulo.
- (C) 4, o slide com a estrela.
- (D) 5, o slide com o quadrado.
- (E) Não será exibido nenhum slide.

30. Paulo preparou uma mensagem de correio eletrônico usando o Microsoft Outlook 2010, em sua configuração original, com as características a seguir.

De: paulo@site.com.br

Para: hidalgo@site.com.br, bruna@outrosite.com.br

Cc: isabela@site.com.br

Cco: rogerio@site.com.br

Assunto: ata da reunião

Anexo: ata_reuniao.docx

Isabela respondeu depois de algum tempo, usando a opção Responder a Todos, destacando no corpo do e-mail alterações que precisam ser feitas na ata. Assinale a alternativa que indica corretamente quais usuários receberam as alterações que precisam ser feitas na ata e, portanto, estão atualizados sobre o assunto.

- (A) Paulo, Hidalgo, Bruna e Rogerio.
- (B) Paulo, Hidalgo e Bruna, apenas.
- (C) Paulo, apenas.
- (D) Hidalgo, Bruna e Rogerio, apenas.
- (E) Rogerio, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Paciente portador de adenocarcinoma de próstata foi submetido à prostatectomia radical com linfadenectomia pélvica associada. Durante a cirurgia, ocorreu inadvertidamente secção completa do nervo obturatório do lado esquerdo.

A alteração neurológica esperada no pós-operatório devido a essa lesão é:

- (A) perda de força do músculo adutor da coxa esquerda.
- (B) disfunção erétil.
- (C) perda de sensibilidade da região púbica e porção anterior do escroto à esquerda.
- (D) perda de força do quádriceps femoral esquerdo.
- (E) perda de força do diafragma urogenital.

32. Com relação à doação de órgãos para o transplante renal, nas suas diferentes modalidades, a saber, doador vivo *versus* doador cadavérico, é correto afirmar:

- (A) pela lei, para doador vivo, somente parentes de primeiro grau e cônjuges podem doar; não parentes, só com autorização judicial.
- (B) é proibida a retirada do órgão de doador vivo, quando interditado ou incapaz judicialmente, mesmo com autorização de seu responsável legal.
- (C) no caso de cadáver sem identificação ou abandonado, não é vedada a retirada de órgãos para transplante.
- (D) para ser doador vivo de órgãos, a idade mínima é de 18 anos, correspondente à maioridade legal.
- (E) no diagnóstico de morte encefálica, o exame clínico neurológico, bem como exame complementar, devem ser feitos, necessariamente, por 2 médicos da equipe de captação de órgãos.

33. A hiperplasia prostática benigna (HPB) é a causa mais frequente de aparecimento de sintomas do trato urinário inferior nos homens acima de 40 anos. Esses sintomas podem ser de esvaziamento ou de armazenamento.

Quanto ao tratamento clínico da HPB, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de fitoterápicos é recomendado nos pacientes com quadro clínico leve a moderado. Deve ser usado de forma sistemática e contínua.
- (B) Antimuscarínicos devem ser evitados nos pacientes com predominância dos sintomas de armazenamento, pelo risco de retenção urinária aguda ser elevado.
- (C) Os alfabloqueadores são drogas de primeira linha no tratamento clínico da HPB com sintomas moderados a severos; contudo, não impedem a evolução da doença, tratando somente seus sintomas.
- (D) Os inibidores da 5 Alfa Redutase devem ser utilizados em pacientes com volume prostático estimado acima de 40 g, e a melhora dos sintomas ocorre já no primeiro mês de uso.
- (E) As associações medicamentosas do tipo (alfabloqueadores + antimuscarínicos) ou (alfabloqueadores + inibidores da 5 Alfa Redutase) não devem ser realizadas.

34. O adenocarcinoma de próstata é a neoplasia não cutânea mais comum em homens e a segunda maior causa de morte por câncer masculino. Com relação ao diagnóstico do câncer de próstata, assinale a alternativa correta.

- (A) O toque retal é dispensável frente às novas técnicas de imagem como a tomografia computadorizada, por só identificar lesões já volumosas.
- (B) O diagnóstico só é feito por biópsia, seja por agulha ou por produto de ressecção transuretral de próstata.
- (C) O PSA isoladamente não pode ser utilizado para indicar biópsia de próstata.
- (D) A velocidade do PSA, a relação PSA livre/ PSA total e a densidade do PSA não são parâmetros significativos na avaliação do paciente com elevação de PSA.
- (E) Antecedente familiar de câncer de próstata não aumenta o risco de o paciente desenvolver a doença.

35. O refluxo vesico-ureteral (RVU) primário ou congênito está associado a maior risco de infecção urinária febril na infância. Seu manejo mudou ao longo do tempo: de uma fase inicial operatória, passou para um manejo conservador medicamentoso e, depois, tratamentos minimamente invasivos ou até somente observação. Atualmente o manejo envolve análise de risco.

Há fatores que aumentam os riscos de infecção urinária associados ao refluxo, tais como:

- (A) sexo masculino.
- (B) idade maior que 4 anos.
- (C) enurese monossintomática.
- (D) cistografia miccional com RVU grau I ou II.
- (E) obstipação intestinal.

36. Paciente de 50 anos, masculino, apresenta-se com achado incidental em ultrassonografia de nódulo sólido hipocogênico de 3,0 cm em polo inferior do rim esquerdo, sendo completamente assintomático e sem comorbidades como diabetes e hipertensão. Tomografia de tórax, abdômen e pelve para confirmação de diagnóstico e estadiamento mostra lesão sólida heterogênea vascularizada sem gordura de permeio e com focos de necrose, ausência de linfadenomegalias regionais e sem suspeita de invasão vascular ou metástases a distância.

Para tratamento desse paciente, pode-se considerar como melhor indicação:

- (A) nefrectomia parcial, apenas, como tratamento curativo.
- (B) nefrectomia radical e quimioterapia neoadjuvante.
- (C) radioterapia localizada (radiocirurgia).
- (D) crioablação com biópsia + imunoterapia.
- (E) observação vigilante.

37. Paciente do sexo masculino, 67 anos, fumante desde 16 anos, apresentou hematúria indolor com coágulos. Exame de imagem tipo ultrassonografia mostra pólipo de 2,5 cm no assoalho vesical. Face ao exposto, assinale a alternativa que contém a melhor sequência diagnóstica e terapêutica.
- (A) Cistoscopia diagnóstica e ressecção completa da lesão. Se o achado for tumor de alto grau superficial, fazer cistectomia radical e neobexiga ortotópica.
- (B) Ressonância magnética de estadiamento, ressecção da lesão com biopsias ao acaso. Se o achado for tumor de alto grau com invasão da camada muscular própria (T2), sem carcinoma *in situ*, repetir ressecção em seis semanas.
- (C) Tomografia de estadiamento, ressecção transuretral completa do pólipo com biopsias ao acaso. Se o achado anátomo patológico for lesão única de baixo grau + carcinoma *in situ* (Tis), fazer imunoterapia com BCG.
- (D) Tomografia de estadiamento. Se houver suspeita de invasão da parede vesical por lesão infiltrativa na imagem, realizar cistectomia radical e derivação urinária tipo ureteroileostomia cutânea.
- (E) Ressecção transuretral da lesão, tomografia de estadiamento pós-operatória. Se o achado for tumor invasivo até a lâmina própria (T1), realizar quimioterapia neoadjuvante e cistectomia radical.
38. Considerando a anatomia do aparelho gênito-urinário, os traumas dessa região possuem apresentações típicas, de acordo com o mecanismo de lesão e os sintomas. A correlação correta de mecanismo de trauma e hipótese diagnóstica, considerando as relações anatômicas, é:
- (A) Queda a cavaleiro: trauma de próstata com hemopermia.
- (B) Fratura de bacia: trauma de uretra bulbar com retenção urinária.
- (C) Trauma abdominal fechado: rotura de bexiga intraperitoneal se a bexiga estiver cheia.
- (D) Estalido durante relação sexual: rotura de freio peniano com sangramento local e perda da ereção.
- (E) Queda de altura com desaceleração súbita e sem fratura óssea: rotura de bexiga extraperitoneal, se a bexiga estiver vazia.
39. Dados epidemiológicos revelam que a infecção pelo HPV (papilomavírus humano, principalmente pelos tipos 16 e 18) pode estar entre as causas do câncer de pênis. Algumas lesões cutâneas apresentam associação com o câncer de pênis. A lesão que tem maior associação é:
- (A) nevus melanocítico.
- (B) corno cutâneo.
- (C) papulose Bowenoide.
- (D) balanite xerótica obliterante.
- (E) eritroplasia de Queyrat.
40. Com relação à criptorquidia, assinale a alternativa correta.
- (A) Deve-se corrigir por volta dos 4 anos de idade, quando a possibilidade de descida espontânea fica reduzida.
- (B) A ultrassonografia pélvica é o exame de escolha para pesquisar testículos não palpáveis.
- (C) Testículos não palpáveis associados à hipospádia demandam solicitação de cariótipo.
- (D) A prevalência de criptorquidia é semelhante em pacientes prematuros e em pacientes nascidos a termo.
- (E) A laparoscopia diagnóstica baseia-se no ducto deferente para firmar o diagnóstico de agenesia testicular.
41. Com relação à embriologia do trato urinário, o defeito na formação do tubo neural do feto que tem como resultante a mielomeningocele pode gerar graves alterações vesicais chamadas, de forma abrangente, de bexiga neurogênica. Contudo, é possível buscar-se sua prevenção da seguinte forma:
- (A) evitando o contato da gestante com organofosforados e metais pesados como chumbo.
- (B) fazendo suplementação oral de ferro e vitaminas A e D, desde o início da vida sexual da mulher.
- (C) proibindo o uso de álcool durante a gestação.
- (D) usando alimentos fortificados, tais como farinhas contendo folatos.
- (E) respeitando-se intervalo de 6 meses entre parada de uso de anticoncepcional oral e gestação.
42. Os hábitos alimentares da população nas últimas décadas têm levado a um aumento importante da prevalência de adultos obesos. Já se sabe que o peso e o índice de massa corpórea são fatores de risco independentes para litíase do trato urinário. Parece haver grande associação entre resistência periférica à insulina (levando à hiperinsulinemia) e a formação de cálculos. Com base nessas informações, tem-se nos grandes obesos uma tendência de:
- (A) imunodeficiência e cálculos de fosfato amoníaco magnésiano.
- (B) esteatorreia e cálculos de oxalato.
- (C) distúrbio metabólico e cálculos de cistina.
- (D) queda de PH urinário e formação de cálculos de ácido úrico.
- (E) hipocalciúria e cálculos de fosfato de cálcio.

43. Considere a seguinte situação:

Paciente masculino adolescente, 15 anos, que refere dor súbita, com aumento de volume em bolsa testicular à direita, há 4 horas, com suspeita de escroto agudo.

Nesse caso,

- (A) é obrigatória a realização de ultrassonografia com *doppler* para indicação cirúrgica, pensando-se em torção testicular.
- (B) deve-se colher exame de urina com cultura, e introduzir antibioticoterapia empírica pela hipótese de orquitepididimite.
- (C) a hipótese de hérnia encarcerada deve ser excluída por exame de transiluminação do escroto.
- (D) em havendo dúvida etiológica, adota-se conduta expectante, observando evolução do quadro.
- (E) na indisponibilidade de exames comprobatórios, a exploração cirúrgica está indicada pelo risco de perda testicular.

44. Com relação à duplicidade pieloureteral, é correto afirmar que

- (A) pela regra de Weigert-Meyer, o ureter da unidade renal superior implanta-se na bexiga cranial e lateralmente ao da unidade renal inferior.
- (B) a unidade inferior pode apresentar refluxo vésico-ureteral ou estenose de junção ureteropielica.
- (C) a ureterocele da unidade inferior tem caráter geralmente obstrutivo.
- (D) perdas urinárias com micção conservada podem sugerir o diagnóstico de ectopia do ureter da unidade inferior.
- (E) megaureter não está associado ao ureter da unidade superior.

45. Considere o caso a seguir.

Paciente masculino de 6 meses de idade. Mãe queixa de aumento intermitente de volume da bolsa testicular direita.

Face ao exposto, a hipótese diagnóstica mais provável é

- (A) teratoma.
- (B) torção de testículo.
- (C) orquite viral.
- (D) hérnia encarcerada.
- (E) hidrocele comunicante.

46. De acordo com a SBU: "O cateterismo vesical intermitente (CVI) é um método que permite o esvaziamento periódico da bexiga pela introdução de um cateter por meio da uretra, ou de um reservatório urinário criado cirurgicamente (neobexiga), por meio de outro canal cateterizável, objetivando-se a preservação do trato urinário superior, controle e prevenção de infecções urinárias e melhora da qualidade de vida".

Face ao exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente o CVI estéril, com uso de luvas, antisséptico e sonda descartável garante a ausência de infecções urinárias.
- (B) Não é recomendada a realização de CVI em neonatos com bexiga neurogênica, pela dificuldade técnica do procedimento.
- (C) Pacientes com válvula de uretra posterior e poliúria descompensada podem se beneficiar de CVI e de cateterismo contínuo noturno.
- (D) Em pacientes adultos, nos casos de déficit motor que inviabilize o autocateterismo, o CVI não deverá ser utilizado.
- (E) Qualquer urocultura positiva, em pacientes realizando CVI, mesmo na ausência de sintomas, deverá ser tratada com antibióticos, de acordo com antibiograma.

47. O conhecimento do estadiamento dos tumores de próstata é fundamental para que o urologista indique e ajude os pacientes a escolherem o melhor tratamento. Assim sendo, considere que um paciente de 67 anos, com prostatismo severo, próstata de 30 g, normal ao toque, e PSA 2,8, foi submetido à ressecção transuretral de próstata. Anátomo patológico: adenocarcinoma de próstata Gleason 6 (3+3) em 10% do material ressecado.

O correto estadiamento desse paciente é

- (A) T0.
- (B) T2.
- (C) pT2.
- (D) T1b.
- (E) pT1a.

48. Com relação às anomalias genitais masculinas, pode-se ter curvatura peniana congênita ou adquirida.

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta.

- (A) A curvatura peniana congênita tem causa desconhecida e, na ausência de anormalidades uretrais, pode ser corrigida cirurgicamente desde a infância.
- (B) A doença de Peyronie, ou curvatura adquirida, tem evolução monofásica, contínua e progressiva.
- (C) Em paciente portador de hipospádia, o grau da hipospádia geralmente não tem relação com o grau de curvatura genital.
- (D) O tratamento cirúrgico da doença de Peyronie necessariamente envolve encurtamento peniano.
- (E) Injeções intralesionais de verapamil, interferon e colagenase não reduzem o grau de curvatura da doença de Peyronie.

49. Paciente do sexo feminino, 55 anos de idade, diagnosticada clínica e urodinamicamente portadora de incontinência urinária de esforço (IUE) e sem hiperatividade detrusora.

De acordo com as diretrizes publicadas pela Sociedade Brasileira de Urologia, referente a opções de tratamento, assinale a alternativa correta.

- (A) Treinamento vesical com micções programadas, perda de peso e tratamento de obstipação não têm impacto no tratamento da IUE.
- (B) O treinamento da musculatura do assoalho pélvico pode ser oferecido como tratamento de primeira linha em pacientes portadoras de IUE.
- (C) *Slings* não podem ser utilizados em qualquer tipo de incontinência urinária de esforço.
- (D) A colpopexia retropúbica apresenta resultado cirúrgico ou eficácia em 1 ano significativamente inferior ao *Sling* sintético.
- (E) *Slings* retropúbicos apresentam menor risco de perfuração vesical que os *Slings* transobturatórios.

50. De acordo com as diretrizes publicadas pela Sociedade Brasileira de Urologia: "A infecção do trato urinário (ITU) é patologia extremamente frequente. Na vida adulta, a incidência de ITU se eleva nas mulheres com picos de maior acometimento relacionados à atividade sexual, durante a gestação ou na menopausa."

Face ao exposto, assinale a afirmação correta em relação à ITU em mulheres adultas.

- (A) Mesmo em cistites não complicadas, é mandatória a realização de exame de imagem para excluir malformações congênitas não diagnosticadas.
- (B) A profilaxia pós-coito é tão eficaz quanto o uso contínuo de antimicrobianos, quando os episódios de infecção estão relacionados com a atividade sexual.
- (C) Há evidências científicas suficientes para recomendar o emprego rotineiro de produtos a base de cranberry na prevenção de ITU.
- (D) A administração tópica de estrogênio ou o uso de estrogênios por via oral previnem a recorrência de infecção do trato urinário em mulheres na menopausa.
- (E) Amoxicilina, cefalexina, nitrofurantoina e sulfametoxazol + Trimetopina são de uso seguro no tratamento de ITU em gestantes, enquanto quinolonas devem ser evitadas.

51. Na embriologia do trato urinário, há estruturas iniciais comuns que evoluem se diferenciando no sexo masculino ou feminino. Dessa forma, há correspondentes da mesma estrutura no homem e na mulher.

Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta.

- (A) Dutos de Wolff: no homem, vias espermáticas (epidídimos, deferentes, vesículas seminais); na mulher, dutos de Malpighi-Gartner.
- (B) Dutos de Muller: na mulher, trompas, útero e os dois terços proximais da vagina; no homem, a próstata.
- (C) Tubérculo Genital: no homem, o pênis; na mulher, o terço distal da vagina.
- (D) Lâminas uretrais: no homem, a uretra; na mulher, os grandes lábios.
- (E) Eminências lábio-escrotais: no homem, a bolsa testicular; na mulher, os pequenos lábios.

52. Paciente masculino, 32 anos, encaminhado por infertilidade conjugal. Esposa de 26 anos, saudável, ciclos menstruais regulares. Há 2 anos sem mecanismos contraceptivos, não obtida gestação. Exame clínico do paciente: sem varicocele e com testículos simétricos, mas de volume diminuído em torno de 8 mL. Espermiograma com menos de 5 milhões de espermatozoides por mL. Viabilidade 16%. Motilidade A+B = 12%. C = 0%. D = 82%. Krueger = 1%.

A próxima etapa de investigação diagnóstica para este paciente é:

- (A) ultrassonografia de bolsa testicular com *doppler* para identificar varicocele subclínica.
- (B) pesquisa da mutação do gene da fibrose cística.
- (C) avaliação do nível de fragmentação do DNA dos espermatozoides.
- (D) cariótipo, Perfil Hormonal e pesquisa de microdeleção do cromossomo Y.
- (E) biópsia de testículo uni ou bilateral.

53. A anestesia para ressecção transuretral de próstata (RTU) é objeto, há anos, de diversos estudos devido às singularidades do procedimento cirúrgico.

Assim sendo, considere o caso: paciente de 74 anos, PSA = 4,8, previamente hígido, com próstata de 70 g e sintomas severos de esvaziamento e armazenamento, foi submetido à RTU de próstata monopolar sob raqui-anestesia nível T10. Após 90 minutos do procedimento, apresentou náuseas, confusão mental, agitação, bradicardia, alargamento de QRS e extrassístoles.

Face ao exposto, a causa mais provável desse quadro é:

- (A) anemia aguda.
- (B) infarto agudo do miocárdio.
- (C) intoxicação hídrica.
- (D) desidratação severa.
- (E) hipotermia.

54. Sífilis é causada pelo *Treponema pallidum* e, tipicamente, apresenta-se como uma lesão indolor, com bordas endurecidas e fundo limpo, o “cancro duro”. O diagnóstico laboratorial compreende exame direto de material da base da lesão em microscopia de campo escuro e reações sorológicas treponêmicas (FTA-abs) e não treponêmicas (VDRL), cuja interpretação deve ser bem conhecida pelo urologista.

Face ao exposto, assinale a alternativa que apresenta a relação correta.

- (A) VDRL não reagente + FTA-abs não reagente no aparecimento do cancro: sem doença, sem contato prévio.
- (B) VDRL não reagente + FTA-abs reagente: doença ativa.
- (C) VDRL 1:2 + FTA-abs reagente: cicatriz sorológica.
- (D) VDRL 1:2, 1:4 + FTA-abs não reagente: contato prévio, sem doença.
- (E) VDRL <1:4 + FTA-abs reagente: doença ativa.

55. A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada de *Mycobacterium tuberculosis*, também conhecida como bacilo de Koch. A doença é muito famosa pelo seu acometimento pulmonar, mas vários outros órgãos do corpo também podem ser infectados pela tuberculose, como o aparelho gênito-urinário.

Assim sendo, é correto afirmar que

- (A) a tuberculose no aparelho urinário (rim e ureter) pode ocorrer em lactentes que ainda não tenham sido vacinados contra a doença.
- (B) cistites que não melhoram com tratamento antibiótico e piúria asséptica persistente classicamente levantam a suspeita de tuberculose urinária.
- (C) a tuberculose no rim tem rápida progressão, evoluindo para destruição do parênquima por granulomas, com risco de formação de abscessos.
- (D) a tuberculose raramente atinge a próstata e, portanto, não altera o PSA.
- (E) a epididimite causada pela tuberculose é geralmente muito dolorosa, dificultando o diagnóstico diferencial com epididimites bacterianas ou virais.

56. A infecção por HPV é uma epidemia global. O controle por vacina é recente e tornou-se meta do Ministério da Saúde, visto que mais da metade dos jovens brasileiros entre 16 e 25 anos possuem algum tipo de HPV. 38,4% são dos subtipos de alto risco mais associados a câncer.

A atual política de vacinação contra HPV no SUS, recentemente revista, recomenda:

- (A) vacinação de meninas de 09 a 14 anos e de meninos entre 11 e 14 anos.
- (B) vacinação somente de meninas abaixo de 16 anos.
- (C) não está liberada a imunização dos portadores do vírus HIV de 09 a 26 anos.
- (D) transplantados e imunossuprimidos não devem receber a vacina.
- (E) pessoas com câncer, em uso de quimioterapia e radioterapia, não se beneficiam dessa imunização.

57. Apresenta-se paciente de 73 anos, masculino, não diabético e sem antecedentes cardiológicos ou neurológicos, com queixa de jato fraco, hesitação inicial, frequência, urgência, nictúria 3 a 4 vezes e sensação de esvaziamento vesical incompleto. Refere qualidade de vida bastante prejudicada pelos sintomas. Antecedente de um episódio de infecção urinária febril, com retenção urinária e sondagem de alívio. PSA = 4,5. Ultrassonografia mostra próstata de 45 g e resíduo pós-miccional de 120 mL.

Nesse momento, dentre as alternativas a seguir, a conduta mais adequada ao caso é:

- (A) ressecção transuretral de próstata.
- (B) estudo urodinâmico completo.
- (C) uso de antimuscarínico.
- (D) prostatectomia retropúbica.
- (E) uso de inibidor da 5 Alfa Redutase.

58. Os tumores de células germinativas do testículo podem ser divididos em seminomatosos e não seminomatosos. Beta-HCG, Alfa Feto Proteína e Desidrogenase Láctica (DHL) são marcadores bioquímicos importantes no diagnóstico e no acompanhamento desses tumores.

Assinale a alternativa que indica em que tipo de tumor a Alfa Feto Proteína não se eleva.

- (A) Teratoma.
- (B) Tumor do saco vitelínico.
- (C) Teratocarcinoma.
- (D) Seminoma puro.
- (E) Carcinoma embrionário.

59. Mulher de 47 anos assintomática, com achado incidental de nódulo hiperecogênico de 2 cm intraparenquimatoso em rim direito. Complementou avaliação com estudo tomográfico com contraste endovenoso, que confirma o nódulo sólido com densidade de – 20UH pré-contraste e 5 UH pós-contraste.

Face ao exposto, o diagnóstico mais provável da lesão renal é:

- (A) nefronia.
- (B) carcinoma de células claras.
- (C) carcinoma de células transicionais.
- (D) abscesso renal.
- (E) angiomiolipoma.

60. Em paciente com tumor de próstata metastático, perde-se a possibilidade de cura da doença, buscando-se, então, seu controle.

Para o tratamento do adenocarcinoma metastático de próstata, é correto afirmar, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), o seguinte:

- (A) o uso de antagonistas de LHRH (Abarelix e Degarelix) deve ser precedido da administração de antiandrogênicos para evitar pico de testosterona inicial.
- (B) a castração cirúrgica não deve ser mais indicada, em razão do abalo psicológico que causa ao paciente.
- (C) agonistas LHRH apresentam como vantagens com relação à orquiectomia a possibilidade de reversibilidade e de permitir emprego intermitente.
- (D) antiandrogênicos não esteroidais (bicalutamida, nilutamida e flutamida) competem apenas com a ação periférica da testosterona, sem interferirem no seu nível sérico, não podendo, portanto, ser usados como monoterapia.
- (E) o emprego de medicamentos que têm como base a ação terapêutica hormonal (abiraterona e a enzalutamida) já é recomendado como terapia de primeira linha.

