



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

MÉDICO NEONATOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **07 (sete) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **40 (quarenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8.

Tomar decisões nem sempre é algo fácil. Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro com suas próprias opiniões.

Agora, imagine você ter uma autoconfiança muito grande e simplesmente não considerar nada disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, constataram que é exatamente o que acontece com pessoas narcisistas.

A origem da palavra “narcisismo” deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que – *spoiler* – morre por se apaixonar por sua própria imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito também chama atenção para o individualismo e a autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas características, o que acaba fazendo com que eles realmente achem que não precisam de nada além de seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão acertada.

Pessoas narcisistas não costumam fazer isso por mal: elas têm uma convicção clara de que já nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.

(Fonte: Superinteressante)

1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta.

- Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões difíceis nunca é uma tarefa fácil.
- Seguir a intuição, procurando seguir sempre as próprias opiniões, é um caminho seguro para se tomar uma boa decisão.
- Considerar as várias possibilidades com criticidade garante o êxito de um empreendimento.
- Abandonar certas opiniões, quando contrárias à análise crítica, pode resultar em uma boa decisão.

2) A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa correta.

- Por ser um texto jornalístico, cuja função é expositiva, o texto não utiliza sequências explicativas na sua composição.
- Os cientistas da universidade canadense de Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias que se relacionam ao mito grego de Narciso.
- A palavra “narcisismo” transformou-se em um conceito utilizado para pensar a sociedade, sendo utilizado em outras áreas do conhecimento, além da mitologia.
- A autoconfiança dos narcisistas oculta um complexo de inferioridade, que eles tentam esconder apresentando-se como pessoas de intelecto acima da média.

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo.

- A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro parágrafo, tem função de prevenir o leitor de que o desfecho da narrativa será revelado, no caso, da narrativa mítica.
- Os narcisistas tendem a se achar autossuficientes, devido ao seu individualismo exagerado e à falta de confiança nas pessoas.
- Apesar de serem inteligentes, os narcisistas, tendem a supervalorizar essa qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-los ao erro.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

4) Leia com atenção a reescrita do trecho e assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente as lacunas.

“_____ crítica óbvia _____ exaltação exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o mito chama atenção para _____ autoconfiança, além de fazer referência ao individualismo do narcisista.”

- à/ à/ a
- há/ à/ à
- a/ a/ à
- à/ a/ a

5) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- No trecho “Ainda que **isso**, vez ou outra”, a palavra destacada tem função anafórica, já que faz referência a uma ideia já enunciada no texto, retomando-a.
- No trecho “Narcisistas geralmente possuem **essas** características”, a palavra destacada tem função catafórica, já que faz referência a uma expressão ainda não enunciada no texto, antecipando-a.
- No trecho “além de **seu** próprio ponto de vista”, a palavra destacada é, morfologicamente, classificada como um pronome demonstrativo.
- No trecho “O problema é **que** os altos níveis de confiança”, a palavra destacada é classificada, morfologicamente, como um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- F, F, V, V.
- V, V, F, F.

6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo e, de acordo com as regras de pontuação previstas na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- Deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega, a origem da palavra “narcisismo”.
- É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, que se origina a palavra “narcisismo”.
- Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.
- A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada em Narciso, o belo jovem da mitologia grega.

7) De acordo as regras de acentuação da Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “portátil”.
- A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “pá”.
- A palavra “você” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “caratê”.
- A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “até”.

8) No trecho “O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, se a expressão grifada fosse substituída pela palavra “nível”, algumas alterações deveriam ser realizadas na frase para que ela permanecesse de acordo com o sentido geral do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a alternativa correta.

- O problema é que o alto nível de confiança que eles tem em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que ele têm em sua habilidade intelectual vira e mexe está equivocado.

Leia a tira abaixo para responder às questões de 9 a 11.



9) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo.

- As reticências na fala da personagem no 1º quadrinho refletem o desânimo da personagem.
- A fala “A gente não aprende tudo na vida?” é uma pergunta retórica, pois a intenção da personagem não é obter uma resposta mas, sim, utilizar a própria pergunta como estratégia de desenvolvimento das suas ideias.
- A fala de Mafalda no último quadrinho surpreende pela crítica ao sistema escola e pela tristeza das festas de formatura, que são comparadas a velórios.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, depois, de acordo com Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente, as suas lacunas.

“A tira acima relaciona às questões pedagógicas _____ questões existenciais _____ problemas são levantados por duas crianças.”

- às / cujos
- as / cujo os
- as / cujos
- às / cujo os

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Considere as duas sentenças abaixo.

A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é mineiro.

B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa não é mineiro.

Assinale a alternativa que contenha o conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de modo que sua negação esteja corretamente expressa pela sentença B.

- a) OU
- b) E
- c) Quando
- d) SE

12) Considere o seguinte quadro de referência de símbolos.

SÍMBOLO	CONECTIVO
~	negação
^	e
v	ou

Dada a frase $p \wedge q$ abaixo, selecione a alternativa que expresse corretamente a sentença: $\sim p \vee \sim q$

“O dia se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês”.

- a) O dia não se renova todo dia e eu não envelheço cada dia, cada mês
- b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês
- c) O dia não se renova todo dia ou eu não envelheço cada dia, cada mês
- d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada dia, cada mês

13) Analise a proposição composta abaixo.

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”.

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Eu não me caso se e somente se eu não compro uma bicicleta
- b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma bicicleta
- c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta
- d) Eu me caso se e somente se eu compro uma bicicleta

14) Leia a proposição composta abaixo.

“Se há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então há influência no resultado apurado”.

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou há influência no resultado apurado
- b) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais e não há influência no resultado apurado
- c) Se não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então não há influência no resultado apurado
- d) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou não há influência no resultado apurado

15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre dois dos grandes filósofos do século XX ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu orientador Bertrand Russell.

“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se recusava a admitir, por exemplo, que não havia rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras.

(Fonte: The independent)

A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação da existência de rinocerontes na sala de aula pode ser interpretada com o argumento:

“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui. Eu *havia* olhado sob aquela e não vi rinocerontes. Eu *olhei* sob essa mesa e não vi rinocerontes. Portanto, não *há* rinocerontes sob as mesas”.

Sobre a classificação lógica deste argumento, assinale a alternativa correta.

- a) dedução
- b) falácia
- c) paradoxo
- d) indução

16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, cuja lógica envolvida no embaralhamento pode ser vista sequencialmente abaixo sobre a palavra LOGICA

original	L	O	G	I	C	A
passo 1	A	C	I	G	O	L
passo 2	C	A	G	I	L	O
resultado	I	L	O	C	A	G

Essa regra pode ser realizada sobre qualquer sequência de seis símbolos, inclusive números. Considere a sequência numérica 311582 que é resultado da aplicação da regra de criptografia acima. Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência numérica original que produziu este resultado.

- a) 181235
- b) 531821
- c) 112358
- d) 231518

17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu time ganhar o próximo jogo. E para o jogo seguinte considera 30% a chance de ganhar e 20% a chance de empatar. Quanto à probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, respectivamente, as combinações vitória e vitória, vitória e empate, vitória e derrota, assinale a alternativa correta.

- a) 18%, 12%, 30%
- b) 90%, 80%, indefinido
- c) 50%, 30%, 20%
- d) 18%, 12%, 70%

18) A tautologia é uma sentença cuja tabela verdade resulta apenas em valores-lógicos verdadeiros. A esse respeito, assinale a alternativa correta que apresenta uma tautologia.

- a) Se eu estou certo, então você está errado
- b) Eu estou certo ou eu estou errado
- c) Eu estou certo e errado
- d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo

19) Considere as proposições abaixo.

P: João teve ciúme de Maria
Q: Maria estava apenas conversando
R: João pediu divórcio

Considere a construção da proposição composta: “Se P e Q, então não-R” ($P \wedge Q \rightarrow \sim R$). De acordo com a lógica proposicional, assinale a alternativa que apresenta a negação correta desta construção de acordo com a lógica proposicional.

- a) João teve ciúme de Maria e Maria estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- b) João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando, então João pediu o divórcio
- d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio

20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a preferência entre dois produtos A e B, 50 pessoas disseram gostar de A, 20 disseram gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A e de B.

Quanto ao número de pessoas que não gostou de nenhum desses produtos e a probabilidade de em um sorteio aleatório, entre as pessoas entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, assinale a alternativa correta.

- a) 100; 20%
- b) 120; 25%
- c) 130; 20%
- d) 120; 20%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Gestante com 38 semanas de idade gestacional, pré-natal sem intercorrências. Indicada cesárea de urgência, por descolamento prematuro de placenta. Feito os primeiros cuidados com o recém-nascido, sendo avaliada respiração irregular e frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto (bpm). Em relação ao próximo passo a ser realizado, assinale a alternativa correta.

- a) Ventilação com Pressão Positiva (VPP) sem oxigênio
- b) VPP com oxigênio
- c) Estimulação com piparote no pé
- d) Aspiração da traquéia sob visualização direta

22) Recém-Nascido (RN) 42 semanas, mãe sem comorbidades, líquido amniótico meconial, nascido de parto vaginal hipotônico e respiração irregular. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para este RN.

- a) Clampeamento imediato, realizar passos iniciais e aspiração da traqueia sob visualização direta
- b) Clampeamento imediato, levar à sala de recepção em berço aquecido, posicionar cervical em leve extensão, secar, aspirar vias aéreas, reposicionar e avaliar frequências cardíaca e respiratória
- c) Clampeamento imediato, realizar passos iniciais com aspiração de vias aéreas superiores e, avaliar frequência cardíaca em 6 segundos e padrão respiratório
- d) Clampeamento entre 1 a 3 minutos, levar à sala de recepção e checar imediatamente a frequência cardíaca para avaliar necessidade de reanimação neonatal

23) Gestante sem comorbidades ou intercorrências durante a gestação. Recém-nascido (RN) 37 semanas nascido de cesárea eletiva, bolsa rota no ato, peso ao nascer 2450 gramas, sem necessidade de reanimação, APGAR 8/9. Evoluiu com desconforto respiratório em sala de parto com batimento de asa nasal e tiragem intercostal, frequência respiratória de 80 movimentos por minuto (mpm) e Saturação 96%. Em relação a melhor conduta inicial para este RN, assinale a alternativa correta.

- a) Coleta de hemograma, proteína C reativa (PCR), hemocultura, e início de antibioticoterapia precoce
- b) Início de CPAP em sala de parto e administração de surfactante
- c) Incubadora aquecida, posicionamento cervical, monitorização e controle térmico
- d) Estímulo ao seio materno, oxigenioterapia e observação seriada

24) O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2018 mostrou que, em um período de dez anos, houve um aumento de 21,7% na taxa de detecção de HIV em gestantes, atingindo taxa de 2,8 casos por 1000 nascidos vivos em 2017. Em relação à prevenção da transmissão vertical, assinale a alternativa incorreta.

- Clampear o cordão umbilical imediatamente e evitar a ordenha de cordão
- Iniciar a primeira dose do AZT logo após os cuidados imediatos ou nas primeiras 4 horas após o nascimento
- Uma das indicações de nevirapina no recém-nascido é o histórico materno de má adesão ao tratamento, mesmo com carga viral menor que 1.000 cópias/ml (mililitros) no 3º trimestre
- Quando indicado, a primeira dose da nevirapina pode ser feita até 24 horas de vida

25) Gestante, primigesta, sorologias negativas, tipagem sanguínea O Rh positivo. Pai: Tipagem B Rh positivo. Recém-nascido (RN) de 37 semanas, com peso ao nascimento 2980g, APGAR 9/10, sem necessidade de reanimação. Durante a visita no alojamento conjunto, RN com 21 horas de vida apresentando icterícia até raiz de coxas, sem demais sintomas. Em relação a melhor conduta para este RN, assinale a alternativa correta.

- Iniciar fototerapia e programar a coleta de exames após 24 horas
- Coletar tipagem sanguínea RN, bilirrubinas totais e frações, hematócrito e reticulócitos, iniciar fototerapia e manter aleitamento materno exclusivo
- Iniciar exsanguíneotransfusão total imediatamente
- Suspender aleitamento materno, iniciar fórmula e fototerapia por 24 horas

26) Recém-Nascido (RN), 38 semanas, filho de mãe com diabetes gestacional com uso de insulina, nascido de cesárea com peso 4500g, comprimento 52 cm, perímetro cefálico 35 cm e perímetro torácico 37 cm. Com 2 horas de vida, RN assintomático, apresentou glicemia capilar 48 mg/dl. Quanto à conduta adequada para o caso, assinale a alternativa correta.

- Estimular aleitamento materno exclusivo e manter controle de glicemia
- Realizar 2ml/kg (mililitros por quilogramas) de glicose 10% em *bolus* e iniciar soro glicosado 10% endovenoso
- Oferecer fórmula infantil para complementar o aleitamento materno e reavaliar glicemia em 30 minutos
- Iniciar glicose 25% endovenosa e reavaliar glicemia com 4 horas de vida

27) Você é médico na UPA, e recebe um Recém-Nascido (RN) de 5 dias de vida para reavaliação. Mãe primigesta, tipagem sanguínea A positivo, sem morbidades durante a gestação, sorologias negativas, pré-natal com 7 consultas. RN nasceu de parto vaginal com 36 semanas e peso 2120 gramas, tipagem sanguínea B positivo, recebeu alta com 34 horas de vida e peso de 1850g, em aleitamento materno exclusivo. Ao exame físico, RN estava com sinais leves de desidratação, icterício até região distal de pernas, peso de 1800g, sem demais alterações. Quanto à etiologia mais provável da icterícia deste recém-nascido, assinale a alternativa correta.

- Icterícia hemolítica ABO
- Icterícia do aleitamento materno
- Icterícia do leite materno
- Colestase neonatal

Leia o enunciado abaixo para responder às questões de 28 a 30.

Gestante secundigesta, 16 anos, tabagista, sem demais morbidades, realizou 4 consultas de pré-natal, com exames de segundo trimestre abaixo.

Tipagem sanguínea - O Negativo
 HIV – teste rápido negativo
 VDRL – 1/32
 Toxoplasmose - IgG negativo / IgM negativo
 Rubéola – IgG positivo / IgM negativo
 Hepatite B – AgHBs negativo / Anti-HBs positivo

No cartão de pré-natal registrado, tratamento com 3 doses de penicilina benzatina no segundo trimestre.

Evoluiu para trabalho de parto vaginal com 38 semanas. Na maternidade, foram realizados os exames abaixo.

HIV teste rápido negativo
 VDRL 1/16
 Toxoplasmose IgG positivo e IgM positivo

28) A avaliação cuidadosa do tratamento da sífilis na gestação é importante para conduzir adequadamente o recém-nascido. Com base na gestante do caso anteriormente descrito, assinale a alternativa correta.

- O tratamento da gestante do caso é considerado adequado, uma vez que foi realizado com 3 doses de penicilina benzatina
- O tratamento da gestante do caso é considerado inadequado, uma vez que não houve queda de 2 titulações do VDRL
- O tratamento da gestante do caso é considerado inadequado, uma vez que não houve registro do tratamento do parceiro
- Se o tratamento tiver sido iniciado até 30 dias antes do nascimento, pode ser considerado adequado

29) Em relação ao Recém-Nascido (RN) exposto à sífilis, assinale a alternativa que apresenta a conduta incorreta para o caso descrito.

- a) Analisar a presença de sinais de sífilis congênita no RN como: rinite serossanguinolenta, pênfigo palmo-plantar e prematuridade
- b) Solicitar todos os exames imediatamente: VDRL, hemograma, líquido e raio-X de ossos longos, independente dos sintomas
- c) A presença de VDRL positivo no RN, com demais exames normais, não confirma o diagnóstico de sífilis congênita e, portanto, não há necessidade de notificação do caso
- d) Se VDRL no líquido negativo e proteinorraquia de 172mg/dl (miligrama por decilitro), o RN deve receber tratamento com Penicilina Cristalina 50.000UI/kg/dose (Unidades internacionais por quilograma por dose) durante 10 dias

30) Com base no caso, em relação à toxoplasmose, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () No segundo trimestre, com sorologia para toxoplasmose IgG e IgM negativas, caracteriza gestante suscetível e deve-se orientar medidas de prevenção como: não ingerir carne crua ou malpassada, lavar cuidadosamente frutas e verduras antes do consumo e evitar contato com fezes de gato.
- () Ao nascimento, a sorologia para toxoplasmose IgG e IgM positivas confirma infecção durante gestação e deve-se coletar todos os exames do recém-nascido e iniciar o tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico por 6 meses.
- () Ao nascimento, com sorologia para toxoplasmose IgG e IgM positivas, deve-se solicitar o teste de avididade para definir conduta no recém-nascido.
- () A soroconversão durante a gestação confirma os diagnósticos de toxoplasmose gestacional e congênita e, portanto, devem ser notificados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V
- b) V, V, F, F
- c) V, F, F, F
- d) F, F, V, V

31) Os procedimentos em recém-nascidos podem levar a dor, que, dependendo da sua intensidade, periodicidade e duração; pode resultar em sequelas a curto e longo prazo. Em relação à dor no período neonatal, assinale a alternativa correta.

- a) A escala de NIPS é utilizada principalmente em recém-nascidos em ventilação mecânica
- b) A analgesia farmacológica, apesar de ser muito indicada, não possui eficácia comprovada na literatura
- c) Os opioides são importantes fármacos para tratamento da dor no período neonatal, e podem ser utilizados, independente das condições clínicas do recém-nascido
- d) A amamentação durante a punção capilar diminui o escore de dor no recém-nascido

32) A sepse é uma das principais causas de morbimortalidade neonatal e seu reconhecimento precoce melhora o prognóstico dos recém-nascidos. Em relação à sepse neonatal, assinale a alternativa incorreta.

- a) São fatores de risco para sepse neonatal precoce: bolsa rota maior que 18 horas, febre materna, asfixia neonatal e prematuridade
- b) Os principais agentes da sepse neonatal precoce são: *Streptococcus agalactiae*, *Listeria monocitogenes* e *Escherichia coli*
- c) O líquido deve ser coletado em todo recém-nascido sintomático com indicação de antimicrobiano e com condições clínicas para o procedimento
- d) Proteína C Reativa (PCR) seriada é padrão ouro para diagnóstico de sepse neonatal

33) A infecção congênita por citomegalovírus é um importante problema de saúde pública, uma vez que, pode levar a consequências graves no período intraútero e neonatal. Apesar disso, sua triagem na gestação é questionável no Brasil pois 90 a 95% das gestantes já tiveram contato com o vírus. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- a) Os sinais mais frequentemente observados na infecção congênita por citomegalovírus são: microcefalia, calcificações difusas, trombocitose
- b) O diagnóstico de infecção congênita por citomegalovírus é confirmado na presença do agente na urina ou saliva nas primeiras 3 semanas de vida
- c) A partir do diagnóstico, todos os recém-nascidos devem ser tratados com ganciclovir ou valganciclovir por, no mínimo, 4 semanas
- d) Para mulheres soronegativas deve-se orientar a prevenção primária com uso de luvas no contato com secreções de gatos e cães

34) O aleitamento materno é o melhor alimento para lactentes até 6 meses de idade. Porém, algumas situações podem contraindicar esta prática. Em relação às contraindicações de aleitamento materno, assinale a alternativa correta.

- a) São contraindicações absolutas de aleitamento materno: HIV, HTLV e hepatite C
- b) O uso de drogas ilícitas na gestação contraindica o aleitamento materno exclusivo
- c) Em lactente portador de galactosemia é contraindicado aleitamento materno
- d) É recomendação de interrupção temporária da amamentação a varicela, se a mãe apresentar vesículas na pele 4 dias antes do parto ou até 3 dias após o parto

35) Recém-nascido a termo, apresentou as seguintes medidas no teste do coraçõzinho: membro superior direito: 98% e membro inferior: 95%, com 28 horas de vida iniciou quadro de taquidispnéia progressiva e dificuldade para mamar. Raio-X tórax apresenta aumento da trama pulmonar e índice cardiotorácico de 0,63. Quanto a cardiopatia mais provável para o caso, assinale a alternativa correta.

- a) Comunicação interventricular
- b) Tetralogia de Fallot
- c) Estenose aórtica
- d) Atresia pulmonar

36) A asfixia perinatal é uma das principais causas de óbito neonatal precoce. De acordo com a Academia Americana de Pediatria (AAP), para o diagnóstico é necessária a presença de alterações neurológicas e de disfunção sistêmica. Sobre os critérios da AAP para asfixia perinatal, assinale a alternativa correta.

- a) pH de sangue de cordão menor que 6,8
- b) Escore de APGAR do quinto minuto menor que 7
- c) Manifestações neurológicas precoces: coma, convulsão, hipotonia
- d) Disfunção sistêmica, como dificuldade de amamentação

37) Um a dois em cada 1000 recém-nascidos precisará de reanimação avançada. Dentre os fármacos utilizados na reanimação neonatal, assinale a alternativa correta.

- a) Adrenalina 1:10.000 – 0,01-0,03mg/kg/dose (miligrama por quilograma por dose)
- b) Cloreto de sódio a 0,9% - 20ml/kg (mililitro por quilograma)
- c) Cloridrato de naloxona – 0,1mg/kg (miligrama por quilograma)
- d) Adrenalina 1:10.000 – 0,1-0,3mg/kg/dose (miligrama por quilograma por dose)

38) Alterações ortopédicas são comuns no período neonatal, a maioria de aspecto benigno se diagnosticado e tratado precocemente. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A displasia do desenvolvimento do quadril deve ser suspeitada na manobra de Ortolani positivo, a qual consiste em movimentos de abdução da perna e adução dos dois quadris.
- () A fratura de clavícula pode estar associada à lesão de plexo braquial, sendo chamada de Erb-Duchenne quando afeta as raízes C5-C6 e causa paralisia, principalmente do ombro e cotovelo; e Klumpke quando afeta as raízes mais baixas (C7-C8-T1).
- () O tratamento do pé torto congênito é por meio de uma imobilização com gesso, técnica chamada Pavlik.
- () A fratura de clavícula é, geralmente, muito sintomática e o tratamento consiste na imobilização por meio do enfaixamento torácico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V
- b) V, V, F, F
- c) V, F, F, F
- d) F, F, V, V

39) O Alojamento Conjunto é o local em que a mulher e o Recém-Nascido (RN) sadio, logo após o nascimento, permanecem juntos, em tempo integral, até a alta. De acordo com o Ministério da Saúde, em relação às indicações de alojamento conjunto, assinale a alternativa incorreta.

- a) RN clinicamente estáveis, com capacidade de sucção e controle térmico; peso \geq 2000 gramas e idade gestacional \geq 34 semanas
- b) Puérperas estáveis e sem contraindicações para a permanência junto ao seu bebê
- c) RN com icterícia, com necessidade de fototerapia
- d) RN com antibioticoterapia para tratamento de sepse neonatal, após a estabilização clínica

40) Todo bebê que nasce no Brasil tem direito a realizar gratuitamente exames muito importantes para a sua saúde. Em relação aos exames de triagem neonatais, assinale a alternativa correta.

- a) Na fase 4 do Teste do Pezinho as doenças triadas são: hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hemoglobinopatias, fibrose cística e hiperplasia adrenal congênita
- b) O teste do olhinho pode detectar doenças como catarata congênita e retinoblastoma e deve ser realizado o mais precocemente, antes da alta hospitalar
- c) O período ideal de coleta do teste do pezinho é do segundo ao quinto dia de vida
- d) O resultado do teste do coraçõzinho será normal se ambas as saturações forem maiores que 95%, e a diferença entre elas menor ou igual a 3%

PCI Concursos