

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ –  
REAPLICAÇÃO DE PROVA EDITAL 01/2017  
PROVA PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL

---

**Língua Portuguesa**

**1) Identifique a frase que exerce a função de predicativo do sujeito.**

- a) Sou favorável a **que o prendam**.
- b) Fabiano tinha a certeza **de que não se acabaria tão cedo**.
- c) Meu maior desejo agora é **que me deixem em paz**.
- d) Mariana teve a sensação **de que alguém a observava**.

**2) As frases abaixo que funcionam como objeto indireto, são:**

- I. Aconselha-o **a que trabalhe mais**.
- II. Ignoramos **como se salvaram**.
- III. Alguém me convencera **de que eu devia jejuar**.
- IV. Perguntei-lhe **quando ia casar**.

A assertiva é:

- a) Somente a II e IV
- b) Somente a I e III
- c) Somente a I e II
- d) Somente a III e IV

**3) Das frases abaixo, identifique a frase cuja conjunção é conclusiva.**

- a) Os sequestradores deviam render-se ou seriam mortos.
- b) O professor não proíbe, antes estimula as perguntas em aula.
- c) Choveu durante a noite, porque as ruas estão molhadas.
- d) Você é o proprietário do carro, portanto é o responsável.

**4) Uma palavra pode ter mais de uma significação. A esse fato linguístico dá-se o nome de:**

- a) Parônimos
- b) Homófonos
- c) Polissemia
- d) Antônimos

**5) Concordância nominal. Assinale a oração correta.**

- a) Ela está meio encabulada com a situação que se criou.
- b) Os jogadores chegaram meio mortos ao hotel.
- c) É proibidas pescas, neste local.
- d) É proibido a caça, nesta propriedade.

**6) Identifique a frase cuja concordância verbal NÃO está correta.**

- a) São verdadeiros abusos para o consumidor.
- b) Os Andes ficam na América do Sul.
- c) Entre nós não haveriam segredos se um morresse.
- d) Menos de dois candidatos disputam a vaga.

**7) Identifique a frase cuja concordância nominal está CORRETA.**

- a) Reformam-se as leis municipais com facilidade.
- b) Comprou-se muitos presentes para os funcionários.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ –  
REAPLICAÇÃO DE PROVA EDITAL 01/2017  
PROVA PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL**

---

- c) Precisam-se de datilógrafas.  
d) Tratavam-se de questões vinculadas a cláusulas péticas da Constituição.

8) “O **desagradável** era vê-lo de **mau** humor depois da **troca** de emprego.”

Na frase acima, as palavras destacadas comportam-se, respectivamente, como:

- a) Substantivo, adjetivo, substantivo.  
b) Substantivo, advérbio, adjetivo.  
c) Adjetivo, advérbio, verbo.  
d) Adjetivo, verbo, adjetivo.

9) **Assinale a questão em que ocorre erro no emprego da palavra parônima.**

- a) Na Idade Média, os monges infligiam a si mesmos castigos corporais.  
b) O iminente doutor fará uma palestra no auditório da universidade.  
c) O submarino emergiu, depois de cinco dias no fundo do mar.  
d) A escola não deferiu o meu pedido de transferência.

10) **Em todos os exemplos a seguir, o diminutivo traduz ideia de afetividade, exceto:**

- a) Deixe-me olhar seu dentinho, minha querida.  
b) Para mim você será sempre a queridinha.  
c) Ele é um empregadinho da nossa firma.  
d) Amorzinho, você vem comigo?

### **ESPECÍFICA**

11) **A organização Mundial de Saúde recomenda que os métodos de exames usados em “check ups” médicos devem dispor de:**

- a) Alta sensibilidade e baixa especificidade;  
b) Baixa sensibilidade e alta especificidade;  
c) Altas sensibilidades e especificidade;  
d) Baixa sensibilidade e especificidade.

12) **Os grupos prioritários do Programa Ampliado de Imunização são:**

- a) Gestantes e menores de 1 ano;  
b) Materno-infantil e trabalhadores;  
c) Gestantes e crianças de 1 a 4 anos;  
d) Materno infantil e adolescentes.

13) **Na análise do hemograma abaixo, qual é o diagnóstico provável?**

- Hemoglobina: 8,8 g/dl;
- Hematócrito: 27%
- Volume corpuscular médio: 118 fl
- Concentração média de hemoglobina: 32 pg
- RDW: 13,1%
- Leucócitos:  $4.100/\text{mm}^3$ , com granulócitos hipersegmentados
- Plaquetas:  $96000/\text{mm}^3$

- a) Anemia secundária e doença crônica.  
b) Anemia moderada secundária e deficiência de ferro.  
c) Anemia megaloblástica.  
d) Pantocitopenia secundária.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ –  
REAPLICAÇÃO DE PROVA EDITAL 01/2017  
PROVA PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL**

---

**Identifique conforme a chave abaixo as definições usadas em epidemiologia, nas quatro questões subsequentes:**

- (a) Anfixenose
- (b) Antroponose
- (c) Antropozoonose
- (d) zoonose

**14) “Infecção transmitida aos animais, a partir do reservatório humano”;**  
( )

**15) “Infecção cuja transmissão se restringe aos seres humanos e assim estes representam o papel de reservatórios”;**  
( )

**16) “Infecção cuja transmissão se processa de maneira intercambiável entre o homem e animais”;**  
( )

**17) “Infecção transmitida ao homem, a partir de reservatório animal”;**  
( )

**18) Paciente 32 anos, procura unidade básica de saúde por queixa de leucorréia fétida, com piora após período menstrual realizado exame a fresco que evidenciou presença de “clue cells”. Qual o possível diagnóstico e conduta?**

- a) Candidíase, prescrevo fluconazol 150 mg via oral dose única
- b) Tricomoníase, prescrevo azitromicina 1 g via oral, dose única, trato parceiro
- c) Tricomoníase, prescrevo azitromicina 1 g via oral, dose única, não necessita tratar parceiro, uma vez que não é doença sexualmente transmissível
- d) Vaginose bacteriana, prescrevo metronidazol 250 mg via oral de 8/8 horas por 7 dias, não necessita tratar parceiro, uma vez que não é doença sexualmente transmissível

**19) Paciente 28 anos, refere ter tido relação sexual desprotegida há 50 horas e não deseja engravidar, qual a conduta**

- a) Medroxiprogesterona 150 mg intramuscular, dose única
- b) Desogestrel 75 mcg via oral de 12/12 hs por 1 dia
- c) Levonorgestrel 0,75 mg de 12/12 hs por 1 dia
- d) Inserção de DIU de cobre

**20) Paciente 28 anos, nega uso de método contraceptivo, nega atraso menstrual, refere dor pélvica que piora no período menstrual, refere dispareunia e sangramento vaginal aumentado. Ao exame identificado dor a palpação de fundo de saco, útero de volume normal, porém com diminuição da mobilidade. Qual o diagnóstico mais provável?**

- a) Mioma
- b) Pólipo
- c) Endometriose
- d) Cisto simples ovariano

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ –  
REAPLICAÇÃO DE PROVA EDITAL 01/2017  
PROVA PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL**

---

- 21) Qual a droga de escolha para o tratamento das convulsões na eclâmpsia?**
- a) Diazepan
  - b) Fenobarbital
  - c) Fenitoína
  - d) Sulfato de magnésio
- 22) Gestante no 1º. Trimestre da gestação veio trazer exames de rotina que evidenciaram glicemia de jejum de 98 mg/dl, podemos afirmar:**
- a) Paciente euglicêmica
  - b) Paciente euglicêmica, conforme rotina realizar teste oral de tolerância a glicose com 75 g de glicose na 24ª. Semana de gestação para rastreio de diabetes gestacional
  - c) Repetir glicemia de jejum, se acima de 94 mg/dl, diagnóstico de diabetes gestacional determinado
  - d) Necessita de realização de teste oral de tolerância de glicose com 75 g de glicose imediatamente para diagnóstico de diabetes gestacional
- 23) Considerando a boca primeira região do sistema digestório e o intestino o último, escolha uma sequência de regiões onde há digestão.**
- a) Estômago, pâncreas e intestino.
  - b) Boca, estômago e intestino delgado.
  - c) Boca, estômago e fígado.
  - d) Estômago, fígado e intestino delgado.
- 24) Carlos 6 anos, não dava sossego à sua mãe enquanto ela cozinhava e acabou por colocar a mão no fogão que estava quente. A reação do menino de retirar a mão do fogão é imediata. O comportamento observado refere-se a:**
- a) Uma atividade do sistema muscular voluntário.
  - b) Um reflexo ( medular) de retirada do membro estimulado.
  - c) Inibição dos receptores de tato, para proteção do menino.
  - d) Ativação dos receptores de tato e retirada voluntária do membro estimulado.
- 25) O sistema nervoso autônomo, também conhecido como neurovegetativo, tem como característica:**
- a) Ter adrenalina como um dos neurotransmissores.
  - b) Ser dividido em sistema simpático, parassimpático e somestésico.
  - c) Apenas acelera os batimentos cardíacos.
  - d) Não estar sob o comando do córtex cerebral.
- 26) Após atividades físicas é comum ingerir isotônicos, porque:**
- a) Para repor água.
  - b) Para mais sais que água.
  - c) Para repor água e sais.
  - d) Para repor apenas sais, afinal não houve perda de água.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ –  
REAPLICAÇÃO DE PROVA EDITAL 01/2017  
PROVA PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL**

---

**27) Sobre a hemoglobina, proteína transportadora dos gases respiratórios, é correta afirmar:**

- a) Sua ligação com o O<sub>2</sub> não é interferida pela presença de CO<sub>2</sub>.
- b) Se liga mais facilmente ao CO<sub>2</sub> do que ao O<sub>2</sub>.
- c) Quanto maior a concentração de CO<sub>2</sub> maior será a afinidade por o O<sub>2</sub>.
- d) Sua ligação com O<sub>2</sub> tem a mesma estabilidade nos pulmões e demais tecidos.

**28) Sobre administração de medicamentos assinale as alternativas verdadeiras (V) e falsas (F) e marque a sequência correta:**

- Um paciente em uso de corticoide deve ser orientado a ingerir bastante líquido, receber uma dieta hipossódica e pobre em potássio.
  - Mulheres em uso de anticoncepcional com prescrição de amoxicilina mais clavulanato devem ser orientadas a adotar medidas complementares com métodos de barreira a fim de se evitar uma gravidez.
  - O anticoncepcional injetável deve se aplicado na via intramuscular com a técnica de trilha em “Z” por ser uma substância oleosa.
  - Na injeção intradérmica a agulha deve ser introduzida a um ângulo de 30°.
  - Pacientes em uso de digoxina devem ser orientados quanto à intoxicação digitálica.
  - A seringa e a agulha utilizada na aplicação de insulina pode ser reaproveitada pelo mesmo paciente se após o uso for lavada, desinfetada com álcool e tampada após o uso.
- a) F – F – V – F – V – F
  - b) V – V – V – F – V – V
  - c) F – F – V – F – V – V
  - d) F – V – V – F – V – F

**29) A aplicação das vacinas tem o adiamento recomendado nas seguintes situações, EXCETO:**

- a) Criança com peso inferior a 2.000g, deve-se adiar BCG e Hepatite B.
- b) As vacinas contra caxumba e rubéola não devem ser administradas nas 2 semanas que antecedem ou até 3 meses após o uso imunoglobulina ou de sangue e derivados.
- c) Crianças em uso de antibiótico.
- d) A vacina contra a febre amarela não deve ser administrada a pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida.

**30) Com relação a Hipertensão arterial (HÁ) assinale as alternativas verdadeiras (V) e falsas (F) e marque a sequência correta: *CANCELADA / Anulada***

- A (HÁ) apresenta maior prevalência e maior risco de lesão em órgãos-alvo e eventos cardiovasculares nos níveis socioeconômicos mais baixos.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ –  
REAPLICAÇÃO DE PROVA EDITAL 01/2017  
PROVA PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL**

---

( ) Na verificação da pressão arterial é importante orientar o paciente a manter as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e manter-se relaxado.

( ) É considerada uma doença crônica, não transmissível, de natureza unifatorial e assintomática.

( ) A pressão diastólica é determinada no desaparecimento do som – fase IV de Korotkoff.

- a) V – V – V – F
- b) V – F – V – F
- c) V – V – V – F
- d) F – V – V – F

**31) O programa prioritário na área de dermatologia sanitária no Brasil, é o controle de:**

- a) Doenças venéreas;
- b) Aids;
- c) Hanseníase;
- d) Dermatoses ocupacionais.

**32) São doenças de notificação compulsória, EXCETO:**

- a) Dengue e Coqueluche;
- b) Difteria e Meningite;
- c) Febre Amarela e Hepatites virais;
- d) Rubéola e Caxumba.

**33) Constitui nível terciário da medicina preventiva:**

- a) Reabilitação;
- b) Diagnóstico precoce;
- c) Proteção específica;
- d) Pronto atendimento

**34) Conforme a O.M.S. (Organização Mundial de Saúde), são vacinas que conferem em média 95% de eficácia:**

- a) Antisarampo, antidiftérica, antipólio e toxóide tetânico;
- b) Antisarampo, antipertussi, antipólio e toxóide tetânico;
- c) Antisarampo, antidiftérica, antipólio e B.C.G. – ID;
- d) Antisarampo, antitifoide, antidiftérica e toxóide tetânico.

**35) A vacinação com BCG, não representa contra indicação para:**

- a) Prematuros com menos de 2.000g;
- b) Recém-nascidos com trauma obstétrico;
- c) Lesões dérmicas;
- d) Nenhuma delas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ -  
REAPLICAÇÃO DE PROVA EDITAL 01/2017  
PROVA PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL**

---

**36) Quando ocorrem vômitos durante a terapia da reidratação oral a conduta mais adequada é:**

- a) Prescrever um anti-emético para evitar a maior espoliação da criança;
- b) Suspender a reidratação oral e adotar a terapia intravenosa;
- c) Diminuir o volume administrado de cada vez e aumentar a frequência da administração.
- d) Diminuir o volume administrado de cada vez e reduzir a frequência da administração.

**37) A medida mais eficaz para reduzir a incidência de gastroenterites no Brasil é:**

- a) O aumento do período médio de aleitamento materno.
- b) A expansão da rede de saneamento básico.
- c) A educação em saúde da família.
- d) O aumento da cobertura de programas de suplementação alimentar das crianças.

**38) Paciente 32 anos vem a consulta com queixa de lesão em vulva, indolor, com aparecimento há 2 dias. Ao exame úlcera única, indolor, bordos bem definidos, fundo limpo. Considerando o diagnóstico mais provável qual o tratamento de escolha:**

- a) azitromicina
- b) doxiciclina
- c) penicilina g benzatina
- d) metronidazol

**39) Paciente 42 anos, portadora de diabetes mellitus em uso de metformina 850 mg/d, queixa-se de prurido vaginal associado a leucorréia esbranquiçada há 3 dias. Ao exame presença de hiperemia vaginal, leucorréia esbranquiçada com placas aderidas em mucosa vaginal, qual o diagnóstico mais provável e conduta:**

- a) candidíase, fluconazol 150 mg via oral, dose única, tratar o parceiro
- b) candidíase, fluconazol 150 mg via oral, dose única, não necessita tratar o parceiro
- c) tricomoníase, azitromicina 1 g via oral dose única, tratar parceiro
- d) vaginose bacteriana, azitromicina 1 g, não tratar parceiro

**40) No Brasil, segundo o MS, a região com maior prevalência da endemia hansênica é:**

- a) Nordeste
- b) Sudeste
- c) Amazônia
- d) Santa Catarina