

HUPAA-UFAL – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO
Nº 010/2014

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

**Cirurgião Dentista - Cirurgia
e Traumatologia
Buco-Maxilo-Faciais**

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS

Texto para responder às questões de **01** a **05**.

O fumo em lugares fechados

Incrível como esse tema ainda gera discussões acaloradas. Como é possível considerar a proibição de fumar, nos lugares em que outras pessoas respiram, uma afronta à liberdade individual?

As evidências científicas de que o fumante passivo também fuma são tantas e tão contundentes, que os defensores do direito de encher de fumaça bares, restaurantes e demais espaços públicos só podem fazê-lo por duas razões: ignorância ou interesse financeiro. Sinceramente, não consigo imaginar terceira alternativa.

Vamos começar pela ignorância. Num país de baixos níveis de escolaridade como o nosso, nem todos têm acesso a conhecimentos básicos. A fumaça expelida dos pulmões fumantes contém, em média, um sétimo das substâncias voláteis e particuladas do total inalado. Já aquela liberada a partir da ponta acesa contém substâncias tóxicas em concentrações bem maiores: três vezes mais nicotina, três a oito vezes mais monóxido de carbono, 47 vezes mais amônia, quatro vezes mais benzopireno e 52 vezes mais DNPB (estes dois, cancerígenos potentes).

Por serem de tamanho menor, as partículas que se desprendem da ponta acesa, produzidas durante 96% do tempo em que um cigarro é consumido, penetram com mais facilidade nos alvéolos pulmonares.

Depois de uma manhã de trabalho num escritório em que várias pessoas fumam, a concentração de nicotina no sangue de um abstêmio pode atingir os níveis de quem tivesse fumado três a cinco cigarros. Empregados de bares e restaurantes, que passam seis horas em ambientes carregados de fumaça, chegam a ter concentrações sanguíneas de nicotina equivalentes a de quem fumou cinco ou mais cigarros.

Mulheres gestantes expostas à poluição do fumo, em casa ou no trabalho, apresentam nicotina não apenas na corrente sanguínea, mas no líquido amniótico e no cordão umbilical do bebê.

[...]

Agora, vamos ao interesse pessoal dos que entendem que proibir a poluição ambiental causada pelo fumo é uma interferência do Estado na liberdade individual. Se ainda não foi inventado um método de exaustão capaz de impedir que a fumaça se dissemine pelo ambiente inteiro, esses senhores defendem o indefensável. Liberdade para através de uma ação individual causar mal à coletividade? Não sejamos ridículos.

Os sindicatos dos empregados de bares e restaurantes, que sempre se levantaram contra a proibição, alegando risco de desemprego (fato que não ocorreu em nenhuma cidade do mundo), que medidas tomaram até hoje para proteger seus associados da poluição ambiental em que trabalham? Alguma vez lutaram para que eles recebessem adicional de insalubridade? Para que tivessem um plano de saúde decente?

Não é função do Estado proteger o cidadão do mal que ele causa a si mesmo. Mas é dever, sim, defendê-lo do mal que terceiros possam fazer contra ele.

(Dráuzio Varella. Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/tabagismo/o-fumo-em-lugares-fechados-3/>. Adaptado.)

01

Considerando as estratégias discursivas escolhidas pelo autor, é correto afirmar que o texto tem por principal objetivo

- A) informar sobre a regulamentação da Lei Antifumo.
- B) explicar, através de dados científicos, os malefícios do tabaco.
- C) inserir práticas contrárias à prática do fumo em locais determinados.
- D) esclarecer a população, com menor escolaridade, acerca dos malefícios do fumo.
- E) argumentar favoravelmente acerca da lei que proíbe o fumo em determinados lugares.

02

De acordo com as ideias apresentadas no texto, é correto afirmar que o autor mostra-se, em relação à liberdade individual,

- A) omissivo.
- B) contrário.
- C) imparcial.
- D) favorável.
- E) implacável.

03

Em “[...] esses senhores defendem o indefensável.” (7º§), o pronome de tratamento indica, do ponto de vista do discurso do autor na defesa de suas ideias,

- A) ironia.
- B) erudição.
- C) admiração.
- D) tratamento respeitoso.
- E) inadequação linguística.

04

Assim como em “[...] uma afronta à liberdade individual?” (1º§), o uso do sinal indicativo de crase também é obrigatório em:

- A) Não vendemos à prazo. D) Não me refiro à secretária experiente.
 B) Os marujos não desceram à terra. E) Fui à casa, mas regresssei em pouco tempo.
 C) Refiro-me à sua matrícula no curso.

05

Considerando que alguns elementos são indispensáveis para que a coesão e a coerência textuais sejam mantidas, em relação ao trecho “Mas é dever, sim, defendê-lo do mal que terceiros possam fazer contra ele.” (9º§), é correto afirmar acerca dos termos destacados que

- A) têm um referente em comum.
 B) os dois fazem referência a “dever”.
 C) fazem referência a termos diferentes.
 D) um poderia ser omitido em função do registro do outro.
 E) o primeiro é exemplo da linguagem culta e o segundo, da coloquial.

Texto para responder às questões de 06 a 10.

Fumo em lugares fechados será vetado no Brasil

Ministério da Saúde regulamenta regras da Lei Antifumo; fumódromo está proibido.

O Ministério da Saúde anunciou ontem, em função das comemorações do “Dia Mundial sem Tabaco”, as regras do decreto que vai regulamentar a Lei Antifumo, aprovada em 2011. As novas normas preveem a proibição do fumo em locais fechados e de uso coletivo em todo o país, extinguindo, inclusive, os fumódromos. Além disso, veta toda e qualquer propaganda comercial, até mesmo nos pontos de venda. Nesses locais, só será possível a exposição dos produtos acompanhada por mensagens sobre perigos do fumo. O decreto da presidente Dilma Rousseff deverá ser publicado amanhã no Diário Oficial e entrará em vigor 180 dias depois.

O consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos ligados ao fumo está proibido em locais de uso coletivo públicos e privados. Isso inclui *hall* e corredores de condomínios, restaurantes, clubes e até pontos de ônibus, não importa se o ambiente é apenas parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou toldo. Em bares e restaurantes, o fumo só será permitido caso haja ambientes totalmente livres, como mesas na calçada. O consumo continuará livre em vias públicas, residências e áreas ao ar livre. As embalagens deverão ter, em 100% da face posterior e em uma de suas laterais, avisos sobre os danos provocados pelo tabaco. Em 2016, o mesmo deverá ser feito também em 30% da face frontal dos maços.

O Ministério da Saúde informou que os fumantes não serão alvo de fiscalização. Isso recairá sobre os estabelecimentos comerciais. Caso não cumpram a lei, eles podem ser advertidos, multados, interditados ou até ter a autorização para funcionamento cancelada. As multas vão de R\$ 2 mil a R\$ 1,5 milhão. A fiscalização ficará a cargo dos órgãos de vigilância sanitária de estados e municípios. Os responsáveis pelos estabelecimentos poderão, inclusive, chamar a polícia quando o cliente se recusar a apagar o cigarro.

Até hoje, não havia definição sobre o conceito de local coletivo fechado, onde o fumo é proibido. Além disso, atualmente ainda são permitidas a existência de fumódromos e a propaganda nos pontos de venda. A regulamentação iguala as normas para todo o Brasil, e extingue as variações no caso dos estados que possuem suas próprias legislações. No Rio, por exemplo, já existe uma lei rigorosa em vigor desde 2009, muito semelhante à estabelecida pelo governo federal. Há algumas diferenças, como os valores de multas, por exemplo. No estado, elas variam de R\$ 3.933 a R\$ 38 mil.

– A Lei Antifumo é um grande avanço. O decreto é fundamental para que possamos continuar enfrentando o tabaco como problema de saúde pública – disse o ministro da Saúde, Arthur Chioro, acrescentando que o propósito não é criminalizar o fumante nem tornar sua vida um inferno. – O tabaco faz mal. Mas é uma droga legal e as pessoas têm direito de usar.

(O Globo, 01 de junho de 2014.)

06

Acerca da construção linguística do título do texto, é correto afirmar que é um exemplo de

- A) voz passiva, com destaque para o agente da ação.
 B) voz passiva, com destaque para o sujeito paciente.
 C) voz ativa, em que o sujeito é também o agente da ação.
 D) voz ativa, pois o sujeito tem destaque na escolha discursiva.
 E) voz passiva sintética, em que o sujeito tem destaque no discurso.

07

De acordo com as ideias e informações do texto, analise as afirmativas.

- I. Dentre as ações que serão colocadas em prática, de acordo com a Lei Antifumo, estão a proibição de qualquer tipo de propaganda do fumo, assim como de seus perigos.
- II. A autonomia dos estados diante da Lei Antifumo permanece no sentido de que as adaptações deverão ser feitas desde que tenham por objetivo combater o fumo.
- III. O decreto que regulamenta a Lei Antifumo contribui para que os prejuízos causados à saúde pelo tabaco sejam vistos e combatidos como problema de saúde pública.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) II e III.

08

O trecho “Além disso, veta toda e qualquer propaganda comercial, até mesmo nos pontos de venda.” (1º§) tem garantida a correção gramatical e preservado o sentido original na reescrita:

- A) Diante disso, a propaganda comercial será proibida, inclusive nos pontos de venda.
- B) Ademais, proíbe toda e qualquer propaganda comercial, inclusive nos pontos de venda.
- C) Para isso, será vetada qualquer propaganda comercial, até mesmo nos pontos de venda.
- D) Até mesmo nos pontos de venda toda e qualquer propaganda comercial será, portanto, vetada.
- E) Inclusive, nos pontos de venda, será vetada – depois disso – toda e qualquer propaganda comercial.

09

- I. “[...] que possuem suas próprias legislações.” (4º§)
- II. “[...] que o propósito não é criminalizar o fumante [...]” (5º§)

Nos dois trechos em destaque, o termo “que” introduz as orações. Acerca desses trechos, assinale a afirmativa correta.

- A) No trecho I ocorre uma especificação; no trecho II, uma impessoalização.
- B) Nos dois trechos, o “que” é empregado como “pronomo relativo”, atuando como elemento de coesão textual.
- C) Enquanto no trecho I ocorre uma generalização, o trecho II tem o papel de aposto de um termo da oração principal.
- D) Nos dois trechos é possível verificar a impessoalidade própria do tipo textual apresentado, marcada pelo uso do “que”.
- E) O trecho I amplia o sentido do termo antecedente, enquanto o trecho II tem a função de completar o verbo antecedente.

10

Apesar do texto apresentado possuir predominantemente uma linguagem denotativa, é possível identificar conotação em

- A) “Isso recairá sobre os estabelecimentos comerciais.” (3º§)
- B) “[...] não é criminalizar o fumante nem tornar sua vida um inferno.” (5º§)
- C) “O decreto da presidente Dilma Rousseff deverá ser publicado amanhã [...]” (1º§)
- D) “[...] a proibição do fumo em locais fechados e de uso coletivo em todo o país, [...]” (1º§)
- E) “O consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos ligados ao fumo está proibido [...]” (2º§)

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

11

Usando a lógica, complete a tabela numérica a seguir.

5	8		26
	12		42
		30	58
11	20	38	74

A soma dos números que completam corretamente a tabela é igual a

- A) 52. B) 59. C) 65. D) 68. E) 73.

12

Um turista, ao chegar a uma determinada cidade, pretende escolher 5 atrações turísticas para visitar. Considere que dentre as 9 atrações disponíveis para visitaç o, 4 sejam gratuitas e as demais, pagas. De quantas maneiras esse turista poder  fazer a escolha das atrações, sendo que pelo menos 2 delas devam ser gratuitas?

- A) 105. B) 120. C) 148. D) 180. E) 225.


13

O segundo, o quarto e o sexto termos de uma progress o aritm tica s o, respectivamente: $2a + 5$, $6a + 3$ e $9a + 7$. Sobre essa seq ncia,   correto afirmar que

- A) a raz o   9. D) o primeiro termo   8.
 B) o valor de a    mpar. E) a soma dos dois primeiros termos   21.
 C) o quinto termo   50.

14

O quadrado no centro da figura tem lado cuja medida corresponde a dois terços da altura h de um dos tri ngulos.



A  rea de toda figura   dada por

- A) $\frac{8h^2}{3}$. B) $\frac{13h^2}{4}$. C) $\frac{16h^2}{9}$. D) $\frac{17h^2}{11}$. E) $\frac{19h^2}{12}$.

15

M rio come u a praticar um novo jogo que adquiriu para seu v deo-game. Considere que a cada partida ele conseguiu melhorar sua pontua o, equivalendo sempre a 15 pontos a menos que o dobro marcado na partida anterior. Se na quinta partida ele marcou 3.791 pontos, ent o, a soma dos algarismos da quantidade de pontos adquiridos na primeira partida foi igual a

- A) 4. B) 5. C) 7. D) 8. E) 10.

LEGISLA O APLICADA   EBSERH

16

O Conselho Consultivo   o  rg o permanente da EBSERH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio   Diretoria Executiva e ao Conselho de Administra o, al m de avaliar e fazer sugest es em rela o ao papel social da EBSERH, de acordo com seus objetivos espec ficos na sociedade. Diante do exposto, analise.

- I. Os membros do Conselho Consultivo ser o indicados, trimestralmente, pelos respectivos  rg os ou entidades, e designados pelo Ministro de Estado da Educa o, sendo sua investidura feita mediante registro na ata da primeira reuni o de que participarem.
- II. A atua o de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo n o ser  remunerada e ser  considerada como fun o socialmente relevante, assegurada a indeniza o das despesas com locomo o, estadia e alimenta o necess rias ao desempenho da fun o.
- III. O Conselho Consultivo reunir-se-  extraordinariamente pelo menos uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicita o do Conselho de Administra o, ou a pedido de um terço dos seus membros.

Est ( o) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) II. C) I e II. D) I e III. E) II e III.

17

O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, é composto por três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação. Compete ao Conselho Fiscal, EXCETO:

- A) Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEERH.
- B) Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores da EBSEERH e verificar o cumprimento de seus deveres legais, estatutários e regimentais.
- C) Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros e quaisquer outros documentos e requisitar informações para essa finalidade.
- D) Opinar a respeito das linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, indicando propostas de melhoria ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva.
- E) Denunciar, por qualquer de seus membros, erros, fraudes ou crimes que identificarem no âmbito da EBSEERH, e propor providências corretivas e saneadoras para o que for identificado.

18

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) é empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. Diante do exposto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A EBSEERH fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- B) Os contratos temporários de emprego poderão ser prorrogados duas vezes, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse cinco anos.
- C) Fica a EBSEERH, para fins de sua implantação, autorizada a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- D) A partir da assinatura do contrato entre a EBSEERH e a instituição de ensino superior, a EBSEERH disporá de prazo de até um ano para reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal.
- E) Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres autorizadas a ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência do contrato, bens e direitos necessários à sua execução.

19

A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação. O Presidente e Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

- A) Brasileiros natos e maiores de trinta e cinco anos.
- B) Brasileiros natos com mais de quinze anos de exercício de função.
- C) Brasileiros maiores de trinta e cinco anos e idoneidade moral e reputação ilibada.
- D) Idoneidade moral e reputação ilibada e com mais de quinze anos de exercício de função.
- E) Idoneidade moral e reputação ilibada; notórios conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde; e, com mais de dez anos de exercício de função.

20

Sem prejuízo de outras que possam ser criadas, são comissões da EBSEERH a Comissão de Ética e a Comissão de Controle Interno. Com base na afirmativa anterior, é correto afirmar que

- A) os membros da Comissão serão designados pelo Presidente para mandatos não coincidentes de dois anos.
- B) a Comissão, por ato próprio, aprovará seu regulamento interno, incluindo suas competências institucionais.
- C) o presidente da EBSEERH poderá constituir Comissão de Controle Interno, composta por sete membros, sendo um representante da Presidência e um representante de cada Diretoria.
- D) a atuação no âmbito da Comissão de Ética não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço privado.
- E) a Comissão de Ética da EBSEERH será vinculada administrativamente à Diretoria, para cumprir plano de trabalho aprovado pela mesma, que proverá o apoio técnico e material para os trabalhos da Comissão.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21

São implicações organizativas do Sistema Único de Saúde, EXCETO:

- A) Equidade.
- B) Regionalização.
- C) Hierarquização.
- D) Descentralização.
- E) Participação social.

22

Municípios limítrofes querem se organizar como “regiões de saúde”, porém não apresentam serviços de vigilância em saúde. Dessa forma, é correto afirmar que os municípios

- A) não podem ser instituídos pelo estado.
- B) podem ser instituídos, pois atendem aos requisitos mínimos.
- C) podem ser instituídos pelo estado, visto que independem dos serviços de vigilância.
- D) podem ser instituídos, pois serviços de vigilância não são critérios para essa formação.
- E) não podem ser instituídos pelo estado, pois não há organização entre municípios para a denominação de regiões de saúde.

23

À direção nacional do Sistema Único de Saúde, compete participar na formulação de políticas de:

- I. saneamento básico;
- II. controle das agressões ambientais;
- III. controle das condições dos ambientes de trabalho.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II e III, apenas.

O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões 24 e 25.

“Determinantes sociais são fatores que impactam diretamente na incidência de diversas doenças. Doenças crônicas e infecciosas são ligadas a esse fator de forma veemente.”

24

Sobre os fatores sociais que são considerados determinantes de doenças, analise.

- I. Renda.
- II. Educação.
- III. Desenvolvimento infantil.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II e III, apenas.

25

É considerada doença associada com maior relevância à determinação social implicada à falta de saneamento básico:

- A) Obesidade.
- B) Ascaridíase.
- C) Cardiopatia.
- D) Trauma ortopédico.
- E) Acidente automobilístico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26

No planejamento cirúrgico dos dentes não irrompidos, o exame radiográfico é de capital importância, sobretudo no tocante à localização dos mesmos. Em relação aos métodos radiográficos para auxiliar a localização dos dentes não irrompidos, analise as afirmativas.

- I. O método de *Miller-Winter* emprega o princípio da tripla incidência. Originalmente, este método foi idealizado para localizar os dentes não irrompidos da região dos molares inferiores.
- II. O método de localização radiográfica de *Donovan* emprega o princípio da dupla incidência. Este método de localização radiográfica visa auxiliar a localização de dentes localizados na região mais posterior de mandíbula, possibilitando a visualização da região radicular do dente não irrompido.
- III. O método de localização radiográfica de *Parma* emprega o princípio da dupla incidência para encontrar dentes não irrompidos na região de molares inferiores. O método emprega uma radiografia intrabucal periapical da região dos dentes molares inferiores e uma radiografia oclusal direta com filme periapical.
- IV. Ao utilizar a técnica de *Clark*, onde se realizou um desvio distorrádial, observou-se que a imagem radiográfica de um canino superior não irrompido apresenta a mesma posição em relação à tomada radiográfica periapical da região. Tal situação indica que o canino superior está situado equidistante do vestíbulo e do palato.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) III e IV.

27

As lesões ósseas que acometem a mandíbula e a maxila podem ser agrupadas em lesões fibro-ósseas benignas, condições metabólicas, neoplasias benignas e malignas. Sobre as lesões ósseas que acontecem a maxila e a mandíbula, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () A osteopetrose é um grupo de desordens esqueléticas raras caracterizadas por um aumento acentuado na densidade óssea resultante de defeito na função normal dos osteoblastos e osteoclastos.
- () A displasia cleidocraniana é uma desordem óssea causada por uma mutação no gene que guia a diferenciação dos osteoblastos.
- () Pacientes com Doença de *Paget* mostram diminuições nos níveis séricos de fosfatase alcalina e elevações nas concentrações séricas de cálcio e de fósforo.
- () A síndrome de *Mazabraud* é associada à displasia fibrosa em combinação com mixomas intramusculares.

A sequência está correta em

- A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) F, V, F, V. D) V, F, F, F. E) V, F, V, V.

28

Acerca das características clínicas da Síndrome do Carcinoma Nevoide Basocelular, condição hereditária autossômica dominante que exhibe alta penetrância e expressividade variável, de acordo com *Brad W. Neville* e colaboradores, analise as afirmativas.

- I. Retardo mental, fibromas ovarianos e meningioma apresentam frequência de aparecimento de 50% ou maior.
- II. Hipertelorismo ocular leve, espinha bífida oculta das vértebras cervicais ou torácicas e foice do cérebro calcificada apresentam frequência de aparecimento de 50% ou maior.
- III. Cistos epidermoides da pele, circunferência craniana aumentada e anomalias das costelas apresentam frequência de aparecimento de 50% ou maior.
- IV. Cifoescoliose, pequenas depressões palmoplantares e meningioma apresentam frequência de aparecimento de 50% ou maior.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II. B) I e IV. C) II e III. D) II e IV. E) III e IV.

29

Sobre as anomalias de desenvolvimento da região bucal e maxilofacial, as quais devem ser do conhecimento do cirurgião bucomaxilofacial, especialmente para avaliação de pacientes encaminhados para análise de cirurgia ortognática, analise as afirmativas.

- I. Na hemi-hiperplasia a cirurgia ortognática somente deve ser realizada quando o crescimento do paciente tiver cessado.
- II. Pacientes portadores da síndrome de *Treacher Collins* apresentam boca e nariz desviados para o lado afetado. Tal alteração de desenvolvimento manifesta-se durante as duas primeiras décadas de vida e começa com atrofia da pele e das estruturas subcutâneas em área localizada da face.
- III. Pacientes com a síndrome de *Crouzon* apresentam hipoplasia de mandíbula e proptose ocular característica.
- IV. Pacientes com disostose mandibulofacial exibem zigomas e mandíbula hipoplásicos. Muitas vezes, os côndilos e os processos coronóides também são hipoplásicos.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II. B) I e IV. C) II e III. D) II e IV. E) III e IV.

30

A remoção de dentes impactados é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados pelos cirurgiões bucomaxilofaciais, e muitos cirurgiões mencionam que a remoção de um terceiro molar é uma das operações mais desafiantes. Em relação aos dentes impactados, analise as afirmativas.

- I. O grupo de estudos de *Belfast*, citado por *Michael Miloro*, argumenta que o desenvolvimento radicular influencia na impacção dos terceiros molares.
- II. Condensação óssea na linha oblíqua externa pode influenciar na impacção de um terceiro molar inferior.
- III. Um 3º molar impactado em uma pessoa de 20 anos com raízes parcialmente desenvolvidas é menos provável de irromper do que um dente similar com as raízes totalmente desenvolvidas.
- IV. Está bem estabelecido que a posição de retenção dos terceiros molares não muda substancialmente após os 18 anos, embora haja alguma evidência de um movimento contínuo até a 4ª década.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV. B) I e II, apenas. C) II e IV, apenas. D) III e IV, apenas. E) I, II e III, apenas.

31

Quando a infecção dentária se difunde profundamente para os tecidos moles, ao invés de extravasar pela superfície através das vias oral ou cutânea, os espaços fasciais podem ser afetados. Sobre a infecção dos espaços fasciais, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () A disseminação da infecção para o espaço canino associa-se com a origem do músculo elevador do lábio superior.
- () A disseminação da infecção para o espaço bucal possui relação com o músculo bucinador para as infecções odontogênicas dos molares localizados na maxila e com o músculo milo-hióideo para as infecções odontogênicas dos molares situados na mandíbula.
- () Os espaços mastigatórios massetérico, pterigomandibular e temporal comunicam entre si com os espaços bucal, submandibular e perifaríngeo. A infecção pode ficar confinada em qualquer um destes compartimentos ou pode se difundir a qualquer ou todos os outros.
- () Os espaços temporais devem ser drenados através de incisão ligeiramente superior ao arco zigomático. A incisão deve ser feita perpendicular ao ramo zigomático, evitando, assim, o nervo facial.

A sequência está correta em

- A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) F, V, F, V. D) V, F, V, V. E) V, F, V, F.

32

“Posteriormente, o espaço sublingual se comunica com o espaço _____. O espaço submental está limitado lateralmente pelo(s) músculo(s) _____.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) parotídeo / platisma
- B) massetérico / digástricos
- C) peritonsilar / milo-hióideo
- D) laterofaríngeo / digástricos
- E) pterigomandibular / milo-hióideo

33

A inserção do freio lingual e labial em pacientes desdentados pode interferir na adaptação e estabilidade da prótese. Acerca do tratamento do freio lingual e labial, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () A zetaplastia está indicada para freios labiais com inserções largas.
- () A vestibuloplastia está indicada para freios labiais com inserções estreitas em suas bases.
- () No tratamento do freio labial com inserção anormal, as suturas devem englobar o periósteo, especialmente no fundo do vestibulo.
- () Fibras superficiais do músculo genioglosso podem contribuir para inserções altas do freio lingual.

A sequência está correta em

- A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) F, V, F, V. D) V, F, F, F. E) V, F, V, V.

34

Pacientes com problemas sistêmicos, algumas vezes, requerem modificações nos cuidados transoperatórios quando uma cirurgia oral é planejada. Sobre os pacientes com condições médicas comprometidas que necessitam de cirurgia bucomaxilofacial, analise.

- I. O tratamento de um problema oral cirúrgico maior eletivo em um paciente que teve um infarto do miocárdio deve ser adiado até, pelo menos, 12 meses após o infarto. Esta protelação baseia-se na evidência estatística de que o risco de um novo infarto diminui o máximo possível após 12 meses.
- II. Entre os sintomas da insuficiência cardíaca congestiva pode-se citar: alargamento da respiração, quando o paciente está em posição supina; e, edema nos tornozelos.
- III. Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) dependem inteiramente dos níveis diminuídos de oxigênio arterial para estimular a respiração. A suplementação com oxigênio, durante a cirurgia, em pacientes com DPOC grave provoca a remoção do estímulo respiratório baseado na hipóxia. A frequência respiratória desses pacientes pode tornar-se criticamente diminuída, se a concentração de oxigênio arterial for elevada pela administração de oxigênio em alta concentração.
- IV. Para *James R. Hupp*, pacientes com hipertensão de leve a moderada, o que equivale dizer pressão sistólica menor que 20 mmHg ou pressão diastólica menor que 110 mmHg, geralmente, não representam um problema para a realização de cirurgia oral ambulatorial.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II. B) I e IV. C) II e III. D) II e IV. E) III e IV.

35

Acerca da trombose cavernosa do seio ou trombose séptica do seio cavernoso, complicação incomum ameaçadora e crítica, que, por vezes, pode originar-se da disseminação de uma infecção odontogênica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () O nervo oculomotor é o único nervo que corre na cavidade do seio cavernoso, e não na parede, sendo o primeiro geralmente a ser afetado.
- () A infecção dissemina-se no seio cavernoso através do plexo pterigoide, ou superficialmente através das veias oftálmicas e faciais.
- () A perda da visão pode resultar de oclusão da artéria retiniana central, oclusão da veia oftálmica, trombose da artéria carótida ou neuropatia óptica isquêmica.
- () Deve-se evitar o uso de anticoagulantes na fase precoce do tratamento da trombose do seio cavernoso para evitar a instalação de um quadro de Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD).

A sequência está correta em

- A) F, V, V, F. B) F, V, F, F. C) V, F, V, V. D) V, F, F, V. E) V, V, F, F.

36

“Segundo *Michael Miloro*, o tratamento das fraturas radiculares que ocorrem nos terços médio e apical com mobilidade consiste da aposição dos segmentos fraturados com contenção rígida por _____ semanas. Já nas fraturas do processo alveolar, o tratamento requer estabilização dos fragmentos envolvidos e fixação rígida. A fixação rígida deve permanecer por, aproximadamente, _____ semanas, se a técnica fechada for utilizada.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) 6 / 20 B) 8 / 10 C) 10 / 12 D) 12 / 4 E) 20 / 8

37

O paciente com lesões hepáticas graves resultantes de doenças infecciosas, abuso de álcool ou congestão vascular ou biliar necessita de cuidados especiais antes da cirurgia oral ser realizada. A produção de fatores da coagulação dependentes da vitamina K pode estar diminuída na doença hepática grave. Os fatores da coagulação dependentes da vitamina K são

- A) II, VII, IX e X. D) III, V, VII, IX e XI.
- B) II, V, VII, IX e X. E) IV, VII, VIII, IX e XII.
- C) V, IX, X, XI e XII.

38

A terapêutica anticoagulante é administrada a pacientes com dispositivos trombogênicos implantados, com problemas cardiovasculares trombogênicos, após infarto do miocárdio ou com necessidade de circulação sanguínea extracorpórea. Sobre os fármacos com propriedades anticoagulantes, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () O tempo para a heparina circulante ser inativa é de 6 horas, se a administração for intravenosa, e de 24 horas, se a administração for subcutânea.
- () O sulfato de protamina é a droga de eleição para reverter os efeitos do *warfarin*, se houver a necessidade de uma cirurgia oral de emergência.
- () Os pacientes devem interromper o uso de *warfarin* 5 a 7 dias antes da cirurgia oral planejada. O tratamento com *warfarin* pode ser reiniciado 24 horas após a cirurgia.
- () Segundo *James R. Hupp*, se o cirurgião bucomaxilofacial indicar a suspensão do uso de aspirina pelo paciente, a cirurgia deve ser adiada por 5 dias.

A sequência está correta em

- A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) F, V, F, V. D) V, F, F, V. E) V, F, V, F.

39

“Para anestésias múltiplos dentes em casos de exodontias múltiplas, pode ser necessário injetar vários tubetes anestésicos. Para *James R. Hupp*, as doses máximas recomendadas de anestésico local (mg/kg) de lidocaína a 2% com adrenalina 1:100.000 é de _____ mg/kg. Para um paciente adulto com 70 kg, o número máximo de mepivacaína a 2% com levonordefrina 1:20.000 é de _____ tubetes. A dose máxima (mg/kg) de articaína a 4% com adrenalina 1:100.000 é de _____ mg/kg.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) 6 / 8 / 6 B) 7 / 9 / 8 C) 5 / 10 / 7 D) 4,5 / 11 / 9 E) 5,5 / 7 / 8,5

40

A maioria dos esquemas de classificação dos dentes impactados baseia-se na radiografia panorâmica, visando prever problemas pré e pós-operatórios. Sobre o sistema de *Pell e Gregory* para classificar terceiros molares impactados, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () Em relação à margem anterior do ramo, os dentes que se apresentam posicionados posteriormente de maneira que, aproximadamente, metade esteja coberto pelo ramo, a relação do dente com o ramo será de classe 3.
- () Em relação à margem anterior do ramo, os dentes que apresentam diâmetro mesiodistal da coroa completamente anterior à margem anterior do ramo da mandíbula classifica-se como relação classe 1.
- () Em relação ao plano oclusal, uma impacção classe C é aquela na qual a superfície oclusal do dente impactado está abaixo da linha cervical do segundo molar.
- () Em relação ao plano oclusal, uma impacção classe B é aquela na qual a superfície oclusal do dente impactado está à altura ou próxima ao nível do plano oclusal do segundo molar.

A sequência está correta em

- A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) F, V, V, F. D) V, F, F, V. E) V, F, V, F.

41

A cirurgia endodôntica é o tratamento ou a prevenção da patologia perirradicular por meio de abordagem cirúrgica. Acerca da cirurgia parendodôntica, analise as afirmativas.

- I. Na curetagem que se realiza em volta do ápice podem ser deixadas partes do tecido de granulação ou do epitélio, sem comprometimento da cicatrização.
- II. *James R. Hupp* e colaboradores, citando *Tamse* e colaboradores, afirmam que uma radiotransparência em forma de “J”, no qual o espaço mais espesso do ligamento periodontal se conecta com a lesão periapical é indicativo de fratura radicular vertical.
- III. A incisão semilunar, para acesso da região periapical, deve possuir sua base em tecido aderido ou ceratinizado para propiciar uma cicatrização mais rápida e com menor possibilidade de deiscência.
- IV. O Agregado Mineral Trióxido (MTA), devido às propriedades físicas e biológicas, possui boa indicação como material de preenchimento apical, apesar de pouca quantidade de hemorragia interferir com a presa final do material.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II. B) I e IV. C) II e III. D) II e IV. E) III e IV.

42

A má oclusão e anomalias associadas dos componentes esqueléticos da face podem ocorrer como resultado de vários fatores, incluindo tendências hereditárias, problemas pré-natais, condições sistêmicas durante o nascimento, traumatismo e influências ambientais. Sobre as técnicas de osteotomias para a correção das deformidades de desenvolvimento da mandíbula, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () Osteotomias subcondilares verticais possuem indicação para o tratamento de grandes deficiências mandibulares horizontais.
- () Osteotomia de ramo C invertido, por apresentar abordagem extraoral, caiu em desuso; geralmente, era reservada para o tratamento de excesso horizontal de mandíbula.
- () A osteotomia alveolar mandibular total tem indicação na retrusão ou protusão alveolar dental mandibular.
- () Em casos de deficiência mandibular que existir relação oclusal adequada ou quando o posicionamento anterior da mandíbula não for suficiente para produzir projeção adequada do mento pode ser realizada uma genioplastia.

A sequência está correta em

- A) F, V, F, F. B) F, F, V, V. C) F, V, F, V. D) V, F, V, F. E) V, F, V, V.

43

O traumatismo à região facial, frequentemente, resulta em lesões do tecido mole, dos dentes e dos principais componentes do esqueleto da face, incluindo maxila, mandíbula, zigoma, complexo naso-órbito-etmoidal e estruturas supraorbitárias. Segundo o estudo de *Olson* e colaboradores, citado por *James R. Hupp*, *Edward Ellis III* e *Myron R. Tucker*, os locais de maior frequência das fraturas mandibulares, em ordem decrescente, são:

- A) Ângulo, área condilar, corpo, sínfise, região alveolar, ramo e coronoide.
- B) Sínfise, área condilar, ângulo, corpo, região alveolar, coronoide e ramo.
- C) Área condilar, sínfise, ângulo, corpo, coronoide, ramo e região alveolar.
- D) Área condilar, ângulo, sínfise, corpo, região alveolar, ramo e coronoide
- E) Ângulo, sínfise, área condilar, corpo, coronoide, ramo e área alveolar.

44

A identificação de áreas de resistência no esqueleto craniofacial estimulou o desenvolvimento de várias técnicas de osteotomias para expandir a maxila, em conjunção com aparelhos ortodônticos. A resistência à expansão esquelética facial aumentada está associada às seguintes suturas. Assinale-as.

- A) Mediana do palato, incisiva e zigomaticomaxilar.
- B) Mediana do palato, zigomaticomaxilar e zigomaticofrontal.
- C) Zigomaticotemporal, zigomaticomaxilar e zigomaticofrontal.
- D) Mediana do palato, zigomaticotemporal e zigomaticofrontal.
- E) Mediana do palato, zigomaticotemporal e zigomaticomaxilar.

45

As deformidades maxilares podem se manifestar nos planos sagital, axial e coronal. Acerca da cirurgia ortognática de maxila, analise as afirmativas.

- I. As osteotomias maxilares anteriores são, geralmente, usadas para tratar o excesso maxilar horizontal, quando a oclusão posterior estiver correta.
- II. A osteotomia alveolar maxilar total possui a vantagem de proporcionar melhora na: via aérea nasal; estabilidade em razão do melhor contato ósseo; e, habilidade de alongar a maxila.
- III. A necessidade da cirurgia na expansão palatina rápida está associada com a relação maxilo-mandibular, a idade do paciente e a condição da sutura mediopalatina.
- IV. As osteotomias maxilares anteriores são, geralmente, usadas para tratar o excesso maxilar horizontal, quando a oclusão posterior for corrigível pela cirurgia mandibular.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e IV.
- D) II e III.
- E) III e IV.

46

“As mudanças que ocorrem no tecido mole associadas à cirurgia ortognática devem ser levadas em consideração durante o planejamento ortocirúrgico. As mudanças do tecido mole associadas à osteotomia segmentária de recuo maxilar incluem _____ no ângulo nasolabial, _____ do lábio superior, _____ do intervalo interlabial e _____ do lábio inferior com diminuição associada da profundidade do sulco labial inferior.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) aumento / alongamento / diminuição / retração
- B) diminuição / alongamento / diminuição / retração
- C) aumento / encurtamento / aumento / alongamento
- D) diminuição / encurtamento / aumento / alongamento
- E) aumento / encurtamento / diminuição / alongamento

47

As complicações das fraturas do complexo zigomático e do arco são incomuns. Tais complicações podem ocorrer no período pós-operatório inicial ou se manifestar apenas mais tarde durante a recuperação. Acerca das complicações das fraturas do complexo zigomático e do arco zigomático, assinale a afirmativa correta.

- A) Hifema traumático caracteriza-se por uma hemorragia retrobulbar.
- B) Não há relação clínica da presença de trismo com fraturas zigomáticas.
- C) Uma diminuição do volume orbital é a etiologia mais comum do enftalmo.
- D) A síndrome da fissura orbital superior inclui: ptose, oftalmoplegia, anestesia da frente e pupilas fixamente dilatadas.
- E) As causas principais da diplopia incluem: edema, hematoma, aprisionamento dos músculos extraoculares e do tecido orbital; e, a lesão aos nervos cranianos III, IV ou V.

48

Mulher, 41 anos, apresenta lesão assintomática, radiotransparente, unilocular de margens bem definidas, com focos radiopacos no interior da lesão. A lesão localiza-se na região periapical de canino e pré-molares superiores e ocasiona reabsorção radicular de alguns dentes. Assinale a alternativa que apresenta a lesão de origem odontogênica que melhor se enquadra nos aspectos clínicos e radiográficos descritos.

- A) Fibro-odontoma ameloblástico.
- B) Fibroma odontogênico central.
- C) Cisto odontogênico calcificante.
- D) Tumor odontogênico adenomatoide.
- E) Tumor odontogênico epitelial calcificante.

49

As patologias associadas à dor facial e às doenças neurológicas são, em muitos casos, de difícil diagnóstico. Não é incomum tais pacientes serem encaminhados para um cirurgião bucomaxilofacial, por ser essa a especialidade que mais se aproxima da área médica. Sobre as patologias associadas à dor facial e às doenças neuromusculares, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () O envolvimento de crianças com a paralisia idiopática do sétimo nervo é, geralmente, associado a infecção viral, Doença de *Lyme* ou otalgia.
- () Pacientes com síndrome de *Gradenigo* podem apresentar um quadro de dor muito semelhante ao encontrado em pacientes com neuralgia do trigêmeo.
- () A síndrome de *Ramsay Hunt* está associada à neuralgia vagoglosssofaríngea.
- () A síndrome de *Guillain-Barré* está associada à neuralgia facial atípica.

A sequência está correta em

- A) F, F, V, V. B) F, V, F, V. C) V, F, F, V. D) V, F, V, F. E) V, V, F, F.

50

Nas fraturas faciais, os objetivos do tratamento incluem rápida cicatrização óssea, o retorno das funções ocular, mastigatória e nasal normais, a recuperação da fala e um resultado estético facial e dental aceitáveis. Sobre o tratamento das fraturas mandibulares, analise.

- I. Nos casos de fraturas condilares, o tempo máximo de fixação intermaxilar, segundo *James R. Hupp* e colaboradores, é de 2 a 3 semanas para adultos e de 1 a 2 meses para crianças, seguido de um período de reabilitação funcional intenso.
- II. O deslocamento lateral da cabeça do côndilo está sempre associado com uma fratura concomitante no côndilo ou em qualquer parte dentro da mandíbula. Esse tipo de lesão está associado com uma mordida aberta anterior, que não pode ser atribuída somente à fratura mandibular, mas, em vez disso, é secundária ao côndilo deslocado.
- III. As fraturas condilares, independente do grau de deslocamento, e as fraturas mandibulares cominutivas grosseiras são melhor tratadas pela redução fechada.
- IV. Fraturas na região parassinfiseana não podem ser tratadas rotineiramente de modo satisfatório através da redução fechada.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II. B) I e IV. C) II e III. D) II e IV. E) III e IV.

INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipad*, *ipod*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
7. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta correta.**
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na *Internet*, no site **www.idecan.org.br**, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de **02 (dois) dias úteis**, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no site **www.idecan.org.br**.
- A interposição de recursos poderá ser feita **via Internet**, através do **Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos**, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao **IDECAN**, conforme disposições contidas no site **www.idecan.org.br**, no *link* correspondente ao Concurso Público.