

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO,
SOB A FORMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO
PARA ENFERMEIROS, NOS MOLDES DE
RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL
NAVAL MARCÍLIO DIAS
C-EENF/2018***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (LVSC) é uma ferramenta prática e de fácil utilização por profissionais de saúde interessados na melhoria da segurança cirúrgica e redução de óbitos e complicações cirúrgicas evitáveis. Marque a opção INCORRETA sobre a LVSC.

- (A) É de caráter obrigatório componente da política pública oficial.
- (B) Durante sua execução são feitas verificações em três tempos.
- (C) Antes da indução anestésica devem estar presentes pelo menos um membro da equipe de enfermagem e o anestesiológico.
- (D) Antes da incisão cirúrgica confirma-se a realização da profilaxia antimicrobiana nos últimos 60 minutos.
- (E) Antes da saída do paciente da sala cirúrgica é feita a conclusão da contagem de agulhas, instrumentos e compressas.

QUESTÃO 2

Qual das soluções abaixo relacionadas NÃO é indicada para os deslocamentos de líquidos para o terceiro espaço ou pressão intracraniana aumentada?

- (A) Isotônica de NaCl 0,9%.
- (B) Lactato de Ringer.
- (C) Hipotônica de NaCl 0,45%.
- (D) Hipertônica de NaCl 3%.
- (E) Coloidal de dextrana em soro fisiológico.

QUESTÃO 3

Quais são os efeitos colaterais do sistema gastrointestinal mais comuns da quimioterapia que duram de 24 a 48 horas e que podem persistir até 1 semana após a administração?

- (A) Constipação e dor abdominal.
- (B) Náuseas e pirose.
- (C) Vômitos e melena.
- (D) Mucosite e diarreia.
- (E) Náuseas e vômitos.

QUESTÃO 4

Qual defeito congênito na parede abdominal caracteriza-se por vísceras recobertas por membranas translúcidas com cordão umbilical no seu ápice?

- (A) Hérnia umbilical.
- (B) Onfalocele.
- (C) Hérnia inguinal.
- (D) Megacólon congênito.
- (E) Gastroquise.

QUESTÃO 5

Assinale a opção que, de acordo com o Brunner e Suddarth (2009), apresenta duas complicações gastrointestinais que podem ocorrer durante o atendimento ao paciente queimado.

- (A) Edema e íleo paralítico.
- (B) Náuseas e diarreia.
- (C) Íleo paralítico e úlcera de Curling.
- (D) Hérnia de hiato e disfagia.
- (E) Disfagia e edema.

QUESTÃO 6

Ao analisar o traçado do eletrocardiograma (ECG), qual corresponde à duração total da sístole elétrica ventricular?

- (A) Complexo QRS.
- (B) Onda U.
- (C) Intervalo QT.
- (D) Segmento ST.
- (E) Onda P.

QUESTÃO 7

A infiltração ou extravasamento são complicações da terapia intravenosa. Assinale a intervenção de enfermagem indicada para este caso.

- (A) Colocar um curativo compressivo.
- (B) Monitorar os sinais vitais.
- (C) Repuncionar o mesmo membro.
- (D) Reduzir a taxa de fluxo intravenoso.
- (E) Elevar o membro.

QUESTÃO 8

Segundo Brunner e Suddarth (2009), durante as primeiras 24 horas depois da cirurgia, o cuidado de enfermagem do paciente hospitalizado na unidade clínica-cirúrgica geral envolve tratar a dor, monitorizar as complicações e outros. Assinale a alternativa correta.

- (A) A frequência de pulso é registrada a cada 20 min na primeira hora.
- (B) A frequência respiratória é registrada a cada 30 min na primeira hora.
- (C) A pressão arterial é registrada a cada 10 min na primeira hora.
- (D) Ofertar oxigênio complementar a cada 15 min na primeira hora.
- (E) A temperatura é monitorada a cada 4 horas durante as primeiras 24 horas.

QUESTÃO 9

A respeito da diálise peritoneal, assinale a alternativa correta.

- (A) É diferente da hemodiálise porque não remove os resíduos metabólicos e as substâncias tóxicas.
- (B) Não é recomendada para pacientes com diabetes ou doença cardiovascular.
- (C) A membrana peritoneal que cobre os órgãos abdominais e reveste a parede abdominal serve como a membrana semipermeável.
- (D) O líquido dialisado não estéril é introduzido dentro da cavidade peritoneal através de um cateter abdominal.
- (E) A ureia e a creatinina, os produtos metabólicos finais normalmente excretados pelos rins, são depurados do sangue por meio da segmentação.

QUESTÃO 10

Em relação ao atendimento numa emergência psiquiátrica, pode-se afirmar que

- (A) deve-se evitar aproximação física com o paciente.
- (B) as contenções devem ser imediatamente colocadas.
- (C) o paciente deve ficar sozinho em alguns momentos para não se sentir vigiado.
- (D) deve-se evitar dizer seu nome ao paciente ou qualquer verdade, se implicar algo que o desagrada.
- (E) a meta imediata é obter o controle da situação.

QUESTÃO 11

Em relação ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, marque a opção INCORRETA.

- (A) O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo branco e contornos pretos acrescido da expressão MATERIAL RADIOATIVO.
- (B) Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante.
- (C) O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, que corresponde às etapas de segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento, e disposição final.
- (D) Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento.
- (E) Os sacos de acondicionamento devem ser constituídos de material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, respeitado os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.

QUESTÃO 12

Dentre as arritmias cardíacas, a fibrilação ventricular tem as seguintes características:

- (A) ausência completa da atividade elétrica atrial e ventricular com eventuais ondas P e batimentos de escape ventricular irregulares.
- (B) uma série de ondas repetitivas, rápidas e caóticas, originando-se nos ventrículos, que não são uniformes e possuem uma configuração bizarra.
- (C) batimentos prematuros, em que a despolarização ocorre em qualquer dos ventrículos antes do próximo batimento sinusal; e apresenta intervalo QRS alargado.
- (D) a frequência do átrio não pode ser constatada, apresenta valores de frequência cardíaca ventricular em torno de 160 a 180bpm e ritmo irregular.
- (E) taquicardia ventricular muito rápida com frequência acima de 220bpm.

QUESTÃO 13

A indicação de terapia antirretroviral (TARV) na gestação pode ter dois objetivos: profilaxia da transmissão vertical ou tratamento da infecção pelo HIV (BRASIL. Gestação de Alto Risco: Manual Técnico, 2012). Portanto, em gestantes sintomáticas ou assintomáticas que possuam contagem de LT-CD4+ menor ou igual a 350 céls./mm é indicada a TARV

- (A) a partir da 28ª semana para evitar danos ao feto.
- (B) apenas se houver coinfeção por vírus da hepatite C.
- (C) durante o trabalho de parto.
- (D) entre a 14ª e 28ª semana de gravidez.
- (E) em qualquer idade gestacional.

QUESTÃO 14

A infecção de sítio cirúrgico (ISC) permanece nos dias atuais como um dos principais riscos à segurança dos pacientes nos serviços de saúde do Brasil (ANVISA, 2017). No que se refere às ISC é correto afirmar que

- (A) a incisional superficial ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico, sendo o primeiro dia, o subsequente ao procedimento, e envolve apenas pele e tecido subcutâneo.
- (B) a infecção de episiotomia não é definida como ISC superficial.
- (C) a profunda ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico, ou até 60 dias se houver colocação de implantes.
- (D) no órgão/cavidade ocorre em até 15 dias após o procedimento cirúrgico, sendo após este período considerada como ISC profunda.
- (E) a profunda primária é identificada na incisão secundária em pacientes com mais de uma incisão.

QUESTÃO 15

Sobre a escala de coma Glasgow, é correto afirmar que

- (A) o paciente precisa estar sedado durante o teste.
- (B) é utilizado para uma mensuração objetiva da consciência em uma escala numérica.
- (C) quanto menor o score do paciente, melhor a sua função neurológica.
- (D) só pode ser aplicada nas primeiras 48 (quarenta e oito) horas de internação.
- (E) avalia o grau de sedação do paciente.

QUESTÃO 16

Contrações uterinas mais vigorosas e mais longas, de aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) segundos, resultando em uma dilatação de 8 cm e um apagamento a partir de 80 (oitenta) por cento do colo, são características da fase ativa que ocorre no

- (A) 1º estágio clínico do parto.
- (B) 2º estágio clínico do parto.
- (C) 3º estágio clínico do parto.
- (D) 4º estágio clínico do parto.
- (E) Período de Greenberg.

QUESTÃO 17

Em relação aos riscos químicos, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR 32) do Ministério do Trabalho e Emprego, é correto afirmar que

- (A) na etiqueta de produtos químicos manipulados (fracionados) basta constar o nome do fornecedor, data de fabricação e validade do produto.
- (B) deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviços de saúde.
- (C) é autorizada a reutilização de embalagens de produtos químicos.
- (D) para os recipientes de produtos químicos fracionados não há obrigatoriedade de adicionar o nome do responsável pelo fracionamento.
- (E) a etiqueta para produtos químicos fracionados deve ser fornecida também pelo fabricante do produto.

QUESTÃO 18

A biópsia hepática é a remoção de uma pequena quantidade de tecido hepático, comumente através da aspiração por agulha. As suas complicações mais frequentes são:

- (A) diarreia e peritonite biliar.
- (B) icterícia e cirrose.
- (C) sangramento e peritonite biliar.
- (D) cefaleia e vômito.
- (E) sangramento e icterícia.

QUESTÃO 19

De acordo com a Resolução COFEN nº0564/2017 são direitos do profissional de enfermagem, EXCETO:

- (A) realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente.
- (B) comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos ético-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, família e coletividade.
- (C) conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e / ou local de trabalho sob a sua responsabilidade profissional.
- (D) anunciar a prestação de serviço para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais.
- (E) associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e Órgãos de Fiscalização do Exercício Profissional, atendidos os requisitos legais.

QUESTÃO 20

Qual é o método de avaliação da idade gestacional que apresenta mais critérios neurológicos, permitindo uma avaliação mais completa dos recém-nascidos e dos prematuros?

- (A) New Ballard Score.
- (B) APGAR.
- (C) Gráfico de Colorado.
- (D) Escala de Braden.
- (E) Capurro.

QUESTÃO 21

Qual é o distúrbio clínico caracterizado por pH abaixo de 7,35 e PaCO₂ maior que 42 mmHg?

- (A) Acidose metabólica aguda.
- (B) Alcalose metabólica crônica.
- (C) Acidose respiratória aguda e crônica.
- (D) Acidose metabólica aguda e crônica.
- (E) Alcalose respiratória aguda.

QUESTÃO 22

Segundo Brunner e Suddarth (2009), dentre as complicações da terapia com insulina, podemos citar:

- (A) lipodistrofia, cefaleia do entardecer e rubor em membros superiores.
- (B) fenômeno da alvorada, efeito somogyi e febre.
- (C) rubor em membros superiores, febre e lipodistrofia.
- (D) hiperglicemia matinal, hipotensão arterial e cefaleia do entardecer.
- (E) lipodistrofia, hiperglicemia matinal e reações alérgicas locais.

QUESTÃO 23

Para profilaxia da transmissão vertical do HIV, assinale a opção correta com relação à conduta ao recém-nascido.

- (A) Limpar todo sangue e secreções visíveis na superfície corporal do RN, logo após o nascimento, e encaminhá-lo imediatamente para banho em banheiras pediátricas.
- (B) Iniciar a primeira dose do AZT solução oral, preferencialmente, ainda na sala de parto, logo após os cuidados imediatos, ou nas primeiras 2 horas após o nascimento.
- (C) Indicar o aleitamento cruzado, o aleitamento misto e o uso de leite humano com pasteurização domiciliar.
- (D) Iniciar a primeira dose do AZT solução venosa, preferencialmente, ainda na sala de parto, logo após os cuidados imediatos, ou nas primeiras 2 horas após o nascimento.
- (E) Dar alta da maternidade com consulta agendada em serviço especializado para seguimento de crianças expostas ao HIV. A data da primeira consulta não deve ultrapassar 15 dias após o nascimento.

QUESTÃO 24

As seguintes doenças são de notificação compulsória:

- (A) cólera, diarreia e antraz pneumônico.
- (B) ebola, varíola e raiva humana.
- (C) cólera, febre amarela e pneumonia.
- (D) febre amarela, diarreia e coqueluche.
- (E) cólera, pneumonia e botulismo.

QUESTÃO 25

Acerca dos cuidados de enfermagem frente à Terapia de Nutrição Parenteral Total (NPT) assinale a alternativa correta.

- (A) Deve ser infundida por bomba de infusão em qualquer equipo e em temperatura ambiente.
- (B) Trocar o equipo a cada 72h, registrando em formulário a data da troca.
- (C) Manter acesso venoso periférico exclusivo para infusão.
- (D) Interromper a administração se o paciente apresentar pirogenia.
- (E) Instalar soro glicosado a 5%, acima de 120ml/h na primeira hora de início de infusão.

QUESTÃO 26

Durante o atendimento a um paciente traumatizado, o enfermeiro observou que a vítima apresenta sinal de Battle, otorreia e rinorreia, que são sinais clássicos de

- (A) fratura de base de crânio.
- (B) hemorragia meníngea.
- (C) lesão axonal difusa.
- (D) concussão.
- (E) choque hemorrágico.

QUESTÃO 27

Qual das alternativas abaixo corresponde a um dos tipos de transtorno de humor?

- (A) Agarofobia.
- (B) Hipocondria.
- (C) Bulimia nervosa.
- (D) Transtorno bipolar.
- (E) Transtorno da personalidade esquizotípica.

QUESTÃO 28

De acordo com as Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (ANVISA,2017), analise as seguintes afirmativas abaixo e marque a opção correta.

- I- Rotineiramente, o cateter venoso periférico, não deve ser trocado num período inferior a 96 (noventa e seis) horas.
- II- Para pacientes neonatais e pediátricos o cateter venoso deve ser trocado rotineiramente a cada 48 (quarenta e oito) horas.
- III- O sítio de inserção do cateter venoso periférico deve ser avaliado no mínimo duas vezes por turno em pacientes pediátricos.
- IV- No cateter totalmente implantável, é recomendado manter a agulha por até cinco dias, protegida por cobertura estéril.

- (A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 29

Com relação à Cardioversão Elétrica é correto afirmar que

- (A) o desfibrilador é ajustado para sincronizar com o ECG em um monitor cardíaco.
- (B) é usada em situações de emergência como a fibrilação ventricular.
- (C) não deve ser utilizada em pacientes conscientes e que tenham pulso.
- (D) o desfibrilador deve estar com o modo de sincronização desligado a fim de evitar a descarga elétrica em um período refratário.
- (E) em geral após o procedimento, é necessária a intubação orotraqueal.

QUESTÃO 30

Incidente relacionado ao cuidado de saúde é um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente. O incidente que não atingiu o paciente é classificado como

- (A) incidente sem dano.
- (B) near miss.
- (C) evento adverso.
- (D) incidente com dano.
- (E) erro.

QUESTÃO 31

Com relação à higienização das mãos é correto afirmar que

- (A) não se deve aplicar cremes hidratantes nas mãos diariamente a fim de evitar a colonização das mesmas com microorganismos residuais.
- (B) a fricção anti-séptica das mãos pode substituir a higienização simples das mãos mesmo quando estas estiverem visivelmente sujas.
- (C) após higienizar as mãos com preparação alcoólica deve-se deixar que estas sequem espontaneamente.
- (D) as escovas utilizadas no preparo cirúrgico das mãos devem estar sempre impregnadas com anti-séptico.
- (E) nos processos de higienização das mãos pode-se utilizar secadores elétricos em substituição ao papel toalha.

QUESTÃO 32

Quanto à administração de medicamentos pela via intramuscular, marque (V) verdadeiro ou (F) falso nas afirmativas abaixo e assinale a seguir a alternativa correta.

- () A via intramuscular fornece uma absorção mais lenta do medicamento que a subcutânea.
- () O peso e a quantidade de tecido adiposo podem influenciar na relação do tamanho da agulha.
- () O músculo é menos sensível a medicamentos irritantes e viscosos.
- () O músculo deltoide é utilizado para pequenos volumes de medicação (2ml ou menos).
- () O uso da técnica em Z não é recomendável para administração de medicações intramusculares, pois aumenta o risco de irritação local da pele.

- (A) (F) (V) (V) (V) (F)
- (B) (F) (V) (F) (V) (V)
- (C) (F) (F) (V) (V) (V)
- (D) (V) (F) (F) (F) (V)
- (E) (V) (V) (V) (F) (F)

QUESTÃO 33

No procedimento de enfermagem de passagem de sonda nasoenteral, qual das seguintes ações NÃO deverá ser realizada após o posicionamento da sonda?

- (A) Realizar Rx de abdome.
- (B) Introduzir ar com uma seringa.
- (C) Ausculta de ruídos estomacais com estetoscópio.
- (D) Retirada do fio guia.
- (E) Introduzir o fio guia.

QUESTÃO 34

São exemplos de vacinas administradas por via intramuscular (IM):

- (A) rubéola e febre amarela atenuada.
- (B) BCG e *haemophilus influenza B* (conjugada).
- (C) febre amarela (atenuada) e sarampo.
- (D) pneumocócica 10 valente (conjugada) e hepatite B (recombinante).
- (E) rotavírus humano e raiva humana.

QUESTÃO 35

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução COFEN nº 0564/2017 em seu artigo 108 cita as penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem aos profissionais que cometerem infrações éticas e/ou disciplinares. A cassação ao direito ao Exercício Profissional consiste em

- (A) perda do direito ao exercício profissional por até 90 dias.
- (B) perda do direito ao exercício profissional por um período de até 20 anos e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- (C) perda do direito ao exercício profissional por um período de até 180 dias e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- (D) perda do direito ao exercício profissional por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- (E) retirada da carteira profissional no ato da notificação por um período de até 10 anos.

QUESTÃO 36

Segundo o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (2011), as reações adversas causadas pela terapia medicamentosa anti tuberculose (antiTB) são divididas em dois grandes grupos: reações adversas menores, em que normalmente não é necessária a suspensão do tratamento e reações adversas maiores, que normalmente causam a suspensão do tratamento. Marque a alternativa que corresponde a uma reação adversa menor:

- (A) Hiperuricemia com artralgia.
- (B) Neurite óptica.
- (C) Hepatotxicidade.
- (D) Nefrite intersticial.
- (E) Rabdomiólise com mioglobínúria.

QUESTÃO 37

O sangramento vaginal (metrorragia) com aspecto de "suco de ameixa" que ocorre geralmente no primeiro trimestre da gestação é característico de

- (A) descolamento prematuro de placenta.
- (B) contrações de Braxton Hicks.
- (C) placenta prévia.
- (D) doença trofoblástica gestacional.
- (E) pré-eclâmpsia.

QUESTÃO 38

A Prevenção de Lesões por Pressão (LPP) é sabidamente uma das principais metas para a Segurança do paciente. Neste sentido, a utilização de escalas de avaliação de risco para formação de LPP oferece a oportunidade de planejar as ações preventivas e de controle das lesões. Quanto às escalas validadas é correto afirmar que

- (A) a de Waterlow avalia oito tópicos principais.
- (B) a de Braden considera como pacientes sem risco para o desenvolvimento de LPP aqueles cujos escores variam entre 19 e 30 pontos.
- (C) a de Waterlow, os pacientes de escores baixos têm maior risco de desenvolvimento de LPP.
- (D) a de Braden leva em consideração exclusivamente os seguintes parâmetros: percepção sensorial, mobilidade, e nutrição.
- (E) a de Braden Q é a versão pediátrica da Escala de Braden.

QUESTÃO 39

A coleta de sangue para triagem neonatal (Teste do Pezinho-PKU) deve ocorrer preferencialmente

- (A) do primeiro ao sétimo dia de vida.
- (B) do sétimo ao décimo quarto dia de vida.
- (C) do segundo ao sétimo dia de vida, não podendo ultrapassar o trigésimo.
- (D) antes das primeiras quarenta e oito horas de vida.
- (E) no segundo mês de vida.

QUESTÃO 40

Dentre as intervenções de enfermagem para evitar a perda de calor no recém-nascido, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Controlar o balanço hídrico e débito urinário.
- (B) Garantir o bom funcionamento dos equipamentos.
- (C) Fornecer oxigênio aquecido.
- (D) Colocar as incubadoras próximas às paredes.
- (E) Reduzir as correntes de ar.

QUESTÃO 41

A vacina Rotavírus Humano G1P1(8) (atenuada) (VORH) é indicada para prevenção de gastroenterite em crianças menores de um ano de idade. Quanto à via de administração e dose, assinale a alternativa certa.

- (A) Intramuscular - 0,5 ml no vasto lateral da coxa.
- (B) Subcutânea - 0,5ml na face posterior do braço.
- (C) Intramuscular - 0,5ml no deltoide.
- (D) Oral -1,5ml.
- (E) Intradérmica - 0,2 ml no terço médio do braço direito.

QUESTÃO 42

Que doença se caracteriza por uma cervicopite ou vulvite, considerada sexualmente transmissível, que causa secreção de odor fétido, de coloração amarelo esverdeada abundante, prurido, polaciúria, dispareunia, disúria e hiperemia da mucosa vaginal?

- (A) Candidíase.
- (B) *Gardnerella Vaginalis*.
- (C) *Neisseria Gonorrhoeae*.
- (D) Tricomoniase.
- (E) Sífilis.

QUESTÃO 43

A leucemia é a forma mais comum de câncer infantil. Marque V (verdadeiro) e F (falso) nas afirmativas abaixo e assinale a seguir a alternativa correta.

- () Duas formas são geralmente reconhecidas nas crianças: leucemia linfóide aguda e leucemia não linfóide aguda (mieloide).
- () A leucemia é uma proliferação irrestrita de glóbulos brancos maduros nos tecidos formadores de sangue do corpo.
- () As meninas parecem ter prognóstico mais favorável que os meninos.
- () O processo leucêmico e a maioria dos agentes quimioterápicos causam mielossupressão.
- () A criança deve ser precocemente imunizada com vacinas virais vivas (sarampo, rubéola e caxumba) independente de sua resposta imunológica.

- (A) (V) (F) (V) (V) (F)
- (B) (F) (F) (V) (V) (V)
- (C) (F) (V) (F) (F) (V)
- (D) (V) (F) (V) (F) (F)
- (E) (F) (V) (F) (V) (V)

QUESTÃO 44

Considerando o uso do cateter totalmente implantável em pediatria, assinale a alternativa correta.

- (A) Não podem ser utilizados para administração de sangue e hemoderivados.
- (B) O acesso ao reservatório do cateter é realizado com uma agulha não cortante.
- (C) É contraindicada a utilização de anestésico tópico previamente à punção.
- (D) O septo do cateter totalmente implantável pode suportar até 500 punções.
- (E) A agulha cortante de calibre 24, em ângulo de 45°, é a mais utilizada em pediatria

QUESTÃO 45

Hemocomponentes são produtos obtidos a partir do sangue total por meios de processos físicos. Em uma infusão de hemocomponentes, assinale a alternativa que apresenta qual será o componente usado quando o paciente apresentar trombocitopenia.

- (A) Leucócitos.
- (B) Plasma.
- (C) Hemoglobina.
- (D) Plaquetas.
- (E) Hemácias.

QUESTÃO 46

Qual é a complicação menos comum e mais letal em paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio?

- (A) Arritmia.
- (B) Choque cardiogênico.
- (C) Ruptura ventricular.
- (D) Tromboembolismo.
- (E) Insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 47

Considerando as fases do puerpério, assinale a alternativa correta.

- (A) O imediato ocorre somente na primeira hora após o parto.
- (B) O mediato segue da 2ª hora ao 11º dia após o parto.
- (C) O tardio segue do 11º dia a 42ª semana após o parto.
- (D) O remoto ocorre a partir da 43ª semana após o parto.
- (E) No mediato as puérperas enfrentam maior risco de infecções genitais e extra-genitais.

QUESTÃO 48

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução COFEN nº 0564/2017, capítulo II, é dever do Profissional de Enfermagem.

- (A) Aplicar o Processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e comunidade.
- (B) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- (C) Executar e/ou determinar atos contrários ao Código de Ética, à Legislação e princípios que disciplinam o exercício da Enfermagem.
- (D) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa e à coletividade.
- (E) Documentar formalmente as etapas do Processo de Enfermagem, em consonância com sua competência legal.

QUESTÃO 49


Analise as alternativas abaixo de acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para vacinação, do Ministério da Saúde (2014), e assinale a opção correta.

- I- A região dorso-glútea é utilizada para administração de alguns tipos de soro, como o antirrábico.
 - II- É contraindicada a aplicação de vacinas virais atenuadas para as mães que estejam amamentando, pois foram observados eventos adversos associados a passagem desses vírus para os recém-nascidos.
 - III- Dentre alguns fatores que influenciam a resposta imune temos: idade, gestação, reação anafilática, uso de anti-histamínico profilático.
 - IV- Na sala de vacinação todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2°C a +8°C, sendo ideal +5°C.
- (A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - (B) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
 - (C) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
 - (D) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
 - (E) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

QUESTÃO 50


O uso de máscaras no atendimento de pacientes com tuberculose deve ser feito de forma criteriosa. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e assinale a seguir a alternativa correta.

- () É recomendado o uso de máscaras PFF2 ou N95 para qualquer pessoa que entrar em área de risco de transmissão.
 - () É necessário treinamento especial para o uso de máscaras PFF2 pois estas não podem ser reutilizadas sob nenhuma hipótese.
 - () No transporte de pacientes bacilíferos em ambulâncias, estes devem utilizar máscaras PFF2 ou N95.
 - () Para profissionais que atendem doentes referenciados bacilíferos em serviços ambulatoriais de baixa renovação de ar, é recomendado o uso de máscaras PFF2 ou N95.
- (A) (V) (V) (F) (V)
 - (B) (V) (F) (V) (V)
 - (C) (V) (F) (F) (V)
 - (D) (F) (F) (V) (V)
 - (E) (V) (F) (V) (F)



INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 8 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 90 minutos.
- 9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assine o seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:





Nome: ROBERTO SILVA

Assinatura: Roberto Silva

Instruções de Preenchimento

* Não rasure esta folha.
 * Não rabisque nas áreas de respostas.
 * Faça marcas sólidas nos círculos.
 * Não use canetas que borrem o papel.

ERRADO:  CORRETO: 

PREENCHIMENTO DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO										DV	P	G
5	7	0	2	0	7	0	2	4				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2

Preenchimento da DEEnM

01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

T
A
R
J
A

- 12 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50