

**MARINHA DO BRASIL**  
**DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA**

***PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO,  
SOB A FORMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO  
PARA ENFERMEIROS, NOS MOLDES DE  
RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL  
NAVAL MARCÍLIO DIAS  
C-EENF/2016***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**ENFERMAGEM**

### QUESTÃO 1

De acordo com o manual de normas e procedimentos para vacinação, NÃO é contraindicada a vacinação a usuários

- (A) com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave que podem receber vacinas de agentes vivos atenuados.
- (B) em uso de dose imunossupressora de corticoide.
- (C) em uso de imunoglobulina, sangue ou hemoderivados.
- (D) em uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral.
- (E) adultos que fazem uso de imunossupressor com dose acima de 20 mg/kg/dia por tempo superior a 14 dias.

### QUESTÃO 2

Um profissional de enfermagem, após administrar a vacina tetra viral (atenuada), deve orientar o paciente por precaução a evitar por seis semanas ingestão de

- (A) salicilatos (AAS).
- (B) benzodiazepínicos (BZDs).
- (C) insulina (NPH).
- (D) cefuroxima(CXM).
- (E) vancomicina(VAN).

### QUESTÃO 3

Uma das formas de fazer o diagnóstico da tuberculose é o exame bacteriológico, que consiste na coleta do escarro em que a qualidade e a quantidade são fundamentais. É uma boa amostra de escarro aquela que

- (A) é obtida da faringe. O volume ideal é de 5 ml.
- (B) provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse. O volume ideal é de 5 ml a 10 ml.
- (C) obtém somente saliva com bacilos dispersos. O volume ideal é de 15 ml.
- (D) contém grande quantidade de saliva obtida sem o esforço da tosse. O volume ideal é de 15 ml a 20ml.
- (E) é obtida de aspirações de secreções nasais. O volume ideal é de 15 ml a 25 ml.

### QUESTÃO 4

Durante uma consulta de Enfermagem, na anamnese obstétrica, uma mulher apresenta um exame Beta HCG positivo. Informa que a data de sua última menstruação foi 15/06/2016. Calcule a data provável do parto.

- (A) 20/02/2017
- (B) 02/03/2017
- (C) 15/03/2017
- (D) 22/03/2017
- (E) 05/04/2017

### QUESTÃO 5

A hipertemia maligna é uma complicação possível do intraoperatório. Assinale a manifestação clínica considerada como sinal tardio.

- (A) Elevação da temperatura.
- (B) Hipotensão.
- (C) Taquicardia.
- (D) Oligúria.
- (E) Arritmia ventricular.

### QUESTÃO 6

Analise as afirmativas abaixo, com relação à placenta prévia, e assinale a seguir a opção correta.

- I- O exame de urina é normal.
- II- O exame de urina apresenta proteinúria.
- III- Seu início é tempestuoso, com instalação frequentemente subitânea.
- IV- A hemorragia é indolor, exceto durante as contrações uterinas do trabalho de parto.

- (A) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (E) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

### QUESTÃO 7

A reação transfusional que tem seus sinais e sintomas relacionados à presença de anticorpos antileucocitários do receptor que reagem contra os leucócitos do doador é denominada reação

- (A) hemolítica aguda.
- (B) alérgica.
- (C) febril hemolítica.
- (D) febril não hemolítica.
- (E) hemolítica tardia.

### QUESTÃO 8

Um importante cuidado de enfermagem na realização de uma paracentese é monitorar rigorosamente o paciente quanto aos sinais de colapso vascular. São eles:

- (A) rubor, frequência de pulso diminuída ou pressão arterial aumentada.
- (B) palidez, frequência de pulso aumentada ou pressão arterial diminuída.
- (C) hemorragia, pulso alternante e desorientação.
- (D) epistaxe, torpor e hematêmese intensa.
- (E) palidez, frequência de pulso diminuída ou pressão arterial oscilante.

### QUESTÃO 9

Em publicação do Ministério da Saúde, segundo o "Documento de consenso do câncer de mama" de 2004, é definido como grupo populacional com risco muito elevado para o desenvolvimento do câncer de mama aquele que apresenta

- (A) história familiar, nuliparidade e menopausa tardia.
- (B) exposição a radiações ionizantes em idade inferior a 40 anos.
- (C) história familiar com diagnóstico acima de 50 anos de idade.
- (D) história familiar de câncer de mama masculino.
- (E) menarca precoce e ingestão regular de álcool.

### QUESTÃO 10

Conforme o manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, a tuberculose continua sendo mundialmente um importante problema de saúde, exigindo o desenvolvimento de estratégias para o seu controle, considerando aspectos humanitários, econômicos e de saúde pública. Com relação à tuberculose, é correto afirmar que

- (A) a busca ativa de assintomáticos respiratórios tem como objetivo identificar precocemente os casos bacilíferos, interromper a cadeia de transmissão e reduzir a incidência da doença a longo prazo.
- (B) devem-se orientar os sintomáticos respiratórios para a coleta do exame de escarro, sendo duas amostras no momento da identificação.
- (C) a tuberculose pulmonar pós-primária é mais comum em crianças. O paciente apresenta-se irritado, com febre baixa, sudorese noturna e inapetência.
- (D) a prova tuberculínica consiste na inoculação intradérmica de um derivado protéico do M. Tuberculosis, sendo feita a leitura do resultado em: não reator, reator fraco, reator forte.
- (E) o paciente que retorna ao sistema após o abandono deve imediatamente recomeçar o tratamento, sem haver a necessidade de nova investigação diagnóstica.

### QUESTÃO 11

Quais os tipos de tumores cerebrais mais frequentes em adultos de meia-idade, que são encapsulados benignos comuns das células aracnoides nas meninges?

- (A) Gliomas.
- (B) Euromas acústicos.
- (C) Meningiomas.
- (D) Adenomas hipofisários.
- (E) Angiomas.

### QUESTÃO 12

O uso de cateter venoso central de inserção periférica é indicado no caso de

- (A) vigência de bacteremia.
- (B) infusão de soluções hipertônicas.
- (C) mastectomia prévia no membro a ser cateterizado.
- (D) fístula arteriovenosa no membro a ser cateterizado.
- (E) rede venosa esclerosada.

### QUESTÃO 13

A principal meta do tratamento do diabetes é normalizar a atividade da insulina e os níveis glicêmicos para reduzir o desenvolvimento de complicações vasculares e neuropáticas. Que complicação o uso da terapia com insulina pode apresentar?

- (A) Reações alérgicas sistêmicas.
- (B) Hiperglicemia noturna.
- (C) Glaucoma.
- (D) Polifagia.
- (E) Infarto agudo do miocárdio.

### QUESTÃO 14

A diarreia caracteriza-se por uma frequência aumentada de eliminações fecais, em uma quantidade aumentada e consistência alterada. Com relação à diarreia é INCORRETO afirmar que

- (A) suas complicações incluem o potencial para as arritmias cardíacas.
- (B) a eliminação de fezes volumosas e oleosas sugere a má absorção intestinal.
- (C) a secretora geralmente é de alto volume, sendo provocada pela produção e secreção aumentadas de água e eletrólitos pela mucosa intestinal.
- (D) a síndrome do intestino irritável e a intolerância à lactose são, com frequência, processos patológicos que causam a diarreia.
- (E) as fezes aquosas são características dos distúrbios do intestino grosso, enquanto fezes pastosas estão mais associadas aos distúrbios do intestino delgado.

### QUESTÃO 15

A embolia pulmonar refere-se à obstrução da artéria pulmonar ou de um de seus ramos por um trombo. É correto afirmar que

- (A) os trombos responsáveis pela embolia pulmonar se originam, restritamente, nas veias profundas dos membros inferiores.
- (B) a imobilização prolongada no pós-operatório não é tida como fator de risco, pois faz-se necessário durante esse período.
- (C) o teste do D-dímero é utilizado para excluir a embolia pulmonar, mas não como método diagnóstico.
- (D) ocorre o aumento do débito cardíaco e um aumento da pressão arterial como consequências hemodinâmicas.
- (E) obesidade, gravidez e roupas apertadas são erroneamente tidas como condições predisponentes para a embolia pulmonar.

### QUESTÃO 16

Substância tóxica é toda e qualquer substância que lesa o corpo por sua ação química quando ingerida, inalada, absorvida, aplicada à pele ou produzida no corpo em quantidade relativamente pequena. Sendo assim, assinale a opção correta.

- (A) Deve-se induzir o vômito após a ingestão de substâncias cáusticas ou destiladas de petróleo.
- (B) Intoxicações alimentares ocorrem depois da ingestão de alimentos sólidos ou líquidos contaminados. Há grande perda de eletrólitos e água por vômitos e diarreia, produzindo, respectivamente, acidose e alcalose.
- (C) Em casos de queimaduras químicas por soda cáustica e fósforo branco, a pele deve ser lavada imediatamente com água corrente.
- (D) Na intoxicação por opióides, como heroína, é administrado um antagonista narcótico para reverter a depressão respiratória grave e o coma.
- (E) Intoxicação por dose excessiva de cocaína pode gerar diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial por ser uma substância depressora do sistema nervoso central.

### QUESTÃO 17

A angina do peito é uma síndrome clínica comumente caracterizada por episódio ou paroxismos de dor ou pressão na região anterior do tórax. Em relação à angina é correto afirmar que

- (A) a refratária caracteriza-se por dor previsível e consistente que ocorre sob esforço e é aliviada pelo repouso.
- (B) os nitratos são usados no tratamento para aumentar o consumo miocárdico de oxigênio.
- (C) os beta-bloqueadores reduzem o consumo miocárdico de oxigênio por meio do bloqueio da estimulação simpática beta adrenérgica para o coração.
- (D) pacientes que fazem uso de nitroglicerina devem ser orientados a fazer uso do medicamento após a qualquer atividade física, como subir escadas ou relação sexual.
- (E) os agentes bloqueadores dos canais de cálcio de primeira geração são recomendados largamente às pessoas com insuficiência cardíaca.

### QUESTÃO 18

As puérperas portadoras de algumas doenças infecciosas recebem orientação de não amamentar. A amamentação está contraindicada em puérperas com

- (A) dengue.
- (B) caxumba.
- (C) rubéola.
- (D) sarampo.
- (E) HTLV 1 e 2.

### QUESTÃO 19

De acordo com o Manual Técnico Pré-natal e Puerpério: Atenção Qualificada e Humanizada, a ausculta dos batimentos cardíofetais deve ser realizada com sonar após qual semana de gestação?

- (A) Quarta.
- (B) Sexta.
- (C) Oitava.
- (D) Décima segunda.
- (E) Vigésima.

### QUESTÃO 20

A patologia que se caracteriza por ser autossômica recessiva, multissistêmica, e que tem os sintomas respiratórios como principais manifestações, sendo diagnosticada na fase de lactente ou no início da infância, porém podendo ser diagnosticada mais tarde na vida é denominada

- (A) fibrose cística.
- (B) asma.
- (C) bronquiectasia.
- (D) enfisema.
- (E) bronquite crônica.

### QUESTÃO 21

A ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF) faz parte da consulta de pré-natal. É considerada normal a frequência cardíaca fetal com batimentos entre

- (A) 50 e 70
- (B) 60 e 80
- (C) 90 e 120
- (D) 120 e 160
- (E) 161 e 200

### QUESTÃO 22

Assinale o procedimento de enfermagem INCORRETO para o controle da hipertensão intracraniana.

- (A) Manter temperatura corporal menor que 37,7° C.
- (B) Manter cabeceira elevada entre 30 e 45 graus.
- (C) Manter alinhamento céfalo-caudal.
- (D) Manter PIC > 20 mmHg e PPC > 70 mmHg.
- (E) Evitar hipotensão arterial.

### QUESTÃO 23

O uso das teorias de Enfermagem oferece estrutura e organização ao conhecimento de Enfermagem e proporciona um meio sistemático de coletar dados para descrever, explicar e prever a prática. Qual a teoria que consiste basicamente na ideia de que os indivíduos, quando capazes, devem promover o auto cuidado, e quando existir a incapacidade, entra o trabalho do enfermeiro no processo do cuidar?

- (A) Hildegard Peplau.
- (B) Virgínia Henderson.
- (C) Martha Rogers.
- (D) Sister Callista Roy.
- (E) Dorothea Orem.

### QUESTÃO 24

Qual distúrbio tem como tratamento a inserção imediata de um cateter marcapasso transvenoso temporário?

- (A) Bloqueio atrioventricular completo.
- (B) Fibrilação ventricular.
- (C) Taquicardia atrial paroxística.
- (D) Fibrilação atrial.
- (E) Flutter atrial.

### QUESTÃO 25

A quetiapina é um fármaco antipsicótico eficaz no tratamento da esquizofrenia. Os principais efeitos adversos da medicação são

- (A) congestão nasal / azotemia / taquicardia.
- (B) taquicardia / ganho de peso / agitação.
- (C) agranulose / taquicardia / risco alto para convulsão.
- (D) constipação / hipotensão postural / perda de peso.
- (E) hipertensão / perda acentuada de peso / sedação.

### QUESTÃO 26

Qual patologia é causada pela inflamação unilateral do sétimo nervo craniano que acarreta fraqueza ou paralisia dos músculos faciais do lado afetado?

- (A) Neuralgia do trigêmio.
- (B) Miastenia grave.
- (C) Esclerose múltipla.
- (D) Paralisia de Bell.
- (E) Guillain-Barré.

### QUESTÃO 27

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, com relação aos casos de dengue, assinalando a seguir a opção correta.

- ( ) A definição de caso confirmado de dengue clássico acontece quando o caso suspeito é confirmado laboratorialmente. Durante uma epidemia, a confirmação pode ser feita pelo critério clínico-epidemiológico, exceto nos primeiros casos da área, os quais deverão ter confirmação laboratorial.
- ( ) Quando a prova do laço é positiva ou há manifestação hemorrágica espontânea, ausência de sinais de alarme e hemorragia normal têm-se como conduta a hidratação oral supervisionada ou parenteral.
- ( ) A febre hemorrágica da dengue é classificada em Grau II quando há colapso circulatório com pulso fraco e rápido, estreitamento da pressão arterial, pele pegajosa e fria e inquietação.
- ( ) O diagnóstico laboratorial específico deve ser realizado até o quinto dia do início dos sintomas, tendo por objetivo identificar o patógeno e monitorar o sorotipo viral circulante.

- (A) (V) (V) (F) (F)
- (B) (V) (F) (V) (F)
- (C) (F) (V) (F) (V)
- (D) (V) (F) (V) (V)
- (E) (V) (F) (F) (V)

### QUESTÃO 28

A cardioversão elétrica é um procedimento utilizado na reversão de algumas arritmias. Assinale a opção em que a cardioversão elétrica NÃO está indicada.

- (A) Fibrilação atrial.
- (B) Flutter atrial.
- (C) Taquicardia atrial multifocal.
- (D) Taquicardia ventricular.
- (E) Taquicardia supraventricular.

### QUESTÃO 29

A Hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo *Mycobacterium leprae*. A classificação operacional do caso de Hanseníase, visando ao tratamento com poliquimioterapia, é baseada no número de lesões cutâneas. O caso de Hanseníase que apresenta 4 lesões na pele é classificado como

- (A) paucibacilar.
- (B) unobacilar.
- (C) tetrabacilar.
- (D) multibacilar.
- (E) nulibacelar.

### QUESTÃO 30

De acordo com o Ministério da Saúde, qual o primeiro indicador nacional, instituído pela ANVISA, em relação a eventos adversos decorrentes do cuidado em saúde no Brasil?

- (A) Densidade de incidência de infecção primária de corrente sanguínea associada a cateter central.
- (B) Corpo estranho deixado no corpo do paciente durante o procedimento cirúrgico.
- (C) O índice de quedas.
- (D) A perda de sonda nasogástrica.
- (E) A taxa de úlcera por pressão.

### QUESTÃO 31

Os pacientes oncológicos podem apresentar quadros clínicos que são classificados como emergências oncológicas. Assinale a opção que NÃO é considerada uma emergência oncológica.

- (A) Compressão da medula Espinhal.
- (B) Hipercalemia (nível sérico superior a 11m/dl).
- (C) Síndrome da lise tumoral.
- (D) Hipocalcemia (nível sérico superior a 3,5mEq/l).
- (E) Tamponamento cardíaco.

### QUESTÃO 32

Qual o transtorno neurodegenerativo que apresenta tremor, rigidez, instabilidade postural e bradicinesia como manifestações clínicas?

- (A) Doença de Parkinson.
- (B) Doença de Huntington.
- (C) Doença degenerativa de discos.
- (D) Esclerose lateral amiotrófica.
- (E) Doença de Alzheimer.

### QUESTÃO 33

Os três aspectos clínicos principais da cetoacidose diabética são:

- (A) hipoglicemia, alcalose e hipotensão.
- (B) desidratação, hipoglicemia e acidose.
- (C) hiperglicemia, desidratação e acidose.
- (D) acidose, hipertensão e desidratação.
- (E) hiperglicemia, alcalose e hipertensão.

#### QUESTÃO 34

A diálise peritoneal não se faz sem complicações. Assinale a opção que corresponde a uma complicação aguda da diálise peritoneal.

- (A) Hiperglicemia.
- (B) Sangramento.
- (C) Anorexia.
- (D) Hipertrigliceridemia.
- (E) Hérnia Abdominal.

#### QUESTÃO 35

Uma unidade de sangue é conectada ao paciente de forma errada, mas o erro é detectado antes do início da transfusão. Como esta situação é denominada de acordo com a classificação internacional de Segurança do Paciente criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)?

- (A) Incidente sem dano.
- (B) Incidente provável.
- (C) Near Miss.
- (D) Incidente com dano.
- (E) Incidente improvável.

#### QUESTÃO 36

A respeito do cateter arterial como método invasivo de monitoração da pressão arterial, é correto afirmar que

- (A) a artéria de primeira escolha é a braquial.
- (B) é indicado em infusão contínua de drogas vasoativas.
- (C) é contraindicado em caso de politraumatismo.
- (D) no teste de Allen modificado com enchimento ulnar adequado, a artéria radial não deve ser puncionada.
- (E) não há necessidade de verificação prévia do coagulograma para a retirada do cateter arterial.

#### QUESTÃO 37

A fratura é uma interrupção na continuidade de um osso, sendo definida de acordo com seu tipo e extensão. Qual tipo caracteriza-se por uma fratura em que o osso se divide em vários fragmentos?

- (A) Compressiva.
- (B) Impactada.
- (C) Em galho verde.
- (D) Composta.
- (E) Cominutiva.

#### QUESTÃO 38

Foi prescrito para um paciente o seguinte: 20 UI de insulina NPH. No posto de Enfermagem tem frasco de 100 UI/ML e seringas de 3 ML. Quantos ML de insulina deve-se aspirar para administrar no paciente?

- (A) 3
- (B) 0,6
- (C) 0,4
- (D) 0,3
- (E) 0,2

#### QUESTÃO 39

O isoproterenol é um fármaco que tem como uma de suas funções tratar bloqueios cardíacos. O enfermeiro deve ficar na cabeceira do paciente durante todo tempo em que o isoproterenol estiver sendo infundido, pois o mesmo pode ocasionar

- (A) taquicardia ou fibrilação ventricular.
- (B) elevação da pressão intraocular.
- (C) retenção urinária importante.
- (D) acentuada resistência ao fluxo do ar.
- (E) sonolência e desorientação por toxicidade.

#### QUESTÃO 40

A ventilação não invasiva é uma técnica de ventilação mecânica em que não é empregado qualquer tipo de prótese traqueal. Seu uso é indicado em

- (A) inabilidade em eliminar secreções e deglutir.
- (B) trauma facial.
- (C) edema pulmonar cardiogênico.
- (D) hemorragia gastrointestinal.
- (E) obstrução mecânica das vias aéreas.

#### QUESTÃO 41

A nutrição parenteral consiste na administração de nutrientes necessários para sobrevivência por outras vias que não o trato gastrointestinal. Assinale a complicação metabólica relacionada à administração da terapia nutricional parenteral.

- (A) Colestase.
- (B) Hiponatremia.
- (C) Fígado gorduroso.
- (D) Atrofia do trato gastrointestinal.
- (E) Embolia Pulmonar.

#### QUESTÃO 42

Os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos implicam algumas complicações graves. Qual das complicações pode ser evitada com o uso de bloqueadores dos canais de cálcio?

- (A) Vasoespasmo.
- (B) Hiponatremia.
- (C) Hidrocefalia.
- (D) Convulsão.
- (E) Hipocalemia.

#### QUESTÃO 43

O teste do reflexo vermelho é um rastreamento que deve ser realizado em todos os recém nascidos(RN). Qual o período ideal em que o exame deve ser realizado?

- (A) Até os primeiros 3 meses.
- (B) Na primeira hora de vida.
- (C) Até o 28º dia de vida.
- (D) Ao completar 1 ano.
- (E) Na primeira semana de vida.

#### QUESTÃO 44

O Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, do Ministério da Saúde, destaca que a vacina para prevenir contra febre amarela está indicada em residentes ou viajantes que se deslocam para as áreas com recomendação de vacinação. Em relação a essa vacina é correto afirmar que

- (A) não está contraindicada para indivíduos com doenças autoimunes.
- (B) é administrada por via intramuscular.
- (C) o esquema vacinal corresponde à administração de uma dose a partir dos 6 meses.
- (D) não está indicada para gestantes e lactentes.
- (E) é indicada para indivíduos com 60 anos ou mais que serão vacinados pela primeira vez.

#### QUESTÃO 45

O choque é uma das alterações mais comuns nos grandes queimados. Uma das prioridades na assistência de enfermagem a esses pacientes é observar os sinais vitais, em particular a pressão arterial e o débito urinário que, em adultos, deve ser mantido entre quantos ml/h?

- (A) 10 e 20
- (B) 20 e 30
- (C) 50 e 70
- (D) 80 e 90
- (E) 100 e 150

#### QUESTÃO 46

Uma importante fase do pré-natal é avaliar a situação vacinal referente ao tétano. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo, assinalando a seguir a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) A vacinação da gestante é realizada para prevenção contra o tétano, apenas para proteção da gestante.
- ( ) A última dose ou dose de reforço da vacina dT (dupla adulto) deve ser administrada pelo menos cinco dias antes da data provável do parto.
- ( ) A vacina dT pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez em qualquer período gestacional.
- ( ) Nas gestantes, a vacina dT deverá ser administrada considerando o histórico vacinal para difteria e tétano.

- (A) (V) (F) (V) (F)
- (B) (V) (V) (F) (F)
- (C) (F) (F) (V) (V)
- (D) (F) (V) (F) (V)
- (E) (V) (V) (V) (F)

#### QUESTÃO 47

Após recebimento das doses da vacina anti-hepatite, o profissional de saúde deverá realizar teste sorológico para saber se ocorreu a soroconversão. Um profissional de saúde sem infecção por vírus da hepatite B e com resposta vacinal contra a hepatite B deverá apresentar HbsAg

- (A) positivo e Anti-HBc negativo.
- (B) positivo e Anti-HBs positivo.
- (C) negativo e Anti-HBs positivo.
- (D) positivo e Anti-HBs negativo.
- (E) positivo e Anti-HBc positivo.

#### QUESTÃO 48

Deixar de comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional é considerado uma infração, de acordo com o código de ética dos profissionais de Enfermagem, resolução 311/2007. Qual penalidade a ser aplicada?

- (A) Multa.
- (B) Cassação do direito ao exercício profissional.
- (C) Censura.
- (D) Advertência verbal.
- (E) Suspensão do exercício profissional.



#### QUESTÃO 49

Tendo em vista o capítulo II do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que trata do sigilo profissional, assinale a opção que apresenta um direito do profissional de enfermagem.

- (A) Revelar, quando necessário à prestação da assistência, o fato sigiloso em atividade multiprofissional.
- (B) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigados ao sigilo.
- (C) Permanecer em sigilo mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
- (D) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o sigilo profissional.
- (E) Divulgar, quando autorizado, casos ou situações pertinentes ao cotidiano das atividades.

#### QUESTÃO 50

O que indica uma restauração adequada no caso de um choque hipovolêmico?

- (A) Aumento da frequência cardíaca, pressão arterial média e diurese.
- (B) Diminuição da pressão venosa central.
- (C) Diminuição dos níveis de lactato.
- (D) Diminuição do débito cardíaco.
- (E) Saturação venosa de oxigênio abaixo de 65%.