

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

*(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO
QUADRO DE MÉDICOS DO CORPO DE SAÚDE DA
MARINHA - CP-CSM-MD/2018)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

QUADRO DE MÉDICOS

QUESTÃO 1

Dentre as alterações ortopédicas congênitas, qual é a mais comumente observada?

- (A) Pé Calcâneo Valgo.
- (B) Metatarso Adulto.
- (C) Pé Torto Congênito.
- (D) Pé Talo Vertical.
- (E) Joelho Varo.

QUESTÃO 2

Sobre a síndrome carcinoide, marque a opção correta.

- (A) A vasodilatação cutânea é transitória e costuma durar cerca de 5 minutos.
- (B) Durante os períodos sintomáticos em que se observa o rash, é comum elevação da pressão arterial.
- (C) As alterações no endocárdio das válvulas e câmaras cardíacas são mais encontradas no ventrículo direito.
- (D) Diarreia do tipo explosiva é mais comum do que a manifestação de diarreia secretória crônica.
- (E) Broncoconstrição é um dos sintomas mais comuns que acompanham o rash evanescente.

QUESTÃO 3

Sobre o tremor essencial é correto afirmar que:

- (A) afeta cerca de 25% das pessoas com mais de 65 anos.
- (B) geralmente é esporádico, não havendo influência genética importante.
- (C) costuma apresentar-se acompanhado de bradicinesia.
- (D) o início precoce do tratamento influencia no seu prognóstico.
- (E) propranolol e primidona estão entre as drogas de primeira linha para seu tratamento.

QUESTÃO 4

Marque a opção que apresenta um agente indutor intravenoso que causa supressão adrenal com infusão contínua.

- (A) Cetamina.
- (B) Propofol.
- (C) Midazolam.
- (D) Tiopental.
- (E) Etomidato.

QUESTÃO 5

A tríade de artrite reumatoide crônica, esplenomegalia e neutropenia, frequentemente acompanhada por linfadenopatia, hepatomegalia, febre, perda de peso, anemia e trombocitopenia, refere-se à Síndrome de:

- (A) Still.
- (B) Felty.
- (C) Reiter.
- (D) Sjogren.
- (E) Artropatia crônica juvenil.

QUESTÃO 6

Um homem procura o serviço de emergência com história de hematêmese e melena. Qual a mais frequente patologia a provocar esse quadro?

- (A) Varizes esofagianas.
- (B) Doença ulcerosa péptica.
- (C) Angiodisplasia.
- (D) Síndrome de Mallory-Weiss.
- (E) Esofagite erosiva.

QUESTÃO 7

A anestesia Geral será a técnica de escolha na paciente gestante em qual circunstância?

- (A) Grave crise de asma.
- (B) Estômago cheio.
- (C) Ruptura uterina.
- (D) Pneumopatia com secreção abundante.
- (E) Prematuridade.

QUESTÃO 8

O mecanismo de ação da sertralina é caracterizado pela inibição da recaptação de:

- (A) dopamina.
- (B) serotonina e dopamina.
- (C) norepinefrina.
- (D) dopamina e norepinefrina.
- (E) serotonina.

QUESTÃO 9

Muitas vezes o paciente considera o medicamento herbáceo inofensivo e até esquece de informar seu uso ao médico. Porém, sabe-se que o uso de alguns herbáceos devem ser suspensos no pré-operatório por estarem relacionados a complicações cirúrgicas. Sendo assim, assinale a opção correta sobre o uso desses medicamentos.

- (A) o uso de herbáceos não deve ser descontinuado.
- (B) o uso do alho deve ser suspenso pois aumenta o risco de tromboembolismo pulmonar.
- (C) apenas o Ginsen tem recomendação de ser suspenso devido ao risco de hipoglicemia pré-operatória.
- (D) o Ginko deve ser suspenso devido ao alto risco de sangramentos, principalmente quando associado a drogas que inibem agregação plaquetária.
- (E) todos os medicamentos devem ser suspensos, independentemente de sua origem.

QUESTÃO 10

A complicação mais importante da endocardite infecciosa é:

- (A) insuficiência cardíaca.
- (B) valvulopatia cardíaca.
- (C) embolia pulmonar.
- (D) cerebrite.
- (E) aneurisma micótico.

QUESTÃO 11

Quanto ao aleitamento materno, é correto afirmar que:

- (A) não ajuda o desenvolvimento do paladar.
- (B) favorece prevenção contra cárie dentária.
- (C) leva a um atraso no desenvolvimento orofacial.
- (D) evita melhor aceitação futura de alimentos saudáveis.
- (E) favorece quadros alergênicos.

QUESTÃO 12

A lesão tumoral óssea benigna, presente frequentemente em adultos jovens do sexo masculino, tipicamente com piora da dor à noite e melhora significativa com uso de aspirina denomina-se:

- (A) Osteocondroma.
- (B) Osteoma osteoide.
- (C) Fibroma não ossificante
- (D) Cisto unicameral.
- (E) Condrioblastoma.

QUESTÃO 13

O deslocamento anterior de uma vértebra sobre outra, acometendo comumente os níveis L4-L5 e L5-S1, refere-se à:

- (A) osteoartrose.
- (B) hérnia de disco.
- (C) discopatia degenerativa.
- (D) espondilolistese.
- (E) fratura vertebral.

QUESTÃO 14

Assinale a opção que apresenta o bloqueador neuromuscular não despolarizante de longa duração.

- (A) Pancurônio.
- (B) Rocurônio.
- (C) Vecurônio.
- (D) Cisatracúrio.
- (E) Mivacúrio.

QUESTÃO 15

Dentre as zonas flexoras da mão, aquela que representa a área do ligamento transversal, no túnel do carpo, é a zona:

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V

QUESTÃO 16

A complicação mais séria associada ao tratamento da displasia do desenvolvimento do quadril é:

- (A) alongamento do membro.
- (B) neuropraxia do nervo tibial.
- (C) instabilidade patelar.
- (D) claudicação.
- (E) osteonecrose cabeça do fêmur.

QUESTÃO 17

Dentre as síndromes de câncer familiar, é correto afirmar que:

- (A) a polipose adenomatosa familiar está relacionada à mutação do gene BRCA 1 (17q12-3) e câncer de célula renal.
- (B) a síndrome de Li Fraumeni está relacionada à mutação do gene P16 (3p21) e feocromocitoma.
- (C) a Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 2 (NEM 2) está relacionada à mutação do ret e câncer da tireóide, adenoma hipofisário e tumor de pâncreas.
- (D) o câncer gástrico difuso hereditário está relacionado à mutação do CDH1 (16q22) e câncer gástrico.
- (E) não existe característica familiar nos tumores malignos da tireoide.

QUESTÃO 18

De acordo com a classificação de Garden, para as fraturas do colo do fêmur, a fratura completa, sem desvio, corresponde ao tipo:

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V

QUESTÃO 19

Uma das complicações precoces que podem acontecer após uma tireoidectomia total é um distúrbio eletrolítico, que, se não diagnosticado e tratado de forma adequada, pode evoluir de forma fatal. Estamos falando de:

- (A) hipocalcemia aguda, que ocorre devido ao efeito diurético da alta concentração sanguínea do hormônio tireoidiano no pós-operatório imediato.
- (B) hipercalcemia, que ocorre pela secreção inadequadamente alta de paratormônio no pós-operatório.
- (C) hipercalemia aguda, que pode ocorrer devido à administração de doses altas de potássio no per operatório para profilaxia de arritmias.
- (D) hipocalcemia, que pode ocorrer devido à disfunção das paratireóides e consequente secreção inadequada (diminuída) de paratormônio.
- (E) hipoglicemia pelo tempo de jejum para o preparo cirúrgico.

QUESTÃO 20

Qual o medicamento indicado no tratamento da dependência de álcool?

- (A) Naltrexona.
- (B) Lítio.
- (C) Amantadina.
- (D) Memantina.
- (E) Donepezila.

QUESTÃO 21

O Antipsicótico de escolha para uso na gestação é:

- (A) Ziprazidona.
- (B) Aripiprazol.
- (C) Haloperidol.
- (D) Olanzapina.
- (E) Clozapina.

QUESTÃO 22

A respeito da Síndrome Compartimental Abdominal, é correto afirmar que:

- (A) pacientes de alto risco devem ter o abdome fechado, mesmo com tensão e uso de próteses (tela).
- (B) a pressão intra-abdominal pode ser facilmente avaliada, na beira do leito, apenas com uma régua e cateterismo vesical.
- (C) seu diagnóstico é restrito a pacientes em pós-operatório de cirurgias de parede abdominal (hérnias).
- (D) entre as manifestações clínicas encontra-se aumento do débito urinário, abdome tenso e desconforto respiratório.
- (E) cursa com diminuição severa da pressão intra-abdominal.

QUESTÃO 23

Que doença tem diagnóstico diferencial com quadro clínico de náuseas e vômitos de difícil controle após 9 semanas de gestação?

- (A) Pneumonia.
- (B) Hipertireoidismo.
- (C) Anemia megaloblástica.
- (D) Insuficiência cardíaca.
- (E) Hipotireoidismo.

QUESTÃO 24

A aspiração pulmonar de conteúdo gástrico durante a anestesia é uma complicação grave. Para evitar a aspiração, diretrizes de jejum foram desenvolvidas, e a ASA adotou as recomendações que orientam o período mínimo de jejum, após ingestão de fórmula infantil, o qual é de:

- (A) 8 horas.
- (B) 6 horas.
- (C) 4 horas.
- (D) 2 horas.
- (E) Não necessita de jejum.

QUESTÃO 25

Marque a opção que apresenta as características da demência de Pick.

- (A) Início abrupto, evolução em degraus e curso flutuante.
- (B) Início insidioso, comprometimento da atenção e alucinações visuais precoces.
- (C) Início abrupto, evolução rápida para demência grave e presença de espasmos musculares precoces.
- (D) Início insidioso, comprometimento, principalmente, da memória e alucinações auditivas.
- (E) Início antes dos 65 anos, alterações precoces de comportamento e comprometimento da memória em estágios avançados.

QUESTÃO 26

Uma paciente de 35 anos de idade comparece à emergência com queixa de lesão na região vulvar associada a muita dor. Ao exame físico nota-se a presença de três úlceras, associadas à linfadenopatia inguinal dolorosa. De acordo com essas informações, o diagnóstico de suspeição é de:

- (A) herpes.
- (B) cancroide.
- (C) sífilis.
- (D) condiloma.
- (E) neoplasia intraepitelial vulvar.

QUESTÃO 27

Assinale a opção que apresenta o fármaco que pode ser utilizado no tratamento da Síndrome Neuroléptica Maligna.

- (A) Agomelatina.
- (B) Bromocriptina.
- (C) Venlafaxina.
- (D) Clorpromazina.
- (E) Duloxetina.

QUESTÃO 28

Marque a opção que apresenta uma contraindicação à anestesia espínhal (neuroaxial) no parto.

- (A) Malformação de Arnold Chiari tipo 1.
- (B) Estados de hipovolemia.
- (C) Pré-eclâmpsia grave (anestesia combinada).
- (D) Doença cardíaca complexa.
- (E) Esclerose múltipla.

QUESTÃO 29

Pela classificação de Salter Harris, para lesões da placa fisária, o sinal de Thurston-Holland é observado em qual Tipo?

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V

QUESTÃO 30

Dentre as cardiopatias abaixo, qual é a cardiopatia congênita cianótica?

- (A) Comunicação Interatrial (CIA).
- (B) Defeito do Septo Átrio Ventricular total.
- (C) Tetralogia de Fallot.
- (D) Persistência do Canal Arterial.
- (E) Fibrilação Atrial.

QUESTÃO 31

Com relação aos fios utilizados para sutura, é correto afirmar que:

- (A) o polidioxanone é um fio monofilamentar, de polímero de poliéster, absorvível, que permanece até 50% em 4 semanas.
- (B) o polipropileno é um fio monofilamentar que está sujeito a degradação pela ação de enzimas teciduais.
- (C) o nailon é um fio inabsorvível, que não sofre hidrólise, e por isso não perde a força tênsil com o tempo.
- (D) a sutura de poliéster trançada é absorvível e perde gradualmente sua força tênsil por hidrólise.
- (E) a sutura com fio de aço é utilizada com frequência para fechamento da parede abdominal em reoperações.

QUESTÃO 32

Marque a opção que apresenta o nome do tumor ósseo maligno de aparecimento insidioso, mais frequentemente na faixa etária de 5 a 25 anos de idade, associado à febre, eritema, dor e edema, sugerindo osteomielite, com histologia apresentando pequenas células azuis com pouquíssima matriz intracelular.

- (A) Sarcoma de Ewing.
- (B) Adamantínoma.
- (C) Osteossarcoma
- (D) Mieloma múltiplo.
- (E) Condrossarcoma.

QUESTÃO 33

Na anatomia da coxa, os compartimentos miofasciais são em número de:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

QUESTÃO 34

Sobre as síndromes pós-gastrectomias, é correto afirmar que:

- (A) o *dumping* precoce ocorre principalmente após reconstrução a Bilroth II, com pequena ressecção gástrica.
- (B) o *dumping* tardio é a síndrome pós-gastrectomia mais comumente observada.
- (C) a síndrome da alça aferente ocorre principalmente quando o ramo aferente permanece com comprimento entre 30cm e 40cm e anastomose pré-cólica.
- (D) a síndrome da alça eferente ocorre quando o ramo aferente permanece maior que 30 cm.
- (E) seu aparecimento está relacionado à ingestão de alimentos ricos em sódio.

QUESTÃO 35

Dentre as doenças exantemáticas na infância, qual apresenta exantema vesicular, de etiologia viral?

- (A) Rubéola.
- (B) Exantema Súbito.
- (C) Varicela .
- (D) Citomegalovirose.
- (E) Toxoplasmose.

QUESTÃO 36

Uma paciente do sexo feminino, 33 anos de idade, apresenta há 4 anos, crises recorrentes e súbitas de ansiedade, taquicardia, falta de ar, sudorese e sensação de morte iminente. As crises são desencadeadas em lugares públicos, essa paciente tem medo de passar mal e não ser socorrida. De acordo com essas informações, assinale a opção que apresenta o provável diagnóstico da paciente.

- (A) Transtorno de ansiedade generalizada.
- (B) Fobia específica.
- (C) Transtorno de Pânico.
- (D) Transtorno Somatoforme.
- (E) Transtorno obsessivo compulsivo.

QUESTÃO 37

Uma paciente de 74 anos com queixa de "bola na vagina" ao exame físico apresenta prolapso uterino onde o colo do útero está a 1,0 cm abaixo do hímen e não mais que 2 cm a menos que o comprimento total da vagina. Essa paciente possui que estágio de prolapso uterino?

- (A) 0
- (B) I
- (C) II
- (D) III
- (E) IV

QUESTÃO 38

Qual das drogas está mais bem indicada no tratamento da Angina de Prinzmetal?

- (A) Sinvastatina.
- (B) Losartan.
- (C) AAS.
- (D) Propranolol.
- (E) Anlodipino.

QUESTÃO 39

Marque a opção que apresenta o nome do anestésico inalatório que é caracterizado como potente, com velocidade de indução e despertar rápido, não sendo adequado para indução inalatória, apresentando mínima sensibilização às catecolaminas.

- (A) Óxido nitroso.
- (B) Éter.
- (C) Halotano.
- (D) Sevoflurano.
- (E) Desflurano.

QUESTÃO 40

A principal via de disseminação dos tumores malignos da cabeça e do pescoço se dá pelo sistema linfático. Sendo assim, é correto afirmar que:

- (A) o nível V é limitado pelo osso hioide e os linfonodos são paratraqueais.
- (B) o nível II é limitado superiormente pela base do crânio, inferiormente por uma linha que parte do osso hioide, posteriormente pelo músculo esternocleidomastoideo e se divide em Ila e Iib (anterior e posterior ao nervo espinhal).
- (C) o nível I é o principal nível de drenagem do couro cabeludo.
- (D) o nível IV é o principal nível de drenagem dos tumores da língua.
- (E) o nível I é o principal nível de drenagem da cavidade nasal.

QUESTÃO 41

Considerando a idade materna no risco de anomalias genéticas fetais, pode-se considerar a realização do teste de 1º trimestre combinado que avalia:

- (A) alfafetoproteína, estriol não conjugado, fração beta da gonadotrofina coriônica humana e inibina-a dimérica.
- (B) translucência nucal, alfafetoproteína e fração beta da gonadotrofina coriônica humana.
- (C) translucência nucal, proteína plasmática associada à gravidez e fração beta da gonadotrofina coriônica humana.
- (D) alfafetoproteína, proteína plasmática associada à gravidez e fração beta da gonadotrofina coriônica humana.
- (E) translucência nucal, proteína plasmática associada à gravidez e inibina-a dimérica.

QUESTÃO 42

São consideradas lacerações perineais de segundo grau após parto transvaginal aquelas que envolvem as seguintes estruturas:

- (A) lesão do períneo envolvendo os músculos, porém não o esfíncter anal.
- (B) lesão do períneo envolvendo os músculos e menos de 50% da espessura do esfíncter anal externo.
- (C) lesão do períneo envolvendo os músculos e mais de 50% da espessura do esfíncter anal externo.
- (D) lesão do períneo envolvendo a pele e/ou a mucosa vaginal.
- (E) lesão do períneo envolvendo os músculos e o esfíncter anal externo e interno.

QUESTÃO 43

A diarreia aguda pode ter causas infecciosas e não infecciosas; as infecciosas têm uma maior prevalência e impacto na saúde da criança, principalmente nos menores de 5 anos. Sendo assim, dentre os agentes causadores de diarreia infecciosa, qual o mais prevalente nos surtos epidêmicos virais transmitidos por água ou alimentos ?

- (A) Shigella.
- (B) Astrovírus.
- (C) Adenovírus.
- (D) Norovírus.
- (E) Enterococo.

QUESTÃO 44

O agente infeccioso mais comum na osteomielite em crianças mais velhas e adultos é:

- (A) *Salmonella*.
- (B) *Pseudomonas*.
- (C) *Streptococcus*.
- (D) *Staphylococcus aureus*.
- (E) *Kingella*.

QUESTÃO 45

Marque a opção que apresenta as alterações encontradas no contexto da anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12.

- (A) Trombocitopenia, leucopenia, aumento de LDH, elevação da homocisteína e do ácido metilmalônico .
- (B) Diminuição do volume corpuscular médio das hemácias, trombocitopenia, leucocitose, aumento de LDH.
- (C) Aumento do volume corpuscular médio das hemácias, trombocitopenia, leucocitose, redução do LDH.
- (D) Aumento do volume corpuscular médio das hemácias, trombocitopenia, aumento do LDH, elevação da homocisteína com manutenção de níveis normais do ácido metilmalônico .
- (E) Trombocitose, leucopenia, aumento do LDH, redução dos níveis de homocisteína e aumento do ácido metilmalônico.

QUESTÃO 46

Assinale a opção que apresenta manifestações habitualmente encontradas na Hipercalcemia.

- (A) Dificuldade de concentração, úlcera péptica, poliúria, bradicardia e diminuição do intervalo QT no ECG.
- (B) Depressão, poliúria, hipotireoidismo, taquicardia e estímulo do nódulo AV demonstrado no ECG.
- (C) Euforia, nefrolitíase, úlcera de córnea, oligúria e aumento do intervalo QT no ECG.
- (D) Alteração da personalidade, hipotireoidismo, diminuição da sede, poliúria, diarreia e taquicardia.
- (E) Depressão, estupor, constipação, anorexia e aumento do intervalo QT no ECG.

QUESTÃO 47

A causa mais comum de uma oligoartropatia inflamatória em um homem jovem é:

- (A) Artrite gonocócica.
- (B) Artrite psoriásica.
- (C) Síndrome de Reiter.
- (D) Artrite reumatoide.
- (E) Artrite tuberculosa.

QUESTÃO 48

Uma paciente com 16 anos de idade apresenta quadro clínico de dismenorreia desde a menarca aos 12 anos. Essa paciente realizou videolaparoscopia com diagnóstico de endometriose. Assim, pode-se considerar como forma inicial de tratamento, EXCETO:

- (A) ressecção cirúrgica dos focos.
- (B) uso de contraceptivos orais de baixa dose.
- (C) controle clínico com analgésicos.
- (D) agonista GNRH com terapia *add-back*.
- (E) expectante.

QUESTÃO 49

A vacina quadrivalente do HPV baseada nos subtipos 6, 11, 16 e 18 e a bivalente nos subtipos 16 e 18, ajudam na prevenção do câncer de colo de útero, vulva e vagina, pênis, ânus, boca e orofaringe. Conforme o calendário vacinal de 2018, quanto à vacinação do HPV em meninas, assinale a opção correta.

- (A) Entre 9 e 14 anos de idade, esquema de duas doses (0-6 meses).
- (B) Entre 11 e 14 anos de idade, esquema de duas doses (0-6 meses).
- (C) Entre 9 e 14 anos de idade, esquema de três doses (0-3-6 meses).
- (D) Entre 9 e 14 anos de idade, esquema de três doses (0-2-6 meses).
- (E) Ainda não faz parte do calendário vacinal.

QUESTÃO 50

A anomalia congênita onde a posição média do esôfago encontra-se ausente é?

- (A) Hérnia Diafragmática.
- (B) Atresia Duodenal.
- (C) Atresia Intestinal.
- (D) Atresia de Esôfago.
- (E) Megacólon Congênito.

RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1- Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assinhe corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2- O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3- Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4- A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
- 5- Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 6- Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 7- Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 8- Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 9- O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
- 10- Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 11- Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assinhe o seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 12- Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

- 13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias (BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DENSM na Internet. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50