

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de 1 a 5 correspondem ao texto abaixo.

Tecendo a manhã

(João Cabral de Melo Neto)

1

*Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.*

2

*E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.*

- A partir da leitura de todo o poema, depreende-se que ele apresenta
 - a maneira como os galos gritam nas manhãs a fim de fazer com que todos acordem.
 - um fato sem importância que aconteceu em uma manhã qualquer.
 - um trabalho individualizado e que não tem um produto final.
 - a construção solidária de um objeto, de uma obra ou de uma nova sociedade.
- O provérbio que se aplica ao poema é
 - de grão em grão a galinha enche o papo.
 - uma andorinha só não faz verão.
 - cada um por si e Deus por todos.
 - quando um não quer dois não brigam.
- O poema apresenta basicamente as seguintes oposições:
 - individualidade ✕ coletividade e dependência ✕ autonomia.
 - trabalho ✕ ócio e solidariedade ✕ individualidade.
 - produtividade ✕ improdutividade e independência ✕ insegurança.
 - capacidade de criação ✕ falta de criatividade e atividade ✕ inatividade.
- Em **entretendendo** (entretender), nota-se a presença das palavras
 - entender; tenda; estender; entreter.
 - entre; tenda; entender; tender.
 - entre; entristecer; depender; tender.
 - entretenimento; entendimento; tendência; distender.

- Na oração *Um galo sozinho não tece uma manhã*, a palavra em destaque tem a função sintática de
 - sujeito.
 - adjunto adnominal de negação.
 - adjunto adverbial de negação.
 - objeto direto.

- No período *Como havia muitas pessoas na sala, fiquei sufocada*, a palavra **como** é uma conjunção subordinativa
 - comparativa.
 - proporcional.
 - conformativa.
 - causal.

Instrução: Nas questões 7 e 8, assinale a alternativa que preenche corretamente, pela ordem, as lacunas dos períodos apresentados.

- A documentação que _____ nesta tarde está completa, acabei de _____ amanhã bem cedo, como combinamos anteriormente. _____ ao _____.
 - me enviaram; conferi-la; Devolvê-la-ei; Avisem-me; recebê-la.
 - me enviaram; a conferir; Devolvê-la-ei; Me avisem; recebê-la.
 - enviaram-me; conferir-la; Devolverei-a; Avisem-me; receber-la.
 - enviaram-me; conferi-la; A devolverei; Me avisem; recebê-la.
- Devo ir _____ Curitiba _____ trabalho na próxima semana. A empresa aérea acabou de confirmar que meu voo sai _____ 5 horas da tarde do Aeroporto de Confins. _____ vezes costumo me atrasar, sairei de casa mais cedo _____ fim de não perder o voo.
 - à; a; às; As; à
 - à; à; às; Às; a
 - a; a; às; Às; a
 - a; a; as; Às; à
- A seqüência em que todas as palavras têm as sílabas separadas corretamente é
 - ca-ó-ti-co; nos-tal-gia; ex-ce-ção; tungs-tê-nio.
 - ab-so-lu-to; sa-í-da; fi-el; gar-ra-fa.
 - re-fle-xão; a-bru-pto; fe-no-lfta-le-í-na; p-si-co-se.
 - m-ne-mô-ni-co; Má-ri-o; coor-de-nar; sub-lu-nar.
- Todas as palavras estão acentuadas corretamente e recebem acento gráfico por seguirem a mesma regra de acentuação em
 - ítêm; também; armazéns; contém.
 - Jaú; balaústre; Pacaembú; baú.
 - calvície; mágoas; errôneos; imundície.
 - desejá-los; ímã; atrás; saída.

| | ESPECIALIDADE |
|---|---|
| <p>11. Todas as palavras estão corretamente grafadas em</p> <p>(A) aleijar; problema; supertição; etmologia.</p> <p>(B) carangueijo; propriedade; beneficiência; ponteagudo.</p> <p>(C) bugiganga; cataclisma; borburinho; surrupiar.</p> <p>(D) apropriado; astigmatismo; supetão; braguilha.</p> | <p>16. Paciente retornou ao consultório, após 3 dias, com queixa de dor aguda às mudanças de temperatura, após passar por procedimento clínico restaurador. Não revelou dor à percussão e à palpação. A imagem radiográfica está normal. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é</p> <p>(A) pulpite reversível.</p> <p>(B) abscesso apical agudo.</p> <p>(C) pericementite apical crônica.</p> <p>(D) pericementite apical aguda.</p> |
| <p>12. Todas as palavras são formadas por hibridismo em</p> <p>(A) passatempo; automóvel; embora; zunzum.</p> <p>(B) endovenosa; televisão; microondas; alcalóide.</p> <p>(C) monocultura; cilíndrico; amoroso; ajoelhar.</p> <p>(D) escriturário; desamor; leiteiro; biodança.</p> | <p>17. As raízes mesiovestibulares nos primeiros molares superiores com 2 canais são, aproximadamente, de</p> <p>(A) 10% a 25%</p> <p>(B) 30% a 45%</p> <p>(C) 60% a 75%</p> <p>(D) 80% a 95%</p> |
| <p>13. O uso de vírgula está INCORRETO em:</p> <p>(A) Se ela comprar um carro novo, ficará endividada.</p> <p>(B) A mulher, naquela hora, estava no quarto e o marido saía de casa.</p> <p>(C) É interessante, a oferta mas não tenho o dinheiro necessário.</p> <p>(D) No meio da confusão, a criança.</p> | <p>18. Paciente chega ao consultório queixando-se de dor no maxilar posterior direito. Os pré-molares e molares mostram sensibilidade à percussão, mas respondem normalmente aos testes de vitalidade. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é</p> <p>(A) sinusite maxilar aguda.</p> <p>(B) necrose pulpar do primeiro molar superior.</p> <p>(C) pulpite irreversível no segundo pré-superior.</p> <p>(D) fratura no segundo molar superior.</p> |
| <p>14. As orações em destaque:</p> <p><i>Esperamos que o novo chefe cumpra seu dever.</i></p> <p><i>Como estava chateada, não saí de casa.</i></p> <p>Estão corretamente classificadas, respectivamente, em</p> <p>(A) oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada adverbial causal.</p> <p>(B) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada adverbial causal.</p> <p>(C) oração subordinada substantiva completiva nominal e oração coordenada sindética explicativa.</p> <p>(D) oração subordinada substantiva subjetiva e oração subordinada adverbial final.</p> | <p>19. Dente despulpado com ápice aberto, divergente,</p> <p>(A) deve ser extraído, pois não há condições de tratá-lo endodonticamente.</p> <p>(B) deve ser tratado cirurgicamente com obtenção retrógrada.</p> <p>(C) é um candidato à técnica de apicificação.</p> <p>(D) pode ser tratado pela terapêutica endodôntica convencional.</p> |
| <p>15. Ao relacionar a coluna da direita com a da esquerda, numerando as figuras de linguagem, a seqüência correta é</p> <p>I. Eles, o seu único desejo é exterminar-nos. (Garret) 1. pleonasma</p> <p>II. Maria embarcou em um avião gigantesco. 2. anacoluto</p> <p>III. Li Machado de Assis ainda no ginásio. 3. metonímia</p> <p>IV. A mulher não acreditava naquilo que seus próprios olhos viam. 4. catacrese</p> <p>(A) I-2 ; II-4 ; III-3 ; IV-1</p> <p>(B) I-2 ; II-4 ; III-1 ; IV-3</p> <p>(C) I-3 ; II-1 ; III-4 ; IV-2</p> <p>(D) I-3 ; II-2 ; III-4 ; IV-1</p> | <p>20. O forame principal do canal radicular está</p> <p>(A) associado ao ápice do dente.</p> <p>(B) localizado freqüentemente ao lado da raiz.</p> <p>(C) determinado, geralmente, pelo <i>comprimento da raiz</i>.</p> <p>(D) localizado no terço médio.</p> |
| | <p>21. Em lesões periapicais,</p> <p>(A) o índice de sucesso, após o tratamento endodôntico aproxima-se de 20%, segundo Berbert (1978).</p> <p>(B) o cisto residual apresenta-se independentemente da área apical e o tratamento endodôntico não terá efeito.</p> <p>(C) a descompressão, enucleação e marsupialização são tipos de tratamento de granulomas.</p> <p>(D) os estudos radiográficos mostram uma proporção aproximada de 25% de granuloma e de 75% de cisto.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>22. A pericementite apical aguda caracteriza-se</p> <p>(A) pelo trajeto fistuloso que drena pus.</p> <p>(B) pela predominância histológica de linfócitos e edemas.</p> <p>(C) pela queixa persistente no consumo de doces.</p> <p>(D) pela possibilidade de causa por traumatismo em dente com polpa viva.</p> | <p>28. O efeito do edema sobre a fisiologia da polpa é</p> <p>(A) pressão intersticial reduzida.</p> <p>(B) transporte sanguíneo ausente.</p> <p>(C) suprimento sanguíneo aumentado na região.</p> <p>(D) necrose tecidual localizada pela hipoxia e anóxia.</p> |
| <p>23. Basicamente, a inflamação é uma resposta</p> <p>(A) celular.</p> <p>(B) nervosa.</p> <p>(C) vascular.</p> <p>(D) histológica.</p> | <p>29. Apresenta-se ativa, de forma cilindro-cônica, extralonga, com 6 lâminas cortantes, helicoidais e atuando lateralmente, sem vibrações. Trata-se da broca</p> <p>(A) endo z.</p> <p>(B) <i>batt</i>.</p> <p>(C) largo.</p> <p>(D) <i>gates</i>.</p> |
| <p>24. Paciente apresenta sensibilidade à percussão, mas, positivamente aos testes de vitalidade. Nesse caso, o tipo de tratamento MAIS aceitável é o de</p> <p>(A) ajuste oclusal.</p> <p>(B) restauração temporária.</p> <p>(C) pulpectomia total.</p> <p>(D) melhora espontânea.</p> | <p>30. A dentina secundária é formada lentamente por meio da síntese da matriz de dentina pelos odontoblastos em relação</p> <p>(A) às lesões de cárie.</p> <p>(B) aos estímulos fisiológicos.</p> <p>(C) ao uso de material tóxico em cavidades profundas.</p> <p>(D) ao aquecimento da dentina em preparos cavitários.</p> |
| <p>25. A técnica de condensação vertical para a obturação de canais radiculares implica</p> <p>(A) a utilização de um espaçador digital compatível com o diâmetro do canal.</p> <p>(B) a preparação de um canal com paredes paralelas.</p> <p>(C) as 3 dimensões pelo amolecimento da guta-percha por calor e condensação da massa.</p> <p>(D) a adaptação do cone primário no comprimento do canal preparado.</p> | <p>31. São microorganismos de importância endodôntica:</p> <p>(A) bastonetes <i>gram</i> - aeróbicos</p> <p>(B) bastonetes <i>gram</i> + anaeróbicos</p> <p>(C) <i>cocos gram</i> – anaeróbicos</p> <p>(D) <i>cocos gram</i> + aeróbicos</p> |
| <p>26. Os canais acessórios e laterais são encontrados com maior frequência</p> <p>(A) no terço médio da raiz.</p> <p>(B) no terço apical da raiz.</p> <p>(C) em qualquer parte da raiz.</p> <p>(D) na região da furca.</p> | <p>32. É um cimento obturador à base de hidróxido de cálcio [Ca(OH)₂]:</p> <p>(A) Ketac-endo®</p> <p>(B) Fillcanal®</p> <p>(C) Cimento de Rickert®</p> <p>(D) Apexit®</p> |
| <p>27. O melhor meio para o diagnóstico diferencial de um abscesso apical agudo em relação a um abscesso periodontal agudo é</p> <p>(A) teste pela anestesia.</p> <p>(B) palpação.</p> <p>(C) teste de vitalidade pulpar.</p> <p>(D) exame radiográfico.</p> | <p>33. A técnica de Ingle pressupõe</p> <p>(A) que a partir do dente, na radiografia, diminuam-se 4 a 5 mm da medida observada.</p> <p>(B) reposicionar o instrumento para uma nova tomada radiográfica quando a diferença entre o término e o ápice radicular for igual ou superior a 2 mm.</p> <p>(C) sugerir a técnica radiográfica de Clark.</p> <p>(D) introduzir o instrumental no canal utilizando a borda incisal ou cúspide do dente como referências.</p> |

34. Segundo Leonardo *todo exame radiográfico implica preocupação quanto à determinação da dose de radiação ao qual o paciente é submetido*. O sistema digital, em relação aos filmes convencionais, propaga que a dose de radiação, atualmente, tem uma redução aproximada de
- (A) 20% a 80%
 - (B) 30% a 80%
 - (C) 40% a 90%
 - (D) 50% a 90%
-
35. É uma contra-indicação geral da cirurgia paraendodôntica, segundo Leonardo,
- (A) a oclusão traumática.
 - (B) os processos patológicos em fase aguda.
 - (C) os problemas periodontais severos com suporte ósseo insatisfatório.
 - (D) a radiação nos maxilares recebida pelos pacientes.
-
36. A presença de lesão periapical crônica em dentes, suporte de próteses fixas grandes cuja remoção para retratamento convencional dos canais radiculares envolve extenso trabalho e alto custo, é uma indicação de
- (A) apicectomia.
 - (B) obturação retrógrada.
 - (C) instrumentação e obturação do canal radicular por via retrógrada.
 - (D) curetagem com alisamento ou plástica apical.
-
37. Segundo a técnica de Bregman, o CRD é
- (A) CRI x CAD / CAI
 - (B) CAI x CAD / CPD
 - (C) CPD x CRI / CAD
 - (D) CAI x CPD / CRI
-
38. Dentre as síndromes dolorosas dos maxilares que simulam a odontalgia, uma apresenta dor intensa e pulsátil em vários dentes superiores posteriores e não-episódica. Segundo Cohen, trata-se de
- (A) nevralgia do trigêmio.
 - (B) cefaléia em salvas.
 - (C) otite média aguda.
 - (D) sinusite bacteriana.
-
39. O ângulo de incidência horizontal recomendado em endodontia para pré-molares superiores com duas raízes e dois canais é
- (A) ortorradial.
 - (B) distorradial.
 - (C) mesiorradial.
 - (D) vestibulorradial.
-
40. Paciente, sexo feminino, 26 anos de idade, apresenta dor intensa, temperatura elevada e gânglios linfáticos palpáveis. Os dentes possuem pequena mobilidade e não há presença de edema, dificultando a detecção de alterações radiográficas. Nesse caso, o diagnóstico é
- (A) osteomielite aguda.
 - (B) osteomielite crônica.
 - (C) abscesso fênix crônico.
 - (D) abscesso periapical agudo.