



## Questões de Conhecimento Específico

01. Para fins de comunicação de parcerias sexuais em casos de infecções sexualmente transmissíveis (IST), considera-se como parcerias sexuais o último ano para casos de:

- A) Tricomoníase.
- B) Corrimento uretral.
- C) Sífilis secundária.
- D) Sífilis latente.

02. A infecção gonocócica na gestante poderá estar associada a um maior risco de prematuridade, ruptura prematura de membrana, perdas fetais, retardo de crescimento intrauterino e febre puerperal. No recém-nascido (RN), a principal manifestação clínica é a:

- A) Febre.
- B) Conjuntivite.
- C) Meningococemia.
- D) Infecção urinária.

03. Para gonorreia que se apresenta como infecção anogenital não complicada (uretra, colo do útero e reto) recomenda-se como tratamento:

- A) Ciprofloxacina 500 mg, VO, dose única associado a Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, dose única.
- B) Ceftriaxona, 500 mg, IM, dose única associada a Ciprofloxacina 500 mg, VO, dose única.
- C) Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, dose única.
- D) Amoxicilina 500 mg, VO, 3xdia, 7 dias associada a Doxiciclina 100 mg, VO, 2xdia, 7 dias.

04. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

*“A hepatite viral \_\_\_\_\_ é uma infecção de transmissão parenteral, predominantemente, pela via sexual. A transmissão vertical também pode ocorrer, e ocasiona uma evolução desfavorável, com maior chance de cronificação.”*

- A) A.
- B) B.
- C) C.
- D) E.

05. Não é recomendada a pesquisa de rotina no pré-natal devido ao baixo índice de detecção do agravo em gestantes e à ausência de imunoprofilaxia ou intervenção medicamentosa que possam prevenir a transmissão vertical. Trata-se da:

- A) Hepatite B.
- B) Hepatite C.
- C) Sífilis.
- D) Toxoplasmose.

06. Sobre o tratamento da anafilaxia, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

(\_) - A reação anafilática é sempre uma condição de absoluta emergência;

(\_) - O objetivo do tratamento é a manutenção da oxigenação e a perfusão de órgãos vitais;

(\_) - A adrenalina é a droga de escolha e deve ser imediatamente administrada. A epinefrina é administrada em solução aquosa a 1:1.000, dose para adultos é de 1 a 2 ml por via intramuscular ou subcutânea.

- A) V/V/F.
- B) V/F/F.
- C) F/V/V.
- D) F/F/V.

07. Sobre a anamnese do paciente com queixa de cefaleia, é correto afirmar que:

- A) Na migrânea a dor é habitualmente generalizada, descrita na maioria dos casos como uma dor em aperto ou como uma faixa em torno da cabeça.
- B) Na cefaleia tensional é mais comum a dor unilateral.
- C) As cefaleias primárias tais como a migrânea e a tensional costumam ser cronicamente recorrentes.
- D) As cefaleias primárias tais como a migrânea e a tensional não seguem um padrão nos episódios de exacerbação.

08. Dos sinais de alerta do paciente com queixa de cefaleia, o surgimento de cefaleia após os 50 anos deve levar o clínico a suspeitar de:

- A) Adenoma de hipófise.
- B) Arterite de células gigantes – arterite temporal.
- C) Hidrocefalia.
- D) Encefalite.

09. Nas cefaleias de fraca intensidade, o médico poderá utilizar para o tratamento medicamentos do tipo:

- A) Dipirona, Diclofenaco sódico e Ibuprofeno.
- B) Sumatriptano, Naratriptano e Ácido acetilsalicílico.
- C) Rizatriptano, Ácido tolfenâmico e Clonixinato de lisina.
- D) Sumatriptano, Clorpromazina e Indometacina.

10. Para tratamento de cefaleias em adolescentes, a sociedade brasileira de cefaleia recomenda como posologia para o Naproxeno sódico:

- A) 0,5mg/dose.
- B) 0,04mg a 0,08mg/kg/dose até 3 doses/dia.
- C) 10mg a 20mg/kg/dose até 4 doses/dia.
- D) 2,5mg a 5mg/kg/dose até 4 doses.

11. Entre os sinais de irritação meníngea, o médico deverá avaliar a positividade dos sinais de:

- A) Murphy e Romãña.
- B) Kerning e Brudzinski.
- C) Halban e Roving.
- D) Lasegue e Xale.

12. Em crises convulsivas em adultos acima de 35 anos, o clínico deverá identificar condições como:

- A) Tumor cerebral, distúrbios genéticos e uso de cocaína.
- B) Doença cerebrovascular, abstinência de álcool e hipoglicemia.
- C) Traumatismos, síndromes metabólicas carenciais e hipocalcemia.
- D) Hemorragias cranianas, convulsões febris e hipóxia.

13. Ataxia, tontura, diplopia, vertigem, anemia aplástica, leucopenia, irritação gastrointestinal, hepatotoxicidade e hiponatremia são efeitos colaterais da droga antiepiléptica denominada:

- A) Fenitoína.
- B) Fenobarbital.
- C) Carbamazepina.
- D) Valproato.

14. Sobre as novas drogas antiepilépticas, considere os itens a seguir com relação aos seus efeitos colaterais:

I. *Lomotrigina: Reações dermatológicas, síndrome de Stevens-Johnson (SJS), necrólise epidérmica tóxica têm sido relatados. A suspensão abrupta pode provocar crises de rebote;*

II. *Gabapentina: Sonolência (em 24% dos pacientes), tonturas (em 20,3%) e ataxia (em 17,4%), principalmente no início do tratamento;*

III. *Topiramato: Parestesias, particularmente "pontadas" nas extremidades, disfunção auditiva ou zumbido, perda do apetite, alterações do paladar e distúrbios gastrintestinais.*

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.

15. Entre as drogas ilícitas, a mais comum relacionada à cetoacidose diabética é:

- A) Maconha.
- B) Álcool.
- C) Cocaína.
- D) Diazepam.

16. Diarreias prolongadas geralmente estão associadas, quando infecciosas, a agentes etiológicos do tipo:

- A) *Clostridium difficile, Salmonella e Shigella.*
- B) *Rotavírus, Norwalk e Cryptosporidium.*
- C) *Candida albicans, Clostridium perfringens e Bacillus cereus.*
- D) *Giardia lamblia, Cryptosporidium, Escherichia coli enteropatogênica clássica.*

17. Nos casos de diarreia são contra-indicações para realização da Terapia de Reidratação Oral (TRO), exceto:

- A) Vômitos persistentes.
- B) Distensão abdominal grave íleo parálítico.

- C) Alteração de consciência.
- D) Ganho suficiente de peso após as primeiras horas de TRO.

18. Saturação O<sub>2</sub> 91%-95%; PaO<sub>2</sub> > 60mmHg; PaCO<sub>2</sub> < 45mmHg são achadas no paciente asmático que indicam quadro:

- A) Leve.
- B) Moderado.
- C) Grave.
- D) Muito grave.

19. Nos casos de asma, os corticoides sistêmicos aumentam a velocidade de alívio dos sintomas, especialmente se:

- I. *O tratamento inicial com  $\beta$ 2 de curta duração falhar;*
- II. *O paciente já usa corticoide sistêmico;*
- III. *Houve necessidade de corticoide sistêmico em exacerbação prévia.*

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.

20. Para pacientes com dor abdominal em quadrante superior esquerdo, o médico deverá investigar causas do tipo:

- A) Abscesso esplênico e pancreatite.
- B) Salpingite e nefrolitíase.
- C) Isquemia mesentérica e Malária.
- D) Doença inflamatória pélvica (DIP) e Adenite Mesentérica.

### ***Questões de Língua Portuguesa***

21. A morfologia está agrupada em dez classes, denominadas classes de palavras ou classes gramaticais. Não é uma delas:

- A) Substantivo.
- B) Procedência.
- C) Artigo.
- D) Numeral.

22. Não deveria haver acento indicador de crase em qual dos casos abaixo?

- A) Marcaram o encontro no restaurante para às 20h.
- B) Saímos à noite.
- C) No verão, voltamos àquela praia.
- D) Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa.

23. *“Que lindas flores!”*

O termo em destaque na frase acima exerce a função de:

- A) Substantivo.
- B) Advérbio.
- C) Pronome.
- D) Preposição.

24. Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita?

- A) Estava ansioso pela eminêssia da lisenssa.
- B) Estava ansioso pela iminência da licença.
- C) Estava ancioso pela eminensia da licença.
- D) Estava ancioso pela iminência da licença.

25. A semântica estuda:

- A) Posição das palavras na frase.
- B) Significado das palavras.
- C) Divisão silábica.
- D) Acentuação.

26. Não corresponde a sinônimos:

- A) Âmago – Cerne.
- B) Esperto – Ardiloso.
- C) Arroubo – Entusiasmo.
- D) Belicoso – Dilapidado.

27. Assinale a alternativa incorreta. Tendo em vista a função que exercem, as orações subordinadas classificam-se em:

- A) Subordinadas substantivas.
- B) Subordinadas adjetivas.
- C) Subordinadas remissivas.
- D) Subordinadas adverbiais.

28. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Nomenclatura Gramatical Brasileira, os termos da oração podem ser:

- A) Essenciais.
- B) Integrantes.
- C) Efêmeros.
- D) Acessórios.

29. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras está corretamente escrita:

- A) Mendingo – Cabelerero.
- B) Degladiar – Previlégio.
- C) Possui – Contribue.
- D) Empecilho – Periquito.

30. As orações coordenadas subdividem-se em:

- A) Simpáticas e Parassimpáticas.
- B) Plenas e Parciais.
- C) Assindéticas e Sindéticas.
- D) Côncavas e Convexas.

### **Questões de Conhecimentos Gerais**

31. Segundo a Lei Orgânica de Barra Bonita – SC, é de competência administrativa comum do município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas:

- I. *Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;*
- II. *Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público justificado, sob a pena de nulidade do ato;*
- III. *Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos fatores desfavoráveis.*

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e III estão corretos.
- B) Apenas os itens II e III estão corretos.
- C) Apenas os itens I e II estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.

32. No Brasil, a caverna mais profunda fica no Amazonas com cerca de 670 metros de desnível. Ela é chamada de:

- A) Abismo Verde.
- B) Caverna do Diabo.
- C) Abismo Guy Collet.
- D) Toca da Onça.

33. O menor país do mundo, em extensão territorial, é o Vaticano, localizado no continente:

- A) Africano.
- B) Europeu.
- C) Americano.
- D) Asiático.

34. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

*“A Revolta da Vacina foi uma rebelião popular contra a \_\_\_\_\_, ocorrida no Rio de Janeiro, em novembro de 1904.”*

- A) Vacina Anti- difteria.
- B) Vacina Anti- poliomielite.
- C) Vacina Anti-varíola.
- D) Vacina Anti- tétano.

35. *Os Estados Unidos declarou em maio/2019 apoio oficial à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), de acordo com uma publicação do Itamaraty em rede social que foi compartilhada também pela Embaixada dos EUA em Brasília.*

*(Fonte adaptada: <https://g1.globo.com/>>acesso em 22 de maio de 2019)*

Em relação à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), analise:

- I. *Constitui foro composto por 136 países;*
- II. *É dedicado à promoção de padrões convergentes em vários temas, como questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais;*
- III. *O MEC mantém parceria com a OCDE para a promoção de políticas públicas voltadas à melhoria da educação.*

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens II e III estão corretos.
- C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.