

Médico Especialista Pediatria

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.

• Este caderno de questões está assim constituído:

| DISCIPLINAS | Nº QUESTÕES |
|---------------------------------|-------------|
| Saúde Pública | 04 |
| Legislação Geral | 04 |
| Noções de Segurança do Trabalho | 02 |
| Conhecimentos Específicos | 30 |

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

• O tempo de duração da prova objetiva será de **até três horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

• Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

✂

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|
| 01 | <input type="checkbox"/> | 02 | <input type="checkbox"/> | 03 | <input type="checkbox"/> | 04 | <input type="checkbox"/> | 05 | <input type="checkbox"/> | 06 | <input type="checkbox"/> | 07 | <input type="checkbox"/> | 08 | <input type="checkbox"/> | 09 | <input type="checkbox"/> | 10 | <input type="checkbox"/> |
| 11 | <input type="checkbox"/> | 12 | <input type="checkbox"/> | 13 | <input type="checkbox"/> | 14 | <input type="checkbox"/> | 15 | <input type="checkbox"/> | 16 | <input type="checkbox"/> | 17 | <input type="checkbox"/> | 18 | <input type="checkbox"/> | 19 | <input type="checkbox"/> | 20 | <input type="checkbox"/> |
| 21 | <input type="checkbox"/> | 22 | <input type="checkbox"/> | 23 | <input type="checkbox"/> | 24 | <input type="checkbox"/> | 25 | <input type="checkbox"/> | 26 | <input type="checkbox"/> | 27 | <input type="checkbox"/> | 28 | <input type="checkbox"/> | 29 | <input type="checkbox"/> | 30 | <input type="checkbox"/> |
| 31 | <input type="checkbox"/> | 32 | <input type="checkbox"/> | 33 | <input type="checkbox"/> | 34 | <input type="checkbox"/> | 35 | <input type="checkbox"/> | 36 | <input type="checkbox"/> | 37 | <input type="checkbox"/> | 38 | <input type="checkbox"/> | 39 | <input type="checkbox"/> | 40 | <input type="checkbox"/> |

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

SAÚDE PÚBLICA

1) Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A _____ é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde.

- a) rede de atenção à produção
- b) atenção às doenças transmissíveis
- c) vigilância em saúde do trabalhador
- d) vigilância epidemiológica
- e) vigilância sanitária

2) Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo:

A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de centralização e dependência dos demais componentes da rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde (2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

3) Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde é conhecida como:

- a) Consultório na rua.
- b) Equipe especializada de rua.
- c) Unidades Básicas de Saúde.
- d) Centros de Atenção Psicossocial.
- e) Centro de Referência de Assistência Social.

4) Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO afirmar que:

- a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma desigual.
- c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário às crianças vulneráveis.
- d) Haverá utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar duplicidade de ações para fins idênticos.

LEGISLAÇÃO GERAL

5) Em conformidade com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à imagem.
- b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
- c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
- e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

6) De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, analisar a sentença abaixo:

As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades com fins lucrativos (1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País (2ª parte). A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo tipo de comercialização (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

7) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida licença ao servidor:

- I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo.
- II. Por motivo de doença em pessoa da família.
- III. Para tratar de interesse particular.
- IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

8) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é CORRETO afirmar que:

- a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 5% sobre o vencimento.
- b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da manhã, cada hora será remunerada como duas horas.
- c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre o valor das horas diurnas.
- d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre o valor das horas formais.
- e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 40% sobre o vencimento.

NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO

9) Em conformidade com a NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, sobre os graus de insalubridade, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Grau máximo.
- (2) Grau médio.
- () Trabalho ou operações em contato permanente com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose).
- () Trabalho ou operações em contato permanente com esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano (coleta e industrialização).
- () Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagiante em resíduos de animais deteriorados.

- a) 1 - 1 - 2.
- b) 1 - 2 - 2.
- c) 1 - 2 - 1.
- d) 2 - 1 - 1.
- e) 2 - 2 - 1.

10) Em conformidade com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo:

Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto (1ª parte). Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais para facilitar a sua identificação e higienização domiciliar (2ª parte). Deverá ser vedado o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Segundo o Estatuto do Idoso, analisar a sentença abaixo:

As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e a grupos de autoajuda (1ª parte). Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles ao Ministério Público (2ª parte). Considera-se violência contra o idoso somente a ação praticada em local público que lhe cause morte ou sofrimento físico ou psicológico (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

12) Em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em relação ao atendimento, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento ao público.
- () O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência, para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica, é dispensável em todos os casos, devido à condição de saúde.
- () As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre a condição de saúde dessa pessoa.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - C.
- d) E - C - E.
- e) C - C - C.

13) Sobre a notificação compulsória de doenças e agravos, analisar os itens abaixo:

- I. A notificação compulsória é facultativa para Médicos, sendo realizada por outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços privados de saúde.
- II. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa.
- III. A notificação compulsória imediata é realizada em até 3 dias, diante da confirmação de doença ou agravo que tenha grande letalidade e que seja um problema de saúde pública.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Nenhum dos itens.

14) Sobre o Código de Ética Médica, analisar os itens abaixo:

- I. É vedado ao Médico deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, com exceção de quando vários médicos tenham assistido o paciente.
- II. É vedado ao Médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
- III. É permitido ao Médico assinar em branco as folhas de receituários, os atestados, os laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens I e III.
- e) Todos os itens.

15) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, é considerado o princípio do(a):

- a) Integralidade da assistência.
- b) Universalidade de acesso.
- c) Preservação da autonomia.
- d) Integração em nível executivo das ações de saúde.
- e) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

16) A obesidade infantil é uma questão crescente no Brasil e no mundo, preocupando não somente os pais e responsáveis, mas também as organizações de saúde. Sobre a obesidade infantil, analisar os itens abaixo:

- I. Crianças com obesidade têm mais risco de desenvolver doenças em articulações e ossos, diabetes e problemas cardíacos na vida adulta.
- II. Caracteriza-se por uma disfunção ocasionada pelo excesso de peso em crianças de 12 a 18 anos.
- III. O tratamento para a obesidade infantil deve passar por alguns campos importantes. A mudança no estilo de vida consiste em um deles. Na verdade, trata-se do pilar fundamental para reduzir peso e melhorar a saúde.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Nenhum dos itens.
- e) Todos os itens.

17) Em relação aos conhecimentos farmacológicos, sobre a bromocriptina, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

O alcaloide do mesilato de bromocriptina é de ação rápida, _____ do receptor da dopamina, sendo que esta suprime a secreção de prolactina. Quando se deseja a gravidez, esse medicamento é _____.

- a) agonista | retirado
- b) agonista | preferível
- c) antagonista | de escolha
- d) antagonista | suspenso
- e) sinergista | suspenso

18) O exame físico começa com a anamnese, seguida da observação do paciente e passando-se para o diagnóstico diferencial. A execução do exame físico é focalizada nos sistemas sugeridos pelo diagnóstico diferencial, fazendo-se testes ou manobras com o foco em questões específicas. Em relação ao exposto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () No caso de suspeita de hipovolemia, o pulso e a pressão arterial devem ser tomados com o paciente em pé e deitado, para observação de hipotensão postural.
- () O baqueteamento digital pode indicar doenças pulmonares, como câncer ou cardiopatia cianótica crônica.
- () A percussão dos campos pulmonares pode ser útil na identificação de hipertimpanismo por pneumotórax hipertensivo ou de macicez por pneumonia consolidada ou derrame pleural.

- a) C - C - E.
- b) C - C - C.
- c) E - E - E.
- d) E - C - E.
- e) C - E - E.

19) Em relação à manutenção da saúde na mulher adulta, são indicados, na prevenção da osteoporose:

- I. Evitar álcool e tabaco.
- II. Uso de baclofeno.
- III. Fazer atividade física regularmente.
- IV. Repor cálcio e vitamina D.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II, III e IV.
- d) Somente os itens I, III e IV.
- e) Nenhum dos itens.

20) No laboratório clínico, os termos sensibilidade e especificidade têm significados alternativos que se aplicam aos exames, e os diferentes usos desses termos podem causar confusão. Sobre esse assunto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A especificidade analítica pode se referir à menor concentração detectável do analito, que pode ser medida com alguma certeza definida.
- () A métrica comumente usada para um exame laboratorial segue especificamente a sensibilidade, sendo a especificidade duvidosa quanto a sua versão de certeza.
- () A especificidade analítica se refere à extensão em que outras substâncias, no sistema do exame, interferem com a medida do analito de interesse.

- a) C - C - E.
- b) E - E - E.
- c) E - E - C.
- d) E - C - C.
- e) C - E - E.

21) Sobre a vacina BCG, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Protege contra formas graves de tuberculose.
- () Pode ser aplicada em gestantes e pessoas imunodeprimidas, sem contraindicação.
- () A criança exposta ao HIV, que chega ao serviço ainda não vacinada, poderá receber a vacina se assintomática e sem sinais de imunodepressão.
- () A partir dos 5 anos de idade, pessoas portadoras de HIV não devem receber a vacina.

- a) C - C - E - E.
- b) E - E - C - E.
- c) C - E - C - C.
- d) E - C - E - C.
- e) E - E - E - E.

22) Em relação à abordagem da hematúria, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A presença de eosinófilos na urina são sugestivos de nefrite intersticial.
 - () A presença de cilindros hemáticos é sugestiva de patologia glomerular renal.
 - () Não existe nefrite intersticial causada por medicamentos.
- a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
e) E - E - E.

23) Mãe traz lactente de 5 meses à emergência, por quadro de choro intenso, agitação e baixa aceitação da amamentação, há 3 horas. Ao exame, FC = 210bpm, FR = 58mrpm, PA = 66/32mmHg, temperatura = 38,5°C, bons pulsos e perfusão, muito agitado. Solicita-se um eletrocardiograma, que evidencia ondas P de aspecto normal, intervalo R-R regular, FC = 212bpm, complexos QRS 0,08s. Com relação à taquicardia, a etiologia mais provável e a conduta são:

- a) Taquicardia supraventricular; manobra vagal.
- b) Taquicardia supraventricular; adenosina.
- c) Taquicardia supraventricular; cardioversão sincronizada.
- d) Taquicardia sinusal; antitérmico e investigação do quadro febril.
- e) Taquicardia sinusal; cardioversão química.

24) Sobre febre e hipertermia, analisar a sentença abaixo:

Febre ou pirexia é a condição na qual o organismo determina aumento na temperatura corporal como uma resposta organizada e coordenada a uma doença ou agressão, a fim de aumentar a eficácia dos mecanismos de defesa (1ª parte). A febre deve ser diferenciada da hipertermia, que consiste na elevação da temperatura corporal de maneira não coordenada e contra as tentativas do organismo de manter um estado de eutermia (2ª parte). A hipertermia ocorre como consequência do desequilíbrio entre a produção de calor e a sua dissipação, podendo ocorrer por excesso de calor ambiental (insolação, internação) ou por interferência na função do centro termorregulador (lesão cerebral, drogas ou metabolitos) (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

25) Em relação à avaliação diagnóstica, analisar a sentença abaixo:

Os objetivos da avaliação diagnóstica psiquiátrica na criança e no adolescente são determinar se há riscos psicopatológicos ou de desenvolvimento e, quando houver, estabelecer uma fórmula explicativa e um diagnóstico diferencial, além de determinar se há tratamento indicado e, quando houver, desenvolver um plano de tratamento e facilitar o envolvimento dos pais e filhos nesse plano (1ª parte). Os objetivos da avaliação diagnóstica são esclarecer as razões de encaminhamento, obter um posicionamento preciso sobre o funcionamento de desenvolvimento da criança e a natureza e extensão das dificuldades psicossociais da criança, comprometimento funcional e sofrimento subjetivo, além de identificar fatores individuais, familiares ou ambientais potenciais que podem ser responsáveis por influenciar ou melhorar essas dificuldades (2ª parte). Os assuntos irrelevantes ao diagnóstico e planejamento do tratamento podem se estender a fatores genéticos, constitucionais e temperamentais, psicodinâmica individual, habilidades cognitivas, de linguagem e sociais, padrões de interação familiar nas práticas da criação dos filhos e influências da comunidade, escola ou socioeconômicas (3ª parte).

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

26) Frequentemente, durante a consulta médica, os pacientes queixam-se de dor abdominal. O principal desafio é realizar uma avaliação clínica que permita distinguir os quadros abdominais agudos que requerem cirurgia daqueles que podem ser tratados clinicamente em regime ambulatorial. Sendo assim, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A distensão abdominal é determinada pela contração das fibras musculares lisas intestinais e pelo aumento do conteúdo intraluminal por exsudação ou acúmulo de gases e secreções digestivas.
- b) Quando existe anorexia, descarta-se de imediato a possibilidade de diagnóstico inflamatório e/ou infecção abdominal.
- c) A dor de parede abdominal, muitas vezes esquecida, deve ser suspeitada quando a dor se altera com a alimentação ou evacuação, acompanhada de náuseas, vômitos ou diarreia.
- d) A dor abdominal recorrente ou constante se relaciona, frequentemente, com hérnias da parede abdominal, hematomas de parede abdominal, aprisionamento do nervo do reto ou cutâneo lateral torácico, herpes-zoster ou dor miofascial.
- e) A dor abdominal cólica com pirose, logo após a ingestão de alimentos, sugere úlcera gástrica, desde que o paciente refere fazer uso prolongado de ácido acetilsalicílico.

27) Em relação às infecções neonatais, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Todas as mães que adquirem um agente infeccioso durante a gestação transmitirão o agente aos seus recém-nascidos. E todos os recém-nascidos que adquirem um referido agente de suas mães manifestarão clinicamente quaisquer sinais de infecção.
- b) Todos os recém-nascidos com toxoplasmose congênita que sobrevivem não necessitarão de um cuidadoso acompanhamento durante a infância em relação à doença ocular, independentemente da sua apresentação inicial.
- c) As infecções no período neonatal com frequência são fatais e causam morbidade significativa, em longo prazo, entre os sobreviventes, se tratadas adequada e imediatamente.
- d) A sífilis congênita resulta primariamente da transmissão transplacentária da mãe infectada para o seu filho.
- e) A vacina contra a varicela deve ser administrada na gravidez, principalmente às mães que não sabem se tiveram varicela ou se receberam a vacina contra a varicela.

28) Em relação às infecções virais comuns, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O herpesvírus humano 6 é um vírus ubíquo que infecta a maioria das crianças antes dos 3 anos de idade, embora a maioria das infecções seja assintomática.
- () O varicela-zóster é um vírus altamente contagioso que causa duas síndromes clínicas: catapora e cobreiro.
- () A catapora é a infecção infantil mais comum, mas ocorre também em adolescentes e adultos, sendo, geralmente, mais grave em adultos, e é vista mais comumente no inverno ou no início da primavera.

- a) C - C - C.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.
- e) E - E - E.

29) Sobre a Febre Familiar do Mediterrâneo, analisar os itens abaixo:

- I. É uma doença inflamatória recorrente autossômica dominante, prevalente entre pessoas do Oriente Próximo.
- II. O gene responsável, o MEFV, está localizado no cromossomo 16.
- III. A infiltração neutrofílica predomina durante as crises.
- IV. Em cerca de 25% dos pacientes afetados, desenvolve-se uma forma de amiloidose renal.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

30) Em relação à desnutrição, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Não há necessidade de avaliar os hábitos alimentares da criança e da família para que se faça o diagnóstico de erros alimentares.
- b) O tratamento ambulatorial da desnutrição energético-proteica destina-se a crianças que apresentam desnutrição nas formas leve a moderada.
- c) Todas as crianças com desnutrição grave têm deficiências de vitaminas e sais minerais. A mais importante deficiência é a de vitamina C, que representa risco de vida e de cegueira para a criança.
- d) A hiperglicemia é uma importante causa de morte na criança com desnutrição grave nos primeiros dias de tratamento.
- e) O edema da desnutrição deverá ser tratado com diurético, já que ele é devido a deficiências nutricionais.

31) Sobre a pitiríase versicolor, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () É uma doença bacteriana que acomete exclusivamente a camada mais superficial da pele.
- () É causada pelo fungo sapróbio da pele, *Malassezia furfur*, que, sob certas condições, como calor, umidade, transpiração excessiva e estados de imunodepressão, torna-se infectante em indivíduos mais suscetíveis.
- () Pode surgir em lactentes em função da maior atividade das glândulas sebáceas nessa fase.
- () Surge inicialmente em pequeno número e pode coalescer formando grandes placas.

- a) E - C - C - C.
- b) C - C - E - E.
- c) E - E - E - C.
- d) E - C - C - E.
- e) C - E - E - E.

32) O olho vermelho é um sinal oftalmológico representado pela hiperemia da conjuntiva bulbar. Qualquer doença que afete a córnea, a conjuntiva, a íris ou o corpo ciliar pode se expressar pelo olho vermelho. Algumas dessas doenças são patologias benignas; outras podem causar graves danos à função visual. Porém, a maioria dos pacientes com olho vermelho tem um problema de fácil diagnóstico e tratamento em atenção primária. Em relação às possibilidades diagnósticas do olho vermelho, analisar os itens abaixo:

- I. Conjuntivite alérgica.
- II. Glaucoma agudo.
- III. Queimadura solar.
- IV. Queimadura física.
- V. Erosão do cílio.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I, II e IV.
- b) Somente os itens I, III e IV.
- c) Somente os itens II, IV e V.
- d) Somente os itens I, II, III e V.
- e) Todos os itens.

33) Embora a anemia seja um achado frequente na prática pediátrica, não é um diagnóstico definitivo. Esse achado deve sempre ser encarado como um desafio para o Médico à procura de uma explicação diagnóstica. Em relação às anemias, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O nível sanguíneo de hemoglobina é o indicador mais comumente utilizado para triagem da anemia e da anemia ferropriva.
- () A Organização Mundial da Saúde (OMS) define anemia como $HB > 13g/dL$ para menores de 5 anos.
- () Podem ser classificadas quanto a características fisiopatológicas ou morfológicas, podendo ser hereditárias ou adquiridas.

- a) C - C - E.
- b) C - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.
- e) E - E - E.

34) Em relação aos distúrbios metabólicos do recém-nascido, analisar os itens abaixo:

- I. Em recém-nascidos com secreção inapropriada de hormônio antidiurético, observa-se hiponatremia, com água corpórea normal ou aumentada, em maior ou menor grau, e aumento de volemia.
- II. No tratamento do choque hipovolêmico – frequente em crianças com hipernatremia, infundir soro fisiológico (NaCl), albumina a 5% ou plasma, 10 a 20ml/Kg, de 15 a 45 minutos.
- III. No recém-nascido, a hipopotassemia ocorre quando os níveis séricos de K estão abaixo de 3,9mEq/l.
- IV. No tratamento da hiperpotassemia, na vigência de níveis séricos de K entre 6 e 6,5mEq/l e ECG normal, deve-se administrar glicose hipertônica a 25% na velocidade de 1 a 3ml/Kg/h.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e IV.
- d) Somente os itens III e IV.
- e) Todos os itens.

35) O tratamento da bacteriúria assintomática está indicado após remoção de cateter vesical presente por:

- a) Menos de 5 dias e gestação.
- b) Mais de 5 dias e lactação.
- c) Menos de 7 dias e gestação.
- d) Mais de 7 dias e lactação.
- e) Menos de 7 dias e lactação.

36) No Brasil, já existem alguns milhares de alvarás de autorização judicial para a interrupção da gravidez, os quais são concedidos em casos de lesões fetais incompatíveis com a vida extrauterina. Nesse sentido, existem métodos terapêuticos fetais para evitar más formações. Sobre a terapêutica fetal, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Cianocobalamina para alcalose metilmalônica, a partir de 12 semanas.
- b) Ácido fólico para tratar e evitar infecções do tubo neural, periconcepcional.
- c) Prednisona, ácido acetilsalicílico e heparina para perdas gestacionais de repetição por presença de anticorpo lúpus anticoagulante, a partir do diagnóstico.
- d) Evitar amniocentese e o uso de tiroxina no bócio congênito (ultrassonografia).
- e) Dexametasona para hiperplasia congênita da suprarrenal, a partir da 30ª semana.

37) Em relação à glomerulonefrite difusa aguda, analisar os itens abaixo:

- I. Os sintomas clínicos clássicos são edema, hipertensão e hematúria.
- II. Insuficiência renal aguda como consequência da glomerulonefrite difusa aguda possui tendência à hiperpotassemia.
- III. É considerada, juntamente com a febre reumática, seqüela tardia, não supurativa, de estafilococcia.
- IV. É mais comum em menores de dois anos, sendo mais rara no período pré-escolar e escolar.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

38) Define-se como violência contra a criança ou o adolescente toda ação ou omissão, conscientemente aplicada ou não, que venha a lhe provocar dor, seja ela física ou emocional. As causas externas de morbimortalidade, que englobam as injúrias físicas não intencionais e intencionais, têm provocado forte impacto na morbidade e na mortalidade na infância e na adolescência. Em relação à violência na infância e na adolescência, analisar os itens abaixo:

- I. A síndrome do bebê sacudido é uma das formas mais graves de lesão cerebral por violência contra crianças, provocada por sacudidas (uma ou mais) violentas no corpo da criança, que ocorre mais frequentemente após os 4 anos de vida.
- II. O tempo para procura de atendimento é um dado importante, pois as fraturas doem mais intensamente na seqüência do trauma e melhoram com o passar dos dias. O atraso em dias para a busca de atendimento deve ser atentamente investigado e considerado, no mínimo, como negligência grave.
- III. O primeiro passo para o diagnóstico sempre deve ser o acolhimento e a escuta da vítima que, nos casos agudos, se encontra em situação de grande ansiedade e medo.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item III.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Nenhum dos itens.

39) Paciente de 7 anos foi internado na UTI para tratamento de sepse urinária há 6 horas. Está em uso de antibiótico parenteral, intubado, com adrenalina em infusão contínua 0,1mcg/kg/min, mas mantém quadro de hipotensão sistêmica. Ecocardiograma funcional evidencia boa função ventricular. Dentre as condutas abaixo, analisar os itens em relação aquela(s) que seria(m) contraindicada(s):

- I. Associação de milrinona.
- II. Aumento da dose de adrenalina.
- III. Infusão de soro fisiológico 20ml/kg em 30 minutos.
- IV. Associação de hidrocortisona.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item III.
- d) Somente o item IV.
- e) Todos os itens.

40) Sobre o autismo infantil, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA:

- () Há uma comprovada associação de causa e efeito entre autismo e algumas vacinas.
- () O melhor tratamento para pacientes infantis autistas é com o uso de antipsicóticos atípicos, tal como a Risperidona.
- () Existem diversas formas de apresentação e, na maior parte dos casos, os tratamentos mais indicados são as terapias não farmacológicas.
- () É um transtorno de etiologia psicológica.

- a) C - E - E - E.
- b) E - C - E - E.
- c) E - E - C - E.
- d) E - E - E - C.
- e) C - C - E - C.