



ENFERMEIRO POLICLÍNICA

21. (Concurso Aurora/2018) S.E.M., 56 anos, Diabetes Mellitus tipo 2, chegou à emergência com quadro de hiperglicemia grave (superior a 600mg/dl), acompanhada de desidratação e alteração do estado mental, na ausência de cetose. Diante dos sinais e sintomas apresentados por S.E.M., assinale a alternativa que contemple a complicação aguda do diabetes desenvolvida por S.E.M.

- A) Síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica;
- B) Cetoacidose diabética;
- C) Hipoglicemia não cetótica;
- D) Hiperglicemia não cetótica;
- E) Neuropatia autonômica.

22.(Concurso Aurora/2018) J.C.N, 62 anos, feminino, compareceu ao serviço de saúde com sintomas de poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia e portando resultados de exames para rastreamento do diabetes realizados recentemente. A enfermeira observou que a paciente apresentou hemoglobina glicada de 7,5%. Diante dessa situação clínica deve-se:

- A) Iniciar mudança no estilo de vida;
- B) Diagnosticar o paciente com diabetes mellitus;
- C) Realizar o exame do teste de tolerância á glicose;
- D) Repetir exame após três meses;
- E) Orientar glicemia em jejum.

23.(Concurso Aurora/2018) Em relação à técnica de aferição da pressão arterial (PA), é correto afirmar que:

- A) A câmara inflável deve cobrir pelo menos a metade da circunferência do braço;
- B) Deve-se desinflar o manguito rapidamente (4 a 6 mmHg/seg) para finalizar a aferição;

- C) A pressão sistólica a ser considerada corresponde ao valor em que começam a ser ouvidos os ruídos de Korotkoff;
- D) deve-se palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 70mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido;
- E) a pressão diastólica a ser considerada corresponde ao valor em que começam a ser ouvidos os ruídos de Korotkoff.

24.(Concurso Aurora/2018) Os métodos atuais de tratamento, quando o tumor permanece localizado no momento do diagnóstico, obtém-se uma cura em cerca de um terço dos pacientes por meio de estratégias de tratamento local, como cirurgia ou radioterapia. Todavia, nos casos remanescentes, a ocorrência precoce de micrometástases constitui um aspecto característico, indicando a necessidade de uma abordagem sistêmica com quimioterapia para o tratamento efetivo do câncer (BRUNNER; SUDDARTH, 2016). Assim, avalie as asserções que seguem e a relação proposta entre elas.

- I. A quimioterapia adjuvante refere-se à quimioterapia administrada a pacientes que apresentam câncer avançado para os quais não existe tratamento alternativo.
- II. A quimioterapia adjuvante tem por objetivo avaliar os sintomas relacionados com o tumor, melhorar a qualidade global de vida e prolongar o tempo de progressão do tumor.

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.



25. (Concurso Aurora/2018) Uma consequência nociva da radioterapia é a mucosite oral, que acomete os pacientes submetidos à radiação nos tumores de cabeça e pescoço. Assim, o profissional de enfermagem deve estar ciente deste distúrbio bucal decorrente da radioterapia para que possam ajudar os pacientes a obterem melhor qualidade de vida durante seu tratamento. Sobre este tema, avalie as asserções que seguem e a relação proposta entre elas.

- I. O desequilíbrio entre a proliferação e a perda celular produz redução das células epiteliais, resultando em um epitélio com menor espessura, o que se manifesta como mucosite na mucosa oral.
- II. A mucosa oral passa por uma série de mudanças que estão relacionadas com a dose e duração do tratamento. A primeira reação da mucosa bucal à radiação é edema e eritema devido à dilatação vascular da mucosa está intacta apenas com uma ardência local.

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

26. (Concurso Aurora/2018) Uma enfermeira está realizando avaliação neurológica de um paciente admitido na emergência com hipótese diagnóstica de Acidente Vascular Encefálico (AVE), apresentando os seguintes sinais e sintomas: pupilas anisocóricas e não reagentes a luz, com abertura ocular ao estímulo doloroso,

emite sons incompreensíveis; resposta motora com flexão anormal ao estímulo doloroso. Qual o somatório de Glasgow para este paciente, assinale a alternativa com o somatório correto.

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 9

27. (Concurso Aurora/2018) Um Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode causar uma grande variedade de déficits neurológicos se não houver o atendimento adequado. Desta forma, a enfermagem deve estar atenta às manifestações desta encefalopatia para que possa prestar um cuidado adequado e com o mínimo de sequelas possíveis. Assim, assinale a alternativa que contenha informações corretas acerca do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas sobre o Acidente Vascular Encefálico isquêmico agudo.

- A) O aparecimento súbito de déficits neurológicos nos AVE isquêmico e hemorrágico independe da região cerebral envolvida.
- B) Tomografia computadorizada (TC) do crânio ou ressonância magnética (RM) com evidência de hemorragia é um indicador para administração do trombolítico.
- C) A administração do trombolítico, por via intravenosa, deve ocorrer em até 12 horas do início dos sinais e sintomas.
- D) Avaliar a possibilidade de se iniciar a infusão do trombolítico frente a um AVE isquêmico em qualquer território encefálico;
- E) A investigação, quanto ao início das manifestações neurológicas do AVE, é secundária à aplicação dos critérios de inclusão ou de exclusão do trombolítico.



28. (Concurso Aurora/2018) Após a infusão do rtPA, em paciente com Acidente Vascular Encefálico isquêmico, a enfermeira deve prescrever os cuidados de enfermagem para o regime de tratamento com rtPA intravenoso. Assim, assinale a alternativa que contenha as condutas que não podem faltar na prescrição de cuidados de enfermagem para o paciente em regime de tratamento com rtPA.

- A) Passar sonda nasoentérica nas primeiras 24 horas após administração do rtPA.
- B) Realizar sondagem vesical de demora nos 30 minutos do término da infusão do rtPA.
- C) Manter o paciente em jejum por 24 horas após administração do rtPA.
- D) Administrar heparina, antiagregante plaquetário ou anticoagulante oral nas primeiras 24 horas do uso do trombolítico.
- E) Iniciar a monitorização da pressão arterial 24 horas após administração do rtPA.

29. (Concurso Aurora/2018) Paciente de 50 anos apresenta mal-estar súbito e afasia. Chega ao hospital com suspeita de AVC em cinco horas do evento. Seguindo as novas orientações qual será a conduta clínica imediata mais adequada.

- A) Conduta expectante;
- B) Trombólise com rTPA;
- C) Trombólise com estreptoquinase;
- D) A trombectomia mecânica;
- E) Nenhuma das respostas anteriores.

30.(Concurso Aurora/2018) As alterações pertinentes à lesão medular são diversas e se referem as funções cardiovascular, respiratória, térmica, vascular, gastrointestinal, urinária, tegumentar, sensitiva, musculoesquelética e sexual. As disfunções do sistema urinário após a lesão medular ocorrem no trato urinário inferior ocasionando falhas nos mecanismos de enchimento-armazenamento e micção e esvaziamento. As manifestações clínicas mais comuns são:

- A) Episódios retenção urinaria e intestinal;
- B) Episódios de infecção urinaria e /ou incontinência urinaria;
- C) Episódios de incontinência urinaria e intestinal;
- D) Episódios infecção urinaria e retenção intestinal;
- E) Episódio de retenção urinaria e/ou incontinência urinaria.

31.(Concurso Aurora/2018) A escala de comprometimento ASIA (*American Spinal Injury Association*) baseada na completude da lesão (grau de transecção da medula) e na função sensorial/motora classifica as lesões medulares em relação a extensão do dano lesional em lesão completa ou incompleta. Considerando a classificação da escala ASIA, assinale a alternativa que contenha a classificação de uma lesão medular completa.

- A) ASIA A
- B) ASIA B
- C) ASIA C
- D) ASIA D
- E) ASIA E



32.(Concurso Aurora/2018) A lesão medular pode causar alterações em quase todo o sistema gastrointestinal, como diminuição do tempo de esvaziamento gástrico e intestinal, diminuição do tônus do esfíncter anal, atonia intestinal e íleo paralítico, resultando no intestino neurogênico reflexo e arreflexo (FURLAN, 2011). Em relação as características do intestino neurogênico podemos dizer que:

- A) No intestino reflexo o reflexo da defecação está preservado, porem há diminuição do tônus do esfíncter anal.
- B) O intestino arreflexo ocorre nas lesões acima do nível lombar e do cone medular.
- C) no intestino reflexo esta contra indicado o uso de supositórios em razão da flacidez do esfíncter anal.
- D) No intestino arreflexo, o reflexo de defecção está ausente, o tônus anal está reduzido e ocorre diminuição do peristaltismo
- E) No intestino arreflexo o reflexo de defecação está ausente porem o reflexo anal está presente.

33. (Concurso Aurora/2018) O Trauma Crânio Encefálico (TCE) é uma situação comum no cotidiano da enfermagem, sendo responsável por altas taxas de mortalidade e morbidade em todo o mundo. Apresenta-se de formas variadas, que devem ser reconhecidas precocemente pelo enfermeiro ainda no atendimento primário com o exame clínico e neurológico, assim como deve ser precoce o início dos procedimentos avançados de suporte a vida e condutas específicas que tem como objetivo diminuir a incidência de lesões neuronais secundárias ao trauma. Desta forma, a principal ação de enfermagem no cuidado imediato ao paciente vítima de TCE deve ser:

- A) Mensuração da PIC;
- B) Manutenção da imobilização cervical;
- C) Prevenção de lesão cerebral secundária;
- D) Manutenção de via aérea pérvia e boa ventilação;
- E) Avaliação neurológica.

34.(Concurso Aurora/2018) A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é manifestação clínica da infecção pelo vírus HIV, que leva, em média, oito anos para se manifestar. Entretanto, a soro conversão isolada não é um critério estabelecido para início da terapia antirretroviral (TARV). Assim, uma enfermeira de um setor de infectologia foi abordada por um paciente acerca das recomendações para início da TARV, assinale a alternativa correta que contenha a resposta proferida pela enfermeira.

- A) Pessoas assintomáticas com LT-CD4+ <500 células/mm³ não deve iniciar o tratamento;
- B) Pessoas assintomáticas com LT-CD4+ > 500 células/mm³ deve iniciar o tratamento;
- C) Sintomáticos, independentemente da contagem de LT-CD4, com tuberculose ativa deve iniciar o tratamento com celeridade;
- D) Coinfectados pela hepatite B, doença cardiovascular ou risco cardiovascular elevado e neoplasias que necessitam de tratamento imunossupressor são critério irrelevantes para o início do tratamento;
- E) O principal critério para início do tratamento é LT-CD4+ <200 células/mm³.



35.(Concurso Aurora/2018) A adesão a terapia antirretroviral (TARV) deve ser compreendida como uma ação em conjunto, onde o paciente não apenas obedece à solicitação da enfermeira de ingerir ao medicamento, mas adota, entende e concorda com a prescrição medicamentosa. Desta forma, como um importante agente promotor da adesão da TARV a enfermeira (o) necessita ser detentora (or) de conhecimentos sobre esta terapia medicamentosa. Acerca dos esquemas recomendados para terapia inicial com TARV, assinale a alternativa correta.

- A) O Efavirenz deve ser evitado no primeiro trimestre de gravidez;
- B) No esquema inicial deve ter dois Inibidores da Transcriptase Reversa;
- C) O esquema alternativo difere do esquema preferencial pela presença da zidovudina;
- D) Zidovudina, lamivudina e efavirenz compõem o esquema alternativo;
- E) Fosamprenavir é classificado como inibidor da protease (IP).

36. (Concurso Aurora/2018) Em relação à transformação de soluções, marque a alternativa que corresponde à quantidade de ampolas necessárias à transformação de 500 ml de Solução Glicosada a 5% (SG 5%) em 500 ml de Solução Glicosada a 10% (SG 10%), considerando que no serviço temos disponível ampolas de glicose 50 % com volume de 10 ml.

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8
- E) 10

37.(Concurso Aurora/2018) Assinale a alternativa que apresenta o estadiamento correto para uma lesão por pressão apresentando perda de pele na sua espessura total no centro da lesão e tecido vermelho vivo e brilhante na periferia.

- A) Estágio I;
- B) Estágio II;
- C) Estágio III;
- D) Estágio IV;
- E) Estágio V.

38.(Concurso Aurora/2018) J.M.E. permaneceu muito tempo em uma posição disfuncional que favoreceu a formação do pé equino que é uma lesão permanente causada pelo encurtamento dos músculos da panturrilha e pelo alongamento da musculatura da região anterior da perna. Assinale a alternativa que contenha a posição corporal que favorece a formação do pé equino.

- A) Posição supina;
- B) Posição lateral;
- C) Posição lateral oblíqua;
- D) Posição de pronação;
- E) Posição Sims.

39.(Concurso Aurora/2018) Sobre as escalas de avaliação de dor, qual a ferramenta menos apropriada para avaliação da intensidade da dor em indivíduo adulto.

- A) Escala de faces de Wong-Baker;
- B) Escala analógica visual;
- C) Escala analógica numérica;
- D) Escala gráfica de palavras;
- E) Escala analógica de cores.



40.(Concurso Aurora/2018) **Dentre as complicações locais da terapia intravenosa vale destacar a flebite que pode ser definida como inflamação da camada íntima das veias. Um enfermeiro que após avaliação de acesso venoso em cliente encontra dor, edema e eritema no local de inserção do dispositivo intravenoso, pode classificar essa flebite como sendo de grau:**

- A) Grau: + 0
- B) Grau: + 1
- C) Grau: + 2
- D) Grau: + 3
- E) Grau: + 4

41.(Concurso Aurora/2018) **A colocação de uma sonda no intestino (sonda enteral) apresenta a vantagem de reduzir o risco de refluxo gástrico, entretanto, deixa o indivíduo vulnerável a Síndrome do esvaziamento rápido. Neste sentido assinale a alternativa que caracterize a síndrome do esvaziamento rápido.**

- A) É um problema associado ao posicionamento incorreto da sonda e o uso de sonda calibrosa;
- B) Ocorre quando a alimentação por sonda nasoentérica é administrada através de bomba controlada contínua;
- C) É decorrente de uma prescrição de enfermagem com infusão rápida da alimentação;
- D) É decorrente de uma hipodistensão do intestino delgado;
- E) Todas as alternativas estão corretas.

42. (Concurso Aurora/2018) **A fisiologia da cicatrização de feridas e suas etapas são eventos importantes e que devem ser considerados pelo enfermeiro no tratamento de feridas. Acerca deste assunto marque a alternativa correta.**

- A) Na fase macrofágica ocorre intensa deposição de fibras de colágeno;
- B) A fase inflamatória é a última e mais prolongada fase de cicatrização e pode durar meses ou anos;
- C) Principal característica da fase proliferativa é o desenvolvimento de um tecido vermelho vivo e a reconstituição da matriz extracelular;
- D) A idade, anemia, hipoproteinemia e deficiência de zinco são eventos indiferentes para fisiologia da cicatrização de feridas;
- E) Todas as alternativas estão corretas.

43.(Concurso Aurora/2018) **Sabe-se que o debridamento é a remoção do tecido desvitalizado presente na ferida, diante dessa afirmativa marque a correta.**

- A) o debridamento autolítico utiliza coberturas que são seletivos para o tecido necrótico e causam danos mínimos em tecidos saudáveis;
- B) o debridamento enzimático usa as proteínas do próprio organismo humano para dissolver o tecido necrótico;
- C) o debridamento mecânico utiliza agentes químicos pela ação da condução para remover o tecido necrótico;
- D) o debridamento cirúrgico utiliza agentes anestésicos que têm ação de retirar o tecido necrótico;
- E) o debridamento instrumental conservador utiliza coberturas proteolíticas para retirar o tecido necrótico;

44.(Concurso Aurora/2018) **A administração de oxigênio requer conhecimentos específicos de enfermagem. Sobre esta temática assinale a opção correta.**

- A) Sinais de sonolência e prostração podem indicar alta concentração de oxigênio;
- B) Em virtude dos riscos, como a lesão da mucosa respiratória e a dificuldade de eliminar o muco, o oxigênio deve sempre ser umidificado;



- C) A oxigenioterapia facilita a expectoração e provoca broncodilatação;
- D) É necessário trocar a posição do cateter e a fixação a cada 72 horas para prevenir lesões da narina e mucosa nasal;
- E) No processo de inalação, deve-se manter o paciente em decúbito ventral e orientado a não conversar durante o procedimento.

45. (Concurso Aurora/2018) O Código de Ética do Profissional de Enfermagem (Resolução COFEN nº 0564/2017) reúne princípios, direitos, responsabilidades, deveres, proibições e penalidades pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem. Leva em consideração a necessidade e o direito da população de assistência em enfermagem, os interesses do profissional e de sua organização centrados na pessoa, na família e na coletividade. Com base nesse Código, assinale com (V) as afirmativas verdadeiras e com (F) as falsas.

- () O profissional de enfermagem deve exercer sua profissão com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- () O profissional de enfermagem deve se responsabilizar por falta cometida em atividades de sua profissão, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação e/ou conhecimento prévio do fato.
- () É direito do profissional de enfermagem proteger a pessoa, a família e as coletividades contra danos decorrentes de imperícia, imprudência ou negligência por parte de qualquer membro da equipe de saúde.

- () É dever do profissional de enfermagem aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, éticos-políticos, socioeducacionais e culturais, em benefício da pessoa, da família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- () É direito do profissional alertar o colega responsável por falta cometida por imperícia, imprudência e negligência.

Assinale a alternativa que corresponda à seqüência CORRETA:

- A) V - F - V - F - V
- B) F - V - F - V - V
- C) V - V - F - V - F
- D) F - V - F - V - F
- E) V - V - F - F - V

46. (Concurso Aurora/2018) O hidrocolóide é indicado para prevenção ou tratamento de feridas não infectadas, que apresentem de pouca a moderada quantidade de exsudato, independente da presença ou não de tecido necrótico. Sobre essa cobertura, marque a alternativa que apresenta o tempo máximo de troca de curativo realizado com hidrocolóide:

- A) 12 horas;
- B) 24 horas;
- C) 48 horas;
- D) 5 dias;
- E) 7 dias.



47.(Concurso Aurora/2018) A Enfermagem, enquanto prática social que se insere no mundo do trabalho e na atenção à saúde, é marcada por determinações históricas, sociais, econômicas e políticas. Faz parte do gerenciamento em saúde conhecer detalhadamente o processo de trabalho das equipes. A prática do enfermeiro(a) particularizar-se em uma rede ou subprocessos que são denominados:

- A) Assistir, Liderar ou Coordenar, Ensinar.
- B) Cuidar, Administrar ou Gerenciar, Pesquisar e Ensinar.
- C) Supervisionar, Pesquisar e Ensinar.
- D) Cuidar, Pesquisar e Liderar.
- E) Cuidar e Liderar.

48.(Concurso Aurora/2018) O processo de Enfermagem é uma abordagem intencional de soluções de problemas para atender às necessidades de assistência à saúde dos pacientes e de enfermagem. Trata-se portanto de uma ferramenta gerencial fundamental para o cuidado. Nesta perspectiva, é correto afirmar:

- A) A etapa de investigação tem como objetivo identificar problemas reais através do histórico de enfermagem, exame físico e da avaliação dos resultados.
- B) O diagnóstico de enfermagem é a identificação de problemas de saúde reais ou potenciais que são sempre passíveis de resolução por meio das atividades de planejamento.
- C) A etapa de investigação é composta pelo planejamento, implementação, exame físico e avaliação.
- D) No planejamento, os objetivos devem ser estabelecidos a curto, médio e longo prazo pelo enfermeiro. O enfermeiro não pode delegar intervenções para outros membros da equipe de enfermagem.

E) A etapa do exame físico consiste na identificação de problemas que conduzem ao levantamento dos diagnósticos de enfermagem.

49. (Concurso Aurora/2018) O processo de trabalho da Enfermagem é teórico-prático, tem um caráter coletivo, é interdependente e complementar ao trabalho da saúde, sendo que ambos se inserem em um contexto social, histórico, cultural, político e econômico. Com base nessa definição, assinale a afirmativa correta.

- A) O gerenciamento do cuidado de Enfermagem se dá apenas no nível do planejamento e da delegação de ações pelo Enfermeiro no processo de trabalho.
- B) A divisão técnica do trabalho de Enfermagem independe das ações hierarquizadas por complexidade de concepção e execução.
- C) O processo de trabalho em Enfermagem envolve exclusivamente duas ações básicas: o cuidado e a gerência dos sistemas de produção em saúde.
- D) O processo de trabalho de Enfermagem contempla múltiplas dimensões – assistencial, educacional, gerencial, dentre outras.
- E) Nenhuma das respostas anteriores

50.(Concurso Aurora/2018) Sobre as drogas vasoativas avalie as asserções a seguir:

- A noradrenalina é o neurotransmissor do sistema nervoso simpático e precursor da adrenalina, possui atividade tanto no receptor alfa, como beta 1 adrenérgico, com pouca ação sobre receptores beta 2.
- Sua ação sobre receptor alfa a torna um potente vasoconstritor visceral e renal, o que limita sua utilização clínica, por isso a função renal deve ser monitorizada através de dosagens de uréia, creatinina e volume de diurese.



Analisando a relação entre as duas asserções, marque a alternativa correta:

- A) As duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira;
- B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira;
- C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa;
- D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda é uma proposição verdadeira;
- E) As duas asserções são proposições falsas.

51.(Concurso Aurora/2018) O choque cardiogênico é caracterizado por:

- A) deficiência metabólica, mesmo em repouso, com conseqüente hipóxia tecidual na presença de volume intravascular normal.
- B) bloqueio mecânico ao fluxo sanguíneo pulmonar ou sistêmico.
- C) baixo volume intravascular e lactato aumentado.
- D) inadequação entre o que é ofertado e o que é consumido de oxigênio pelos tecidos, independente do volume, sendo inadequado para a demanda metabólica.
- E) fluxos sanguíneos alterados em excesso ou deficitariamente, com alteração do volume intravascular e conseqüente inadequação da perfusão tecidual.

52.(Concurso Aurora/2018) A menos que os benefícios justifiquem o risco, crianças com idade inferior a oito anos não devem receber tratamentos com tetraciclina, porque esses fármacos:

- A) causam ruptura dos tendões;
- B) não alcançam o LCR;
- C) não são bactericidas;
- D) depositam-se nos tecidos em calcificação;
- E) podem causar anemia aplástica.

53. (Concurso Aurora/2018) As anotações de enfermagem no prontuário, quando realizadas com rigor técnico e caráter ético, fornecem informações sobre o estado do paciente e a assistência realizada, de modo a otimizar a comunicação entre os membros da equipe de saúde e assegurar a continuidade da assistência integral ao paciente. Nesse contexto, julgue os itens seguintes com V quando as assertivas forem verdadeiras ou F quando as assertivas forem falsas e a seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- () Caso cometa erros no texto do registro de enfermagem, o profissional poderá corrigi-los utilizando-se do corretor líquido, escrevendo, então, a informação correta.
- () A anotação de enfermagem deve ser feita em escrita legível e a caneta, em todos os turnos de trabalho e é imprescindível a identificação da data e do horário da prestação do cuidado de enfermagem. E o profissional poderá deixar espaços em branco para organização das informações e, ao final, identificar-se com a rubrica.
- () As anotações de enfermagem fornecem dados que servem de fonte de investigação e pesquisa para os profissionais da área da saúde e de outras áreas afins.
- () Por meio dos registros de enfermagem realiza-se a comunicação escrita da situação do doente e dos tratamentos e cuidados efetuados em determinado período de tempo. Registrar corretamente as situações que envolvem o doente é uma responsabilidade de todos os profissionais de enfermagem.
- () A anotação de enfermagem deve ser precisa, concisa, eficiente, pois tem por finalidade a avaliação do paciente e o desenvolvimento de pesquisas. Porém, ela não tem, valor de documentação legal, nem pode ser usada para a defesa do profissional de enfermagem ou a instituição em ação judicial.



- A) V, F, F, V, V;
- B) F, F, V, V, F;
- C) F, V, F, F, F;
- D) V, F, V, V, V;
- E) F, F, V, F, V.

54.(Concurso Aurora/2018) Um médico, preocupado em escolher uma associação de antimicrobianos, para uma criança de 4 anos com infecção de corrente sanguínea de origem hospitalar, opta por antibióticos cujos mecanismos de ação possam agregar algum efeito sinérgico. Introduce um betalactâmico e um aminoglicosídeo cujos mecanismos de ação são, respectivamente:

- A) Inibição da síntese protéica e interferência na integridade da parede celular;
- B) Interferência na integridade da parede celular e inibição da síntese protéica;
- C) Ambos interferem na integridade da parede celular;
- D) Inibição da síntese protéica e inativação do RNA mensageiro;
- E) Ambos interferem na formação do ácido fólico.

55. (Concurso Aurora/2018) A Leishmaniose Visceral é uma parasitose, não contagiosa e de evolução crônica, sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, adinamia, anemia, dentre outras manifestações (BRUNNER; SUDDARTH, 2016). Assim, avalie as asserções que seguem e a relação proposta entre elas.

- I. Deve ser levantada suspeita clínica da leishmaniose visceral sempre que o paciente apresentar febre e esplenomegalia associada ou não a hepatomegalia.

- II. Os principais órgãos acometidos pela leishmaniose visceral são: baço, fígado, tecido hemocitopoético, pulmões e rins.

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

56.(Concurso Aurora/2018) A Doença de Chagas pode ser sintomática ou assintomática. A fase inicial aguda inicia-se através das manifestações locais quando o agente etiológico penetra no hospedeiro na sua forma infectante. No curso clínico crônico, os pacientes passam por um longo período sem sintomas (10 a 30 anos), mas podem com o correr do tempo apresentar comprometimento cardíaco (cardiopatia chagásica) ou digestivo (megaesôfago e megacólon). O principal AGENTE ETIOLÓGICO DA DOENÇA e sua FORMA INFECTANTE para mamíferos são, respectivamente:

- A) Triatomainfestans; forma amastigota;
- B) Trypanosoma cruzi; forma promastigota;
- C) Triatomainfestans; forma tripomastigota;
- D) Trypanosoma cruzi; forma tripomastigota;
- E) Todas as respostas estão incorretas.



57.(Concurso Aurora/2018) Analise as afirmativas sobre a Leishmaniose Tegumentar Americana:

- I- É uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoário do gênero *Leishmania*, que acomete pele e mucosas, sendo primariamente uma infecção zoonótica.
- II- A incubação da doença no homem é, em média, de 02 meses, podendo apresentar períodos mais curtos (02 semanas) ou mais longos (02 anos).
- III- Seu agente etiológico é o protozoário da espécie *Leishmania chagasi*.
- IV- Todo indivíduo que apresentar úlcera cutânea com fundo granuloso e borda infiltrada em moldura é considerado caso suspeito de Leishmaniose tegumentar americana.

São corretas as afirmativas:

- A) I, II e III somente;
- B) II, III e IV somente;
- C) I, III e IV somente;
- D) I, II e IV somente;
- E) I, II, III e IV.

58.(Concurso Aurora/2018) Após a absorção, os fármacos penetram na corrente sanguínea e quase todas as drogas se subdividem em duas partes: uma livre, dissolvida no plasma, e outra que se liga as proteínas plasmática. Sobre a distribuição de fármacos na corrente sanguínea analise as alternativas abaixo e assinale depois a única alternativa verdadeira.

- I – Do ponto de vista farmacológico, somente a parte livre é que pode atravessar o endotélio vascular e atingir o seu sítio de ligação;
- II – A parte de um fármaco que fica ligada às proteínas plasmáticas constitui fração de reserva das drogas;
- III – Uma droga ligada a albumina pode ser deslocada por outra que possui maior afinidade pela albumina;

IV – O resultado da competição pelas proteínas plasmáticas entre fármacos é o aumento da parte livre da droga deslocada podendo produzir níveis tóxicos.

- A) Todos os itens acima são verdadeiros;
- B) Apenas os itens I e IV são verdadeiros;
- C) Apenas os itens II e IV são verdadeiros;
- D) Apenas os itens II e III são verdadeiros;
- E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

59. (Concurso Aurora/2018) Dentre os cuidados de enfermagem aos pacientes vítimas de Trauma Crânio Encefálico (TCE) com elevação da Pressão Intra Craniana (PIC) está à reposição volêmica criteriosa. Assinale a alternativa que contenha a solução mais adequada para o paciente vítima de TCE com elevação da PIC.

- A) Cloreto de Sódio 0,9%;
- B) Solução injetável de manitol 20%;
- C) Glicose 5%;
- D) Cloreto de Sódio 0,45%;
- E) Solução de Ringer com Lactato.

60.(Concurso Aurora/2018) Com base em seus conhecimento sobre farmacologia e administração de fármacos assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Cápsula é todo comprimido revestido com solução queratinosa para liberação entérica;
- B) É considerado pomada o fármaco semissólido de consistência oleosa e com pouca penetração na pele;
- C) Absorção é a transferência de um fármaco desde o seu local de administração até a corrente circulatória;
- D) Similar é todo medicamento que apresenta nome fantasia e que os teste de bioequivalência não foram validados;
- E) A velocidade de absorção dos fármacos por via oral sofre influência direta da forma farmacêutica dos medicamentos.