

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:**
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;**
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | B | C | D | E |
| 2 | A | B | ■ | D | E |
- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de tubo transparente, com tinta azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;
- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;

- O Caderno de Provas será composto:

| CONTEÚDO | Nº DE QUESTÕES |
|------------------------------------|----------------------|
| Língua Portuguesa | 05 (cinco) |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 05 (cinco) |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 05 (cinco) |
| Informática | 05 (cinco) |
| Conhecimentos Específicos | 20 (vinte) |
| Total de Questões | 40 (quarenta) |

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

CADERNO DE PROVA**LÍNGUA PORTUGUESA**

O texto abaixo é um fragmento de uma crônica de Martha Medeiros e servirá de subsídio para as questões 1 a 4:

A DOR QUE DÓI MAIS

Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o queixo no chão dói. Torcer o tornozelo dói. Um tapa, um soco, um pontapé, doem. Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim. Mas o que mais dói é saudade.

Saudade de um irmão que mora longe. Saudade de uma cachoeira da infância. Saudade do gosto de uma fruta que não se encontra mais. Saudade do pai que já morreu. Saudade de um amigo imaginário que nunca existiu. Saudade de uma cidade. Saudade da gente mesmo, quando se tinha mais audácia e menos

cabelos brancos. Doem essas saudades todas.

1 - No fragmento “Torcer o tornozelo **dói**. Um tapa, um soco, um pontapé, **doem**”, temos um exemplo de flexão verbal para haver a concordância do verbo com o sujeito.

Observe as seguintes alternativas e assinale aquela que possui a CORRETA concordância verbal, seguindo as normas em vigência:

- a) Faziam dois anos que ele havia parado de estudar.
- b) Deve existir sérios problemas na cidade.
- c) Fui eu quem brigou com ele.
- d) Cada um dos alunos devem ser responsáveis pela organização da mochila.
- e) Estados Unidos são uma nação poderosa.

2 - No título “A dor que dói **mais**” temos na palavra em destaque um exemplo de:

- a) advérbio
- b) conjunção

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

- c) preposição
- d) interjeição
- e) substantivo

3 - No excerto “Saudade do pai **que** já morreu” temos um exemplo do uso do pronome relativo **que** com a função de substituir um termo mencionado anteriormente, no caso: o pai. Poderíamos ainda substituir perfeitamente o vocábulo **que** por “o qual” e assim novamente observar a função do **que** como pronome relativo. Porém, na língua portuguesa temos outros pronomes relativos. Nesse sentido, assinale a única alternativa que na palavra em destaque NÃO há a ocorrência de um pronome relativo:

- a) A cantora **que** veio aqui não era famosa.
- b) Ali, **onde** você mora, é o melhor lugar do mundo.
- c) As mulheres, **que** são geniosas, ocupam cargos superiores.
- d) **Tal** absurdo eu não cometeria.
- e) Conheci o pai da garota **o qual** se acidentou.

4 - Observe: “Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim. **Mas** o que mais dói é saudade”, a palavra em destaque cria um sentido de oposição ao anteriormente exposto e denomina-se conjunção adversativa. Analise cada vocábulo em destaque nas orações propostas e verifique aquela que apresenta a classificação INEXATA considerando o sentido da conjunção.

- a) Gosta de chocolate, **mas também** de castanhas. (Aditiva)
- b) Farei todos os exercícios, **logo** terei bom desempenho. (Conclusiva)
- c) Fuja daqui, **porém** tome cuidado! (Aditiva)
- d) Você quer vinho **ou** prefere tomar suco? (Alternativa)
- e) Venci **porque** sou a melhor cozinheira. (Explicativa)

5 - Leia com atenção a notícia publicada no dia 17 de janeiro de 2020 pela Revista Superinteressante e assinale a alternativa que apresenta uma informação EQUIVOCADA segundo o exposto no texto:

Quem foi Joseph Goebbels, líder nazista citado por Secretário da Cultura

Considerado o braço direito de Adolf Hitler, Joseph Goebbels se tornou uma das figuras de maior destaque no governo nazista da Alemanha, que durou entre 1933 e 1945. Ele foi nomeado Ministro da Propaganda e era o principal articulador do setor de informação do regime, fomentando ideias antissemitas e de apoio ao partido. Na madrugada de hoje (17), Goebbels voltou ao noticiário após um vídeo publicado pela Secretaria Especial da Cultura do governo brasileiro, em que o secretário Roberto Alvim faz um discurso com alusões a um pronunciamento do nazista.

No vídeo, Alvim anuncia os planos de financiamento à cultura de sua gestão e diz que “a arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada a aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada”.

A frase é bastante parecida com uma dita pelo lacaio de Hitler na década de 1930: “a arte alemã da próxima década será heroica, romântica, objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grandes padrões e imperativa e vinculante, ou então não será nada”.

Mais tarde, o secretário negou que havia copiado Goebbels e disse que tudo não passava de uma “infeliz coincidência”, mas que a frase usada era “perfeita”. Outros elementos do vídeo, como a retórica, a estética e a música de fundo — uma ópera de Richard Wagner, considerada a favorita de Hitler — levaram internautas, políticos e ativistas a ampliar a comparação com o regime nazista. A repercussão foi tanta que o Secretário da Cultura foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro no início da tarde de hoje. No Twitter, Bolsonaro classificou o pronunciamento como “infeliz”.

Fonte: <https://super.abril.com.br/historia/quem-foi-joseph-goebbels-lider-nazista-citado-por-secretario-da-cultura/> Acesso em 24 de fev. 2020.

- a) Goebbels era o principal articulador do setor de informação do regime nazista disseminando ideias de preconceito contra judeus.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

- b) No vídeo produzido pelo secretário Roberto Alvim, a retórica juntamente com a música de fundo foram elementos ponderados pelos internautas, políticos e ativistas para que se realizasse a comparação com o regime nazista.
- c) O adjetivo utilizado pelo secretário Roberto Alvim e pelo presidente Jair Bolsonaro, para caracterizar o feito (pronunciamento), foi o mesmo.
- d) A demissão do secretário foi posterior ao pronunciamento no qual fez-se alusão ao regime nazista.
- e) Diante das inúmeras evidências o secretário Roberto Alvim assentiu que fez menção a Joseph Goebbels ao tecer seu discurso.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

6 - Vinte colaboradores de uma determinada prefeitura foram escalados para realizar um trabalho de contenção de encostas para ser concluído em dez dias. Como no final do sexto dia apenas 40% do trabalho estava concluído, o prefeito destacou mais alguns colaboradores que a partir do sétimo dia foram incorporados ao grupo inicial. Considerando-se que os colaboradores têm desempenhos equivalentes, para concluir o trabalho no tempo determinado, ou seja, no final do décimo dia, o número de colaboradores destacados a mais a partir do sétimo dia foi de:

- a) 30 colaboradores
- b) 8 colaboradores
- c) 20 colaboradores
- d) 10 colaboradores
- e) 25 colaboradores

7 - Obras de infraestrutura foram feitas em uma área de lazer e resultou na ampliação de 980 metros quadrados, elevando sua área para 1.764 metros quadrados. Considerando que em ambos os casos as áreas de lazer antes da ampliação e depois da ampliação são figuras planas e quadradas, então podemos afirmar que a medida dos lados da área de lazer, anterior à ampliação era de

- a) 28 *m*
- b) 34 *m*
- c) 32 *m*
- d) 26 *m*

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

e) 24 *m*

8 - O segundo termo de uma Progressão Aritmética (PA) é 5 e sua razão é a mesma de uma Progressão Geométrica (PG) em que os números 4 e 12 nessa ordem, são dois termos consecutivos dessa PG. O quinto termo da PA é:

- a) 36
- b) 17
- c) 14
- d) 225
- e) 29

9 - Em um grupo de 15 pessoas, do qual Jessé e Mateus fazem parte, o número de comissões que podemos formar com cinco elementos distintos, nas quais Jessé e Mateus estarão sempre presentes em cada uma delas é de:

- a) 286
- b) 2.730
- c) 2.197
- d) 976
- e) 324

10 - Uma concessionária de veículos está vendendo um automóvel à vista por R\$ 64.800,00. Se um cliente fizer a compra com financiamento, então a condição é que a entrada deverá ser de 30% do valor total do veículo e mais 42 parcelas mensais consecutivas no valor de R\$ 1.442,88 que correspondem ao restante do valor. Nessas condições a taxa mensal de juros simples utilizada no financiamento é de:

- a) 1%
- b) 0,72%
- c) 0,64%
- d) 0,50%
- e) 0,80%

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

11 - Com relação ao Fundo Amazônia criado em 2008 pelo decreto Nº 6.527 é INCORRETA a informação presente em:

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

a) O objetivo central do Fundo Amazônia é promover projetos para a prevenção e o combate ao desmatamento e também para a conservação e o uso sustentável das florestas na Amazônia Legal.

b) Apesar do foco principal do Fundo ser contribuir para a prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas na Amazônia Legal, ele promove também a implementação de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento no Brasil fora da Amazônia Legal e em outros países tropicais.

c) A captação de recursos para o Fundo Amazônia é condicionada pela redução das emissões de gases de efeito estufa oriundas do desmatamento, ou seja, é preciso comprovar a redução do desmatamento na Amazônia para viabilizar a captação de novos recursos.

d) Em dezembro de 2019 foi publicado o Relatório de avaliação de meio termo da efetividade do Fundo Amazônia, que compreende o período de 2008 a 2018. Essa avaliação foi realizada por uma equipe de consultores independentes, com a coordenação técnica da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL, da Organização das Nações Unidas (ONU) e conclui que existem evidências claras de que o Fundo Amazônia tem contribuído para reduzir o desmatamento na Amazônia.

e) O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, manifestou recentemente que a permanência de Daniela Baccas como chefe do Departamento de Meio Ambiente responsável pela gestão do fundo será imprescindível para a efetivação de algumas mudanças. Reiterou ainda que o fundo arrecadou R\$ 1,2 bilhão da Noruega, seguido pela Alemanha (que desembolsou R\$ 68 milhões) e a Petrobrás (R\$ 7 milhões).

Fonte: Adaptado de <http://www.fundoamazonia.gov.br> e <https://oglobo.globo.com> . Acesso em 22 fev 2020.

12 - A Prefeita de Alto Bela Vista, Cátia Tessmann Reichert, além da função administrativa de governar o município assumiu recentemente a presidência:

a) Do Parque Estadual Fritz Plaumann.

b) Do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense - Consórcio Lambari.

c) Do projeto Integrar.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

d) Do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense - CIS/AMAUC.

e) Da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – Amauc.

13 - Instituído em 2017, _____, desde então, busca formas para contribuir com a estabilização da Venezuela. Entre os membros encontram-se Brasil, Peru, Colômbia, Argentina e México.

a) o Grupo de Lima

b) o Acordo de Lima

c) o Tratado de Paz

d) o Tratado de lima

e) a Pacto de Lima

14 - O Censo Demográfico 2020 será a maior operação de recenseamento já organizada no País. Nesse sentido assinale V (Verdadeiro) e F (Falso) para as seguintes proposições:

() A coleta de dados será realizada entre agosto e outubro de 2020.

() Mais de 211 milhões de habitantes serão visitados nos 5570 municípios brasileiros.

() O IBGE tem sua fundamentação operacional baseada nos Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais e no Código de Boas Práticas das Estatísticas que garantem a independência estatística e a confidencialidade dos dados.

() A Lei nº 5.534, de 14 de novembro de 196 dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas para Fundação IBGE e ao mesmo tempo, assegura o caráter sigiloso das informações prestadas.

() Atendendo à necessidade da comunidade autista no Brasil e reconhecendo a importância do tema, foi sancionada a Lei 13.861/2019 que incluirá dados específicos sobre autismo no Censo do IBGE de 2020.

Fonte: Adaptado de: <https://censo2020.ibge.gov.br> e <https://exame.abril.com.br>. Acesso em 22 fev. 2020.

A sequência correta encontra-se em:

a) V – V – V –V – F

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

b) F – V – V –V –V

c) V – V – V –V –V

d) F – F – V –V –V

e) V– F – V –V – F

15 - O Banco Central lançou no dia 19 de fevereiro de 2020 um serviço que promete tornar mais rápida a realização de pagamentos e transferências online entre pessoas, empresas e entes governamentais. O novo serviço deve ser disponibilizado a partir de novembro deste ano. Com o serviço, a população terá uma nova alternativa para efetuar transações, além dos modelos tradicionais já existentes, como TED, DOC, boleto, cheque e cartões, afirma o BC. A ferramenta estará disponível a qualquer dia do ano, sem limite de horário, e com o dinheiro imediatamente disponível ao recebedor. Estamos falando do:

a) PIX

b) NECTON

c) BITCOIN

d) ETHEREUM

e) TED 20

Fonte: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/dicas-de-economia/noticia/2020/02/banco-central-lanca-servico-que-promete-pagamentos-e-transferencias-em-segundos-ck6tqvug60kiw01qdmpo1q4iz.html> . Acesso em 20 fev. 2020.

INFORMÁTICA

16 - Dentre as opções a seguir, escolha a que define o CLOCK de um processador:

a) Relógio interno do dispositivo ou computador, responsável pelas configurações de data e horários.

b) É o número de núcleos do processador.


c) É o tempo gasto para armazenar os arquivos em um dispositivo de armazenamento como por exemplo um disco rígido.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

d) É a frequência com que o processador consegue executar as suas tarefas (ciclos de processamento), medida atualmente em GHZ (Gigahertz).

e) É uma memória auxiliar para processamento.

17 - Com um documento aberto no MICROSOFT WORD e com alguma parte do texto do documento selecionada, ao utilizar o mouse e clicar rapidamente duas vezes na ferramenta



poderá ser executada a seguinte operação:

a) Copiar formato ou aparência do texto selecionado, apenas uma vez para outra parte selecionada no documento.

b) Copiar formato ou aparência do texto selecionado, para um número indefinido de partes selecionadas no documento.

c) Copiar o texto da seleção da origem, para um número indefinido de partes selecionadas no documento.

d) Somente criar novas seções no documento com o formato do texto selecionado.

e) Copiar o texto da seleção de origem, apenas uma vez para alguma parte selecionada no documento.

18 - Considerando a seguinte representação de planilha no MICROSOFT EXCEL:

| | A | B | C |
|---|----------|----------|-----------|
| 1 | Coluna 1 | Coluna 2 | Resultado |
| 2 | 10 | 2 | 12 |
| 3 | 11 | 4 | 7 |
| 4 | 13 | 6 | 7 |
| 5 | 22 | 8 | 30 |
| 6 | 25 | 10 | |

E a fórmula da célula C2:

`=SE(MOD(A2;2)=0;SE(MOD(B2;2)=0;A2+B2;A2-B2);A2-B2)`

Arrastada nos endereços: C3, C4, C5 e C6

Qual o valor que será gerado na célula C6?

- a) 25
- b) 15
- c) 10
- d) 35
- e) 5

19 - Qual a utilidade da função PROCV em uma planilha do MICROSOFT EXCEL?

- a) Localizar itens em uma tabela ou um intervalo por linha.
- b) Localizar o maior valor encontrado em uma coluna.
- c) Localizar o menor valor encontrado em uma coluna.
- d) Localizar algum valor fora do padrão em uma tabela ou intervalo por linha.
- e) Localizar a origem dos valores de uma fórmula.

20 - Em que consiste no processo de hifenização no MICROSOFT WORD:

- a) Deixar em negrito documento, partes ou títulos em um documento.
- b) Marcar as partes do texto do documento para vincular a um hiperlink.
- c) Processo de separação de palavras, que ocorre no final de cada linha de um parágrafo.
- d) Retirar todas acentuações ou caracteres especiais do texto.
- e) Processo de destacar palavras com formato específico no texto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO GINECOLOGISTA

21 - A hiperprolactinemia, uma alteração frequente na prática médica, é responsável por amenorréia secundária em 20% a 25% dos casos. As causas dessa anormalidade podem ser classificadas em fisiológicas, farmacológicas e patológicas. Na investigação inicial, a pesquisa de quais fatores deve ser considerada, EXCETO:

- a) Hipotireoidismo primário.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

- b) Uso de domperidona.
- c) Ovários policísticos.
- d) Insuficiência renal crônica.
- e) Hepatite aguda viral B.

22 - No acompanhamento de mulher jovem com hiperprolactinemia associada a adenoma de hipófise, sem indicação cirúrgica, é INCORRETO afirmar-se:

- a) Os efeitos adversos mais comuns com o tratamento com bromocriptina são náusea, vômitos, cefaleia, tontura e hipotensão postural.
- b) A RM de hipófise deve ser repetida se os níveis de prolactina voltarem a ficar acima do limite superior da normalidade após suspensão de bromocriptina.
- c) A cabergolina está reservada para mulheres hiperprolactinêmicas com infertilidade e desejo de engravidar, pela maior segurança e experiência com o uso do medicamento em gestantes.
- d) Após normalizados os níveis da prolactina por pelo menos 2 anos e o tumor reduzido em mais de 50% do tamanho inicial, a dose do agonista dopaminérgico pode ser diminuída gradativamente até retirada.
- e) A não introdução do agonista dopaminérgico pode ser uma opção para os pacientes assintomáticos com microprolactinoma ou hiperprolactinemia idiopática.

23 - O planejamento familiar é um direito do cidadão. No ano passado foram realizadas 67.056 laqueaduras no Brasil. A esterilização definitiva voluntária no Brasil segue legislação específica encontrada no § 4º do Artigo 10 da Lei 9.263/1996 (que regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal) e Portaria SAS/MSNº 048/1999. A este respeito é FALSA a afirmativa:

- a) Pode ser realizada em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.
- b) O planejamento familiar deve ter acompanhamento por equipe multidisciplinar a fim de desencorajar a esterilização precoce e informação dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldade de reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

- c) A esterilização cirúrgica, como método contraceptivo, será executada se mulher casada manifestar este desejo durante a cesariana.
- d) Pode ser realizada em caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, como pode ser o caso de cesarianas prévias, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.
- e) É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante períodos de parto, aborto ou até o 42º dia do pós-parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade.

24 - Devido à alta possibilidade de complicações decorrentes da Doença Inflamatória Pélvica (DIP), deve-se iniciar o tratamento com antimicrobianos. Deve-se encaminhar para tratamento hospitalar os seguintes casos, EXCETO:

- a) As pacientes com uso de DIU.
- b) Gestantes.
- c) Pacientes com sintomas graves (febre, náusea, vômitos, defesa à palpação abdominal).
- d) Pacientes com intolerância ao tratamento por via oral ou falta de resposta ao tratamento após 72 horas.
- e) Necessidade de exploração ou intervenção cirúrgica (suspeita de torção ovariana ou abscesso tubo-ovariano roto, gravidez ectópica).

25 - À respeito do tratamento da DIP, todas as afirmativas são corretas, com EXCEÇÃO:

- a) As parcerias, mesmo assintomáticas, devem ser tratadas.
- b) Deve-se oferecer testagem para HIV, sífilis e hepatite C e hepatite B para todas as pacientes para parcerias sexuais.
- c) O tratamento pode ser feito com dose única de Ceftriaxona IM Doxiciclina e metronidazol por 14 dias.
- d) Deve-se iniciar o tratamento com antimicrobianos sempre que houver confirmação laboratorial com coleta de secreção e sintomas iniciados há pelo menos 5 dias.
- e) A doxiciclina pode ser substituída por Azitromicina no tratamento.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

26 - O câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, atrás apenas do câncer do colo do útero. No atendimento de mulher referindo sintomas como distensão abdominal, dor abdominal ou pélvica, surgimento de massa e ascite detectável, pode indicar a possibilidade de câncer de ovário, frequentemente em estágios avançados. Dentre as sentenças abaixo, uma traz informações FALSAS com relação a esta doença:

- a) A cirurgia padrão compreende histerectomia abdominal total com salpingo-ooforectomia bilateral e omentectomia, avaliação e biópsia do peritônio diafragmático, goteiras parietocólicas, peritônio pélvico, amostragem de linfonodos pélvicos e para-aórticos, além de lavagem peritoneal para pesquisa de células malignas.
- b) Histórico familiar de cânceres de ovário, colorretal e de mama está associado a risco aumentado de câncer de ovário.
- c) Achado ultrassonográfico (USG) de massa pélvica fixa é muito sugestiva de carcinoma ovariano, especialmente se acompanhada de ascite.
- d) A dosagem do CA 125 pode estar presente em concentrações elevadas em pacientes com câncer de ovário, porém, isoladamente, não é útil como exame de triagem ou diagnóstico.
- e) A quase totalidade das neoplasias ovarianas (95%) é derivada das células germinativas (que formam os óvulos).

27 - O câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina (atrás do câncer de mama e do colorretal), e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. O exame preventivo tem grande valor no diagnóstico precoce. A seguinte afirmação é FALSA:

- a) Mulheres imunossuprimidas, como as infectadas pelo HIV, ou em uso de imunossupressores, devem ser encaminhadas para colposcopia após o primeiro exame citopatológico mostrando LSIL (lesão intraepitelial de baixo grau).
- b) Mulheres com alteração genética, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2 tem risco aumentado para o câncer cervical.
- c) Nos exames preventivos, para mulheres com mais 64 anos de idade e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

- d) As mulheres com história de lesões pré-neoplásicas retornam ao rastreamento trienal ao apresentarem dois exames de controle citológicos semestrais normais.
- e) Na presença de lesões suspeitas vegetantes ou ulceradas no colo do útero, a citologia, nesses casos, pode não identificar a presença de células neoplásicas devido à necrose tecidual.

28 - A infecção pelo HPV é uma das IST mais frequentes no mundo. O risco estimado para a exposição a essa infecção é de 15% a 25% a cada nova parceria. As primeiras manifestações da infecção pelo HPV surgem entre 2 a 8 meses, mas pode demorar até 20 anos para aparecer algum sinal da infecção. As manifestações costumam ser mais comuns em gestantes e em pessoas com imunidade baixa. A respeito desta doença, todas as sentenças são corretas, com EXCEÇÃO:

- a) A maioria das infecções por HPV em mulheres (sobretudo quando adolescentes) tem resolução espontânea, em um período aproximado de 24 meses.
- b) A vacinação antes da primeira relação sexual, na faixa de 9 a 14 anos, em duas doses, previne lesões genitais pré-cancerosas do colo do útero, de vulva, de vagina, anal e as verrugas genitais.
- c) O tratamento das verrugas anogenitais em gestantes deve ser feito com podofilina.
- d) Para mulheres vivendo com HIV/AIDS, recomenda-se a vacina contra o HPV na faixa etária de nove a 26 anos de idade, com esquema diferenciado de doses (0, 2 e 6 meses).
- e) As verrugas, geralmente, são causadas por tipos de HPV não cancerígenos.

29 - As ISTs aumentam em até 18 vezes a chance de infecção pelo HIV/Aids, além de doenças como sífilis, gonorreia e clamídia, por exemplo, poderem causar malformações de feto e, inclusive levar ao óbito, entre outras complicações. De acordo com dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis 2019, foram notificados 62.599 casos em gestantes (ampliação de 25,7% dos casos em relação a 2017). Já em bebês, foram registrados 26.219 casos de sífilis congênita. No seguimento de tratamento de paciente com diagnóstico de sífilis, a melhor forma de fazê-lo é:

- a) Título seriado de VDRL.
- b) Título seriado de FTA-Abs.
- c) Anticorpos anticardiolipina.
- d) Teste Rápido para sífilis.

e) MHA-TP associado ao Teste de Elisa.

30 - A doença trofoblástica gestacional (DTG) pode ser definida como uma anomalia proliferativa que acomete as células que compõem o tecido trofoblástico placentário, cito e sinciciotrofoblasto, ainda que seus diferentes estágios histológicos difiram na propensão para regressão, invasão, metástase e recorrência. No seu diagnóstico, é **INCORRETO**:

- a) O marcador tumoral biológico e específico é o fragmento beta da gonadotrofina coriônica humana (beta-hCG).
- b) Os dois principais fatores de risco para DTG são, principalmente, a idade materna superior a 35 anos e a história prévia de DTG.
- c) Essas pacientes apresentam maior risco de cursar com embolização trofoblástica maciça para os pulmões, o que demanda cuidado durante o esvaziamento uterino.
- d) Aspiração intrauterina (V-A) é a técnica de escolha para o esvaziamento molar, pelo menor risco de perfuração uterina, infecção e permanência de restos molares na cavidade uterina.
- e) A avaliação da pressão arterial pode diagnosticar pré-eclâmpsia precoce, antes da 20ª semana de gravidez e dosagem de TSH e T4 livre podem indicar o hipotireoidismo, associado frequentemente a esta doença.

31 - O climatério geralmente é associado a alterações físicas e emocionais que quando surgem são caracterizadas como síndrome climatérica. Os sintomas do climatério sofrem influência de inúmeros fatores de ordem biológica, aspectos psicológicos e aspectos sociais¹. Dentre eles, destacam-se os sintomas vasomotores, como fogachos e sudorese, a atrofia genital e os transtornos psicológicos, como transtornos de humor e do sono. A respeito do tratamento, **CORRETO** afirmar-se:

- a) O uso de Terapia Hormonal (TH) geralmente é indicado para pacientes abaixo de 60 anos e que tiveram a menopausa há menos de 10 anos.
- b) No caso da terapia Hormonal, prefere-se a associação de estrogênio /progesterona, por haver maior associação de câncer de mama com o uso de estrogênio isoladamente.
- c) O estrogênio é recomendado como um agente de primeira linha para controle da osteoporose.
- d) Doenças hepáticas ativas e graves não são contra-indicações à terapia hormonal.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

- e) Com a queda no nível de estrogênio ocorre aumento no nível de HDL e queda nos níveis de colesterol total, LDL e triglicerídeos.

32 - A osteoporose é uma doença que pode acarretar um enorme prejuízo à qualidade de vida das pacientes que atingem o climatério. É caracterizada por diminuição da massa óssea e deterioração na microarquitetura do tecido ósseo, levando à fragilidade mecânica e consequente predisposição a fraturas, com trauma mínimo, e dor. É CORRETA a afirmativa:

- a) A partir dos 40 anos, o volume de massa óssea começa a diminuir lentamente mantendo-se na mesma velocidade até os 65 anos, quando deve-se investigar por densitometria óssea.
- b) resultados consistentes demonstram redução no risco de fraturas com uso de fitoestrogênios, desde que usados no início do climatério.
- c) A terapia androgênica na mulher após a menopausa reduz riscos de fratura óssea.
- d) A definição/ diagnóstico de osteoporose, sugerida pela OMS, indica que valores da DMO iguais ou inferiores a 2,5 desvios padrão (DP) da média de valor de pico em adultos jovens são compatíveis com o diagnóstico, devido ao alto risco de fraturas.
- e) A tibolona é um esteróide sintético muito eficaz na prevenção da perda óssea pós menopausa.

33 - No período do climatério, alterações endócrinas decorrentes sobretudo do declínio da função ovariana são de grande importância. Clinicamente essas modificações se apresentam como insuficiência do corpo lúteo, que nas fases iniciais determina irregularidades menstruais, como espanio ou polimenorreia, evoluindo mais tardiamente para amenorréia por anovulação temporária ou definitiva. Vários fatores interferem na instalação da menopausa, sendo FALSA a afirmativa:

- a) Mulheres que vivem em países de altitudes maiores podem apresentar a menopausa em idade mais precoce.
- b) Nutrição deficiente e baixo peso levam à ocorrência precoce da idade da menopausa.
- c) Mulheres multíparas têm menopausa mais precocemente.
- d) Mulheres que têm longas jornadas de trabalho e exercem atividades estressantes têm mais chances de entrar na menopausa mais cedo.
- e) Mulheres tabagistas tem a idade da instalação da menopausa antecipada de 12 a 18 meses.

34 - A presença de úlcera genital está associada a elevado risco de transmissão e aquisição do HIV e tem sido descrita como a principal causa para a difusão do vírus nas populações de maior vulnerabilidade; portanto, o diagnóstico e tratamento imediato dessas lesões constitui uma medida de

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

prevenção e controle da epidemia de HIV. Na presença de úlcera genital, a pesquisa e tratamento devem ser direcionados para os seguintes agentes etiológicos, EXCETO:

- a) Herpes genital.
- b) Cancroide.
- c) Sífilis primária.
- d) Gonorréia.
- e) Linfgranuloma venéreo.

35 - A endometriose é uma doença ginecológica definida pelo desenvolvimento e crescimento de estroma e glândulas endometriais fora da cavidade uterina. Pode -se afirmar corretamente:

- a) A escolha do tratamento deve levar em consideração somente a extensão e localização da doença, sendo preferencialmente cirúrgico, quando ocorre fora da idade fértil.
- b) As apresentações clínicas menos comuns são infertilidade e dor pélvica, sendo mais frequentes as crises vasomotoras.
- c) A dor não é influenciada pela profundidade do implante endometriótico nem sua localização.
- d) O padrão-ouro para diagnóstico de endometriose é a laparoscopia com inspeção direta da cavidade e visualização dos implantes, não necessitando de biópsia para confirmação histopatológica.
- e) Quando houver indicação ao uso de Danazol, deve -se controlar contagem de plaquetas, não havendo necessidade de testes de função hepática, pois sua eliminação é unicamente renal.

36 - O grave comprometimento da qualidade de vida das mulheres que apresentam prolapso genital, o aumento de sua prevalência em decorrência da maior expectativa de vida da população e a frequência com que se observa recidiva do prolapso após tentativas cirúrgicas prévias, têm determinado profundo interesse na revisão dos métodos terapêuticos disponíveis para o tratamento dessa afecção, em particular a abordagem cirúrgica. Ê correta a assertiva:

- a) A fixação alta nos ligamentos uterossacros apresenta boa taxa de cura e risco de até 11% de lesão ureteral, sendo a cistoscopia mandatória e, de preferência utilizando algum corante como índigo carmin.
- b) Na cirurgia de prolapso no compartimento anterior, preferencialmente, fazer o tratamento utilizando tela sintética para correção.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

- c) A colpocleise é uma ótima alternativa para pacientes menopausadas, independente das condições clínicas e da atividade sexual.
- d) Há grande diferença na eficácia da via laparotômica ou laparoscópica na sacrocolpopexia abdominal, porem prefere-se a via laparoscópica por ter relação com menor sangramento e curva de aprendizado menor.
- e) Não há necessidade de investigar a presença de prolapso uterino ou de cúpula associado às grandes cistoceles, para programação cirúrgica.

37 - A infecção do trato urinário (ITU) é uma das afecções mais comuns na gestação, podendo ter evolução desfavorável, com complicações sérias para a mãe e o concepto, apesar de terapia antimicrobiana adequada. Assinale a bactéria mais frequentemente envolvida com sua gênese durante esta especial fase da mulher:

- a) Klebsiella.
- b) Enterobacter.
- c) Staphylococcus coagulase negativa.
- d) Enterococcus.
- e) Escherichia coli.

38 - As Infecções de trato urinário (ITUs) são mais frequentes nas mulheres, sendo estimado que cerca de metade das mulheres terão ao menos um episódio de ITU ao longo da vida. Um número bem mais restrito de mulheres desenvolve quadros cronicamente recorrentes de ITUs, dando origem à condição conhecida como ITU recorrente, ou ITU de repetição, sendo FALSA a afirmativa:

- a) Para seu diagnóstico há que registrar-se mais de 5 episódios de infecção no curso de 12 meses, ou 3 episódios em seis meses, sem necessidade de demonstração de resolução após cada tratamento.
- b) O hipostrogenismo observado na menopausa provoca alterações na microbiota e atrofia da mucosa vaginal, com perda de lactobacilos e elevação do pH do meio, fatores que se relacionam com um maior risco de colonização vaginal e infecções ascendentes.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC

- c) Incontinência urinária e disfunções miccionais com a presença de um esvaziamento vesical lento ou incompleto, e de resíduos pós-miccionais superiores a 30mL, se associam a um maior risco de quadro recorrentes de ITU.
- d) Urolitíase pode estar associada a quadros recorrentes de ITU.
- e) Mulheres sexualmente ativas estão sob maior risco de desenvolverem ITU.

39 - A puberdade precoce (o aparecimento de caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9 anos em meninos) pode comprometer a estatura final de crescimento. Ao ser detectado desenvolvimento isolado das mamas (telarca precoce) ou dos pelos pubianos (pubarca precoce). É conduta **INCORRETA** frente a estes achados:

- a) A avaliação da progressão por 3-6 meses pode auxiliar na definição de necessidade ou não de tratamento nos casos de estágio iniciais de puberdade, especialmente em meninas entre 6-8 anos.
- b) A realização de ultrassonografia (USG) pélvica para avaliação de tamanho uterino e aumento da espessura endometrial e aspecto ovariano.
- c) A Radiografia anual de mãos e punhos, para avaliação da idade óssea, não tem boa correlação com prognóstico, por isto deve ser evitada.
- d) Dosagem de valores basais de LH e, em alguns casos o teste de GnRH, são necessários para o diagnóstico.
- e) A ressonância magnética (RNM) de crânio faz parte de investigação nos casos de suspeita de puberdade precoce de origem central.

40 - Os serviços de saúde devem fornecer meios aos usuários e usuárias para que façam uma escolha consciente do método anticoncepcional que melhor se adapta às suas necessidades. Lembrando que qualquer que seja a escolha, deve-se estimular o uso associado do preservativo masculino ou feminino para proteção contra DST. Um fator de influência na escolha do método são as contraindicações ao uso dos anticoncepcionais hormonais, sendo todas as que se seguem, **EXCETO**:

- a) Idade maior ou igual a 35 anos e fumante.
- b) Doença tromboembólica em atividade no momento ou no passado.

- c) Câncer de mama atual ou no passado.
- d) Antecedente de acidente vascular cerebral (AVC).
- e) Mulheres que tiveram aborto recentemente.