

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. O cuidado de enfermagem perpassa pela promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde; assim, julga-se pertinente conhecer os temas transversais, propostos na Política Nacional de Promoção da Saúde (2015/2016), por serem referências para a formulação de agendas e para a adoção de estratégias e temas prioritários. São Temas Transversais dessa Política:

- (A) Ambientes e territórios saudáveis; Produção de saúde e cuidado; e Cultura da paz e direitos humanos.
- (B) Territorialização; Rede de Atenção à Saúde; e Gestão.
- (C) Educação e formação; Participação e controle social; e Produção e disseminação de conhecimentos e saberes.
- (D) Alimentação adequada e saudável; Enfrentamento do uso abusivo de álcool e de outras drogas; e Formação e educação permanente.

02. A Lei de nº 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Sobre o disposto na referida Política, assinale a alternativa correta.

- (A) É direito da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, bem como ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade.
- (B) Em um dos seus artigos, é mencionado o direito de ter a presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização voluntária e ter acesso, porém restrito, aos meios de comunicação disponíveis.
- (C) Menciona a inclusão na Rede de Atenção Psicossocial, além dos serviços/pontos de atenção existentes, os seguintes: ambulatório multiprofissional de saúde mental, unidades ambulatoriais especializadas, hospital psiquiátrico e hospital-dia.
- (D) Refere que os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação, no qual fica liberada a necessidade de laudo médico circunstanciado para internação psiquiátrica.

03. Pesquisa realizada pela Universidade Oxford com mais de 62.000 pacientes portadores da Covid-19 detectou a presença de sequelas psiquiátricas, prevalecendo transtornos de ansiedade, depressão, insônia e demência (TAQUET, M. *et al*, 2020). Assim, para o enfermeiro prestar assistência de forma direcionada e plausível, sobre o Transtorno Depressivo Maior, é correto afirmar que:

- (A) é um transtorno de ansiedade, do tipo agorafobia, caracterizado como uma emoção ou um tom de sentimento difuso e persistente que influencia o comportamento de uma pessoa e colore sua percepção de ser no mundo.
- (B) apresenta sintomas como: humor deprimido, acentuada diminuição do interesse ou prazer, perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor.

(C) nos critérios diagnósticos, devem apresentar episódios maníacos e hipomaníacos, sendo considerados os induzidos por substância ou atribuíveis aos efeitos psicológicos de outra condição médica.

(D) pode ser caracterizado também como Distímia, apresentando episódios de hipomania e depressão leve. No Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-5), é definido como um “distúrbio do humor crônico e flutuante”, com muitos períodos de hipomania e de depressão.

04. O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) sofre influências ambientais, como o uso exagerado da internet e redes sociais, as quais acarretam em alterações fisiopatológicas e propiciam a ocorrência das manifestações clínicas principalmente na faixa etária escolar e adolescente. Leia o Caso: Maria, 38 anos, mãe de Gabriel, recebeu diagnóstico do filho como TDAH e solicitou explicações para a enfermeira do CAPS Infantil sobre a doença, bem como os principais sinais e sintomas. A enfermeira listou vários sinais característicos de Desatenção e Hiperatividade/Impulsividade, conforme o DSM-5. Sobre esses aspectos, relacione as colunas.

Coluna I

- (1) Desatenção.
- (2) Hiperatividade/Impulsividade.

Coluna II

- () Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho.
- () Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex., materiais escolares, lápis, livros, instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celular).
- () Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente.
- () Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída (p. ex., termina frases dos outros, não consegue aguardar a vez de falar).
- () Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado (p. ex., sai do seu lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local de trabalho ou em outras situações que exijam que se permaneça em um mesmo lugar).

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) 1, 1, 1, 2, 2.
- (B) 2, 1, 2, 2, 1.
- (C) 2, 2, 1, 1, 1.
- (D) 1, 1, 1, 1, 2.

05. O Comitê Regional de Humanização do Médio Vale do Itajaí segue com o propósito de esclarecer cada vez mais os conceitos, princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH). Para tanto, eles descrevem seu modelo de atuação: *“No Comitê, utilizamos o método da roda para circular ideias, opiniões e saberes. E todas as decisões são pactuadas com o coletivo, após serem debatidas. Não há um coordenador, as responsabilidades são divididas e alternadas à medida que o tempo avança. Assim, todos somos responsáveis por esse coletivo, quando falamos em seu nome, falamos em nome de todos e todas que ali estão. Mas não é uma tarefa fácil. É na parceria, no reconhecimento do outro como sujeito de saberes e conhecimentos legítimos, no entendimento de que um coletivo é sempre mais forte, na aposta nesse modelo”* (Fonte: <https://redehumanizausus.net> 21.02.2021). O modelo descrito é um exemplo da diretriz:

- (A) Acolhimento.
- (B) Clínica Ampliada.
- (C) Universalidade.
- (D) Cogestão.

06. A Política Nacional de Atenção Básica, publicada no ano de 2017, estabelece Princípios e Diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde, dentre outras particularidades. Assim, analise as assertivas a seguir.

São diretrizes: garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica com vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo, bem como disponibilizar e implantar os Sistemas de Informação da Atenção Básica vigentes, garantindo mecanismos que assegurem o uso qualificado dessas ferramentas nas UBS,

Porque

Devem assegurar a acessibilidade, onde o acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas UBS devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram seus serviços.

Analizando a assertivas propostas e/ou a relação entre elas, assinale a opção correta.

- (A) As duas assertivas são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- (B) As duas assertivas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- (C) A primeira assertiva é uma proposição verdadeira e a segunda é falsa.
- (D) As duas assertivas são proposições falsas.

07. O Programa Saúde na Hora foi lançado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde em maio de 2019 e passou por atualizações com a publicação da Portaria nº 397/GM/MS, de 16 de março de 2020. Sobre esse programa, assinale a alternativa correta.

- (A) Fica instituído o Programa Saúde na Hora no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, com objetivo central de estabelecer novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde - APS no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) Ampliar a cobertura dos Núcleos de Atenção à Saúde da Família (NASF), bem como ampliar o acesso às ações e aos serviços considerados essenciais na Atenção Primária à Saúde (APS), são objetivos do referido programa.

(C) As Unidades de Saúde da Família de 60h, participantes do Programa Saúde na Hora, deverão possuir, em relação ao horário de funcionamento, como opção, 11 (onze) horas diárias ininterruptas, de segunda a sexta-feira, durante os 5 (cinco) dias úteis da semana, e 5 (cinco) horas aos sábados ou domingos.

(D) Em relação ao quantitativo mínimo de equipes de saúde, as Unidades de Saúde de 75h, com saúde bucal, devem possuir 3 (três) equipes de Saúde da Família e 2 (duas) equipes de Saúde Bucal.

08. A avaliação do estado neurológico é uma parte crítica do exame físico de recém-nascidos. O enfermeiro deve realizar essa avaliação durante a consulta de puericultura na Unidade Básica de Saúde. Sobre os reflexos avaliados, assinale a alternativa correta.

(A) O reflexo Preensão apresenta dissonância repentina ou mudança no equilíbrio, provocando extensão e abdução súbitas das extremidades e abanar de dedos, com o dedo indicador e polegar formando um C seguido de flexão e adução de extremidades. Desaparece após 3-4 meses de idade, sendo mais acentuado normalmente durante os primeiros 2 meses.

(B) O reflexo Babinski é realizado por meio do toque das regiões palmar e plantar provocando flexão dos dedos e artelhos. Preensão palmar diminui após 3 meses de idade e apreensão plantar diminui por volta dos 8 meses de idade.

(C) O reflexo Clônus de tornozelo se dá por meio da dorsiflexão rápida do pé com o joelho parcialmente flexionado, resultando em um ou dois movimentos oscilantes (“batimentos”); eventualmente, nenhum batimento é sentido.

(D) O reflexo de Moro é caracterizado pelo estímulo tátil ao longo da região plantar desde o calcanhar até o arco, provocando a extensão dos dedos do pé e dorsiflexão do hálux. Desaparece após a idade de 1 ano.

09. O Ministério da Saúde em 2020 lançou uma nova versão da Caderneta de Saúde da Criança. A caderneta possibilita que o profissional acompanhe o desenvolvimento infantil por meio de um quadro com os marcos, que deve ser preenchido de acordo com a evolução da criança. Após os marcos serem assinalados, o profissional deve verificar o instrumento de desenvolvimento integral da infância, para, assim, tomar a conduta adequada. Marque a alternativa que aponta a conduta correta para o respectivo sinal identificado.

(A) Sinal: Ausência de 1 ou mais reflexos/posturas/habilidades para a sua faixa etária (de 1 mês a 6 anos); uma das condutas é acionar a rede de atenção especializada para avaliação do desenvolvimento.

(B) Sinal: Todos os reflexos/posturas/habilidades para a sua faixa etária estão presentes, mas existe 1 ou mais fatores de risco; uma das condutas é orientar a mãe/cuidador sobre a estimulação da criança.

(C) Sinal: Perímetro cefálico < -2Z escores ou > +2Z escores; a conduta é elogiar a mãe/cuidador e enfatizar para que continue estimulando a criança e retornar para acompanhamento conforme a rotina do serviço de saúde.

(D) Sinal: Presença de 3 ou mais alterações fenotípicas; uma das condutas é retornar para acompanhamento conforme a rotina do serviço de saúde.

10. O Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança tem o objetivo de assegurar a integralidade na assistência multiprofissional, priorizando as ações preventivas, a fim de garantir o crescimento e desenvolvimento infantil. Sobre esse aspecto, assinale a opção correta.

- (A) O calendário mínimo de consultas preconizado aos menores de um ano totaliza 6, sendo nas seguintes idades: 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses.
- (B) No processo de vigilância do desenvolvimento, ao posicionar a criança de bruços, ela deve fazer a elevação da cabeça apenas aos 4 meses de idade.
- (C) Dentre os parâmetros avaliados no Apgar, tem-se: Frequência Cardíaca, Esforço Respiratório, Tônus Muscular, Irritabilidade Reflexa, Cor e Temperatura.
- (D) Para avaliação de risco nutricional, tem-se, como um dos parâmetros, o escore Z, sendo considerado eutrófico (peso adequado) a criança com escore $Z \geq -2$ e $\leq +2$.

11. O novo manual de vigilância epidemiológica sobre eventos adversos (2020) atualiza aspectos como condutas, contraindicações, notificações, eventos adversos, dentre outros. Sobre a vacina adsorvida difteria, tétano, pertússis, hepatite B (recombinante) e *Haemophilus influenzae b* (conjugada), assinale a alternativa que **NÃO** corresponde uma assertiva verdadeira.

- (A) Em crianças com riscos importantes de hemorragias (hemofilia, trombocitopenia, uso de anticoagulantes, outros distúrbios de coagulação) pode-se utilizar a via subcutânea (SC), de preferência logo após a aplicação de fatores de coagulação ou concentrado de plaquetas, se estes estiverem indicados.
- (B) Nos casos de doenças agudas febris moderadas ou graves, recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro, com o intuito de não atribuir à vacina as manifestações da doença.
- (C) Deve-se notificar e investigar os casos que tenham apresentado febre alta nas primeiras 12h após a vacina, devendo ser contraindicada a administração de doses subsequentes desse imunobiológico.
- (D) Após eventos adversos graves em dose anterior, como episódio hipotônico-hiporresponsivo nas primeiras 48h, convulsões nas primeiras 72h, reação anafilática nas primeiras 2h e encefalopatia aguda nos primeiros sete dias após a vacinação, a vacina é contraindicada.

12. As rotavirose são reconhecidas, mundialmente, como uma das principais causas de gastroenterites graves na infância. A Vacina rotavírus G1P[8], disponibilizada no SUS, é monovalente, contendo rotavírus humano, vivo e atenuado. Sobre essa vacina, assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira dose deve ser aplicada aos dois meses, incluindo o intervalo de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 15 dias.
- (B) A segunda dose deve ser aplicada aos quatro meses, incluindo o intervalo de 3 meses e 15 dias a 8 meses e 29 dias.
- (C) A vacina deve ser administrada em pessoas com quadro agudo febril de moderado a grave.
- (D) Recomenda-se a revacinação se a criança cuspir ou regurgitar a vacina após administrada.

13. Noah, 9 meses, compareceu à sala de vacina da Unidade Básica de Saúde em Fortaleza, Ceará, tendo recebido todas as doses preconizadas até essa idade, exceto a 2ª dose da pneumocócica 10 V, pois estava em falta. Hoje, sua mãe compareceu para regularizar a situação vacinal. Qual deverá ser a conduta do profissional enfermeiro nesse caso?

- (A) Administrar a 2ª dose da pneumocócica e aprazar a dose de reforço para 12 meses.
- (B) Administrar a 2ª dose da pneumocócica e aprazar a dose de reforço para 15 meses.
- (C) Administrar apenas a dose que falta, que será considerada a dose de reforço, já que já passou o prazo da 2ª dose.
- (D) Não administrar a 2ª dose, pois passou do prazo.

14. Em 2020, foi lançado o novo PHTLS 9ª edição, no qual o antigo ABCDE foi reavaliado e agora recebeu o nome de XABCDE, no que concerne à sequência de avaliação primária. O acréscimo desse X diz respeito:

- (A) às vias aéreas.
- (B) ao controle de hemorragia externa grave.
- (C) ao nível de consciência.
- (D) à circulação.

15. A escala de coma de Glasgow é um método para definir o estado neurológico de pacientes com uma lesão cerebral aguda, analisando seu nível de consciência. Assinale a alternativa correta, sobre a Resposta Verbal. Quando o paciente é questionado ele:

- (A) refere respostas confusas; confuso (pontuação de 3).
- (B) diz palavras isoladas inteligíveis; palavras (pontuação 1).
- (C) responde adequadamente; orientado (pontuação 6).
- (D) verbaliza apenas gemidos; sons (pontuação 2).

16. Para se avaliar a extensão/superfície corporal queimada, tem-se indicação de diferentes métodos. A Regra de Lund-Browder está sendo mais recomendada, pois contempla as variações corporais de acordo com a idade. Sobre essa regra, assinale a alternativa correta.

- (A) A região do pescoço, o antebraço direito e o esquerdo equivalem a 2% para cada região.
- (B) O troco anterior e o tronco posterior equivalem a 13% para cada região, independentemente da idade.
- (C) A pontuação da região da cabeça vai aumentando à medida que a idade aumenta, isto é, é diretamente proporcional.
- (D) A pontuação da genitália tem o valor fixo de 3%, para crianças e adultos.

17. As camadas que compõem a pele são a epiderme e a derme. De igual forma, existem, ainda, na pele vários anexos, como as glândulas sebáceas e os folículos pilosos. Na fase aguda do tratamento da queimadura, vários órgãos são afetados em intensidade variável, dependendo do caso. Assim, quando o enfermeiro avalia a profundidade da queimadura, ele afirma como sendo correto que:

- (A) primeiro grau (espessura superficial): afeta somente a epiderme, sem formar bolhas.
- (B) segundo grau (espessura total): afeta a epiderme, a derme, estruturas profundas, podendo atingir músculos e ossos e é indolor. Existe a presença de placa esbranquiçada ou enegrecida.
- (C) terceiro grau (espessura parcial-superficial e profunda): afeta a epiderme e parte da derme, forma bolhas ou flictenas.
- (D) quarto grau (espessura total): afeta a epiderme com maior profundidade, caracteriza-se por dor local e vermelhidão da área atingida.

18. A técnica adequada para cuidado de lesões de pele é fator primordial para a cicatrização esperada, minimizando os riscos de contaminação. Sobre a realização do curativo de cateter venoso periférico, assinale o item correto.

- (A) A única substância a ser utilizada na limpeza da inserção do cateter é Soro Fisiológico a 0,9%.
- (B) A limpeza deve ser realizada com solução antisséptica, partindo do ponto de inserção, em direção à periferia, e retornando da periferia do cateter para a inserção.
- (C) Entre as soluções antissépticas a serem utilizadas na limpeza do cateter, tem-se a clorexidina degermante, alcoólica ou aquosa a 2%.
- (D) Para cobrir o cateter deve-se usar, preferencialmente, película estéril transparente semipermeável, que pode ser trocada a cada 7 dias, ou antes, se houver sujidade, adesão prejudicada ou sinais flogísticos.

19. Paciente, 70 anos, diabético, compareceu a Unidade Básica de Saúde com lesão no pé, ao avaliar identificou-se exsudato purulento, sem odor fétido. Das tecnologias no tratamento de feridas, qual a mais recomendada para a condição clínica do pé do paciente em questão?

- (A) Hidrogel.
- (B) Carvão ativado.
- (C) Alginato de cálcio.
- (D) Papaína.

20. No ciclo gravídico puerperal, o corpo da mulher passa por inúmeras modificações fisiológicas e psíquicas, necessitando de atenção especial da equipe de saúde nesse período. Diante desse contexto, assinale a opção correta.

- (A) Nas consultas pré-natais, o enfermeiro precisa avaliar a caderneta de vacina da gestante, devendo atentar para administração da dTPa a partir da 27ª semana.
- (B) Contrações irregulares, perda do tampão mucoso, dilatação e/ou apagamento do colo e perda de líquido amniótico são sinais clínicos de trabalho de parto.
- (C) Mulheres que tiveram Data da Última Menstruação em 10/11/2020, tem Data Provável do Parto (DPP) em 17/08/2021.
- (D) Entre as alterações da gravidez na mulher, tem-se a elevação do diafragma em até 4 cm, aumento da extensão dos pulmões e a respiração é mais costal que diafragmática.

21. A esterilização é um processo de destruição de microorganismos de todas as formas de vida microbiana. Considerando que no Brasil tem-se os métodos de esterilização físicos e fisicoquímicos, correlacione as colunas a seguir:

I. Está contraindicado para materiais termosensíveis, acontece por termorregulação das proteínas dos microorganismos, levando à sua morte.

II. Proporciona esterilização "a frio", sendo compatível com grande variedade de materiais: termo-plásticos, borrachas, têxteis, metais, pigmentos, vidros, adesivos e tintas. Envolve raios gama de uma fonte de ^{60}Co ou feixes de elétrons de alta energia, gerados em aceleradores de partículas.

III. As principais vantagens desse método são baixa temperatura (até 55°C , indicado para materiais termosensíveis), segurança, ausência de resíduos tóxicos, agilidade. Apesar de compatível com a maioria dos dispositivos médicos, é incompatível com: celulose (papel), lençóis e líquidos.

IV. Por ter difusibilidade, esse método é indicado para materiais com lúmens longos, estreitos e de fundo cego, além de poder ser utilizado para produtos termosensíveis. O ciclo básico de esterilização consiste em 5 etapas: pré-condicionamento e umidificação, introdução, exposição, evacuação e lavagem de ar.

- () Óxido de Etileno
- () Vapor Saturado Sob Pressão
- () Vapor e Plasma de Peróxido de Hidrogênio
- () Radiação Ionizante

Assinale o item que corresponde a sequência correta de cima para baixo:

- (A) IV, I, II, III.
- (B) IV, I, III, II.
- (C) I, IV, III, II.
- (D) I, II, III, IV.

22. José, Marta e Pedro encontram-se internados no hospital. Após avaliação clínica, exame físico e resultados de exames laboratoriais, esses pacientes foram diagnosticados com tuberculose pulmonar (José), Influenza A H1N1 (Marta) e Pneumonia fúngica (Pedro). Diante desses diagnósticos, quais os tipos de precauções, para garantia da biossegurança, os profissionais de saúde que irão atender esses pacientes precisam ter, respectivamente?

- (A) Aerossóis; Gotículas; Padrão.
- (B) Gotícula; Aerossóis; Padrão.
- (C) Aerossóis; Aerossóis; Gotícula.
- (D) Gotícula; Gotículas; Aerossóis.

23. A chegada da senilidade é acompanhada de algumas alterações consideradas fisiológicas para essa fase da vida. Nesse contexto, assinale a alternativa que se refere a essas alterações.

- (A) No sistema respiratório, tem-se aumento da expansibilidade da caixa torácica e da espessura das paredes dos alvéolos.
- (B) A musculatura do intestino enfraquece, aumentando a peristalse, além de haver aumento da secreção da lipase e insulina pelo pâncreas.
- (C) Perda da elasticidade uretral e de colo, bexiga menos elástica são algumas das alterações do sistema geniturinário.
- (D) Perda óssea, aumento das fibras musculares e rigidez de cartilagens, tendões e ligamentos conferem as alterações do sistema musculoesquelético no idoso.

24. Carlos, 32 anos, tinha em sua prescrição Penicilina Cristalina 2.000.000UI EV, de 4 em 4 horas. Há na unidade apenas FA de 5.000.000UI. Quantos mililitros devem ser administrados no paciente, se foi utilizado 8 ml para diluição?

- (A) 3,2 ml.
- (B) 4 ml.
- (C) 3,5 ml.
- (D) 4,2 ml.

25. Sabendo que os cuidados de enfermagem perioperatórios são de primordial importância para garantir a realização de um procedimento seguro, além de proporcionar recuperação e prevenir ou tratar complicações relacionadas ao procedimento anestésico-cirúrgico, analise as assertivas a seguir e assinale a correta.

- (A) A posição de Trendelenburg, utilizada em cirurgias laparoscópicas de abdômen inferior e pelve, é uma variação da posição supina, em que a parte superior do dorso é elevada e os pés abaixados.
- (B) Quando necessária a realização de tricotomia do sítio cirúrgico, recomenda-se que esse procedimento deve ser realizado com uso de um tricotomizador em ambiente externo à sala de operação.
- (C) O banho pré-operatório com clorexidina dispensa a degermação e antisepsia do sítio cirúrgico na sala de operação.
- (D) Índice de Aldrete e Kroulik modificado entre 6 e 7 pontos é um dos critérios para o paciente receber alta da Sala de Recuperação Pós-Anestésica.

26. O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Sobre as etapas do processo de enfermagem, analise o conceito a seguir e marque a alternativa a que corresponde.

“Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados” (COFEN, 2009).

- (A) Diagnóstico de Enfermagem.
- (B) Planejamento de Enfermagem.
- (C) Implementação.
- (D) Avaliação.

27. Joselena, coordenadora na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital da rede pública, recebeu a seguinte reclamação da ouvidoria: “Meu pai foi atendido na UTI pela técnica de enfermagem Karla, que se negou a realizar banho no leito nele por dois dias consecutivos, sem qualquer justificativa”. Na função de coordenadora, Joselena já fez os devidos encaminhamentos administrativos e no âmbito da Comissão de Ética da instituição e do Conselho de Enfermagem. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução COFEN nº 564/2017, assinale a opção que corresponde à atitude de Joselena quando comunicou o ato antiético.

- (A) Direito.
- (B) Dever.
- (C) Proibição.
- (D) Direito e Dever.

28. A _____ versa sobre as ações privativas do enfermeiro, dentre elas: “Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.” Preencha a lacuna e marque o item que corresponde à resposta correta.

- (A) Lei nº 7498/86, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87.
- (B) Lei nº 9874/86, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/88.
- (C) Lei nº 7498/88, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87.
- (D) Lei nº 564/87, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87.

29. Assinale a alternativa correta em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), que tem suas diretrizes dispostas na Lei nº 8.080/1990.

- (A) Os próprios municípios devem desenvolver as ações e os serviços de saúde, não sendo permitido constituir consórcios.
- (B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo permitida a destinação de recursos públicos para auxílios às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) Compete à direção estadual do SUS promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde.
- (D) À Direção Nacional do SUS compete gerir laboratórios públicos e hemocentros.

30. Considerando as diretrizes utilizadas para prevenir as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), adotam-se as precauções, cujo principal objetivo é a prevenção da transmissão de patógenos de um paciente para o outro, até mesmo para o profissional de saúde. A ANVISA considera como medidas de precaução respiratória para gotícula:

- (A) uso de luvas, máscara N95 e óculos de proteção.
- (B) usar máscara N95, quando a proximidade com paciente for menor que um metro.
- (C) usar máscara cirúrgica, quando a proximidade com paciente foi menor que um metro.
- (D) uso de luvas, máscara cirúrgica e óculos de proteção.