



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  
EDITAL Nº 001 / 2022

MÉDICO / UROLOGIA - NÍVEL SUPERIOR

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso 5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **2 (duas) horas após seu início** mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas do seu início.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto I

Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior planície alagável do mundo no mapa dos principais safáris fotográficos.

Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou para as redes sociais.

Maior planície alagada do planeta, o Pantanal desponta como o local mais propício do mundo para avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a maior população do felino - este título é da região Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do animal.

Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como uma das áreas com maior densidade do felino no planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por especialistas.

Quem flagrar uma onça nunca observada antes ainda tem a chance de, confirmado o avistamento inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que à distância pareçam iguais.

(Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml>.

Acesso em 16/11/2022)

- 1) De acordo com o texto, o que faz com que “o Pantanal tenha despontado como o local mais propício do mundo para avistar a onça-pintada” é:
  - a) apresentar, na região, a maior população desses felinos.
  - b) ter registradas as pegadas dos felinos na planície alagada.
  - c) ser uma planície com uma das maiores densidades desse felino.
  - d) receber milhares de turistas estrangeiros como visitantes.
- 2) O texto começa com a enumeração de autores que são associados por meio de uma relação de:
  - a) alternância.
  - b) oposição.
  - c) comparação.
  - d) conformidade.
- 3) Em “Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os vocábulos destacados exercem, sintaticamente, a função de:
  - a) núcleo do sujeito composto.
  - b) adjunto adnominal.
  - c) complemento nominal.
  - d) adjunto adverbial.

- 4) “onça-pintada” é um substantivo composto ligado por hífen. A partir do Novo Acordo Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, assinale a alternativa que não sofreu alteração após esse Acordo.
  - a) ultrassonografia.
  - b) contrarregra.
  - c) minissaia.
  - d) suprassumo.

- 5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes umas das outras” (5º§), percebe-se a correta concordância do verbo com o sujeito. Dentre as frases abaixo, assinale a que também apresenta correção de concordância e de ortografia.
  - a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.
  - b) A velha planilha mantém os dados anteriores.
  - c) As páginas contém material diversificado.
  - d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.

Considere a última oração do texto “*ainda que à distância pareçam iguais*” (5º§) para responder às questões de 6 a 8 seguintes.

- 6) A expressão que introduz o trecho deve ser classificada, morfologicamente, como uma locução:
  - a) conjuntiva de valor concessivo.
  - b) prepositiva de valor adversativo.
  - c) adverbial de valor temporal.
  - d) adjetiva de valor explicativo.
- 7) O acento grave presente em “à distância” permite concluir que essa expressão cumpre o mesmo papel sintático da que se destaca em:
  - a) “fincando a maior planície alagável do mundo” (1º§).
  - b) “destaque na literatura brasileira há décadas” (1º§).
  - c) “mas sua floresta dificulta a observação do animal” (3º§).
  - d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§).
- 8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se afirmar, a respeito de sua construção que:
  - a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um advérbio.
  - b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo como núcleo.
  - c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo verbal.
  - d) apresenta um verbo impessoal seguido de adjetivo.

**Texto II**

**Depois que**  
(Marina Colasanti)

Carregava consigo um vasto cemitério. Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à distância.

Breve, chegaria a sua vez. Mas não se incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides com as quais havia dialogado tão longamente.

**9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no texto, podem ser entendidos simbolicamente, apontando, assim, para um conjunto de:**

- a) lápides.
- b) lembranças.
- c) mulheres.
- d) tumbas.

**10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso de verbos para marcar a passagem do tempo. Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, no início, expressa uma ação:**

- a) futura que se relaciona com o passado.
- b) presente, afetada pelo passado.
- c) passada que se prolonga no tempo.
- d) presente com caráter atemporal.

**RACIOCÍNIO LÓGICO**

**11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional é correto afirmar que:**

- a) O valor lógico da disjunção entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros
- b) O valor lógico da conjunção entre duas proposições é falso somente se os valores lógicos das duas proposições forem falsos
- c) O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros
- d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas proposições é verdade somente se apenas um dos valores lógicos das proposições for verdadeiro

**12) Numa escola 75 estudantes gostam de matemática, 53 gostam de geografia e 26 gostam das duas disciplinas. Nessas condições, o total de estudantes que gostam de somente uma das duas disciplinas é igual a:**

- a) 76
- b) 66
- c) 49
- d) 27

**13) Se João pratica esportes, então Paula o acompanha. Se Paula o acompanha, então sexta-feira não é feriado. Podemos concluir corretamente que:**

- a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é feriado
- b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não é feriado
- c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica esportes
- d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica esportes

**14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão e da regra para defender que a premissa pode explicar a conclusão é chamado de:**

- a) Dedução
- b) Indução
- c) Abdução
- d) Tratamento

**15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os valores lógicos das proposições entre ele se alternarem e forem diferentes, é chamado de:**

- a) Disjunção
- b) Disjunção exclusiva
- c) Bicondicional
- d) Condicional

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

**16) Relacione as típicas extensões de arquivos da coluna da esquerda com o seu respectivo tipo da coluna da direita.**

- |          |                         |
|----------|-------------------------|
| (1) BMP  | (A) arquivo compactado. |
| (2) AVI  | (B) arquivo de imagem.  |
| (3) ZIP  | (C) arquivo de vídeo.   |
| (4) XLSX | (D) arquivo do Excel.   |

- a) 1A - 2B - 3C - 4D
- b) 1B - 2C - 3A - 4D
- c) 1B - 2D - 3A - 4C
- d) 1D - 2C - 3B - 4A

**17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, analise as afirmativas logo em seguida e assinale a alternativa correta.**

	A	B
1	7	8
2	9	10

- 1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) teremos como resultado 16 (dezesesseis).
- 2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) teremos como resultado 17 (dezesete).

- a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras
- b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa
- c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa
- d) As afirmativas 1 e 2 são falsas

**18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho:**

"Nas últimas versões do Microsoft Word (em português), enquanto a tecla \_\_\_\_\_ move o cursor para o final da linha atual, a tecla \_\_\_\_\_ move o cursor para o início da linha atual".

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Ctrl / Shift
- b) Home / End
- c) Shift / Ctrl
- d) End / Home

**19) Quanto às características dos programas Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) O firewall é um sistema de segurança de rede de computadores que limita o tráfego de entrada e/ou saída dentro de uma rede.
- ( ) Se numa instalação já tiver um firewall será desnecessário instalar adicionalmente um programa Antivírus, em termos de segurança de dados.
- ( ) A concepção de um firewall atual pode-se considerar tecnicamente como sendo a terceira geração evolutiva dos antigos programas Antivírus.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - V
- d) F - F - V

**20) Referente aos conceitos básicos sobre Correios Eletrônicos temos características especiais tais como:**

1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é bloqueado pelo firewall dos servidores.
2. O e-mail se trata de um modo de comunicação assíncrona, o que quer dizer que não é necessário que haja a presença simultânea do remetente e do destinatário.
3. Por meio do e-mail se consegue enviar mensagens apenas com texto ou também com imagens, vídeos e áudio anexados.

**Da relação apresentada:**

- a) existem somente o 1 e 2
- b) existem somente o 1 e 3
- c) existem somente o 2 e 3
- d) existem 1, 2 e 3

**HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO**

**21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, foi criado um novo estado brasileiro devido ao desmembramento do Mato Grosso. Assinale a alternativa correspondente aos dois estados resultantes de tal desmembramento, de maneira correta.**

- a) Mato Grosso e Rondônia
- b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
- c) Mato Grosso e Goiás
- d) Mato Grosso e Pará

**22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os municípios a seguir, assinale a alternativa que apresenta aquele que está localizado no estado de Mato Grosso, de forma incorreta.**

- a) Sinop
- b) Tangará da Serra
- c) Porto Estrela
- d) Rio Preto

**23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em Mato Grosso que correm esse risco. Por exemplo, o \_\_\_\_\_ recebe um impacto urbano muito grande ao passar pela área urbana de Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar em condomínios que estão surgindo no seu entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 2022).**

**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- a) Rio Iguaçu
- b) Rio Coxipó
- c) Rio Madeira
- d) Rio Grande

**24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por abranger áreas de três diferentes biomas brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos biomas localizados em Mato Grosso, assinale a alternativa correta.**

- a) Cerrado: tem vegetação composta por gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas permitem captar água devido aos baixíssimos índices pluviométricos do clima semiárido
- b) Pantanal: bioma com maior área no interior de Mato Grosso, localizado na porção Leste do estado e com rica biodiversidade
- c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em Mato Grosso localizada principalmente ao Norte do estado
- d) Mata Atlântica: maior planície alagável do planeta, com uma fauna exuberante e considerada a mais rica da Terra

25) Localizado no norte de Mato Grosso, o \_\_\_\_\_ limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com o Pará, em um lugar de profusão de nascentes de água pura e cristalina. Considerado rico em biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui em torno de 850 espécies de aves catalogadas na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Parque Estadual Cristalino
- b) Parque Nacional do Jamanxim
- c) Parque Nacional de Anavilhanas
- d) Parque Nacional de Aparados da Serra

### LEGISLAÇÃO

26) De acordo com as disposições da Constituição Federal sobre saúde, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- ( ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- ( ) O Estado deve fomentar a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F

27) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Sobre o tema, assinale a alternativa que, de acordo com a Constituição Federal, apresente incorretamente uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

- a) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
- b) Participação da comunidade
- c) Seletividade na prestação dos serviços
- d) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Sobre as disposições do decreto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde.

- a) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde
- b) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde
- c) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS
- d) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS

29) Acerca das disposições sobre planejamento da Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, analise as afirmativas a seguir.

- I. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- III. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira centralizada, a partir das necessidades dos governantes.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da resolução, assinale a alternativa incorreta.

- a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde
- b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção
- c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação
- d) Toda pessoa pode adotar comportamento desrespeitoso com as demais pessoas que usam ou que trabalham no estabelecimento de saúde

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) Paciente de 64 anos, sexo masculino, apresenta queixa de hematúria macroscópica, intermitente, com coágulos, há cerca de 3 semanas. Associa-se, ao quadro, incômodo em região hipogástrica (sensação de peso – sic), urgência miccional e sensação de esvaziamento vesical incompleto. Antecedentes pessoais apresenta hipertensão arterial sistêmica (HAS) controlada, diabetes mellitus (tipo 2) e dislipidemia. Relata tabagismo (80 anos - maço) e etilismo social: A partir do quadro clínico, assinale a alternativa correta.**

- a) O melhor exame para investigação do quadro clínico é a tomografia computadorizada de abdome e pelve sem contraste endovenoso, sendo suficiente para o diagnóstico
- b) A principal hipótese diagnóstica é a de carcinoma urotelial e, por este motivo, a cistoscopia e um exame de imagem que avalie o trato urinário superior são exames mínimos necessários para iniciar a investigação
- c) A hematúria macroscópica com coágulos, associada a urgência miccional e sensação de esvaziamento vesical incompleto são sintomas sugestivos de litíase na junção ureteropielica
- d) A ultrassonografia do aparelho urinário é o exame inicial que deve ser solicitado e, em caso de normalidade, é suficiente para descartar hematúria de origem vesical

**32) Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) demonstram que, após o câncer de pele não melanoma, o câncer de próstata é o mais comum na população masculina. Sobre o diagnóstico desta patologia, analise as afirmativas abaixo:**

- I. A ressonância multiparamétrica de próstata é suficiente para confirmar o diagnóstico de câncer de próstata
- II. Caso sintomas do trato urinário inferior estejam presentes no momento do diagnóstico de câncer de próstata é mais provável que se trate de um tumor em estágio avançado
- III. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o rastreio do câncer de próstata deve ser oferecido a partir dos 45 anos para indivíduos afrodescendentes e com antecedente familiar da doença

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas

**33) Paciente do sexo masculino, 17 anos, apresenta febre (38,3º C) e queda do estado geral há 1 dia. Trabalha como guardador de carros e refere que há 7 dias envolveu-se em uma briga e foi golpeado com um chute na região genital. Relata que desde então apresenta um incômodo local. Entretanto, há 2 dias ocorreu aumento de volume em testículo esquerdo associado a importante dor. Questionado sobre atividade sexual, refere relação sexual sem preservativo com parceira eventual há cerca de 5 dias. Ao exame físico, observa-se saída de secreção purulenta em grande quantidade pelo meato uretral e importante aumento de testículo esquerdo com hiperemia e dor local à palpação. A partir do quadro clínico, assinale a alternativa correta.**

- a) É provável que se trate de uma orquitepididimite secundária a uma uretrite gonocócica
- b) Hematoma testicular esquerdo infectado não é uma das hipóteses diagnósticas
- c) Na suspeita de torção de testículo, a ultrassonografia de bolsa testicular sem *doppler* é capaz de excluir ou confirmar o diagnóstico
- d) Apesar da relação sexual desprotegida, a possibilidade da secreção uretral purulenta relacionar-se com o gonococo é pequena, pois o tempo de incubação do patógeno ainda não foi atingido

**34) Paciente virgo, 14 anos, sexo masculino, é levado ao serviço de urgência de madrugada por seu pai devido a quadro algico escrotal. Adolescente refere que estava dormindo, quando acordou devido a dor testicular esquerda, de forte intensidade, sem fatores de melhora ou piora que teve seu início há, aproximadamente, 1 hora. Ao exame físico apresenta testículo esquerdo aumentado de tamanho e epidídimo anteriorizado. Sinal de Prehn negativo.**

**Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a principal hipótese diagnóstica e o exame subsidiário que deve ser solicitado na urgência para sua confirmação.**

- a) Torção de cordão espermático; Tomografia de Pelve com contraste endovenoso
- b) Orquitepididimite; Hemograma completo, PCR, VHS e sorologias
- c) Câncer de Testículo; Ultrassonografia de Bolsa Testicular
- d) Torção de cordão espermático; Ultrassonografia de Bolsa Testicular com doppler

**35) Paciente do sexo masculino, 59 anos, queixa-se de dificuldade progressiva para manter a ereção a cerca de 8 meses. Nega problemas matrimoniais, familiares ou laborais. Refere preservação do desejo sexual, excitação e orgasmo. Antecedentes pessoais: infarto agudo do miocárdio há 1 ano, estando em uso contínuo de monocordil®, é hipertenso e dislipidêmico. Relata que cessou o tabagismo após o evento cardíaco, tendo fumado, em média, 2 maços de cigarro por dia por cerca de 30 anos.**

**Baseado no quadro clínico acima, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para condução do caso.**

- a) indicação de psicoterapia e prescrição de inibidor da 5 fosfodiesterase por via oral
- b) solicitação de perfil glicêmico, lipídico, hormonal e indicação de reposição hormonal (testosterona)
- c) solicitação de perfil glicêmico, lipídico, hormonal e prescrição de vasodilatador intracavernoso injetável
- d) solicitação de perfil glicêmico, lipídico, hormonal e prescrição de inibidor da 5 fosfodiesterase por via oral

**36) Para uma adequada micção, as ações dos sistemas nervosos autonômicos simpático e parassimpático, e somático precisam estar em harmonia com os centros de controle centrais. Em relação a fisiologia da micção, assinale a alternativa correta.**

- a) Na fase de enchimento vesical, ocorre a inibição do sistema nervoso autônomo simpático e o estímulo do sistema nervoso autônomo parassimpático
- b) O lobo frontal realiza o controle consciente da micção e a ponte realiza o controle motor
- c) Na bexiga, os receptores muscarínicos mais prevalentes são o M1 e M3, portanto, se na fase de enchimento vesical houver disfunção da ação do sistema nervoso autônomo parassimpático, o uso de agonistas da acetilcolina é uma das opções de tratamento
- d) Apesar do dissinergismo véstico-esfincteriano representar uma alteração na harmonia entre a contração vesical e no funcionamento do esfíncter uretral, o impacto na qualidade de vida dos seus portadores é mínimo, pois os sintomas urinários de esvaziamento raramente estão presentes

**37) O priapismo é uma ereção peniana prolongada que persiste por mais de 4 horas, na maioria das vezes dolorosa, a qual não se relaciona com estímulo sexual.**

**Dentre as doenças abaixo, a alternativa que apresenta àquela a qual o priapismo de baixo fluxo está mais comumente associado é:**

- a) Doença de Peyronie
- b) Doença de Parkinson
- c) Anemia falciforme
- d) Transtorno Depressivo Maior

**38) Paciente do sexo masculino vítima de acidente de moto apresenta traumatismo contuso no flanco esquerdo. Foi levado ao serviço de emergência pelo corpo de bombeiros e na entrada no hospital apresentava-se com sinais vitais normais e estável hemodinamicamente. Não se identificou hematúria macroscópica. Ao exame físico observou-se equimose em região lombar esquerda e fratura de últimos arcos costais. Após avaliação inicial, foi encaminhado ao setor de diagnóstico por imagem, onde foi submetido a uma tomografia computadorizada de abdome com contraste endovenoso que demonstrou um trauma renal à esquerda grau III sem outras lesões associadas. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento inicial mais adequado para o caso acima.**

- a) O tratamento inicial mais adequado é o conservador que consiste em repouso, hidratação, analgesia, antibiótico e controle hemodinâmico
- b) O tratamento inicial mais adequado é o cirúrgico, sendo necessária a nefrectomia total para controle hemodinâmico, com hematimetria seriada
- c) O tratamento inicial mais adequado é o conservador com a realização de ultrassonografia do aparelho urinário seriada para avaliação da evolução do hematoma retroperitoneal
- d) O tratamento inicial mais adequado é o cirúrgico com drenagem do hematoma visando preservação do rim e o surgimento de infecção no hematoma renal

**39) Os tumores testiculares correspondem a 5% dos tumores urológicos. Em relação ao câncer de testículo, assinale a alternativa correta.**

- a) O principal sítio de metástase, devido à origem embrionária testicular, é o esqueleto axial
- b) O principal sítio de metástase, devido à origem embrionária testicular, são os linfonodos obturatórios
- c) O principal sítio de metástase, devido à origem embrionária testicular, são os linfonodos inguinais profundos
- d) O principal sítio de metástase, devido à origem embrionária testicular, são os linfonodos retroperitoneais



**40) Paciente do sexo feminino, 28 anos, comparece ao pronto atendimento (PA) pela quarta vez em 48 horas. Apresenta quadro álgico lombar esquerdo, de forte intensidade, o qual se irradia para flanco ipsilateral. Associa-se náuseas e vômitos. Relata que nas visitas anteriores ao PA lhe foram prescritos analgésicos e anti-inflamatórios com melhora parcial da intensidade da dor, entretanto, com retorno do quadro inicial após cessação dos efeitos das medicações. Há 3 horas passou a apresentar queda do estado geral e febre aferida de 38,4° C. Ao exame físico apresenta-se em regular estado geral, desidratada 2+/4, febril (38,9° C), hipotensa e com taquicardia. O sinal de Giordano é positivo.**

**A partir do quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a principal hipótese diagnóstica e a terapia inicial que deve ser instituída após confirmação diagnóstica.**

- a) Litíase ureteral esquerda; hidratação, analgesia, antibioticoterapia e retirada do cálculo
- b) Pielonefrite por provável obstrução por litíase ureteral à esquerda; hidratação, analgesia, antibioticoterapia e drenagem do trato urinário superior
- c) Litíase ureteral esquerda; hidratação, analgesia, antibioticoterapia e terapia expulsiva do cálculo com a prescrição de alfa 1 bloqueador adrenérgico
- d) Pielonefrite não obstrutiva à esquerda; hidratação, analgesia, antibioticoterapia e drenagem do trato urinário superior

**41) A deficiência congênita da junção ureterovesical (JUV) pode culminar com o surgimento de refluxo vesicoureteral (RVU) resultando em episódios de infecção do trato urinário (ITU) na infância. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.**

- a) A fisiopatologia do RVU primário correlaciona-se com a redução da extensão do trajeto intramural e submucoso do ureter distal
- b) O grau do RVU não mantém uma relação diretamente proporcional com a probabilidade de ascensão de bactérias para o interior do parênquima renal
- c) A suspeita de RVU não pode ser realizada no período antenatal, mesmo com a presença de dilatação do trato urinário superior do feto ao ultrassom
- d) Dentre as causas funcionais de RVU podemos citar válvulas de uretra posterior e as ureteroceles prolapsadas

**42) Nos últimos 20 anos, ocorreu um expressivo aumento no número de doadores falecidos no Brasil, sendo, atualmente, o tipo de doador renal mais frequente.**

**Sobre o transplante renal e patologias associadas, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os indivíduos que possuem prioridade para o transplante renal, assumindo as primeiras posições das listas de transplante são: (1) falta de acesso vascular para diálise, (2) transplantados com outros órgãos sólidos, (3) doadores renais que evoluíram para doença renal crônica (DRC) terminal e (4) quando existe a compatibilidade HLA completa (chamado zero *mismatch*).
- II. As principais causas de DRC, no Brasil, são a hipertensão arterial e a diabetes melito.
- III. Não são considerados critérios de exclusão para o transplante renal: neoplasia maligna ativa, doenças psiquiátricas e expectativa de vida inferior a dois anos.
- IV. A nefrectomia pré-transplante renal é indicada em casos de rins cronicamente infectados e na hipertensão arterial refratária a tratamento clínico.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas

**43) Os sintomas do trato urinário inferior (STUI), secundários a Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), podem derivar de uma disfunção dinâmica da bexiga e da musculatura lisa prostática, como também de uma obstrução estática vesical, secundária ao crescimento progressivo da glândula. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta quando há a presença desta sintomatologia.**

- a) A urofluxometria livre sempre deve ser solicitada na avaliação inicial do paciente portador de HPB
- b) A realização de urofluxometria livre só é indicada em pacientes que apresentam STUI e tenham idade acima de 60 anos
- c) Existe uma forte recomendação de solicitação de urofluxometria livre para aqueles pacientes sintomáticos em que há a pretensão de iniciar a terapia medicamentosa para HPB
- d) Em pacientes em que o tratamento cirúrgico da HPB será instituído não existe a recomendação da realização de urofluxometria livre

44) Paciente de 66 anos, sexo masculino, apresenta sintomas do trato urinário inferior (STUI) de esvaziamento severos de longa data. Associa-se proeminentes STUI de armazenamento proporcionando importante impacto na qualidade de vida. Foi submetido a monoterapia com bloqueador  $\alpha$ 1-adrenérgico com resposta inadequada. Devido a isso, realizou estudo urodinâmico que evidenciou uma obstrução infra vesical de provável etiologia prostática, além de importante resíduo pós-miccional (> 150 ml).

**Logo, tendo como objetivo proporcionar melhora na qualidade de vida ao paciente supracitado, assinale a alternativa que apresenta a terapia mais efetiva.**

- Associação de um antimuscarínico ao bloqueador  $\alpha$ 1-adrenérgico previamente prescrito
- Suspensão do bloqueador  $\alpha$ 1-adrenérgico previamente prescrito e indicação de tratamento cirúrgico para hiperplasia prostática benigna
- Indicação de aplicação de toxina botulínica intravesical para tratamento dos STUI de armazenamento
- Associação de um inibidor  $\beta$ 3 - agonista ao bloqueador  $\alpha$ 1 - adrenérgico previamente prescrito

45) A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível, que tem como agente etiológico causador a *Mycobacterium tuberculosis*, micobactéria mais virulenta no ser humano, figurando entre as 10 maiores causas de morte no mundo. Este bacilo quando acomete outros órgãos, além dos pulmões, causa a chamada TB extrapulmonar. Em relação a tuberculose urogenital (TUG), assinale a alternativa correta.

- A disseminação do *Mycobacterium tuberculosis* para o trato genitourinário é, predominantemente, linfogênica
- A TUG acomete mais indivíduos do sexo feminino que masculino na proporção 2:1
- Devido a fisiopatologia da TB extrapulmonar, a TUG é mais comum em países desenvolvidos que em países em desenvolvimento
- A TUG é a segunda forma mais comum dos casos extrapulmonares de TB, atrás apenas da forma linfonodal

46) Nas últimas décadas, as cirurgias convencionais para tratamento da litíase urinária por lombotomia, por exemplo, vêm progressivamente sendo substituídas por técnicas menos invasivas e endoscópicas. Sobre o tratamento intervencionista e cirúrgico para calculose renal, analise as afirmativas a seguir.

- A litotripsia extracorpórea (LECO) é contraindicada em gestantes, indivíduos com infecção urinária não tratada e/ ou que apresentam variação anatômica com alteração na drenagem renal.
- A ureterorenolitotripsia flexível pode ser indicada para tratamento de cálculo renal em pacientes para os quais há contraindicação de nefrolitotripsia percutânea (NLP) ou após tratamento incompleto com NLP ou LECO.
- A incidência de sepse de foco urinária pós NLP é de, aproximadamente, 15%, sendo a principal complicação deste procedimento cirúrgico.
- Os procedimentos minimamente invasivos por laparoscopia e/ ou robótica ganharam protagonismo nos últimos anos para tratamento da calculose renal, sendo a primeira opção frente as técnicas endoscópicas e as cirurgias abertas.

**Assinale a alternativa correta.**

- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

47) As disfunções miccionais decorrentes de doenças neurológicas afetam, aproximadamente, 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Os índices de disfunção neurogênica do trato urinário inferior (DNTUI) pós traumatismo medular tendem a ser mais proeminentes em países em desenvolvimento devido ao maior número de acidentes de trânsito e à violência urbana. Sendo assim, em relação a DNTUI, assinale a alternativa correta.

- A injeção de toxina botulínica intravesical, a esfínterectomia e as enterocistoplastias são terapias proscritas para o tratamento da DNTUI
- Na DNTUI, o principal achado do estudo urodinâmico é o aumento da complacência vesical associada a diminuição do resíduo pós-miccional secundários a incontinência urinária de transbordamento
- A premissa do tratamento da DNTUI é manter as pressões de armazenamento e esvaziamento vesicais
- O parâmetro pressórico vesical estabelecido para possíveis danos renais é de 60 cmH<sub>2</sub>O, entretanto, pacientes com pressão detrusora acima de 20 cmH<sub>2</sub>O podem apresentar comprometimento renal, sendo essa pressão muito sensível para predizer dano no rim

**48) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a infertilidade é definida como a incapacidade de um casal em obter uma gestação clínica após, pelo menos, 12 (doze) meses de relações sexuais regulares sem uso de métodos contraceptivos ao longo do ciclo menstrual. Em relação a infertilidade masculina, assinale a alternativa correta.**

- a) Dentre os parâmetros iniciais que devem ser avaliados, em um espermograma de um homem potencialmente infértil, encontra-se a morfologia pelos critérios de Kruger. É considerada astenozoospermia valores abaixo de 7%
- b) A correção da criptorquidia bilateral, mesmo em adultos, pode possibilitar a espermatogênese e é uma alternativa se tecnicamente viável
- c) Estudos não randomizados evidenciam que, indivíduos com varicocele clínica, a varicocelectomia está associada a melhora dos parâmetros seminais, porém não aumenta as taxas de gravidez espontânea e pouco otimiza os resultados em reprodução assistida
- d) A criptorquidia é a principal etiologia de infertilidade masculina (fator masculino)

**49) Os tumores de testículo que se originam a partir de células germinativas compõem, aproximadamente, 95% das neoplasias testiculares. Podem ser divididos entre seminomas e não seminomas. Em relação a esses tipos de tumores, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Dentre as neoplasias que acometem os homens, o câncer de testículo é um dos tumores mais raros diagnosticados, porém é a segunda neoplasia mais frequente em indivíduos do sexo masculino entre 15 e 19 anos de idade.
- ( ) Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de tumor germinativo de testículos podemos citar a criptorquidia, e a neoplasia intratubular intersticial.
- ( ) A ultrassonografia de bolsa testicular apresenta uma baixa sensibilidade, porém alta especificidade no diagnóstico de nódulos testiculares.
- ( ) A  $\alpha$ -fetoproteína eleva-se, exclusivamente, em tumores seminomatosos.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V - V
- b) F - V - V - F
- c) V - F - F - V
- d) V - V - F - F

**50) Paciente de 57 anos, sexo masculino, assintomático, em avaliação de rotina, retorna com exame de imagem que demonstra massa parenquimatosa sólida, de aproximadamente 4 cm, em rim direito. É hígido e não apresenta comorbidades. Em relação ao tratamento do tumor renal deste paciente, assinale a alternativa correta.**

- a) A nefrectomia parcial videolaparoscópica é uma opção de tratamento desde que o pedículo renal não esteja difusamente circundado pelo tumor e esse esteja localizado em uma posição favorável para sua exérese
- b) A nefrectomia parcial proporcionaria resultados oncológicos equivalentes à radical, porém não apresentaria benefícios na prevenção da doença renal crônica e na morbimortalidade cardiovascular a ela associada
- c) A adrenalectomia ipsilateral deve ser realizada independentemente da presença de invasão direta pelo tumor renal
- d) A nefrectomia radical aberta ou laparoscópica é a melhor opção de tratamento, pois proporcionaria melhores resultados oncológico e pós-operatório, à medida que o paciente não apresenta comorbidades

**51) O rastreamento populacional do câncer de próstata fomenta importante discussão em relação ao seu papel e impacto na redução da mortalidade câncer-específica. Enquanto este tipo de medida ainda é incentivada no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Urologia, nos Estados Unidos, o rastreio populacional está contraindicado desde 2012. Sobre o câncer de próstata, assinale a alternativa correta.**

- a) O *Watchful Waiting* é uma forma de abordagem do câncer de próstata que se baseia no adiamento do tratamento definitivo do tumor associado a um acompanhamento minucioso em um grupo de pacientes com requisitos cuidadosamente determinados
- b) A Vigilância Ativa visa apenas ao tratamento dos sintomas sistêmicos e locais do câncer de próstata, com o intuito de manter a qualidade de vida da melhor maneira possível dos indivíduos portadores desta patologia
- c) A graduação patológica da *International Society of Urological Pathology* (ISUP) é baseada no escore de Gleason, permitindo uma nova racionalização da classificação e adequação dos grupos em termos de prognóstico
- d) Para a classificação de risco e prognóstico (Classificação D'Amico) do câncer de próstata, três são os parâmetros pré-tratamento utilizados: estadiamento clínico, escore de Gleason e graduação ISUP

**52) Paciente do sexo masculino, 17 anos, comparece ao serviço médico de urgência referindo impossibilidade de urinar após queda sobre corrimão há, aproximadamente, 2 horas. Relata que estava andando de skate em um parque, quando ao tentar fazer uma manobra sobre o corrimão de uma escada, perdeu o equilíbrio e colidiu a região perineal com a estrutura. Ao exame físico, apresenta dor no períneo, uretorrágia e edema local. A partir do mecanismo do trauma, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a provável hipótese diagnóstica e o exame subsidiário inicial que deve ser solicitado para confirmação diagnóstica.**

- Lesão de uretra peniana; cistoscopia
- Lesão de uretra bulbar; uretrocistografia retrógrada
- Lesão de uretra membranosa; uretrocistografia retrógrada
- Lesão de uretra prostática; cistoscopia

**53) Considerada uma urgência urológica, a parafimose, através do estrangulamento peniano, pode culminar com isquemia distal e, em estágios mais avançados, com necrose do pênis. Em relação a essa condição não traumática, assinale a alternativa correta.**

- A postectomia como potencial tratamento da parafimose não é contraindicada, porém deve ser evitada na urgência, pois o resultado estético final pode ficar comprometido devido ao edema local
- A parafimose é uma condição urológica que ocorre exclusivamente em adultos, não se apresentando na infância, devido a presença da fimose fisiológica
- Mesmo na presença de parafimose, caso o paciente esteja assintomático, nenhuma modalidade de tratamento deve ser instituída
- Estudos recentes demonstram que a aspiração do edema distal e da congestão glandar venosa, bem como a injeção de hialuronidase abaixo da faixa estreita, não são medidas efetivas na redução do edema local, logo, estão proscritas no tratamento da parafimose

**54) A varicocele, definida como a dilatação das veias do plexo pampiniforme, está presente em 14% a 16% dos homens, sendo a causa mais comum de infertilidade masculina. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.**

- A varicocele é considerada de grau 1 quando não identificada pelo exame físico e visualizada apenas na ultrassonografia de bolsa testicular com doppler
- Na presença de varicocele isolada do lado direito, deve-se suspeitar de trombo de veia cava inferior secundário a um carcinoma de células renais
- A patogênese da hidrocele após varicolectomia é o aumento da pressão venosa testicular secundária ao procedimento cirúrgico
- Em uma criança com varicocele esquerda, sabidamente portadora de síndrome genética, na qual a aniridia é dos achados, a pesquisa de nefroblastoma não precisa ser realizada

**55) Paciente do sexo masculino, 62 anos, sem sintomas do trato urinário inferior prévios, apresenta hesitação, esforço miccional, urgência miccional e polaciúria após acidente vascular cerebral isquêmico. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta buscando melhoria em seu quadro clínico.**

- Realização de Ressecção Transuretral (RTU) de Próstata
- Prescrição de antimuscarínico ou beta 3 agonista adrenérgico
- Instituição de cateterismo intermitente limpo
- Realização de estudo urodinâmico

**56) A infecção do trato urinário (ITU) é a mais comum dentre as infecções bacterianas. Cerca de metade das mulheres terá uma ITU durante a vida, sendo que 30% delas já terão tido pelo menos um episódio de ITU antes dos 24 anos de idade.**

**Sobre as causas e implicações clínicas relacionadas a este processo infeccioso, analise as afirmativas a seguir.**

- Dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de ITU estão o uso de espermicidas, novo parceiro sexual, mãe com histórico de ITU e antecedente pessoal de ITU durante a infância.
- Em casos selecionados, em que o tratamento da bacteriúria assintomática se faça necessário, o antibiótico a ser prescrito e a duração do tratamento devem ser os mesmos da ITU sintomática.
- Pacientes com pielonefrite aguda não complicada, que estejam em bom estado geral, com sintomatologia controlada e com boa aceitação de medicação por via oral, o tratamento pode ser realizado de forma ambulatorial.
- Na suspeita de ITU recorrente, em mulheres sem fatores de risco e com menos de 40 anos a investigação de complicações com exames de imagem e/ ou cistoscopia é mandatória.

**Assinale a alternativa correta:**

- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

**57) Paciente do sexo masculino, 56 anos, com diagnóstico de câncer de próstata apresenta disfunção erétil após prostatectomia radical. Assinale a alternativa que apresenta a provável causa da impotência sexual pós-cirúrgica.**

- Lesão inadvertida dos nervos cavernosos
- Lesão inadvertida do nervo ilioinguinal
- Lesão inadvertida do nervo dorsal do pênis
- Lesão inadvertida do nervo genitofemoral

**58) Em relação as anomalias congênitas do trato geniturinário, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) A válvula de uretra posterior acomete apenas o sexo masculino e é a causa mais comum de obstrução uretral congênita.
- ( ) A tríade clássica da Síndrome de Prune-Belly é deficiência da musculatura da parede abdominal, criptorquidia intra-abdominal bilateral e anormalidades do trato urinário.
- ( ) O Refluxo vesicoureteral é a anomalia urológica mais comum na população pediátrica.
- ( ) Mesmo após a correção da criptorquidia bilateral, as taxas de paternidade são menores que 20%.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V - V
- b) F - F - F - V
- c) V - F - V - F
- d) V - V - V - F

**59) A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que tem como agente etiológico o *Treponema pallidum*. Sobre esta doença bacteriana, assinale a alternativa correta.**

- a) Teste não treponêmico positivo associado a teste treponêmico negativo é patognomônico de sífilis primária latente
- b) Após exposição ao *Treponema pallidum*, o indivíduo adquire imunidade vitalícia, ou seja, não irá desenvolver uma nova infecção sifilítica
- c) Mesmo após o tratamento da sífilis, os testes treponêmicos tendem a permanecer positivos ao longo de toda a vida
- d) Existem dois tipos de testes para o diagnóstico da sífilis: treponêmicos e não treponêmicos, sendo que, os não treponêmicos são mais específicos para a doença que os treponêmicos

**60) A torção do cordão espermático, uma das principais causas de escroto agudo, demanda rápida intervenção do urologista, à medida que objetivo primordial é a tentativa de preservação da gônada. Sobre esta emergência urológica, assinale a alternativa correta.**

- a) O pico de incidência da torção intravaginal do cordão espermático ocorre entre 16 e 20 anos de idade
- b) A ausência do reflexo cremastérico é um achado incomum no exame físico do paciente com suspeita de torção do cordão espermático
- c) A ultrassonografia de bolsa testicular com doppler tem alta sensibilidade, porém baixa especificidade no diagnóstico da torção do cordão espermático
- d) A torção intravaginal é comumente atribuída ao excesso de mobilidade testicular secundária a uma fixação anormal da túnica vaginal proximalmente ao cordão espermático