

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN

**CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/2022**



(QOSPM) – MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA

Tarde

Tipo 1 - BRANCA

Organizadora:



INSTITUTO
CONSULPLAN

QUADRO OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR (QOSPM) – MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA**LÍNGUA PORTUGUESA****Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater**

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro.

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia.

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres, a sul-africana *Phumzile Mlambo-Ngcuka*, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica.

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da pandemia também perderam o emprego.

(*Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/12/4968165-violencia-contra-a-mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html>. Adaptado.)*

Questão 01

Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido:

- A) Certeza.
- B) Garantia.
- C) Exigência.
- D) Necessidade.
- E) Comprovação.

Questão 02

De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à violência:

- A) Doméstica e familiar.
- B) Física e outros tipos de violência.
- C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.
- D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus.
- E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus.

Questão 03

Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão dos parágrafos e do texto. Em “*Apesar da diminuição da violência [...]*” (2^o§), a expressão destacada:

- A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal.
- B) Introduce uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial.
- C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo.
- D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão.
- E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas.

Questão 04

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta.

- A) O adjetivo “*calamitosa*” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “*a pandemia do novo coronavírus*”.
- B) Em “[...] *apontam dados da terceira edição [...]*” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “*apontam*” seja substituída por “*aponta-se*”.
- C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] *cerca de 13 milhões de brasileiras relataram [...]*” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral.
- D) Se em “*O mesmo estudo indica [...]*” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “*estudo*”, seguida de “*a mesma informação, a mesma análise*”; a forma verbal “*indica*” permaneceria na terceira pessoa do singular.
- E) A forma verbal “*sofreu*” pode ser substituída por “*sofreram*” em “[...] *uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu [...]*” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “*quatro brasileiras*”.

Questão 05

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. Indique o trecho que apresenta tal elemento.

- A) “[...] que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§)
- B) “[...] se levamos em conta que outras questões [...]” (4º§)
- C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§)
- D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§)
- E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§)

Questão 06

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo:

- A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado.
- B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras.
- C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se destina.
- D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande público.
- E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do conhecimento.

Questão 07

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, assinale a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado.

- A) “[...] que, calamitosa, agravou-se [...]” (1º§) / calamitosa
- B) “[...] que demanda comprometimento também dos homens [...]” (1º§) / ela
- C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, [...]” (3º§) / situação
- D) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, [...]” (1º§) / violência contra a mulher
- E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras [...]” (2º§) / pesquisa visível e invisível

Questão 08

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que:

- I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas.
- II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.
- III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade à sociedade.
- IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência contra a mulher.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e III.
- E) II, III e IV.

Questão 09

Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “*Esses números correspondem a informações [...]*” (2º§), indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado.

- A) À apresentação iremos todos.
- B) Ao documento a diretora solicitou.
- C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez.
- D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.
- E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório.

Questão 10

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido:

- A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus.
- B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais.
- C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus.
- D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020.
- E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida contra elas.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R\$ 60,00 e, se uma demanda é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R\$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R\$ 1.050,00 após o serviço prestado, o número de demandas realizadas corretamente é:

- A) 24
- B) 25
- C) 26
- D) 27
- E) 28

Questão 12

Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os.

- 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia;
- 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia;
- 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia;
- 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia;
- 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e,
- 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia.

De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que:

- A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia.
- B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia.
- C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia.
- D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.
- E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.

Questão 13

No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?

- A) 30
- B) 60
- C) 90
- D) 120
- E) 180

Questão 14

Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa:

Sexo	Aumento de Insônia	
	Sim	Não
Masculino	46	82
Feminino	38	54

Considere os eventos:

- X : selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados;
- Y : selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e,
- Z : selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas.

Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que:

- A) $P(X) < P(Y) < P(Z)$
- B) $P(X) < P(Z) < P(Y)$
- C) $P(Y) < P(X) < P(Z)$
- D) $P(Z) < P(Y) < P(X)$
- E) $P(Z) < P(X) < P(Y)$

Questão 15

O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil X de um determinado mês é dado pelo valor da função $f(x) = -x^2 + 12x - 27$, em que $x = 1, 2, \dots, 20$. Os dias úteis em que houve julgamentos são aqueles que satisfazem $f(x) > 0$. Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir.

- I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais.
- II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6.
- III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo dia útil.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) II.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

Questão 16

Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- A) Bárbara é cardiologista.
- B) Adriana é ginecologista.
- C) Camila é a médica da família.
- D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.
- E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde.


Questão 17

Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R\$ 120,00, que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e foi necessário acrescentar R\$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram para a compra do presente?

- A) 8
- B) 10
- C) 12
- D) 14
- E) 16

Questão 18

O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que $PQ = 25$ m; $QU = 22$ m; e, $UR = 28$ m.



Se o segmento ST possui X metros, todos os valores possíveis de X devem satisfazer:

- A) $2 \leq x \leq 24$
- B) $2 \leq x \leq 32$
- C) $18 \leq x \leq 32$
- D) $24 \leq x \leq 36$
- E) $24 \leq x \leq 48$

Questão 19

Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfermeiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado?

- A) 20
- B) 25
- C) 26
- D) 35
- E) 36

Questão 20

Após um grande incêndio em um prédio residencial, M moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de M?

- A) 40
- B) 48
- C) 54
- D) 66
- E) 84

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 21

O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO:

- A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão institucional.
- B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo.
- D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério.
- E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde.

Questão 22

Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da:

- A) Equidade.
- B) Integralidade.
- C) Universalidade.
- D) Hierarquização.
- E) Regionalização.

Questão 23

“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com _____ previstos(as) no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) as diretrizes
- B) os princípios
- C) as atribuições
- D) as organizações
- E) as competências

Questão 24

O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito de equidade:

- A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido.
- B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível.
- C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas.
- D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as suas necessidades específicas.
- E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e atendimentos com diferentes profissionais da saúde.

Questão 25

A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:

- A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.
- B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível.
- C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços.
- D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso.
- E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Questão 26

Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo possível captar informações a respeito de, EXCETO:

- A) Indicadores de Saúde.
- B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil.
- C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).
- D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e nutricional).
- E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, mortalidade, câncer).

Questão 27

Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os.

- I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social.
- II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional.
- III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

Questão 28

A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades de saúde da população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal nº 13.595/2018, são consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO:

- A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS.
- B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde.
- C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças.
- D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção Básica.
- E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção coletivas e individuais.

Questão 29

Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica:

- A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
- B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores.
- C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- D) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- E) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Questão 30

O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde, discutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definições de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os.

- A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS.
- B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida.
- C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização.
- D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização.
- E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária.

Questão 31

AC, sexo feminino, 25 anos, deseja ser orientada a respeito da prevenção do câncer de colo uterino. O médico informa sobre a necessidade da realização do exame Papanicolaou. Tal procedimento pode ser considerado como prevenção:

- A) Primária.
- B) Secundária.
- C) Terciária.
- D) Quartenária.
- E) Não pode ser considerado prevenção, pois é um exame diagnóstico.

Questão 32

Assinale, a seguir, a alternativa que pode ser considerada na medicina preventiva como prevenção terciária.

- A) Reabilitação pós-AVC.
- B) Campanhas de vacinação.
- C) Realização de mamografia.
- D) Rastreamento de câncer de próstata.
- E) Campanhas de conscientização sobre obesidade.

Questão 33

EF, sexo feminino, 15 anos, procura atendimento médico pois iniciou a vida sexual com seu namorado e deseja receber informações sobre contracepção. Diante da situação hipotética, o médico deverá:

- A) Orientar a paciente sobre os métodos existentes; e, de acordo com a vontade da mesma, lhe prescrever o mais adequado.
- B) Acionar o conselho tutelar e a assistente social, pois, considerando que a paciente tem menos de 16 anos, o caso se enquadra como estupro de vulnerável.
- C) Orientar a paciente que, por ser menor de idade, não poderá receber prescrição de contracepção sem estar acompanhada de um dos pais ou responsáveis.
- D) Orientar a paciente sobre os métodos existentes; e, de acordo com a vontade da mesma, lhe prescrever o mais adequado. Porém, os pais devem ser comunicados por escrito da prescrição.
- E) Orientar a paciente que poderá usar qualquer método contraceptivo, com exceção dos métodos de longa duração, como DIU e implante subdérmico, pois só estão autorizados para maiores de 18 anos.

Questão 34

Determinado médico deseja prescrever para seu paciente, com 50 kg, uma medicação anti-hipertensiva por via endovenosa disponível em uma ampola de 5 mL contendo 5 mg/mL. Para isso, dilui uma ampola em 245 mL de soro glicosado a 5%. A dose desejada da medicação é de 0,5 mcg/kg/min. Qual deverá ser, em mL/h, a velocidade de infusão da solução em BIC?

- A) 1 mL/hora
- B) 5 mL/hora
- C) 10 mL/hora
- D) 15 mL/hora
- E) 25 mL/hora

Questão 35

LDF, 70 anos, chega ao pronto-socorro trazido pelos familiares após ser encontrado em casa com rebaixamento do nível de consciência. É realizada uma tomografia de crânio que evidencia grande sangramento intraparenquimatoso com desvio considerável da linha média. O paciente evolui, desfavoravelmente, necessitando de intubação orotraqueal. Sobre a comunicação de más notícias, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A linguagem deverá ser direta e clara, evitando vocabulário extremamente técnico ou rebuscado, objetivando a compreensão e o entendimento do familiar.
- B) O médico deverá procurar saber o que os familiares entendem do quadro e, independente da vontade da família, informar a situação detalhada e completa do paciente.
- C) O familiar deve receber o tempo adequado para compreender o quadro do paciente para, então, posteriormente, poder discutir questões como a abordagem terapêutica.
- D) Quando a proposta terapêutica é paliativa, é de fundamental importância o entendimento da família, para evitar a não compreensão do propósito do manejo e a superestimação de sua eficácia.
- E) O médico deverá sempre procurar um local adequado, reservado, onde não haja interrupções; se for de preferência do familiar, deve autorizar um acompanhante para poder comunicar as más notícias.

Questão 36

Um paciente que pesa 100 kg e mede 1,80 m pode ser classificado, de acordo com seu IMC, em qual grau de obesidade?

- A) Sobrepeso.
- B) Peso normal.
- C) Obesidade grau I.
- D) Obesidade grau II.
- E) Obesidade grau III.

Questão 37

Paciente, 25 anos, vai ao médico da empresa em que trabalha após ter realizado exame diagnóstico positivo para HIV. Relata ter iniciado novo relacionamento há dois meses e teme que o diagnóstico prejudique sua relação com a parceira. Diante da situação hipotética, o médico deverá:

- A) Notificar a assistente social e as autoridades policiais, pois ocultar tal diagnóstico da parceira configura crime.
- B) Respeitar a decisão do paciente de não comunicar a parceira, visto que sempre deve ser respeitado o sigilo médico.
- C) Comunicar imediatamente a parceira, independentemente de o paciente decidir lhe transmitir a notícia, pois ele poderá desistir de contá-la.
- D) Orientar o paciente que deve comunicar a parceira. Caso não o faça, o médico deverá tomar medidas para convocá-la e comunicar a notícia.
- E) Orientar o paciente que deve comunicar a parceira. Caso não o faça, deverá convocá-la, assim como também deverá notificar a empresa onde o paciente trabalha, pois trata de uma doença altamente transmissível no ambiente laboral.

Questão 38

João, 25 anos, homem trans, vem à consulta em unidade básica de saúde em seu bairro para consulta de rotina. Sobre o atendimento adequado à população transgênero, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Caso o paciente tenha práticas sexuais que possam resultar em gravidez indesejada, pode-se oferecer contracepção.
- B) As unidades de saúde devem exigir que o nome social do paciente esteja retificado em cartório, assim também como o gênero, para que o mesmo seja chamado por ele.
- C) A colpocitologia oncótica deve ser oferecida a todas as pessoas entre 25 e 65 anos que possuem colo do útero e que já tiveram algum tipo de penetração vaginal ao longo da vida.
- D) O cuidado deve ser sempre centrado na pessoa atendida; portanto, suas percepções, necessidades e desejos devem ser compreendidos e a construção do plano terapêutico precisa ser compartilhada com o paciente.
- E) O médico deve atuar pelo conforto da pessoa explicando qualquer procedimento antes de realizá-lo, elucidar dúvidas e compreender quais termos são melhores aceitos pelo paciente para tratar de partes do seu corpo.

Questão 39

Considerando o que dispõe o Novo Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019, assinale a afirmativa correta.

- A) Os Conselhos de Medicina exercem tanto o papel de disciplinadores quanto de julgadores da classe médica.
- B) O Novo Código de Ética Médica foi elaborado a partir das decisões da II Conferência Nacional de Ética Médica realizada em 2008.
- C) O médico portador de doença grave fica impedido do exercício da profissão enquanto perdurarem as limitações de sua capacidade física.
- D) O Novo Código de Ética Médica busca o melhor relacionamento entre o médico e seu paciente, prescindindo da autonomia de vontade deste.
- E) As regras deontológicas de ética médica destinam-se ao exercício da profissão clínica, não se aplicando às atividades de ensino e pesquisa.

Questão 40

De acordo com o Novo Código de Ética Médica, quanto aos princípios fundamentais, assinale a afirmativa correta.

- A) O aprimoramento contínuo dos conhecimentos é um dever ético, assim como o uso do melhor progresso científico.
- B) A autonomia ética sempre autoriza a recusa do médico a atender determinados pacientes por razões de índole pessoal.
- C) O dever ético da atuação médica limita-se ao evento morte do paciente, devendo-se guardar sigilo a respeito das informações do prontuário.
- D) A medicina somente pode ser exercida como comércio nos limites e circunstâncias expressamente previstos do Código de Ética Médica.
- E) O médico não se limitará a disposições estatutárias ou regimentais de hospital ou instituição pública ou privada, ainda que benéficas ao paciente.

CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN

A situação hipotética a seguir contextualiza as questões 41 e 42. Leia-a atentamente.

“Paciente, sexo feminino, 14 anos, comparece à consulta encaminhada do pediatra assistente por amenorreia primária. Mãe refere adequado desenvolvimento neuropsicomotor, adolescente nascida de parto normal a termo, pesando 2.500 kg, alta hospitalar junto com a mãe. Nega comorbidades e internações na infância.”

Ao exame físico:

Altura: 1,61 m;

Peso: 50 kg;

Estágio de desenvolvimento puberal: M1P3; e,

Genitália externa tipicamente feminina.

Questão 41

Qual exame deverá ser o primeiro a ser solicitado nesse caso?

- A) FSH.
- B) Cariótipo.
- C) RNM de sela túrcica.
- D) Ultrassonografia pélvica.
- E) 17-alfa-hidroxiprogesterona.

Questão 42

Paciente retorna com os seguintes exames: FSH 59; LH 40; E2 < 0,5; 17-alfa-OH-P 110. USG: Útero volume 15 cc; Ovários não visibilizados. Cariótipo 46 XY. RNM de sela túrcica: hipófise de aspecto e tamanho habituais. Qual o provável diagnóstico?

- A) Síndrome de Fraser.
- B) Disgenesia gonadal pura.
- C) Hiperplasia adrenal congênita.
- D) Insuficiência ovariana prematura.
- E) Insensibilidade completa aos androgênios.

Questão 43

“_____ é uma doença causada por defeito em receptor de uma ‘substância’ que atravessa a membrana celular e faz a modulação de expressão gênica pela ligação direta do DNA ao complexo receptor-substância.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) Diabetes mellitus
- B) Síndrome de Kallmann
- C) Hiperplasia adrenal congênita
- D) Hipoparatiroidismo verdadeiro
- E) Raquitismo hereditário resistente à vitamina D

Questão 44

A expressão dos transportadores de glicose nos tecidos está ligada aos seus diferentes metabolismos; conforme a demanda e a utilização, quantidade de transportadores poderá variar. Cada grupo de transportadores possui propriedades cinéticas únicas, caracterizando suas funções e sua distribuição por diversos tecidos. Considerando o tipo de receptor e o tecido no qual ele é encontrado, relacione adequadamente as colunas a seguir.

(Alguns números poderão se repetir e outros poderão não ser utilizados.)

1. GLUT 1.
 2. GLUT 2.
 3. GLUT 3.
 4. GLUT 4.
- () Tecido fetal.
 - () Neurônio.
 - () Barreira hematoencefálica.
 - () Rim.
 - () Músculo cardíaco.

A sequência está correta em

- A) 1, 3, 1, 2, 4.
- B) 1, 4, 3, 2, 3.
- C) 2, 3, 2, 4, 4.
- D) 2, 4, 1, 3, 3.
- E) 4, 3, 3, 1, 4.

Questão 45

Paciente, sexo feminino, 5 anos e 3 meses, comparece à consulta por aparecimento de broto mamário. Mãe percebeu que nos últimos três meses houve crescimento de mamas. Refere que na escola é a criança mais alta da turma. Foi realizado Raio X de mãos e punhos para correlação da idade óssea com idade cronológica, com o seguinte resultado:



Qual o marco anatômico indicado para a identificação da idade óssea apresentada?

- A) Sombra pisiforme.
- B) Ossificação do sesamoide.
- C) Aparecimento do gancho do hamato.
- D) Sobreposição do trapézio/trapezoide.
- E) Sobreposição entre capitato e hamato.

A situação hipotética a seguir contextualiza as questões 46 e 47. Leia-a atentamente.

“Paciente, sexo feminino, 36 anos, com queixa de fogachos. Refere última menstruação há um ano. Último parto em 2017, com ciclos regulares após. Refere, ainda, ser portadora de artrite reumatoide há cinco anos, em uso de metotrexato 30 mg/semanal. Exames: FSH 107; LH 78; E2 < 0,02; TSH 1,4; Prolactina 15; e, BHCG neg.”

Questão 46

Marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () Não há indicação formal de solicitação de cariótipo.
- () O uso prolongado de metotrexato aumenta o risco de falência ovariana prematura.
- () A idade da menarca está linearmente ligada à idade da menopausa.
- () A paciente apresenta risco aumentado para osteoporose e eventos cardiovasculares no futuro.

A sequência está correta em

- A) V, F, F, V.
- B) V, V, F, V.
- C) F, F, V, V.
- D) F, V, V, F.
- E) F, V, F, F.

Questão 47

O tratamento com 17-beta-estradiol ou valerato de estradiol deve ser realizado na seguinte dosagem inicialmente:

- A) 1,5 mg.
- B) 2 mg.
- C) 5 mg.
- D) 0,2 mg.
- E) 0,5 mg.

A situação hipotética a seguir contextualiza as questões 48 e 49. Leia-a atentamente.

“Paciente, 34 anos, sexo feminino, será submetida à cirurgia para correção de síndrome de *Cushing*. Em exame de imagem foi evidenciado tumor de 20 mm, sem invasão de dura-máter, com invasão de seio cavernoso. Paciente com sintomas de insuficiência adrenal secundária há três meses.”

Questão 48

Considerando as características apresentadas, qual é o fator de bom prognóstico para a cirurgia?

- A) Sexo feminino.
- B) Tamanho do tumor.
- C) Invasão de seio cavernoso.
- D) Ausência de invasão em dura-máter.
- E) Insuficiência adrenal recente < 12 meses.

Questão 49

Considerando paciente com sintomas de insuficiência adrenal secundária há três meses, assinale o início adequado do uso de glicocorticoides após a cirurgia.

- A) Indução anestésica com dexametasona.
- B) Uso de prednisona quando detectados níveis de ACTH < 20 µg/dL.
- C) Uso de dexametasona quando detectados níveis de cortisol < 20 µg/dL.
- D) Início de prednisona e avaliação de níveis plasmáticos de cortisol para ajuste de dose sete dias após a cirurgia.
- E) Durante o período pós-operatório imediato, preferencialmente com hidrocortisona IV, seguido de hidrocortisona oral, quando disponível.

A situação hipotética a seguir contextualiza as questões 50 e 51. Leia-a atentamente.

“Paciente, 13 anos, comparece à consulta por aumento de pilificação corporal. Mãe refere ausência de menarca. Relata ter realizado pré-natal e que se lembra de alguma alteração na genitália da filha nas ultrassonografias, mas que não foi confirmada após o nascimento. Não fez teste do pezinho, pois perdeu o período oportuno.”

Ao exame:

A: 1,50 m / Peso: 50 kg;

Desenvolvimento puberal: M3P4;

Vulva: sem alterações anatômicas; clitóris: medindo 1,5 x 0,8 cm;

Membrana himenal íntegra; e,

Ferriman 15.

Questão 50

Para a avaliação do grau de hirsutismo, sugere-se a utilização de uma classificação semiquantitativa, escore de *Ferriman-Gallwey*, definido pela soma da pontuação de nove áreas do corpo (de zero a quatro pontos cada uma); assinale-as.

- A) Mento; bochecha; giba; tórax (entre as mamas); abdômen; inguinal; dorso; posterior de coxa; e, antebraços.
- B) Mento; bochecha; tórax (entre as mamas); abdômen superior; abdômen inferior; dorso superior; dorso inferior; inguinal; e, braços.
- C) Entre nariz e lábio superior; mento; bochecha; tórax (entre as mamas); abdômen; inguinal; dorso; posterior de coxa; e, antebraços.
- D) Entre nariz e lábio superior; mento; bochecha; abdômen superior; abdômen inferior; dorso superior; dorso inferior; posterior de coxa; e, antebraços.
- E) Entre nariz e lábio superior; mento; tórax (entre as mamas); abdômen superior; abdômen inferior; dorso superior; dorso inferior; posterior de coxa; e, braços.

Questão 51

Ao retorno, paciente traz seguinte exame: 17-OH-progesterona: 350. Foi indicado o teste de cortrosina para definição diagnóstica. Sobre tal teste, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Um teste normal não exclui insuficiência adrenocortical secundária.
- B) As dosagens seriadas são feitas em 30 e 60 minutos após a aplicação.
- C) Após a dosagem de cortisol e 17-OH-P basais, é injetado 250 µg de ACTH em bolus.
- D) É considerado um teste normal quando o cortisol aumentar mais que 7 µg/dL, excluindo o diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita.
- E) Caso a dosagem de 17-OH-P pós-estímulo seja < 500 ng/dL, é necessária a realização de um teste amplificado com dosagens em 30/60/90 e 120 min.

Questão 52

A síndrome dos ovários policísticos tem sua fisiopatologia intimamente relacionada à resistência insulínica. As mudanças de estilo de vida são fundamentais para o controle dos sintomas e das possíveis complicações da síndrome. A hiperinsulinemia nessas pacientes gera anovulação através de alguns mecanismos; assinale a alternativa que descreve corretamente um deles.

- A) Diminuição da metabolização da SHBG, aumentando, assim, a testosterona livre.
- B) Ação antagonista ao citocromo P450c17, o que aumenta a produção de androstenediona pela suprarrenal.
- C) Diminuição de IGFB-1, com conseqüente diminuição de sua ação nas células da granulosa e aumento rebote da produção dos hormônios pelas células da teca.
- D) Ativação da via MAP-kinase com ação da insulina diretamente nas células da teca, causando hipertrofia e favorecendo a produção de androstenediona e testosterona.
- E) Os mecanismos responsáveis diretamente pelo aumento da produção de androgênios também favorecerão a produção de estrogênio, que, através de *feedback* positivo, favorece a produção de FSH hipofisário, bloqueando a ovulação.

Questão 53

A puberdade precoce pode ser classificada em dependente ou independente de GnRH. Geralmente, há aceleração da velocidade de crescimento, telarca e pubarca prematuras com avanço de idade óssea. Há, ainda, uma causa específica de puberdade precoce em que existe avanço dos caracteres sexuais secundários sem avanço da idade óssea; assinale-a.

- A) Hipotireoidismo.
- B) Síndrome de *Rokitansky*.
- C) Hamartoma hipotalâmico.
- D) Hiperplasia adrenal congênita.
- E) Síndrome de *McCune Albright*.

Questão 54

A síndrome de *Cushing* está associada a um alto risco de mortalidade. As principais causas de mortalidade nestes pacientes são doenças cardiovasculares, *Diabetes mellitus* e infecções. Sobre o tratamento cirúrgico dessa síndrome, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Em pacientes sem tumor identificado, geralmente é realizada uma hemi-hipofisectomia ipsilateral (hipofisectomia parcial).
- B) Há estudos robustos que sugerem que as microcirurgias têm maiores taxas de complicações se comparadas às endoscópicas.
- C) A adenomectomia seletiva é a cirurgia mais realizada, embora a exploração de toda a glândula seja justificada na maioria dos casos.
- D) Nos casos de macroadenoma (≥ 10 mm), a remissão varia de 50% a 70% após cirurgia e, geralmente, é menor que a taxa de remissão do microadenoma.
- E) Apesar dos avanços no tratamento medicamentoso e do progresso em outras modalidades terapêuticas, como a radioterapia estereotáxica, o procedimento cirúrgico ainda é o principal tratamento definitivo.

Questão 55

Paciente, sexo masculino, 60 anos, em pré-operatório de tireoidectomia total por neoplasia. No segundo dia pós-operatório, evolui com parestesia em face e dedos das mãos, fraqueza muscular e espasmos palpebrais. Ao ECG observado alargamento de intervalo QT; onda P positiva; e, FC 65 bpm. Qual o diagnóstico provável e a conduta?

- A) Acidente vascular encefálico hemorrágico; trombólise.
- B) Hipoparatiroidismo verdadeiro; gluconato de cálcio 10% 1 ampola IM.
- C) Hipocalcemia transitória do pós-operatório; infusão de dexametasona associada a gluconato de cálcio 10% 1 ampola IM.
- D) Pseudo-hipoparatiroidismo; gluconato de cálcio 10% 1 ampola diluída em 50 a 100 mL de solução salina a 0,9% e administrado lentamente por via intravenosa durante 10 a 20 minutos.
- E) Hipoparatiroidismo verdadeiro; gluconato de cálcio 10% 1 ampola diluída em 50 a 100 mL de solução salina a 0,9% e administrado lentamente por via intravenosa durante 10 a 20 minutos.

Questão 56

No tratamento da hipocalciúria por hipoparatiroidismo é importante a dosagem de calciúria urinária. Em caso de valores acima do valor de normalidade, os riscos de nefrolitíase, nefrocalcinose e insuficiência renal aumentam consideravelmente a longo prazo. Para a diminuição desse risco, qual medicação deverá ser indicada?

- A) Albumina.
- B) Vitamina D.
- C) Furosemida.
- D) Fósforo quelato.
- E) Hidroclorotiazida.

Questão 57

Paciente, 17 anos, diagnosticada com síndrome de ovários policísticos fenótipo D, vem para avaliação de controle. Essa classificação em fenótipos ocorreu no Consenso de Diagnóstico da Síndrome em 2003, *Rotterdam*. Entretanto, atualmente, os critérios diagnósticos mais aceitos são os atualizados pela Federação Europeia de Reprodução (ESHRE 2018). Qual a característica fenotípica dessa classificação segundo os novos critérios?

- A) Anovulação crônica e hiperandrogenismo laboratorial ou *Ferriman* > 8.
- B) Anovulação crônica e, no mínimo, um ovário com, pelo menos, 20 folículos medindo entre 0,2 e 0,9 cm ou $\geq 10 \text{ cm}^3$ em ultrassonografia realizada com sonda de 8 MHz.
- C) Hiperandrogenismo laboratorial ou *Ferriman* > 8 e, no mínimo, um ovário com, pelo menos, 12 folículos medindo entre 0,2 e 0,9 cm ou $\geq 10 \text{ cm}^3$ em ultrassonografia realizada com sonda de 8 MHz.
- D) Hiperandrogenismo laboratorial ou *Ferriman* > 8 e, no mínimo, um ovário com, pelo menos, 20 folículos medindo entre 0,2 e 0,9 cm ou $\geq 10 \text{ cm}^3$ em ultrassonografia realizada com sonda de 8 MHz.
- E) Anovulação crônica, hiperandrogenismo laboratorial ou *Ferriman* > 8 e, no mínimo, um ovário com, pelo menos, 12 folículos medindo entre 0,2 e 0,9 cm ou $\geq 10 \text{ cm}^3$ em ultrassonografia realizada com sonda de 8 MHz.

Questão 58

Paciente, 33 anos, sexo feminino com quadro de galactorreia bilateral há três meses associada à amaurose unilateral. Exames: RNM de crânio: lesão expansiva hipofisária medindo 2,5 cm; Prolactina 15. Considerando o caso hipotético e sua principal hipótese diagnóstica, qual a explicação para o resultado desses exames?

- A) Presença de macroprolactinemia.
- B) Paciente em amamentação exclusiva.
- C) Uso de contraceptivo oral combinado.
- D) Lesão mamária produtora de secreção.
- E) Efeito de *Hook* em dosagem de prolactina.

Questão 59

Paciente, sexo feminino, 20 anos, encaminhada ao especialista por alteração em exame de prolactina. Refere ter realizado exames por rotina; assintomática. Sem comorbidades, nega uso de medicações. Ciclos menstruais regulares em uso de DIU de cobre. Exames laboratoriais: HB 13; HT 40; FSH 4,0; LH 7,0; E2 56; TSH 2,7; T4L 1,3; prolactina 245; e, BHCG negativo. O exame realizado rotineiramente para esclarecimento do quadro descrito é a dosagem de prolactina:

- A) Por imunoensaio.
- B) Por método imunométrico.
- C) Após repouso de 30 minutos.
- D) Por cromatografia de filtração em gel.
- E) Por precipitação com polietilenoglicol.

Questão 60

“A síndrome de *Klinefelter* é uma anomalia nos cromossomos sexuais, que afeta, unicamente, pessoas do sexo masculino, com uma predominância estimada de um em cada 1.000 homens nascidos vivos. Esta anomalia caracteriza-se pela presença de um cromossomo sexual X extra, em que cerca de 90% dos casos apresentam o cariótipo (47, XXY). Ao contrário do logicamente esperado, indivíduos com tal síndrome apresentam alta estatura devido ao gene _____ escapar da inativação do cromossomo X.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) AR
- B) SRY
- C) SHOX
- D) DAX-1
- E) WNT4

Questão 61

A deficiência de 5 α -redutase tipo 2 é uma doença autossômica recessiva, cuja principal manifestação fenotípica é a ambiguidade genital. Essa característica é causada por:

- A) Mutação no gene SOX9.
- B) Defeito de fusão dos ductos paramesonéfricos.
- C) Ausência de ação do hormônio anti-mülleriano.
- D) Ausência de ação da testosterona no tubérculo genital.
- E) Ausência da atuação da dihidrotestosterona no seio urogenital.

Questão 62

Paciente, sexo masculino, 20 anos, internado em setor neurológico para esclarecimento de sintomas iniciados há seis meses. Familiares relatam início do quadro com náuseas, constipação intestinal e sialorreia, foi aventada hipótese de síndrome de intestino irritável por histórico familiar compatível. Há quatro meses apresentou dificuldade de deambulação, disgrafia e queda de rendimento intelectual seguida de episódios de agressividade, agitação e insônia. Foi medicado com ansiolíticos e antipsicóticos, com melhora parcial. Há um mês apresentou nova piora do quadro neurológico, psiquiátrico e digestivo, tendo sido internado para propedêutica. A tomografia e a ressonância demonstraram lesões nos núcleos da base. O exame oftalmológico com lâmpada de fenda revelou os anéis de *Kayser-Fleischer*. Dos exames relacionados, qual, se alterado, define o diagnóstico da hipótese diagnóstica?

- A) Pesquisa de anti-HCV.
- B) Ceruloplasmina sérica.
- C) Pesquisa de antiendomísio.
- D) Dosagem de alfa-1 antitripsina sérica.
- E) Dosagem do ácido deltaminolevulínico urinário.

Questão 63

Considerando que os pacientes têm indicação de realização de teste oral de tolerância a glicose nesse momento, analise as afirmativas a seguir.

- I. “Paciente, 26 anos, primigesta, 24 semanas de gestação, glicemia de jejum 1º trimestre = 85.”
- II. “Paciente, 39 anos, G2P1A0, 26 semanas de gestação, glicemia de jejum 1º trimestre = 95.”
- III. “Paciente, 18 anos, primigesta, 32 semanas, sem exames de primeiro trimestre, portadora de DM tipo 1.”
- IV. “Paciente, 33 anos, G3P2A0, 15 semanas, histórico de óbito fetal com 35 semanas em gestação anterior.”

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I.
- B) IV.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) I, II e IV.

Questão 64

Paciente em acompanhamento em ambulatório de DMG por diagnóstico desde o primeiro trimestre. Atualmente, com 32 semanas, gestação sem intercorrências. Realizou uma ultrassonografia que evidenciou insuficiência placentária leve. O obstetra assistente indicou a realização de corticoide sistêmico para amadurecimento pulmonar fetal devido ao risco de parto prematuro. Quanto a tal indicação, assinale a afirmativa correta.

- A) A paciente deverá realizar a medicação em regime hospitalar, para evitar atrasos na correção glicêmica em caso de hiperglicemia.
- B) Os riscos da medicação são superados pelos benefícios; entretanto, a realização de dexametasona é preferível em relação à betametasona.
- C) Os riscos da medicação não são superados pelos benefícios; a medicação deverá ser realizada apenas quando há risco iminente de parto prematuro.
- D) Deve-se compartilhar a decisão do uso da medicação com a gestante, uma vez que, pelo risco de hiperglicemia, é provável que haja indicação de uso de insulina a longo prazo após.
- E) Pode ser realizada sem necessidade de internação; as alterações glicêmicas trazidas pela medicação são leves e, geralmente, autolimitadas. A paciente deverá manter rigoroso controle glicêmico em domicílio.

Questão 65

Paciente, sexo masculino, 46 anos, portador do vírus HIV em uso de terapia antiretroviral há vinte anos. Última carga viral realizada há dois meses quando esquema terapêutico foi ajustado, indetectável. Há dois meses apresenta queixa de diminuição do desejo sexual e perda de 5% do peso corporal. Foram investigadas outras causas para os quadros clínicos apresentados. Exames laboratoriais: Testosterona total (realizado há um mês): 120 ng/dl (VR 150-800); Testosterona total (realizado há cinco dias): 100 ng/dl (VR 150-800). Assinale a alternativa correta quando ao seguimento do caso.

- A) É importante discutir com o infectologista a troca do esquema antirretroviral.
- B) Não há indicação de reposição de testosterona de forma injetável no momento.
- C) É necessária a dosagem de SHBG e albumina para o cálculo de testosterona livre, o que irá definir a conduta nesse momento.
- D) A reposição de testosterona injetável pode aumentar a hepatotoxicidade das medicações antiretrovirais classificadas como inibidores de proteases.
- E) A reposição de testosterona é importante também para manutenção de composição corporal, uma vez que o paciente, provavelmente, se encontra com baixo índice de massa magra.

Questão 66

Considerando que *Denosumab* é um anticorpo monoclonal utilizado no tratamento de osteoporose, podemos afirmar que seu mecanismo de ação é:

- A) Ligação de alta afinidade aos cristais de hidróxiapatita.
- B) Ligação com afinidade semelhante à do PTH endógeno ao receptor ligado à proteína G.
- C) Prevenir a interação entre RANKL/RANK, o que aumenta formação, função e sobrevivência dos osteoblastos.
- D) Ligação de alta afinidade ao RANKL, evitando e prevenindo a ativação do seu receptor RANK, na superfície de precursores dos osteoclastos e nos próprios osteoclastos.
- E) Prevenir a liberação de IL-1, potente citocina indutora da reabsorção óssea, e IL-6, por meio da ação da IL-4 (inibe a diferenciação dos osteoclastos e estimula a síntese do fator de crescimento semelhante a insulina [IGF-1] e do fator de transformação do crescimento [TGF-β]).

Questão 67

Paciente, 34 anos, sexo masculino, tabagista, foi submetido à cirurgia bariátrica por derivação biliopancreática pela técnica *Duodenal Switch*. Assinale, a seguir, uma possível complicação dessa cirurgia.

- A) Úlcera de boca anastomótica.
- B) Fístula proximal ao ângulo de *His*.
- C) Estenose de anastomose gastrojejunal.
- D) Piora de doença do refluxo gastroesofágico prévio.
- E) Náuseas e cólica abdominal por obstrução de hérnia interna.

Questão 68

Paciente, 55 anos, queixa-se de fogachos intensos há seis meses, com piora à noite com cerca de 4-5 despertares noturnos. Refere menopausa há um ano. Atualmente, em uso de tamoxifeno há um ano por câncer de mama tipo histológico ductal invasor; subtipo luminal A. Sem demais comorbidades. Qual esquema terapêutico deverá ser indicado à paciente?

- A) Isoflavona.
- B) Paroxetina.
- C) Venlafaxina.
- D) Progesterona isolada oral.
- E) Estrogênio transdérmico associado à progesterona micronizada oral 14 dias/mês.

Questão 69

Paciente, sexo masculino, 20 anos, portador de lúpus eritematoso sistêmico, em uso há dez anos de prednisolona; vitamina D; e, hidroxiquina. Após queda da própria altura no banho, foi diagnosticada fratura de compressão em vértebras torácicas. Realizada Absorciometria Radiológica de Dupla Energia com os seguintes resultados: L1-L4: Z-score: -1,8; colo do fêmur: Z-score: -1,7; fêmur total: Z-score: -1,5. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Osteopenia.
- B) Osteoporose.
- C) Sem doença osteometabólica.
- D) Diminuição de densidade mineral óssea, se comparado com seus pares etários.
- E) Esse exame não é adequado para o diagnóstico da principal hipótese diagnóstica.

Questão 70

A SHBG (do inglês *Sex Hormone Binding Globulin*) é uma proteína produzida pelo fígado e tem como principal função o transporte de alguns hormônios esteroides no sangue. Marque A para as afirmativas que umentam a produção dessa proteína e D para as que diminuem.

- () Envelhecimento.
- () Anorexia.
- () Obesidade.
- () Hipotireoidismo.
- () *Diabetes mellitus*.
- () Uso de pílula anticoncepcional combinada.

A sequência está correta em

- A) A, A, D, D, D, A.
- B) D, A, D, A, A, A.
- C) A, D, A, A, D, D.
- D) A, D, A, D, D, A.
- E) D, D, D, A, A, A.

Questão 71

Por definição, o teste diagnóstico a ser empregado no rastreamento da deficiência de GH deve ser sensível, ou seja, deve oferecer a possibilidade de incluir todos os verdadeiros portadores do distúrbio em uma população avaliada. Além da alta sensibilidade, deve ser de fácil aplicação; baixo custo; e, pouco invasivo. Sobre os exames de rastreamento e diagnóstico de tal doença, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Os ensaios que utilizam anticorpos monoclonais dificilmente dosam as isoformas de GH.
- B) As IGF-BPs podem interferir nas dosagens de IGF-1 por radioimunoensaio, especialmente em pacientes urêmicos.
- C) O diagnóstico por imagem da região hipotálamo-hipofisária está sempre indicado no momento em que este é confirmado.
- D) Em crianças menores de 2 anos, o teste de estímulo com *glucagon* é preferido devido ao seu perfil de possíveis efeitos colaterais.
- E) Quando comparado com o Teste de Hipoglicemia Insulínica ITT, o teste de estímulo com acetato de macimorelina é mais sensível; porém, tem menor acurácia.

Questão 72

Paciente, sexo masculino, 72 anos, internado em unidade coronariana há três dias por IAM. Equipe da endocrinologia é acionada por alterações em exames laboratoriais listados a seguir: TSH 0,2 mUI/l; T4L 1,0 ng/dl; T3 0,4 ng/dl. Qual a conduta no momento?

- A) Iniciar tapazol.
- B) Solicitar RNM de sela túrcica.
- C) Solicitar anticorpos TRAB e Anti-TPO para definição de conduta.
- D) Iniciar esquema terapêutico composto por levotiroxina e tri-iodotironina.
- E) Manter observação clínica e novos exames após melhora do quadro cardíaco.

A situação hipotética a seguir contextualiza as questões 73 e 74. Leia-a atentamente.

“Paciente, sexo feminino, médica, 33 anos, encaminhada ao endocrinologista após tireoidectomia total. Em anatomopatológico evidenciado carcinoma medular de tireoide. O cirurgião de cabeça e pescoço a orientou sobre risco aumentado para neoplasia neuroendócrina (NEM) 2B.”

Questão 73

A análise da pesquisa do gene RET dessa paciente demonstrou mutação patogênica do códon:

- A) 454.
- B) 507.
- C) 609.
- D) 634.
- E) 918.

Questão 74

“_____ é a alteração histológica mais precoce em pacientes com carcinoma medular de tireoide hereditário.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) Hiperplasia nodular
- B) Hiperplasia de células “C”
- C) Lesão de células de *Hurthle*
- D) Adenoma de células foliculares
- E) Hiperplasia de células foliculares

Questão 75

Homem, 21 anos, procura atendimento médico em pronto-socorro após festa de *rave*; queixa-se de tremor, dor abdominal intensa e sudorese. Nega comorbidades; uso de medicação regular e alergias. Nega uso de drogas. Ao exame: FC 115; PA 90 x 60 mmHg; FR 22; SatO₂ 94%; ECG 9; confuso; sudoreico; sonolento; desidratado; abdômen com dor intensa à palpação superficial; e, contratura muscular de defesa. Ausência de outras alterações. Foram solicitados exames laboratoriais na urgência. Resultados disponíveis: Hb 15; Ht 47; Leucócitos globais 10.000; Plaquetas 333.000; K 3,0; Na 135; Glicemia capilar 300; Gasometria Arterial: pH 7,00; PO₂ 78; PCO₂ 30; e, HCO₃ 10. Assinale, a seguir, a conduta imediata indicada para o caso hipotético.

- A) Hidratação venosa com SF 0,9% 1.000 mL + insulina regular venosa 0,1 UI/kg/h.
- B) Hidratação venosa com SF 0,9% 1.000 mL + KCl 19,9% uma ampola na primeira hora.
- C) Hidratação venosa com SF 0,45% 1.000 mL + KCl 19,9% uma ampola na primeira hora.
- D) Hidratação venosa com SF 0,9% 1.000 mL + KCl 19,9% uma ampola na primeira hora + insulina regular venosa 0,1 UI/kg/h.
- E) Hidratação venosa com SF 0,45% 1.000 mL + KCl 19,9% uma ampola na primeira hora + insulina regular venosa 0,1 UI/kg/h.

Questão 76

A avaliação de sensibilidade nervosa é importante ao exame físico geral do paciente diabético. O teste com o monofilamento 10 g é importante para o diagnóstico precoce de lesão de qual tipo de fibra nervosa?

- A) Finas tipo *a-beta*.
- B) Finas tipo *a-gama*.
- C) Grossas tipo *a-beta*.
- D) Finas sensitivas tipo C.
- E) Grossas motoras tipo c-mielinizadas.

A situação hipotética a seguir contextualiza as questões 77 e 78. Leia-a atentamente.

“Paciente, homem idoso, 67 anos, levado ao pronto-socorro por familiares devido sonolência; apatia; e, inapetência. Filha refere tratamento de prostatite iniciado há dois dias. Portador de HAS, DM tipo II e arritmia não especificada. Faz uso de losartana; anlodipino; metformina; insulina NPH; propranolol; e, amiodarona. Nega alergias. Ao exame físico: FR 16; PA 130 x 90 mmHg; FC 92; SATO2 96%; ECG 9; T 35,5° C; sonolência; confusão mental; pele fria; ausência de outras alterações. Exames laboratoriais disponíveis: Hb 11; Ht 35; Leucócitos globais 14.000; Plaquetas 137.000; Na 138; K 4,1; U 52; Cr 1,3; Glicemia 170; TSH 8,3; e, Ca 10.”

Questão 77

Qual o diagnóstico provável do paciente?

- A) Crise tireotóxica.
- B) Coma mixedematoso.
- C) Sepsis de foco urinário.
- D) Insuficiência renal aguda.
- E) Hipercalemia da malignidade.

Questão 78

De acordo com o provável diagnóstico do caso, qual a conduta indicada?

- A) Terapia de substituição renal.
- B) Administrar T4 via endovenosa.
- C) Administrar propiltiouracila via enteral.
- D) Administrar SF 0,9% 1.000 mL via endovenosa.
- E) Administrar ceftriaxona e metronidazol via endovenosa.

Questão 79

Paciente idosa, 76 anos, é levada ao serviço de emergência por filho devido a quadro de sonolência e pressão baixa. Portadora de HAS e DM tipo II. Nega alergias. Filho refere início há uma semana de fadiga; anorexia; perda de peso; náuseas; vômitos; diarreia; e, hiperpigmentação da pele. Ao exame: PA 90 x 60 mmHg; FC 92; FR 18; Glicemia capilar 70; SATO2 95%; ECG 9; desidratada; e, ausência de outras alterações. Exames laboratoriais disponíveis: Hb 12; Ht 37; plaquetas 233.000; leucócitos totais 9.450; Cr 1,2; U 48; Na 128; k 5,8; e, PCR 1. De acordo com a principal suspeita diagnóstica, quais exames complementares devem ser solicitados?

- A) TSH e T4L.
- B) Tomografia de crânio.
- C) Cortisol plasmático e ACTH.
- D) Lactato arterial; gasometria arterial; bilirrubina; e, INR.
- E) Gasometria arterial; cálcio; fósforo; cloro; e, magnésio.

Questão 80

Paciente, 39 anos, mulher, encaminhada ao ambulatório de endocrinologia devido a quadro de DM tipo II; dislipidemia; catarata; pele atrófica; alopecia; e, cabelos grisalhos precoce. Após investigação evidenciada na paciente doença autossômica recessiva, caracterizada por mutações no gene WRN. De acordo com o caso clínico, assinale o diagnóstico da paciente.

- A) Doença de *Wilson*.
- B) Síndrome *Noonan*.
- C) Síndrome de *Werner*.
- D) Dislipidemia primária.
- E) Síndrome de *Prader-Willi*.

ATENÇÃO



NÃO É PERMITIDA a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO. O candidato flagrado nesta conduta poderá ser ELIMINADO do processo.

INSTRUÇÕES

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos – ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos.
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação.
6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.
8. Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de Inscrição ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não poderá levar consigo o seu Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no *link* correspondente ao Concurso Público.