

# POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN

**CONCURSO PÚBLICO  
Nº 001/2022**



**(QOSPM) – MÉDICO – ORTOPEDIA  
E TRAUMATOLOGIA**

**Tarde**

**Tipo 1 - BRANCA**

Organizadora:



**INSTITUTO**  
CONSULPLAN

**LÍNGUA PORTUGUESA****Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater**

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro.

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia.

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres, a sul-africana *Phumzile Mlambo-Ngcuka*, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica.

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da pandemia também perderam o emprego.

*(Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/12/4968165-violencia-contra-a-mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html>. Adaptado.)*

**Questão 01**

**Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido:**

- A) Certeza.
- B) Garantia.
- C) Exigência.
- D) Necessidade.
- E) Comprovação.

**Questão 02**

**De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à violência:**

- A) Doméstica e familiar.
- B) Física e outros tipos de violência.
- C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.
- D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus.
- E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus.

**Questão 03**

**Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão dos parágrafos e do texto. Em “Apesar da diminuição da violência [...]” (2º§), a expressão destacada:**

- A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal.
- B) Introduce uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial.
- C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo.
- D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão.
- E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas.

**Questão 04**

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta.

- A) O adjetivo “calamitosa” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “a pandemia do novo coronavírus”.
- B) Em “[...] apontam dados da terceira edição [...]” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “apontam” seja substituída por “aponta-se”.
- C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] cerca de 13 milhões de brasileiras relataram [...]” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral.
- D) Se em “O mesmo estudo indica [...]” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “estudo”, seguida de “a mesma informação, a mesma análise”; a forma verbal “indica” permaneceria na terceira pessoa do singular.
- E) A forma verbal “sofreu” pode ser substituída por “sofreram” em “[...] uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu [...]” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “quatro brasileiras”.

**Questão 05**

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. Indique o trecho que apresenta tal elemento.

- A) “[...] afirmou que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§)
- B) “[...] se levamos em conta que outras questões [...]” (4º§)
- C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§)
- D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§)
- E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§)

**Questão 06**

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo:

- A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado.
- B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras.
- C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se destina.
- D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande público.
- E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do conhecimento.

**Questão 07**

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, assinale a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado.

- A) “[...] que, calamitosa, agravou-se [...]” (1º§) / calamitosa
- B) “[...] que demanda comprometimento também dos homens [...]” (1º§) / ela
- C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, [...]” (3º§) / situação
- D) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, [...]” (1º§) / violência contra a mulher
- E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras [...]” (2º§) / pesquisa visível e invisível

**Questão 08**

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que:

- I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas.
- II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.
- III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade à sociedade.
- IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência contra a mulher.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e III.
- E) II, III e IV.

**Questão 09**

Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “*Esses números correspondem a informações [...]*” (2º§), indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado.

- A) À apresentação iremos todos.
- B) Ao documento a diretora solicitou.
- C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez.
- D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.
- E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório.

**Questão 10**

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido:

- A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus.
- B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais.
- C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus.
- D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020.
- E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida contra elas.

**RACIOCÍNIO LÓGICO**

**Questão 11**

Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R\$ 60,00 e, se uma demanda é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R\$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R\$ 1.050,00 após o serviço prestado, o número de demandas realizadas corretamente é:

- A) 24
- B) 25
- C) 26
- D) 27
- E) 28

**Questão 12**

Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os.

- 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia;
- 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia;
- 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia;
- 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia;
- 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e,
- 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia.

De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que:

- A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia.
- B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia.
- C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia.
- D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.
- E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.

**Questão 13**

No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?

- A) 30
- B) 60
- C) 90
- D) 120
- E) 180

**Questão 14**

Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa:

| Sexo      | Aumento de Insônia |     |
|-----------|--------------------|-----|
|           | Sim                | Não |
| Masculino | 46                 | 82  |
| Feminino  | 38                 | 54  |

Considere os eventos:

- $X$ : selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados;
- $Y$ : selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e,
- $Z$ : selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas.

Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que:

- A)  $P(X) < P(Y) < P(Z)$
- B)  $P(X) < P(Z) < P(Y)$
- C)  $P(Y) < P(X) < P(Z)$
- D)  $P(Z) < P(Y) < P(X)$
- E)  $P(Z) < P(X) < P(Y)$

**Questão 15**

O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil  $X$  de um determinado mês é dado pelo valor da função  $f(x) = -x^2 + 12x - 27$ , em que  $x = 1, 2, \dots, 20$ . Os dias úteis em que houve julgamentos são aqueles que satisfazem  $f(x) > 0$ . Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir.

- I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais.
- II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6.
- III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo dia útil.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) II.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

**Questão 16**

Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- A) Bárbara é cardiologista.
- B) Adriana é ginecologista.
- C) Camila é a médica da família.
- D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.
- E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde.


**Questão 17**

Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R\$ 120,00, que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e foi necessário acrescentar R\$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram para a compra do presente?

- A) 8
- B) 10
- C) 12
- D) 14
- E) 16

**Questão 18**

O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que  $PQ = 25$  m;  $QU = 22$  m; e,  $UR = 28$  m.



Se o segmento  $ST$  possui  $X$  metros, todos os valores possíveis de  $X$  devem satisfazer:

- A)  $2 \leq x \leq 24$
- B)  $2 \leq x \leq 32$
- C)  $18 \leq x \leq 32$
- D)  $24 \leq x \leq 36$
- E)  $24 \leq x \leq 48$

**Questão 19**

Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfermeiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado?

- A) 20
- B) 25
- C) 26
- D) 35
- E) 36

**Questão 20**

Após um grande incêndio em um prédio residencial,  $M$  moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de  $M$ ?

- A) 40
- B) 48
- C) 54
- D) 66
- E) 84

**NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA**

**Questão 21**

O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO:

- A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão institucional.
- B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo.
- D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério.
- E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde.

**Questão 22**

Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da:

- A) Equidade.
- B) Integralidade.
- C) Universalidade.
- D) Hierarquização.
- E) Regionalização.

**Questão 23**

“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com \_\_\_\_\_ previstos(as) no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) as diretrizes
- B) os princípios
- C) as atribuições
- D) as organizações
- E) as competências

**Questão 24**

O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito de equidade:

- A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido.
- B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível.
- C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas.
- D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as suas necessidades específicas.
- E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e atendimentos com diferentes profissionais da saúde.

**Questão 25**

A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:

- A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.
- B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível.
- C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços.
- D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso.
- E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

**Questão 26**

Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo possível captar informações a respeito de, EXCETO:

- A) Indicadores de Saúde.
- B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil.
- C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).
- D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e nutricional).
- E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, mortalidade, câncer).

**Questão 27**

Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os.

- I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social.
- II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional.
- III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

**Está correto o que se afirma em**

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

**Questão 28**

A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades de saúde da população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal nº 13.595/2018, são consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO:

- A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS.
- B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde.
- C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças.
- D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção Básica.
- E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção coletivas e individuais.

**Questão 29**

**Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica:**

- A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
- B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores.
- C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- D) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- E) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

**Questão 30**

O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os.

- A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS.
- B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida.
- C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização.
- D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização.
- E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária.



**Questão 31**

AC, sexo feminino, 25 anos, deseja ser orientada a respeito da prevenção do câncer de colo uterino. O médico informa sobre a necessidade da realização do exame Papanicolaou. Tal procedimento pode ser considerado como prevenção:

- A) Primária.
- B) Secundária.
- C) Terciária.
- D) Quartenária.
- E) Não pode ser considerado prevenção, pois é um exame diagnóstico.

**Questão 32**

Assinale, a seguir, a alternativa que pode ser considerada na medicina preventiva como prevenção terciária.

- A) Reabilitação pós-AVC.
- B) Campanhas de vacinação.
- C) Realização de mamografia.
- D) Rastreio de câncer de próstata.
- E) Campanhas de conscientização sobre obesidade.

**Questão 33**

EF, sexo feminino, 15 anos, procura atendimento médico pois iniciou a vida sexual com seu namorado e deseja receber informações sobre contracepção. Diante da situação hipotética, o médico deverá:

- A) Orientar a paciente sobre os métodos existentes; e, de acordo com a vontade da mesma, lhe prescrever o mais adequado.
- B) Acionar o conselho tutelar e a assistente social, pois, considerando que a paciente tem menos de 16 anos, o caso se enquadra como estupro de vulnerável.
- C) Orientar a paciente que, por ser menor de idade, não poderá receber prescrição de contracepção sem estar acompanhada de um dos pais ou responsáveis.
- D) Orientar a paciente sobre os métodos existentes; e, de acordo com a vontade da mesma, lhe prescrever o mais adequado. Porém, os pais devem ser comunicados por escrito da prescrição.
- E) Orientar a paciente que poderá usar qualquer método contraceptivo, com exceção dos métodos de longa duração, como DIU e implante subdérmico, pois só estão autorizados para maiores de 18 anos.

**Questão 34**

Determinado médico deseja prescrever para seu paciente, com 50 kg, uma medicação anti-hipertensiva por via endovenosa disponível em uma ampola de 5 mL contendo 5 mg/mL. Para isso, dilui uma ampola em 245 mL de soro glicosado a 5%. A dose desejada da medicação é de 0,5 mcg/kg/min. Qual deverá ser, em mL/h, a velocidade de infusão da solução em BIC?

- A) 1 mL/hora
- B) 5 mL/hora
- C) 10 mL/hora
- D) 15 mL/hora
- E) 25 mL/hora

**Questão 35**

LDF, 70 anos, chega ao pronto-socorro trazido pelos familiares após ser encontrado em casa com rebaixamento do nível de consciência. É realizada uma tomografia de crânio que evidencia grande sangramento intraparenquimatoso com desvio considerável da linha média. O paciente evolui, desfavoravelmente, necessitando de intubação orotraqueal. Sobre a comunicação de más notícias, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A linguagem deverá ser direta e clara, evitando vocabulário extremamente técnico ou rebuscado, objetivando a compreensão e o entendimento do familiar.
- B) O médico deverá procurar saber o que os familiares entendem do quadro e, independente da vontade da família, informar a situação detalhada e completa do paciente.
- C) O familiar deve receber o tempo adequado para compreender o quadro do paciente para, então, posteriormente, poder discutir questões como a abordagem terapêutica.
- D) Quando a proposta terapêutica é paliativa, é de fundamental importância o entendimento da família, para evitar a não compreensão do propósito do manejo e a superestimação de sua eficácia.
- E) O médico deverá sempre procurar um local adequado, reservado, onde não haja interrupções; se for de preferência do familiar, deve autorizar um acompanhante para poder comunicar as más notícias.

**Questão 36**

**Um paciente que pesa 100 kg e mede 1,80 m pode ser classificado, de acordo com seu IMC, em qual grau de obesidade?**

- A) Sobrepeso.
- B) Peso normal.
- C) Obesidade grau I.
- D) Obesidade grau II.
- E) Obesidade grau III.

**Questão 37**

**Paciente, 25 anos, vai ao médico da empresa em que trabalha após ter realizado exame diagnóstico positivo para HIV. Relata ter iniciado novo relacionamento há dois meses e teme que o diagnóstico prejudique sua relação com a parceira. Diante da situação hipotética, o médico deverá:**

- A) Notificar a assistente social e as autoridades policiais, pois ocultar tal diagnóstico da parceira configura crime.
- B) Respeitar a decisão do paciente de não comunicar a parceira, visto que sempre deve ser respeitado o sigilo médico.
- C) Comunicar imediatamente a parceira, independentemente de o paciente decidir lhe transmitir a notícia, pois ele poderá desistir de contá-la.
- D) Orientar o paciente que deve comunicar a parceira. Caso não o faça, o médico deverá tomar medidas para convocá-la e comunicar a notícia.
- E) Orientar o paciente que deve comunicar a parceira. Caso não o faça, deverá convocá-la, assim como também deverá notificar a empresa onde o paciente trabalha, pois trata de uma doença altamente transmissível no ambiente laboral.

**Questão 38**

**João, 25 anos, homem trans, vem à consulta em unidade básica de saúde em seu bairro para consulta de rotina. Sobre o atendimento adequado à população transgênero, assinale a afirmativa INCORRETA.**

- A) Caso o paciente tenha práticas sexuais que possam resultar em gravidez indesejada, pode-se oferecer contracepção.
- B) As unidades de saúde devem exigir que o nome social do paciente esteja retificado em cartório, assim também como o gênero, para que o mesmo seja chamado por ele.
- C) A colpocitologia oncótica deve ser oferecida a todas as pessoas entre 25 e 65 anos que possuem colo do útero e que já tiveram algum tipo de penetração vaginal ao longo da vida.
- D) O cuidado deve ser sempre centrado na pessoa atendida; portanto, suas percepções, necessidades e desejos devem ser compreendidos e a construção do plano terapêutico precisa ser compartilhada com o paciente.
- E) O médico deve atuar pelo conforto da pessoa explicando qualquer procedimento antes de realizá-lo, elucidar dúvidas e compreender quais termos são melhores aceitos pelo paciente para tratar de partes do seu corpo.

**Questão 39**

**Considerando o que dispõe o Novo Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019, assinale a afirmativa correta.**

- A) Os Conselhos de Medicina exercem tanto o papel de disciplinadores quanto de julgadores da classe médica.
- B) O Novo Código de Ética Médica foi elaborado a partir das decisões da II Conferência Nacional de Ética Médica realizada em 2008.
- C) O médico portador de doença grave fica impedido do exercício da profissão enquanto perdurarem as limitações de sua capacidade física.
- D) O Novo Código de Ética Médica busca o melhor relacionamento entre o médico e seu paciente, prescindindo da autonomia de vontade deste.
- E) As regras deontológicas de ética médica destinam-se ao exercício da profissão clínica, não se aplicando às atividades de ensino e pesquisa.

**Questão 40**

**De acordo com o Novo Código de Ética Médica, quanto aos princípios fundamentais, assinale a afirmativa correta.**

- A) O aprimoramento contínuo dos conhecimentos é um dever ético, assim como o uso do melhor progresso científico.
- B) A autonomia ética sempre autoriza a recusa do médico a atender determinados pacientes por razões de índole pessoal.
- C) O dever ético da atuação médica limita-se ao evento morte do paciente, devendo-se guardar sigilo a respeito das informações do prontuário.
- D) A medicina somente pode ser exercida como comércio nos limites e circunstâncias expressamente previstos do Código de Ética Médica.
- E) O médico não se limitará a disposições estatutárias ou regimentais de hospital ou instituição pública ou privada, ainda que benéficas ao paciente.

**Questão 41**

Na ortopedia, diversas manobras são utilizadas no tratamento e redução de luxações e subluxações. A manobra de *Spaso* é utilizada no tratamento da:

- A) Luxação atlantoaxial.
- B) Luxação glenoumeral.
- C) Subluxação de quadril.
- D) Luxação úmero-rádio-ulnar.
- E) Subluxação da cabeça do rádio.

**Questão 42**

O tumor de *Ewing* foi descrito por *James Ewing*, em 1921; corresponde a uma neoplasia maligna osteolítica de alto grau. Este tumor acomete preferencialmente qual porção óssea?

- A) Epífise.
- B) Diáfise.
- C) Metáfise.
- D) Perióstio.
- E) Superfície articular.

**Questão 43**

Existem diversos tipos de tumores ósseos benignos, que podem aparecer em qualquer parte do esqueleto. Qual é o tumor ósseo benigno mais frequente na população?

- A) Osteoma.
- B) Condroma.
- C) Hemangioma.
- D) Osteocondroma.
- E) Cisto ósseo solitário.

**Questão 44**

O osteoma osteoide, primariamente descrito por *Jaffe*, em 1935, é uma lesão benigna que apresenta importantes peculiaridades. A respeito deste tumor, assinale a afirmativa correta.

- A) Incide preferencialmente em idosos.
- B) Tem maior predileção pela população do sexo feminino.
- C) Acomete, preferencialmente, os ossos planos ou laminares.
- D) Geralmente, apresenta-se como uma lesão osteolítica de grande tamanho.
- E) Radiologicamente, o osteoma osteoide clássico apresenta-se como um nicho radiotransparente oval ou arredondado, com uma zona reacional de esclerose densa ao redor da lesão.

**Questão 45**

Os osteossarcomas podem ser classificados quanto ao grau, que indica a probabilidade do tumor se disseminar para outros órgãos e ajuda a determinar o estágio da doença, bem como o tipo de tratamento a ser realizado. NÃO é considerado um osteossarcoma de alto grau:

- A) Parosteal.
- B) Osteoblástico.
- C) Telangiectásico.
- D) Condroblástico.
- E) Pequenas células.

**Questão 46**

Em relação ao sarcoma de *Ewing*, uma neoplasia óssea de comportamento biológico bastante agressivo, que responde por cerca de 6% a 10% dos tumores ósseos malignos primários, assinale a afirmativa correta.

- A) Localiza-se, principalmente, nas epífises ósseas.
- B) Na radiografia, caracteriza-se pela presença de reação osteoblástica intensa.
- C) É definido como periosteal quando seu componente subperiosteal invade a cavidade medular.
- D) Em ossos tubulares, o aspecto mais encontrado é o de lesão fusiforme, mal delimitada, permeativa e reação periosteal associada.
- E) Em exames de ressonância magnética, demonstra sinal de alta intensidade em sequências ponderadas em T1 e hipossinal em sequências ponderadas em T2.

**Questão 47**

Paciente, sexo masculino, 7 anos de idade, tem queixa de dor em região da virilha e face medial de joelho esquerdo há vinte dias. Sem comorbidades ou história de trauma local. Foi feita a hipótese diagnóstica de doença de *Legg-Calvé-Perthes* em fase inicial. Considerando a hipótese diagnóstica, as alterações esperadas no exame físico e nas radiografias de pelve, fêmur e joelho são, respectivamente:

- A) Rotação externa e adução do quadril + redução da densidade óssea da cabeça do fêmur.
- B) Rotação interna e adução do quadril + redução da densidade óssea da cabeça do fêmur.
- C) Rotação interna e abdução do quadril + elevação da densidade óssea da cabeça do fêmur.
- D) Rotação externa do quadril e interna do joelho + redução da densidade óssea da cabeça do fêmur.
- E) Rotação externa do quadril e deslocamento medial do músculo obturador + elevação da densidade óssea da cabeça do fêmur.

**Questão 48**

As fraturas do odontoide estão presentes entre 9% e 15% das fraturas cervicais da população adulta. A associação de lesões neurológicas varia de 2% a 27%, sendo de alta gravidade ou até fatal. Na avaliação das fraturas, a classificação de *Anderson e D'Alonzo* é a mais aceita e difundida. Considerando tal classificação, assinale a afirmativa correta.

- A) A fratura tipo I é a mais comum.
- B) As fraturas tipo III são mais instáveis do que as fraturas do tipo II.
- C) A fratura tipo III ocorre próximo da ponta do osso odontoide, por cima do ligamento transversal.
- D) Nas fraturas tipo III, a zona da fratura tem aporte sanguíneo ruim, apresentando baixas taxas de consolidação.
- E) As fraturas tipo II ocorrem em uma região de menor vascularização e estão associadas a um maior risco de pseudoartrose.

**Questão 49**

Paciente, 79 anos, hipertenso, tabagista, apresentou queda de escada há quatro horas. Comparece em pronto atendimento com dor intensa em região proximal do braço direito, com dificuldade de movimentação do membro, sem ferimentos no local. Realizou radiografia que confirmou o diagnóstico de fratura fechada proximal de úmero. De acordo com as orientações da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia sobre tal tipo de fratura, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A maioria das fraturas proximais do úmero são fechadas.
- B) As mulheres idosas são mais acometidas do que os homens.
- C) É considerado desvio quando o segmento desloca-se mais de 1 cm (0,5 cm para o tubérculo maior), ou angulação maior do que 45°.
- D) A classificação mais comumente utilizada é a de *Neer*, onde o úmero proximal é dividido em quatro partes: cabeça, diáfise, tubérculo maior e tubérculo menor.
- E) Comparado com o tratamento conservador, o tratamento cirúrgico em idosos com fraturas proximais do úmero deslocadas com 3 a 4 fragmentos apresenta melhor desfecho funcional, menos dor e complicações.

**Questão 50**

A fusão lombar extremo-lateral minimamente invasiva (XLIF) permite acesso à área da coluna a ser tratada ao mesmo tempo que preserva e minimiza os potenciais efeitos danosos sobre os tecidos moles circundantes. Nesta técnica, o acesso é realizado através do músculo:

- A) *Psoas*.
- B) Multifido.
- C) Interespinhal.
- D) Ereter da espinha.
- E) Quadrado lombar.

**Questão 51**

A luxação patelar traumática é responsável por, aproximadamente, 3% de todas as lesões no joelho. Normalmente, é resultado de um mecanismo de trauma indireto que acomete em 65% dos casos, pacientes jovens e ativos, na faixa etária abaixo de vinte anos. O mecanismo da lesão pode variar de acordo com o tipo de luxação da patela.

(*Consensos Brasileiros de Ortopedia e Traumatologia – SBOT 2019.*)

O tipo mais comum de luxação da patela e a lesão ligamentar associada a ela são, respectivamente:

- A) Medial e retináculo lateral.
- B) Lateral e ligamento patelofemoral lateral.
- C) Medial e ligamento patelofemoral lateral.
- D) Lateral e ligamento patelofemoral medial.
- E) Medial e ligamento patelofemoral medial.

**Questão 52**

Em relação ao comportamento mecânico dos sistemas de fixação externa, assinale, a seguir, o de menor estabilidade.

- A) Armação biplanar unilateral.
- B) Fixador externo circular (*Ilizarov*).
- C) Fixador uniplanar unilateral de tubo único.
- D) Armação bilateral com pinos transfixantes.
- E) Fixador uniplanar unilateral de tubo duplo.

**Questão 53**

As lesões cervicais subaxiais foram classificadas de diversas maneiras, ao longo da história, com base em diferentes critérios (morfologia, mecanismo da lesão, anatomia) e relacionados às possibilidades de tratamento de cada época. Uma importante classificação para as lesões da coluna cervical baixa é a proposta pela *AO Spine*, desenvolvida com base na classificação do grupo AO para a região toracolombar. A classificação considera a morfologia primária da lesão, assim como a lesão particular das facetas articulares, o estado neurológico e certos modificadores específicos.

(Programa de Formação Contínua *AO Spine*. Adaptado.)

Sobre as lesões do tipo A desta classificação, assinale a afirmativa correta.

- A) Ocorrem por lesão dos elementos posteriores, sem deslocamento.
- B) Ocorrem por lesão de elementos anteriores e posteriores com translação.
- C) São causadas por mecanismo de tração, gerando uma distração da banda de tensão anterior.
- D) São causadas por mecanismo de compressão, gerando uma distração da banda de tensão posterior.
- E) Apresentam falha da coluna anterior em compressão ou lesões mínimas dos processos espinhosos ou das lâminas.

**Questão 54**

As cirurgias de artroplastia total de joelho estão cada vez mais frequentes e o conhecimento de suas peculiaridades é de extrema importância para o ortopedista. Os implantes que compõem uma prótese total do joelho podem ser fixados ao osso com fixação cimentada ou não cimentada. Sobre as características de cada forma de fixação, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A fixação com cimento tem sido o método mais utilizado para artroplastia total do joelho.
- B) A soltura e o desgaste dos implantes ocorrem, geralmente, entre o componente tibial de metal e o polietileno do componente femoral.
- C) A fixação cimentada com o Polimetilmetacrilato de Polímero (PMMA) é colocada sobre a superfície óssea para fixar os implantes.
- D) A fixação não cimentada é apoiada sobre osso através de uma superfície porosa de metal, ou superfície contornada revestida com Hidroxiapatita (HA).
- E) Componentes tibiais podem ser fabricados inteiramente de polietileno, ou de metal sobre o qual é inserido um componente de polietileno encaixado na base tibial.

**Questão 55**

O joelho é uma articulação sem uma boa estabilidade óssea, de forma que depende de seus ligamentos para se manter estável. O principal estabilizador da translação posterior da tíbia é o ligamento:

- A) Patelar.
- B) Colateral lateral.
- C) Colateral medial.
- D) Cruzado anterior.
- E) Cruzado posterior.

**Questão 56**

Paciente, sexo feminino, 55 anos, hipertensa, tabagista e portadora de doença de *Crohn* há trinta anos, comparece em consulta ambulatorial com queixa de dor em quadril direito, de forte intensidade, há dez dias. Traz radiografias de bacia, quadril e fêmur direitos, com achado de linha de hiperlucência subcondral no aspecto anterolateral da cabeça do fêmur. A principal hipótese diagnóstica para o caso hipotético é:

- A) Osteoporose.
- B) Artrite de quadril.
- C) Artrose de quadril.
- D) Osteonecrose da cabeça do fêmur.
- E) Osteossarcoma da cabeça do fêmur.

**Questão 57**

No pós-operatório tardio das artroplastias totais de joelho podem ocorrer complicações como perda óssea e deformidades do membro. O osso mais frequentemente acometido por perda óssea e a deformidade mais comum são, respectivamente:

- A) Tíbia e deformidade em varo.
- B) Tíbia e deformidade em valgo.
- C) Fíbula e deformidade em varo.
- D) Fêmur e deformidade em varo.
- E) Fêmur e deformidade em valgo.

**Questão 58**

Paciente, 52 anos, apresentou queda de motocicleta há duas horas. Após descartadas outras lesões, foi encaminhado para avaliação ortopédica por fratura de olécrano esquerdo, confirmada por radiografia. Sobre esse tipo de fratura, de acordo com as orientações da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) Quando ocorrem por trauma direto, levam a fraturas transversais ou oblíquas; quando ocorrem por trauma indireto produzem um padrão de fratura cominutiva.
- ( ) As indicações do tratamento cirúrgico incluem fraturas expostas, fraturas deslocadas e aquelas em que o mecanismo extensor foi rompido.
- ( ) O tratamento pela técnica de TBW (banda de tensão) apresenta maior risco de infecção e cirurgia de revisão, quando comparado com a técnica de fixação das placas.

A sequência está correta em

- A) F, V, F.
- B) F, F, F.
- C) V, F, F.
- D) F, V, V.
- E) V, V, V.

**Questão 59**

O índice de *Insall-Salvati* é muito empregado em casos de instabilidade femoropatelar. Para o cálculo do índice, é necessário saber:

- A) O comprimento do tendão patelar; e o comprimento diagonal da patela.
- B) A área da articulação fêmoro-tibial; e a distância entre a superfície articular do fêmur e da tíbia.
- C) A distância entre os côndilos femorais; e a distância entre a superfície articular do fêmur e da tíbia.
- D) Distância do bordo inferior da superfície articular da patela até o ângulo ântero-superior da tíbia; e o comprimento da superfície articular da patela.
- E) A altura perpendicular da parte distal da superfície articular da patela até uma linha projetada anteriormente à superfície do platô tibial; e o comprimento da superfície articular da patela.

**Questão 60**

O cotovelo é uma das articulações mais estáveis do esqueleto; porém, quando uma ou mais partes de sua arquitetura são lesadas, o risco de instabilidade recorrente ou artrose se torna grande. O termo “tríade terrível” recebe este nome devido à instabilidade resultante desta lesão, levando, assim, à dificuldade em seu manuseio, até mesmo por cirurgiões experientes.

Fazem parte da tríade terrível do cotovelo:

- A) Fratura da ulna, rádio e úmero.
- B) Fratura da cabeça do rádio, lesão do nervo ulnar e do nervo radial.
- C) Fratura da cabeça do rádio, luxação do cotovelo e fratura do processo coronoide.
- D) Fratura do olécrano, subluxação da cabeça do rádio e lesão do ligamento quadrado.
- E) Luxação do cotovelo, lesão do ligamento colateral ulnar e do ligamento colateral radial.

**Questão 61**

O teste de *Speed*, muito comumente utilizado no exame do paciente com ombro doloroso, avalia principalmente o músculo:

- A) Bíceps.
- B) Deltoide.
- C) Subescapular.
- D) Infraespinhoso.
- E) Supraespinhoso.

**Questão 62**

As fraturas da cabeça do rádio ocorrem usualmente por queda sobre a mão espalmada, com o cotovelo estendido e o antebraço em pronação, havendo um componente de esforço em valgo. O tratamento das fraturas da cabeça do rádio varia conforme o tipo pela classificação de *Mason*. Sobre tais fraturas, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) O tratamento padrão nas fraturas do tipo II é a substituição protética da cabeça do rádio.
- B) O exame de imagem inicial é a radiografia em ântero-posterior, perfil e incidência para radiocapitelar (*Greenspan*).
- C) Um quarto tipo (IV), representado pelas fraturas da cabeça do rádio associadas à luxação do cotovelo, foi acrescentado na classificação modificada por *Johnston*.
- D) Nos casos de substituição protética da cabeça do rádio, pode-se utilizar uma prótese de borracha siliconizada; sua presença destina-se a impedir a migração proximal do rádio.
- E) As fraturas do tipo III apresentam prognóstico pior do que as do tipo I e II, pois a cabeça do rádio está reduzida a um número variável de fragmentos, de dimensões igualmente variáveis.

**Questão 63**

Paciente, sexo masculino, 18 anos, foi vítima de queda de motocicleta há duas horas. Após avaliação da cirurgia geral, foi encaminhado para ortopedia, já que o único achado positivo foi o de fratura fechada do platô tibial esquerdo. Considerando a fratura encontrada, qual é a lesão mais comumente encontrada em associação?

- A) Meniscos.
- B) Ligamento colateral lateral.
- C) Ligamento colateral medial.
- D) Ligamento cruzado posterior.
- E) Fratura cominutiva de patela.

**Questão 64**

A síndrome de *Wartenberg* caracteriza-se por uma neuropatia compressiva entre os ventres musculares do extensor radial longo do carpo e o braquiorradial durante pronação do antebraço. Podemos afirmar que o principal nervo acometido nesta síndrome é o ramo:

- A) Motor do nervo ulnar.
- B) Motor do nervo radial.
- C) Sensitivo do nervo ulnar.
- D) Sensitivo do nervo radial.
- E) Motor do nervo mediano.

**Questão 65**

Paciente, 8 anos de idade, foi vítima de queda de altura. Durante avaliação pela equipe da ortopedia, constatou-se fratura da porção mais distal do fêmur direito. A radiografia evidenciou a presença de uma separação fisária parcial com uma fratura epifisária intra-articular. Qual é a classificação de *Salter-Harris* da fratura apresentada por este paciente?

- A) Tipo I.
- B) Tipo II.
- C) Tipo III.
- D) Tipo IV.
- E) Tipo V.

**Questão 66**

A luxação aguda da patela representa cerca de 2% a 3% de todas as lesões de joelho sendo a segunda causa mais comum de hemartrose traumática do joelho. De acordo com as recomendações das Diretrizes sobre Luxação Aguda da Patela da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, é INCORRETO afirmar que:

- A) O mecanismo típico de luxação é um trauma torsional com rotação interna do fêmur com o pé fixo.
- B) As alterações na ressonância magnética incluem lesão osteocondral da porção ântero-lateral do côndilo femoral lateral e lesão do retináculo medial.
- C) O reparo do ligamento patelofemoral medial leva a um melhor resultado funcional; bem como menor risco de reluxação, quando comparado com o tratamento conservador.
- D) Diversos fatores levam a uma maior predisposição à luxação, incluindo patela alta; morfologia anormal da patela; displasia troclear; joelho valgo; e, aumento da anteversão femoral.
- E) Na ressonância magnética, a presença de edema ou hemorragia na borda inferior do vasto medial oblíquo e lesão condral ínfero-medial na patela são achados indiretos do deslocamento da patela.

**Questão 67**

**Paciente, sexo masculino, 7 anos de idade, apresenta há um mês quadro de dor em quadril direito associada à dificuldade de deambulação. A radiografia de quadril evidenciou achado sugestivo de doença de *Legg-Calvé-Perthes* em estágio inicial. Usualmente, o sinal radiológico mais precoce da doença é:**

- A) Presença do sinal do crescente.
- B) Aumento do espaço articular lateral.
- C) Aumento do espaço articular medial.
- D) Presença de zona radiolucida subcondral.
- E) Diminuição do tamanho da epífise proximal femoral.

**Questão 68**

**Considerando que a luxação congênita do joelho constitui deformidade na qual a tíbia está deslocada em relação ao fêmur, assinale a afirmativa correta.**

- A) A tíbia desloca-se posteriormente ao fêmur.
- B) Faz parte do grupo das deformidades de hiperflexão do joelho.
- C) Nas deformidades mais avançadas, os côndilos podem ser palpáveis na região poplíteia.
- D) Espera-se a ocorrência de deformidade em varo do joelho pela rotação ocorrida no quadril.
- E) O trato iliotibial e o músculo quadríceps se encontram preservados, enquanto ocorre intenso desgaste dos meniscos e estiramento das fibras nervosas adjacentes.

**Questão 69**

**Paciente, sexo masculino, 21 anos, sofreu trauma em pé esquerdo enquanto fazia exercícios na academia, após um peso cair sobre ele. Na radiografia, evidenciou-se fratura do colo do tálus, tipo III de *Hawkins* (fratura do colo com luxação tíbio-talar e subtalar). De acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o melhor tratamento para tal tipo de fratura é:**

- A) Redução fechada.
- B) Redução aberta e fixação interna.
- C) Redução aberta e fixação externa.
- D) Repouso; analgesia; gelo; e, fisioterapia.
- E) Restrição de carga e imobilização gessada.

**Questão 70**

O tratamento das fraturas diafisárias do fêmur em crianças deve sempre visar o mínimo de agressividade e o menor tempo de internação. Devido às propriedades biológicas do osso imaturo que permitem uma rápida consolidação e remodelação óssea, é importante o conhecimento deste potencial pelo especialista, nas diferentes idades, para a escolha do melhor método de tratamento, permitindo desvios e encurtamentos aceitáveis nas diferentes idades.

*(Manual de Trauma Ortopédico / SBOT. Adaptado.)*

**De acordo com as orientações da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, em pacientes com menos de sete anos de idade, o tratamento de escolha nas fraturas diafisárias fechadas de fêmur é:**

- A) Placa ponte.
- B) Haste flexível.
- C) Fixador externo.
- D) Tração esquelética.
- E) Gesso pelvipodálico.

**Questão 71**

**O pé torto congênito é um dos defeitos congênitos mais comuns dos pés e inclui alterações nos ligamentos, músculos, tendões e ossos. Sobre tal patologia, assinale a afirmativa INCORRETA.**

- A) O envolvimento é bilateral em cerca de 50% dos casos.
- B) Na técnica de *Ponseti*, o varismo é a primeira deformidade a ser corrigida.
- C) A técnica de *Ponseti* consiste de manipulações e trocas gessadas seriadas; secção percutânea do tendão calcâneo; e, uso de órtese de abdução.
- D) A deformidade resultante consiste, usualmente, de equino do retropé; varo subtalar; cavo por flexão plantar do antepé; e, adução do médio e do antepé.
- E) A técnica de *Kite* preconiza a correção das deformidades de forma sequencial: inicia-se pela abdução do antepé; seguida da correção do varo do calcâneo; e, por fim, do equino.



**Questão 72**

Paciente, sexo masculino, 22 anos, foi vítima de queda de motocicleta há duas horas. Após avaliação inicial pela cirurgia geral, apresentou como única lesão uma fratura exposta de fêmur direito, tipo III de *Gustillo e Anderson*. De acordo com as orientações das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia sobre tal tipo de fratura, a melhor opção de tratamento é:

- A) Fixação externa definitiva.
- B) Fixação primária com placa e parafusos.
- C) Fixação primária com haste intramedular.
- D) Tratamento inicial com fixador externo provisório seguido de fixação interna com placas e parafusos.
- E) Tratamento inicial com fixador externo provisório seguido de fixação interna com haste intramedular.

**Questão 73**

Paciente, sexo feminino, 79 anos, apresentou queda da escada há duas horas. Devido às alterações ao exame físico, foi aventada a possibilidade diagnóstica de luxação posterior do quadril esquerdo, sem fraturas associadas. O diagnóstico foi confirmado em seguida pela radiografia. A posição esperada do membro inferior esquerdo da paciente ao exame físico é:

- A) Flexão; adução; e, rotação interna.
- B) Adução; flexão; e, rotação externa.
- C) Flexão; abdução; e, rotação externa.
- D) Extensão; adução; e, rotação interna.
- E) Hiperabdução; extensão; e, rotação externa.

**Questão 74**

O ligamento cruzado anterior é fundamental para a estabilização do joelho contra a translação anterior da tíbia sob o fêmur e contra a rotação externa do fêmur sobre a tíbia. Sobre as de lesões do ligamento cruzado anterior, analise as afirmativas a seguir.

- I. As mulheres apresentam maior risco de lesão deste ligamento do que os homens.
- II. Um dos principais mecanismos deste tipo de lesão é quando ocorre um movimento súbito de rotação externa do fêmur com o pé fixado ao chão.
- III. Um dos testes diagnósticos é o da gaveta anterior: com o paciente em decúbito dorsal, joelho flexionado e pé tocando a mesa de exame, o examinador segura na panturrilha, tracionando a perna anteriormente.

**Está correto o que se afirma em**

- A) I, II e III.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

**Questão 75**

A articulação metacarpofalangeana do polegar apresenta características comuns às articulações do tipo condilar e gínglimo. Seu arco primário de movimentação ocorre no plano flexo-extensão, com limitado grau de abdução-adução e de rotação. Qual a lesão mais associada à luxação dessa articulação?

- A) Retração capsular lateral.
- B) Ruptura da cápsula articular.
- C) Fratura dos sesmoides do polegar.
- D) Retração capsular circunferencial.
- E) Fratura articular da base da falange.

**Questão 76**

As fraturas metafisárias proximais da tíbia são fraturas aparentemente simples, por vezes incompletas, que apresentam tendência à deformidade progressiva, mesmo após a consolidação. Qual a lesão mais associada à fratura metafisária proximal da tíbia na criança?

- A) Lesão do nervo fibular.
- B) Rotura do anel pericondral.
- C) Desvio em varo progressivo.
- D) Desvio em valgo progressivo.
- E) Encurtamento do membro afetado.

**Questão 77**

Os métodos de fixação de fraturas podem ser classificados como de estabilidade absoluta e relativa. De acordo com as orientações da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, NÃO é um método de estabilidade absoluta:

- A) Banda de tensão.
- B) Parafuso de tração.
- C) Haste intramedular.
- D) Placa de compressão.
- E) Fios de cerclagem + fios de *Kirschner*.

**Questão 78**

Hérnia de disco é condição frequente, que acomete entre 13 e 40% das pessoas ao longo da vida, com pico de incidência entre 50-60 anos de idade. Considerando que, topograficamente, predomina na coluna lombar, correspondendo por cerca de 80% dos casos, analise as afirmativas a seguir.

- I. Em pacientes com hérnia de disco confirmada por imagem e sintomas persistindo por mais de 3 a 6 semanas, a cirurgia é superior ao tratamento não operatório com relação ao alívio dos sintomas e à melhora funcional.
- II. Pacientes operados apresentam alívio mais rápido da dor radicular.
- III. A maioria dos pacientes têm seus sintomas aliviados com o tratamento conservador.

De acordo com recomendações das Diretrizes sobre hérnia de disco lombar em adultos da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

**Questão 79**

O cisto ósseo simples ou solitário é uma lesão benigna, de conteúdo líquido e expansivo, que incide em crianças com idade em torno de nove anos. Suas principais consequências, as fraturas patológicas e as deformidades, decorrem do comportamento expansivo e da localização da lesão.

(Consensos Brasileiros de Ortopedia e Traumatologia – SBOT 2019.)

Os locais mais comuns de ocorrência são:

- A) Rádio e tíbia.
- B) Rádio e ulna.
- C) Tíbia e fêmur.
- D) Úmero e rádio.
- E) Úmero e fêmur.

**Questão 80**

A espondilolistese é definida como uma translação de um corpo vertebral sobre a vértebra caudal adjacente em uma direção anterior ou, em casos mais graves, anterior e caudal. Sobre tal condição, analise as afirmativas a seguir.

- I. Um bom parâmetro para se prever a progressão da espondilolistese é um alto valor do ângulo de deslizamento.
- II. As espondilolisteses podem ser divididas em alto grau (escorregamento maior do que 50%) e baixo grau (escorregamento menor do que 50%).
- III. O nível da coluna mais comumente afetado é C7-T1.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) II, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II e III, apenas.

**ATENÇÃO**



**NÃO É PERMITIDA** a anotação das respostas da prova em QUALQUER MEIO.  
O candidato flagrado nesta conduta poderá ser **ELIMINADO** do processo.



## INSTRUÇÕES

**É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.**

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos – ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.
4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos.
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação.
6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico.
8. Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de Inscrição ou em qualquer outro meio.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não poderá levar consigo o seu Caderno de Provas.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.

## RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br), a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br).
- A interposição de recursos poderá ser feita via *internet*, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico [www.institutoconsulplan.org.br](http://www.institutoconsulplan.org.br), no *link* correspondente ao Concurso Público.