

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO MUNICÍPIO DO BOM JARDIM (PE)



AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (TODAS AS ÁREAS)

igeduc

80 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de **ELIMINAÇÃO** do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será **ELIMINADO**.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
 - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
 - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
 - Nos itens que avaliam conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
 - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.
-

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 60)**

Julgue os itens subsequentes.

1. Trabalhadores da saúde, independentemente da idade, devem receber 3 (três) doses de tríplice viral, conforme situação vacinal encontrada, observando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Considera-se vacinado o trabalhador da saúde que comprovar 3 (três) doses de vacina tríplice viral.
2. As ações voltadas para o diagnóstico precoce e tratamento adequado dos casos de Leishmaniose são de responsabilidade das secretarias estaduais de saúde (SES), com o apoio das secretarias municipais e Ministério da Saúde.
3. Os indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para Covid-19 devem iniciar o isolamento respiratório domiciliar imediatamente e esse poderá ser suspenso no 7º dia completo após a data da coleta da amostra, e após realizar novo teste, desde que permaneçam assintomáticos durante todo o período.
4. O teste de rotina para diagnóstico da filariose é feito pela pesquisa da microfilaria no sangue periférico pelo método da gota espessa. Uma característica deste parasito é a periodicidade noturna das microfíliarias no sangue periférico do hospedeiro, devendo o horário da coleta do sangue acontecer entre 23h e 1h da manhã.
5. Todo caso suspeito de dengue deve ser notificado à Vigilância Epidemiológica; e quando apresenta a forma grave, a notificação deve ser imediata.
6. Crianças provenientes de famílias de baixa renda apresentam um risco maior relacionado a deficiências alimentares. Além disso, condições sanitárias precárias contribuem para o aparecimento de infecções, parasitoses e da desnutrição.
7. O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional.
8. Para o adequado funcionamento da Estratégia Saúde da Família, é necessária a cobertura de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) de 100% da população cadastrada, com um máximo de 850 pessoas por ACSs e de 10 ACSs por Equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
9. O cancro mole é uma afecção de transmissão exclusivamente sexual caracterizada por lesões múltiplas (podendo ser única) e habitualmente dolorosas, mais frequentes no sexo masculino.
10. As recomendações atuais para o rastreamento do câncer de cólon e de reto incluem todas as pessoas acima dos 50 anos de idade, independentemente de apresentarem sintomas.
11. São recomendados testes que identificam os diferentes tipos de HPV na rotina clínica ou mesmo no rastreamento de pessoas assintomáticas com a finalidade de diagnosticar a infecção pelo HPV.
12. Sugere-se a verificação diária da pressão arterial até a primeira consulta médica de reavaliação do tratamento. Neste período, a pessoa deverá medir a pressão arterial, e o resultado da verificação, data e horário deverão ser anotados no prontuário do paciente ou no local indicado para registro do monitoramento.
13. O Agente Comunitário de Saúde pode e deve vistoriar sistematicamente os domicílios e peridomicílios para controle da dengue e, caso identifique criadouros de difícil acesso, ou se necessite da utilização de larvicida, deve-se realizar imediatamente a aplicação dele no criadouro identificado.
14. A oftalmia neonatal, definida como conjuntivite purulenta do recém-nascido, ocorre no primeiro mês de vida e pode levar à cegueira, especialmente quando causada pela *Neisseria gonorrhoeae*. Por isso a doença deve ser tratada imediatamente, para prevenir dano ocular.
15. O único tratamento preventivo do câncer gástrico é a ressecção completa do tumor. A mesma pode ser feita por via endoscópica ou por cirurgia.

16. Como a esquistossomose, em suas diversas formas clínicas, se assemelha a muitas outras doenças, o diagnóstico de certeza só é feito por meio de exames laboratoriais. A história do doente mais o fato de ser originário de (ou haver vivido em) região reconhecidamente endêmica orientam o diagnóstico.
17. Os primeiros sintomas do cancro mole - dor de cabeça, febre e fraqueza - aparecem de dois a 15 dias após o contágio. Depois, surgem pequenas e dolorosas feridas com pus nos órgãos genitais, que aumentam progressivamente de tamanho e profundidade.
18. É recomendado o tratamento concomitante de gonorreia e clamídia. Após o início do tratamento, não é necessário evitar relações sexuais, porém os parceiros devem receber o mesmo tratamento, preferencialmente em dose única.
19. A estratégia prioritária para o diagnóstico da infecção pelo HIV na atenção primária é a realização do teste rápido. A oferta do teste rápido é obrigatória no primeiro e terceiro trimestres do pré-natal e no momento do diagnóstico da tuberculose, porém ele também deve ser oferecido para qualquer pessoa com indicação para o exame.
20. Caso o Agente Comunitário de Saúde adquira casa própria fora da área geográfica de sua atuação, será mantida sua vinculação à mesma equipe de saúde da família em que esteja atuando, podendo ser remanejado, na forma de regulamento, para equipe atuante na área onde está localizada a casa adquirida.
21. A principal forma de transmissão do tracoma é a direta, de olho a olho, por intermédio das mãos contaminadas com secreção conjuntival de um indivíduo portador. Pode ocorrer também a transmissão indireta, por meio de objetos contaminados.
22. Em geral, o tratamento do câncer de pele não melanoma consiste na cirurgia para a retirada da lesão, que, independentemente do estágio em que se encontra, deve ser realizada em nível hospitalar.
23. É atribuição do Agente Comunitário de Saúde desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade.
24. O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão. O risco aumenta de acordo com a quantidade do consumo e a duração do tabagismo.
25. É necessário um cuidado especial para a busca ativa de crianças com contatos de adultos com tuberculose, uma vez que se trata de um grupo particularmente vulnerável; por isso a necessidade de buscar o caso índice, lembrando que, quanto maior a idade da criança, maior o risco de adoecimento por tuberculose.
26. A lambertura da pele íntegra oferece risco à transmissão do vírus da raiva, bem como a lambertura de mucosas também é grave porque elas são permeáveis ao vírus, mesmo quando intactas, e também porque as lamberturas, geralmente, abrangem áreas mais extensas.
27. Para confirmar o diagnóstico de câncer de próstata, é preciso fazer uma biópsia. Nesse exame, são retirados pedaços muito pequenos da próstata para serem analisados no laboratório. A biópsia é indicada caso seja encontrada alguma alteração no exame de PSA ou no toque retal.
28. A depender do cenário epidemiológico da Unidade Federada ou município, as autoridades locais devem definir se é necessário a recomendação de medidas coletivas de prevenção contra a Covid-19, tais como distanciamento físico e uso de máscaras, que devem ser alinhadas com as autoridades locais, a depender do perfil epidemiológico de cada Unidade Federada ou município.
29. O câncer de pulmão é geralmente suspeitado em pacientes com sintomas e sinais causados pelos efeitos locais ou sistêmicos do tumor, ou que mostram aspectos normais numa radiografia de tórax.
30. A transmissão da esquistossomose depende da presença do homem infectado, excretando ovos do helminto pelas fezes, e dos caramujos aquáticos, que atuam como hospedeiros definitivos, liberando larvas infectantes do verme nas coleções hídricas utilizadas pelos seres humanos.
31. O câncer de cólon está associado a maus hábitos alimentares e, por isso, uma alimentação saudável pode minimizar as chances de desenvolver um câncer. Entre suas principais causas, está uma dieta pobre em carnes vermelhas e gorduras e rica em fibras.
32. A mamografia é o único exame utilizado para rastreamento do câncer de mama, com capacidade de detectar lesões não palpáveis e causar impacto na mortalidade, sendo por isso o exame de imagem recomendado para o rastreamento do câncer de mama no Brasil.
33. O aleitamento materno ideal deve ocorrer desde a sala de parto até dois anos ou mais, exclusivo e em livre demanda até o 6º mês e complementado, a partir daí, com alimentação saudável e equilibrada.
34. O uso do rastreamento do câncer de próstata através da realização de exames de rotina (toque retal e dosagem de PSA) em homens sem sinais e sintomas sugestivos de câncer de próstata, como estratégia de saúde pública, não é recomendado, por existirem evidências científicas de que essa estratégia traga mais dano do que benefício.
35. É considerado como contato domiciliar de paciente com hanseníase toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido, conviva ou tenha convivido com o doente, no âmbito domiciliar, nos últimos cinco anos a partir do diagnóstico da doença, podendo ser familiar ou não.
36. Para o câncer de pele, sua identificação em fase bem inicial ou ainda de lesões pré-malignas, possibilita melhores resultados em seu tratamento, com maiores chances de cura e menores sequelas cirúrgicas.
37. Toda ação de educação popular em saúde necessita ser previamente planejada. O ato de planejar visa a estruturar e a otimizar o trabalho, com vistas a uma ação educativa qualificada.

38. O viajante que se desloca para áreas de transmissão de malária deve procurar orientação de prevenção antes da viagem e acessar o serviço de saúde, caso apresente sintomas de malária dentro de três meses após retornar de uma área de risco de transmissão da doença.
39. A transmissão da filariose ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito da espécie *Culex* com larvas infectantes do parasito.
40. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
41. As ações preventivas em saúde definem-se como intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações. A base do discurso preventivo é o conhecimento epidemiológico moderno.
42. A ocorrência de casos suspeitos de Doença de Chagas requer imediata notificação (até uma semana após a suspeição). A notificação deve ser prontamente informada às autoridades de saúde por profissionais da área de assistência, vigilância e pelos de laboratórios públicos e privados, via contato telefônico, fax, e-mail ou outras formas de comunicação.
43. A imunização para HPV é realizada por meio de vacina quadrivalente, estando indicada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. O esquema é composto de duas doses, com intervalo de seis meses.
44. O leite materno, após ser retirado do seio, pode ser armazenado para consumo do bebê ou doado para locais em que haja banco de leite humano. Caso contrário pode ser desprezado, já que, não havendo algum fator impeditivo, a mãe voltará a produzir leite, sem que haja prejuízo para o aleitamento.
45. A desnutrição leva a uma série de alterações na composição corporal e no funcionamento normal do organismo. Quanto mais grave for o caso, maiores e também mais graves serão as repercussões orgânicas.
46. As gestantes portadoras de herpes simples apresentam risco acrescido de complicações fetais e neonatais, sobretudo quando a infecção ocorre no final da gestação. O maior risco de transmissão do vírus acontece no momento da passagem do feto pelo canal de parto.
47. Diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia, mais severo que o diabetes tipo 1 e 2, detectado pela primeira vez na gravidez. Geralmente se resolve no período pós-parto e pode frequentemente retornar anos depois.
48. Recomenda-se profilaxia com antirretrovirais para todos os casos com risco significativo de transmissão do HIV. Entende-se como exposição com risco de transmissão quando há contato com materiais biológicos de alto risco, através de exposição percutânea, por contato com membranas mucosas (incluindo exposição sexual), por via cutânea envolvendo pele não íntegra ou por mordedura com presença de sangue.
49. O tratamento conservador do câncer de mama consiste na retirada total da mama, associada à radioterapia complementar pós ou pré-operatória.
50. Acidentes laboratoriais também podem transmitir a doença de Chagas devido ao contato com culturas de *Trypanosoma cruzi*, exposição às fezes de triatomíneos contaminadas ou sangue (de casos humanos ou de animais) contendo formas infectantes do parasito.
51. Após a infecção genital primária pelo herpes vírus, a maioria dos pacientes desenvolvem novos episódios nos primeiros 12 meses, por reativação viral. O quadro clínico das recorrências é mais intenso que o observado na primo-infecção.
52. A prevenção de incapacidades em hanseníase inclui um conjunto de medidas visando evitar a ocorrência de danos físicos, emocionais e socioeconômicos. A principal forma de prevenir as deficiências e as incapacidades físicas é o diagnóstico precoce.
53. Os profissionais da Atenção Básica têm importância primordial nas estratégias de prevenção, diagnóstico, monitorização e controle da hipertensão arterial. Devem também ter sempre em foco o princípio fundamental da prática centrada na pessoa e, conseqüentemente, envolver usuários e cuidadores, em nível individual e coletivo, na definição e implementação de estratégias de controle à hipertensão.
54. Hábitos de vida saudáveis são a base do tratamento do diabetes, sobre a qual pode ser acrescido – ou não – o tratamento farmacológico. Seus elementos fundamentais são manter uma alimentação adequada e a realização de atividade física regular, evitar o fumo e o excesso de álcool e estabelecer metas de controle de peso.
55. A vigilância sanitária das tecnologias de alimentos tem como objetivo o controle e a garantia de qualidade dos produtos alimentícios a serem consumidos pela população, atuando na fiscalização dos estabelecimentos que fabricam produtos alimentícios e naqueles que manipulam alimentos, verificando todo o processo de produção, métodos e técnicas empregadas até o consumo final.
56. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde, com exceção dos servidores em regime de tempo integral e dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.
57. A Atenção Básica deve ser o contato e a porta de entrada preferencial dos cidadãos no Sistema Único de Saúde, através do trabalho desenvolvido pelas Equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas.
58. A vacina da Hepatite B deve ser administrada nas primeiras 24 horas de vida, ainda na maternidade. Essa dose pode ser administrada até 30 dias após o nascimento.
59. A maioria das pessoas com sífilis são assintomáticas; quando apresentam sinais e sintomas, muitas vezes não os percebem ou valorizam, e podem, sem saber, transmitir a infecção às suas parcerias sexuais.
60. Um dos principais fatores de risco para o câncer de estômago é uma bactéria – *Helicobacter pylori* – que infecta metade da população mundial e, na maioria dos casos, não causa sintomas. Em alguns indivíduos, porém, essa bactéria causa úlcera e gastrite.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 61 a 80)

Julgue os itens a seguir.

61. Em um hospital, as quantidades de alimentos produzidas mensalmente de janeiro a março do ano anterior foram, respectivamente: 1.920 kg, 2.030 kg e 1.880 kg. Se, em abril, foram produzidos 1.910 kg de alimentos, então a média mensal de alimentos produzidos no 1º quadrimestre foi inferior à média do 1º trimestre daquele ano.
62. Todas as palavras oxítonas são acentuadas.
63. Os seguintes substantivos devem ser escritos com G, não com J: alavancagem, vagem, viagem.
64. De 2019 até 2022, o salário-mínimo passou de R\$ 998,00 para R\$ 1.212,00. Assim, pode-se afirmar que, nesse período, o salário-mínimo teve um aumento de 24,14%.
65. Na ortografia oficial, todas as palavras devem ser escritas de acordo com a pronúncia, sem levar em consideração as regras gramaticais.
66. As palavras paroxítonas terminadas em "l", "n" ou "r" não recebem acento gráfico.
67. Considere a seguinte sequência de dados: 19, 21, 21, 21, 23, 33. A análise dessa série de dados permite comprovar que a moda desse conjunto é maior que a média desses valores.
68. As palavras "pajé" e "crachá" são acentuadas devido à mesma regra de acentuação gráfica.
69. Em uma comunidade rural, ficou constatado que alguns indivíduos contrairam determinada virose. As idades, em anos, dos pacientes são, respectivamente: 12, 7, 7, 3, 7, 11. Dada essa informação, pode-se afirmar que a moda da série de dados apresentada é igual a 8 anos.
70. Nos últimos 30 dias, uma clínica registrou uma média de 29 pacientes atendidos por dia. Com base nesses dados, é correto afirmar que todos os dias desse período houve, no mínimo, 29 pacientes e, no máximo, 34 pacientes atendidos diariamente.
71. São palavras homônimas: cela (cômodo pequeno) e sela (de cavalos).
72. Ao longo de 2 dias, um paciente teve sua temperatura aferida sete vezes, resultando nos seguintes valores, respectivamente: 36°C, 36°C, 36°C, 36°C, 35°C, 37°C e 36°C. Com base nessas informações, é correto afirmar que a média dessa série é igual à sua mediana.

73. Os preços de um determinado medicamento em quatro diferentes farmácias são, respectivamente: R\$ 32,00, R\$ 19,10, R\$ 41,80, R\$ 8,20. Assim, é correto afirmar que o preço médio desse medicamento é superior a R\$ 25,00.
74. Em janeiro de 2022, a renda mensal de uma família era de R\$ 433,00. Em janeiro de 2023, a renda mensal dessa mesma família foi de R\$ 408,00. Assim, é correto afirmar que, no período considerado, a renda dessa família decaiu mais de 4,9%.
75. O resultado da multiplicação de 5% por 5% é menor do que a soma de 5% mais 5%.
76. No Brasil, o H é utilizado no final de algumas interjeições: Ah!, Oh!, Uh!.
77. As idades, em anos, dos netos de uma mesma família são, respectivamente: 3, 7, 2, 1, 9, 33, 12, 17 e 28. Observados esses dados, é correto afirmar que a mediana dessa série é menor que 12.

Texto para as questões de 78 a 80

SAÚDE MENTAL

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde não se resume apenas à ausência de doença, mas sim ao estado de completo bem-estar físico, mental e social. No entanto, essa definição pode parecer utópica, já que raramente nos sentimos plenamente saudáveis, especialmente em relação à saúde mental. Apesar disso, podemos buscar o equilíbrio e a harmonia entre corpo e mente, o que nos permite sentir saudáveis. É importante destacar que a saúde mental e o bem-estar físico estão diretamente relacionados, de modo que, quando nosso corpo está desestabilizado, é pouco provável que estejamos psicologicamente bem.

Após ler o texto "SAÚDE MENTAL", analise e julgue os itens de 78 a 80:

78. O texto afirma que o conceito de saúde, à luz da OMS, compreende exclusivamente a ausência de doença no ser humano.
79. O texto estabelece uma relação de causalidade entre sentir-se saudável e a busca pelo que o autor denominou de equilíbrio e harmonia entre o corpo e a mente.
80. O autor do texto defende que a visão da OMS sobre o conceito de saúde é realista e viável, pois as vacinas e o acesso aos novos medicamentos melhoram a qualidade de vida dos indivíduos.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO