

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01 para as questões de 01 a 08.

Chegar com alegria ao fim da vida depende de uma série de fatores, mas poucos são mais significativos do que a qualidade das relações humanas que desenvolvemos ao longo da nossa existência.

Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos satisfatórios protegem não só a saúde física mas também o cérebro. As perdas cognitivas foram muito menores entre os participantes que tinham vínculos fortes com a família, os amigos e a comunidade. Ao buscar resposta para uma pergunta complexa – “Aos 50 anos é possível determinar fatores preditivos da boa saúde aos 80? –, os pesquisadores novamente se depararam com as relações humanas. O nível de satisfação nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo para a saúde do que, por exemplo, as taxas de colesterol. “As pessoas que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as mais saudáveis aos 80”, informa Waldinger. No outro extremo, o estudo mostrou que a solidão é tão letal quanto o tabagismo e o alcoolismo.

ARANTES, Ana Claudia Quintana. *Pra vida toda valer a pena viver*. Sextante. 2021.págs. 56-58. (Adaptado).

01. Segundo o texto 01,

- A) todo relacionamento protege a saúde física.
- B) a qualidade das relações humanas favorece um final de vida feliz.
- C) muito poucos são os fatores que determinam uma vida com qualidade.
- D) bons relacionamentos têm pouca interferência na saúde mental do indivíduo.
- E) pessoas que vivem em solidão apresentam irrelevantes problemas de saúde.

02. No tocante à Acentuação, analise os itens abaixo, observando os termos neles destacados em maiúscula.

- I. “...depende de uma ‘SÉRIE de fatores, mas poucos são mais significativos...”
- II. “Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos SATISFATÓRIOS...”
- III. “...não apenas a saúde física mas também o CÉREBRO.”
- IV. “...entre os participantes que tinham VÍNCULOS fortes com a família...”
- V. “Aos 50 anos é POSSÍVEL determinar fatores preditivos...”
- VI. “O NÍVEL de satisfação nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo...”

Assinale a alternativa que apresenta uma declaração INCORRETA.

- A) Os termos destacados nos itens I e II obedecem à mesma regra de acentuação.
- B) Os termos destacados nos itens III e IV obedecem à mesma regra de acentuação.
- C) Apenas no item I o termo destacado é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo crescente.
- D) Os termos destacados nos itens V e VI seguem a mesma regra de acentuação.
- E) O acento do termo destacado no item III se justifica por ser uma proparoxítona.

03. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Chegar com alegria ao fim da vida depende de uma série de fatores, MAS poucos são mais significativos...”

Sobre o termo destacado em maiúscula, é CORRETO afirmar que

- A) no fragmento acima, pode ser substituído pelo conectivo “porque”, sem causar prejuízo ao sentido original do texto.
- B) liga orações estabelecendo entre elas uma ideia de adição.
- C) poderia, no fragmento acima, ser substituído pelo conectivo “portanto”, e isso não acarretaria prejuízo ao sentido original do texto.
- D) liga orações estabelecendo entre elas uma ideia de conclusão.
- E) poderia, no fragmento acima, ser substituído pelo conectivo “no entanto” e o sentido original seria preservado.

04. No que concerne à Regência Verbal, observe os itens abaixo:

- I.** “Chegar com alegria ao fim da vida DEPENDE de uma série de fatores...” – o verbo destacado em maiúscula exige complemento regido de preposição.
- II.** “...que relacionamentos satisfatórios PROTEGEM não apenas a saúde física mas também o cérebro.- os complementos do verbo destacado em maiúscula vêm precedidos de preposição.
- III.** “...os pesquisadores novamente se DEPARARAM com as relações humanas.”- o verbo destacado em maiúscula exige complemento regido de preposição.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, apenas.
 B) I e II, apenas.
 C) II, apenas.
 D) I e III, apenas.
 E) I, II e III.

05. Assinale a alternativa cujo termo destacado em maiúscula está INCORRETAMENTE classificado em parênteses.

- A) “...mas POUCOS são mais significativos do que a qualidade das relações humanas...” (advérbio de intensidade)
 B) “Ao buscar resposta PARA uma pergunta complexa...” (preposição)
 C) “...era mais decisivo para a saúde do que, por exemplo, as taxas de COLESTEROL.” (substantivo)
 D) “...que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as MAIS saudáveis aos 80.” (advérbio de intensidade)
 E) “...o estudo mostrou que a solidão é tão LETAL...” (adjetivo)

06. Observe os itens abaixo:

- I.** “...mostrou que relacionamentos satisfatórios PROTEGEM não apenas a saúde física...” – como o termo destacado, escreve-se também “fuligem”.
- II.** “...do que, por exemplo, as TAXAS de colesterol...” – como o termo destacado, escreve-se também “faxada”.
- III.** “Aos 50 anos é POSSÍVEL determinar fatores preditivos da boa saúde aos 80?” – grafa-se também como o termo destacado “assíduo”
- IV.** “...os PESQUISADORES novamente se depararam com as relações humanas.” – como o termo destacado, escreve-se também “paralisar”;
- V.** “O nível de SATISFAÇÃO nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo para a saúde.” – como termo destacado, grafa-se também “intenção”.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) III e V, apenas.
 B) I, III, IV e V, apenas.
 C) I e V, apenas.
 D) II, IV e V, apenas.
 E) I, II, III, IV e V.

07. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos satisfatórios protegem não só a saúde física mas também o cérebro.”

Sobre esse fragmento, é CORRETO afirmar que

- A) nele existem apenas duas orações, uma principal e a outra subordinada adverbial.
 B) nele existem três orações, sendo uma delas subordinada adverbial que exprime circunstância de causalidade.
 C) o conectivo “não só ...mas também” liga orações estabelecendo entre elas uma relação de oposição.
 D) “um estudo realizado em Harvard” inicia o período e se classifica como oração principal.
 E) as orações que compõem o período são assindéticas.

08. Observe o fragmento de texto abaixo:

“...os PESQUISADORES novamente se depararam com as relações humanas.”

Se o termo destacado em maiúscula estivesse no singular, mantendo-se o tempo verbal, estaria CORRETO o que se indica na alternativa

- A) O pesquisador novamente se depararia com as relações humanas.
- B) O pesquisador novamente se deparou com as relações humanas.
- C) O pesquisador novamente se depara com as relações humanas.
- D) Se o pesquisador novamente se deparasse com as relações humanas.
- E) Quando o pesquisador novamente se deparar com as relações humanas.

09. Observe os itens abaixo:

- I. “O aprendizado é uma chuva de rejuvenescimento para o cérebro”. Ana Claudia Quintana Arantes
- II. “Talvez fosse mais sábio compreender esse processo participando das decisões em vez de apenas ser uma vítima do tempo”. Ana Claudia Quintana Arantes
- III. “Quanto melhor se conhece o particular, mais se necessita do geral”. Jacques Houli

Em que item (itens), existe linguagem conotativa?

- A) Em todos.
- B) Apenas no II.
- C) Apenas no I.
- D) Apenas no III.
- E) Apenas no II e III.

Texto 02 para as questões de 10 a 16.**REFLEXÃO SOBRE O ENVELHECER**

As queixas de memória em pacientes idosos são mais insistentes em população que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas. Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidos com problemas cognitivos do que o contrário. Essa população convive com gerações diferentes, separadas por famílias e lares distintos e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si. A companhia do cônjuge de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa sob a submissão dos irmãos e filhos. A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.

Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade, embora, mesmo assim, a escolaridade não interfira na convivência do idoso com os parentes no entendimento do envelhecer, dificilmente havendo rejeição. É comum, ainda, hoje, viver mais de duas gerações em uma mesma casa: avós, filhos e netos. A convivência com o idoso é normal dentro de um contexto cultural e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece os parentes próximos e deles depende para as necessidades básicas de sobrevivência.

MARQUES, Paulo Roberto de Brito. *A Arte em conviver com a doença de Alzheimer*. EDUPE. 2006. p.38-39

10. Sobre o texto 02, assinale a alternativa que expressa uma mensagem que NÃO está nele revelada.

- A) Nas grandes cidades, existe um maior número de idosos que apresentam queixa de memória.
- B) Idosos com menos de 3 anos de escolaridade apresentam menos chances de demenciar.
- C) Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais propensos a apresentar problemas de cognição.
- D) A escolaridade não prejudica a convivência do idoso com os parentes em relação ao entendimento acerca do envelhecimento.
- E) Considera-se demente a pessoa que não reconhece os parentes próximos, deles dependendo para realizar as necessidades básicas de sobrevivência.

11. Observe os itens abaixo:

- I. “As queixas de memória em pacientes idosos são mais insistentes em população que vive nas grandes cidades.” As queixas de memória em pacientes idosos são mais frequentes em população que habita as grandes cidades.
- II. “A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.” Sem o cônjuge, a convivência do dependente se sente prejudicada, e um lar estranho ou a casa de um parente é a triste alternativa.

III. “Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade, embora, mesmo assim, a escolaridade não interfira na convivência do idoso com os parentes no entendimento do envelhecer, dificilmente havendo rejeição.” Com menos de 3 anos de escolaridade, afigura-se menor a tendência de os idosos apresentarem demência, comparados aos com maior escolaridade. Apesar disso, a escolaridade pouco prejudica a convivência do idoso com os parentes quando se trata do envelhecimento, existindo, com uma certa frequência, rejeições.

Em que item (itens) as duas frases expressam a mesma mensagem?

- A) I e II, apenas.
 B) II, apenas.
 C) II e III, apenas.
 D) I e III, apenas.
 E) I, II e III.

12. Assinale a alternativa que apresenta uma INCORREÇÃO no tocante à Concordância.

- A) “...que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas.” - estaria também correta a seguinte construção : que vive nas grandes cidades, com múltiplos demandas e estímulos.
 B) “Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidos com problemas cognitivos do que o contrário.” - se o termo “idosos” estivesse no feminino, estaria também correta a construção: Idosas com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidas com problemas cognitivos do que o contrário.
 C) “Essa população convive com gerações diferentes, SEPARADAS por famílias e lares distintos e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si.” - o termo em maiúscula concorda com o termo a que se refere, “famílias”.
 D) “...e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.” se o termo “alternativa” fosse substituído por “caminho”, estaria correto trecho: e um lar estranho ou a casa de um parente é o lúgubre caminho.
 E) “e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece os parentes próximos...” - se o termo “pessoa” estivesse no plural, estaria correta a construção: e, quando as pessoas idosas tornam-se dementes, é porque não reconhecem os parentes próximos.

13. No que concerne à Pontuação, analise os itens abaixo:

- I.** “...população que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas.” – a vírgula separa elementos de mesma função sintática.
II. “e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si.” – poderia ser retirada a vírgula após o termo “lar”, e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais de pontuação.
III. “A companhia do cônjuge de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa sob a submissão dos irmãos e filhos.” – poderia haver uma vírgula após o termo “alternativa”, e isso não seria considerado uma incorreção no que se refere às normas gramaticais de pontuação.
IV. “...e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece...” – neste caso, as vírgulas são facultativas.
V. “Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade.” – poderia haver uma vírgula após o verbo “demenciar”, e isso não caracterizaria desobediência aos padrões gramaticais vigentes de pontuação.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I e III, apenas.
 B) II, III e IV, apenas.
 C) III, apenas.
 D) I, apenas.
 E) II e V, apenas.

14. Em que alternativa os termos destacados em maiúscula estão sintaticamente classificados de forma CORRETA entre parênteses?

- A) “As queixas de memória em pacientes idosos são MAIS INSISTENTES...” (objeto direto)
 B) “que vive NAS GRANDES CIDADES, com múltiplos estímulos e demandas...” (objeto indireto)
 C) “Essa população convive COM GERAÇÕES DIFERENTES...” (complemento nominal.)
 D) “...dificilmente havendo REJEIÇÃO.” (sujeito)
 E) “...é porque não reconhece OS PARENTES PRÓXIMOS...” (objeto direto)

15. Observe os termos destacados em maiúscula e classifique-os numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.

1. Substantivo	()	“As queixas de memória em pacientes idosos são mais INSISTENTES...”
2. Adjetivo	()	“Idosos com baixa escolaridade E sexo feminino são mais atingidos...”
3. Conjunção	()	“Essa população convive com gerações diferentes, separadas POR famílias e lares distintos...”
4. Preposição	()	A companhia do CÔNJUGE de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa...”
5. Pronome	()	“...têm mais propensão a DEMENCIAR do que os com maior escolaridade...”
6. Verbo	()	“...cada qual cuida de SI.”

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) 2/4/3/1/6/5
 B) 2/3/4/6/1/5
 C) 1/3/4/2/6/5
 D) 1/3/4/2/5/6
 E) 2/3/4/1/6/5

16. Observe o trecho abaixo:

“A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.”

Sobre esse trecho, é CORRETO afirmar que

- A) se trata de um período composto por orações coordenadas assindéticas.
 B) nele existem 3 orações, sendo uma principal e duas subordinadas.
 C) se trata de um período composto por coordenação.
 D) nele, a oração “e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa” é introduzida por um conectivo que liga orações estabelecendo uma relação de oposição.
 E) a oração “A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente..” é classificada como oração principal.

17. Leia o trecho abaixo:

Uma pessoa pode ter uma infância triste e mesmo assim chegar a ser muito feliz na maturidade... Da mesma forma pode nascer num berço de ouro e sentir-se enjaulada pelo resto da vida. (Charles Chaplin)

Sobre esse trecho, Chaplin se utilizou, em algum momento, de uma linguagem conotativa. Assinale a alternativa que apresenta um termo que indica conotação.

- A) Infância.
 B) Maturidade.
 C) Berço.
 D) Enjaulada.
 E) Resto.

18. Sobre as Funções da Linguagem, analise o texto abaixo:

“Os médicos recomendam uma alimentação saudável e a realização de exercício físico diário.”

Trata-se de um texto cuja linguagem tem a função

- A) expressiva ou emotiva.
 B) conativa ou apelativa.
 C) poética.
 D) referencial ou denotativa.
 E) fática.

19. Observe o texto abaixo:

Algoritmo
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Algoritmo</u> • Exemplo: receita de pão - Obter os ingredientes - Misturar os ingredientes - Aguardar o crescimento da massa - colocar no forno por 35 minutos - Retirar do forno

Trata-se de um texto

- A) Injuntivo. B) Descritivo. C) Dissertativo. D) Narrativo. E) Expositivo.

Texto 03 para a questão 20.

<p>“Vós, que sofreis, porque amais, amai ainda mais. Morrer de amor é viver dele.” Victor Hugo. Disponível em https://www.pensador.com/frases_sobre_a_vida/ Acesso em 28 de março de 2023.</p>
--

Se o sujeito fosse permutado para “tu”, estaria **CORRETO** o que se indica na alternativa

- A) Tu que sofrestes, porque amastes, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
 B) Tu que sofres, porque amas, ama ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
 C) Tu que sofrerás, porque amareis, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
 D) Tu que sofres, porque amastes, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
 E) Tu que sofrias, porque amáveis, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.

CONHECIMENTOS DO SUS

21. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. No processo histórico de implantação, com a expansão do antigo Programa Saúde da Família (PSF), que se consolidou como a estratégia prioritária para reorganização da atenção, foi enunciado como ESF na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) no ano de

- A) 1991. B) 1994. C) 1998. D) 2002. E) 2006.

22. De acordo com a PORTARIA GM/MS Nº 3.418, DE 31 DE AGOSTO DE 2022, que consolida a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|--|
| <p>I. Doença de Creutzfeldt-Jakob
 II. Toxoplasmose congênita
 III. Violência doméstica
 IV. Leptospirose
 V. Óbito infantil</p> |
|--|

Assinale a alternativa em que são consideradas as doenças e agravos de notificação SEMANAL.

- A) Todos os itens estão corretos.
 B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
 C) Existem, apenas, três itens corretos.
 D) Existem, apenas, dois itens corretos.
 E) Existe, apenas, um item correto.

23. As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. O Estado de Pernambuco foi pioneiro na criação do plano estadual específico para o enfrentamento das doenças negligenciadas (Programa Sanar), considerado o berço de importantes nomes históricos da luta contra a fome e a pobreza.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|----------------------|
| I. Filariose |
| II. Tuberculose |
| III. Esquistossomose |
| IV. Ascaridíase |
| V. Tracoma |

Assinale a alternativa em que são consideradas as doenças negligenciadas no Estado de Pernambuco.

- A) Todos os itens estão corretos.
B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
C) Existem, apenas, três itens corretos.
D) Existem, apenas, dois itens corretos.
E) Existe, apenas, um item correto.

24. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituída pela PORTARIA Nº 1.823, DE AGOSTO DE 2012, tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|----------------------|
| I. Universalidade |
| II. Integralidade |
| III. Equidade |
| IV. Prevenção |
| V. Seguridade social |

Assinale a alternativa em que são considerados os princípios e diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

- A) Todos os itens estão corretos.
B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
C) Existem, apenas, três itens corretos.
D) Existem, apenas, dois itens corretos.
E) Existe, apenas, um item correto.

25. Em 1988, a Constituição Federal definiu a saúde como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado, criando o Sistema Único de Saúde (SUS). Posteriormente, o SUS também foi regulamentado pela Lei no 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre

- A) a vigilância epidemiológica.
B) a gestão participativa no SUS.
C) as comissões intergestores Tripartite.
D) a Norma Operacional Básica do SUS.
E) a complementariedade dos serviços privados.

26. O Ministério da Saúde através dos Módulos da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, demonstram que aproximadamente 1 milhão de pessoas afirmaram ter diagnóstico médico de Infecção Sexualmente Transmissível (IST) ao longo do ano, o que corresponde a 0,6% da população com 18 anos de idade ou mais.

Sobre o Linfogranuloma Venéreo, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A fase terciária caracteriza-se por adenite inguinal, geralmente unilateral, firme e pouco dolorosa (bubão), que pode ser acompanhada de febre e mal-estar.
B) Possui como agente etiológico a *Klebsiella granulomatis*, dos sorotipos L1 e L2.
C) No Brasil, é caracterizada como uma doença de notificação compulsória.
D) Possui período de incubação de 1 a 3 semanas após o contato sexual.
E) Tem como tratamento de primeira escolha a Doxiciclina 100mg, via oral, a cada 12h, por no mínimo 7 dias.

27. A promoção da saúde vem sendo discutida desde o processo de redemocratização do Brasil, e a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), em seu processo de implementação nas várias esferas de gestão do SUS, vem para provocar mudanças nos modos de gestão do trabalho em saúde. Sobre a PNPS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tem como uma de suas diretrizes o estímulo à cooperação e à articulação intrasetorial e intersetorial para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde.
- B) Tem como objetivo geral promover processos de educação, de formação profissional e de capacitação específicos em promoção da saúde, de acordo com os princípios e os valores expressos nesta Política, para trabalhadores, gestores e cidadãos.
- C) Foi aprovada em 2006, pela Portaria nº 687 e propôs mudanças no trabalho em saúde, com vistas a promover a saúde e a qualidade de vida.
- D) Foi reformulada em 2014 pela Portaria nº 2.446, dialogando com as reflexões dos movimentos no âmbito da promoção da saúde e visando auxiliar na promoção da qualidade de vida da população brasileira.
- E) Está em conformidade com a Declaração de Adelaide (2010) e com a Declaração de Helsinque sobre Saúde em Todas as Políticas (2013).

28. Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e organização da assistência à saúde no Brasil. Dentre os princípios do SUS, temos um que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades, com a integração de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- A) Universalidade
- B) Controle social
- C) Resolubilidade
- D) Integralidade
- E) Equidade

29. A Lei 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, foi um marco na regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Assinale a alternativa que NÃO está descrita na Lei Orgânica da Saúde.

- A) Princípios e Diretrizes do SUS
- B) Complementariedade do setor privado
- C) Controle social
- D) Financiamento do SUS
- E) Comissões intersetoriais

30. A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria Nº 2.436 em 2017, estabeleceu a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa que NÃO foi descrita como equipe de Atenção Básica para Populações Específicas desta Política.

- A) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR)
- B) Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF)
- C) Equipe Multiprofissional de Saúde Indígena (eMSI)
- D) Equipe de Consultório na Rua (eCR)
- E) Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP)

31. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) propõe por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Assinale a alternativa que corresponde a um princípio da PNH.

- A) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- B) Clínica ampliada e compartilhada.
- C) Valorização do Trabalhador.
- D) Acolhimento.
- E) Ambiência.

32. No Brasil, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado na década de 90, com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos ocorridos em todo o território nacional e fornecer informações sobre natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde.

Assinale a alternativa que corresponde ao documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional e essencial à coleta de dados de nascidos vivos.

- A) Certidão de Nascimento.
- B) Ficha de notificação individual.
- C) Autorização de Internação Hospitalar.
- D) Declaração de nascidos vivos.
- E) Nenhuma das alternativas.

33. Os Determinantes Sociais da Saúde abordam o contexto social e o modo como as condições sociais se expressam nas desigualdades, iniquidades e os resultados na saúde. Um dos modelos utilizados pela Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde é o modelo de Dahlgren e Whitehead, organizado em 5 níveis de camadas.

Sobre o modelo de Dahlgren e Whitehead, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O primeiro nível representa o âmbito individual; consideram-se algumas características, como idade, gênero e fatores genéticos que influenciam a saúde do indivíduo.
- B) O segundo nível representa o comportamento e os estilos de vida individuais.
- C) O terceiro nível destaca a influência das redes comunitárias e de apoio, cuja maior ou menor riqueza expressa o nível de coesão social.
- D) No quarto nível, estão representados os fatores relacionados a condições de vida e de trabalho.
- E) O quinto nível aponta os microdeterminantes relacionados às condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade.

34. No Brasil, a Leptospirose é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos principalmente nas capitais e áreas metropolitanas.

Sobre a Leptospirose, analise os itens abaixo:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. Possui duas fases evolutivas: fase precoce (fase leptospirêmica) e fase tardia (fase imune).II. A icterícia rubínica é um sinal característico e geralmente aparece entre o 3º e o 7º dia da doença.III. Tem como agente etiológico a Bactéria helicoidal (espiroqueta) aeróbica obrigatória do gênero <i>Leptospira</i>.IV. Tem período de incubação de 1 a 30 dias (em média, de 5 e 14 dias).V. É doença de notificação compulsória no Brasil. |
|--|

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

35. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) foi instituída em 2002, compatibilizando as determinações das Leis Orgânicas da Saúde com as da Constituição Federal, que reconhecem aos povos indígenas suas especificidades étnicas e culturais e seus direitos territoriais.

Sobre a PNASPI, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A rede de serviços tem como base de organização serviços de saúde nas aldeias que contam com a atuação do Agente Indígena de Saúde com atividades vinculadas a um posto de saúde.
- B) Os Polos-Base se constituem na primeira referência para o Agente Indígena de Saúde que atua nas aldeias.
- C) As Casas de Saúde do Índio (Casais) são locais de recepção e apoio ao índio, que vem referenciado da aldeia/Polo-Base.
- D) Existem três tipos de Polo-Base: tipo I, II e III.
- E) O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é a unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36. Paciente em atendimento ambulatorial, de 55 anos, hipertenso, diabético, refere que perdeu o seguimento com seu médico, que há 2 anos não vai a nenhum tipo de consulta de rotina. Sem antecedente anterior de doença cardiovascular significativa. Faz uso de hidroclorotiazida 25mg/dia , aspirina 100mg/dia e glimepirida 2mg/dia. Ao exame físico, ausculta pulmonar normal, bulhas normofonéticas, pressão arterial de 190 x 110 mmhg. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Devemos solicitar o escore de cálcio do paciente para estratificação da necessidade ou não de teste indutor de isquemia miocárdica para pesquisa de isquemia silenciosa.
- B) O uso da aspirina para prevenção primária deve ser questionado, explicando ao paciente que atualmente não se tem evidência do uso desta neste cenário, ainda que o paciente seja hipertenso e diabético.
- C) O tratamento anti-hipertensivo precisa ser otimizado, tanto por não estar sendo atingido a meta terapêutica e por termos melhores opções de classes para pacientes diabéticos.
- D) Devemos buscar níveis mais baixos de LDL colesterol para ele, com necessidade de estatina de alta potência e, eventualmente, ezetimibe, se as metas não forem alcançadas.
- E) A busca ativa por alterações do sono, sintomas depressivos, atualização de cartão vacinal, distúrbios da sexualidade, diminuição do sedentarismo e dieta adequada são parte fundamental da consulta ambulatorial frequentemente negligenciada.

37. Paciente de 45 anos, tabagista, chega à emergência com precordialgia típica, iniciada há 4 horas. Eletrocardiograma mostrando supra desnivelamento do segmento ST inferior. Ao exame físico, paciente bradicárdico, com pressão arterial de 70 x 40 mmHG, e sinais de baixa perfusão sistêmica. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Recomenda-se realizar as derivações V3r e V4r para diagnóstico do infarto do ventrículo direito.
- B) A bradicardia apresentada deve-se, provavelmente, ao acometimento da artéria coronária direita, que dá origem a artérias como a do nó sinusal e a artéria do nó atrioventricular.
- C) Não é necessário esperar o resultado de troponina para definir a conduta imediata desse paciente, que é indicar o cateterismo cardíaco de emergência.
- D) O resultado esperado do cateterismo para este paciente é uma oclusão da artéria coronária direita, que deve ser aberta imediatamente . Também tem indicação de intervenção, no mesmo procedimento, demais artérias que apresentem lesões severas ou suboclusivas.
- E) O uso do trombolítico deve ficar restrito na impossibilidade da realização do cateterismo em até 2 horas (“tempo porta-stent”> 120 min)

38. Paciente de 40 anos, com diagnóstico prévio de febre reumática, internado com quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Exame físico com sinais de disfunção do ventrículo esquerdo e direito. O ecocardiograma mostra estenose mitral severa, com insuficiência mitral também importante, com fração de ejeção de 40%, além de insuficiência tricúspide moderada, com anel tricúspide de 46mm. Qual a conduta indicada para esse caso?

- A) Plastia da valva mitral e troca valvar tricúspide
- B) Plastia da valva mitral e plastia valvar tricúspide
- C) Troca da valva mitral isoladamente
- D) Plastia da valva mitral isoladamente
- E) Troca valvar mitral e plastia valvar tricúspide

39. Paciente com diagnóstico prévio de insuficiência cardíaca por valvopatia aórtica, portador de prótese metálica, é submetido à nova troca valvar aórtica por endocardite infecciosa. No segundo dia pós-operatório, o paciente apresenta-se com náuseas, vômitos, acidose metabólica e desorientação, com hiponatremia e níveis glicêmicos normais, que são inicialmente atribuídas a possível infecção associada. Durante o pré-operatório, qual das seguintes drogas deveria ter sido suspensa e que pode ser a responsável pelo quadro clínico do paciente?

- A) Dapaglifozina
- B) Levotiroxina
- C) Espironolactona
- D) Insulina glargina
- E) Sacubitril-valsartana

40. Paciente masculino, 37 anos de idade, admitido na UTI-B com queixa de dor torácica. Relatava dor precordial típica com comemorativos clínicos evidentes e dispneia em repouso. Informava que a dor teve início há dois dias, com períodos de acalmia e exacerbação. A história pregressa apenas revelou quadro de dor abdominal associada à gastroenterite na semana anterior. Ao exame clínico, apresentava-se corado, hidratado, cooperativo, TA=37,2°C sem déficits e sem estase sistêmica. PA= 137/74 mmHg. FC=100 bpm. A ausculta cardíaca, bulhas rítmicas, hipofonese de B1 e B3 em esboço. A ausculta respiratória, murmúrio vesicular diminuído, com crepitações basais bilaterais. Abdome livre. Sem edemas. Os exames complementares revelaram: radiografia de tórax com área cardíaca aumentada e sinais de cefalização do fluxo pulmonar. ECG de admissão: ritmo sinusal regular, supra de ST em D2, D3, avF, V4 a V8. Troponina elevada. A associação da clínica do paciente com dor precordial importante, alteração eletrocardiográfica e evidência de injúria miocárdica levou à hipótese de se tratar de infarto agudo do miocárdio. Foi realizado cateterismo, que revelou coronárias normais. Na sequência, realizou uma cardiorressonância magnética, que revelou áreas múltiplas de edema, além de realce tardio mesocárdico.

Qual a principal hipótese diagnóstica deste caso?

- A) Síndrome de Takotsubo
- B) Amiloidose cardíaca
- C) Miocardite
- D) Vasculite com trombose de coronárias
- E) Angina vasoespástica por uso de drogas ilícitas

41. O neurologista solicita uma avaliação cardiológica para um paciente de 75 anos internado com quadro de acidente vascular cerebral isquêmico. Na revisão da história, há descrição de palpitações ocasionais, que melhoravam com o repouso, e tabagismo.

Durante a internação na UTI tinha sido flagrado flutter atrial. Assinale a alternativa INCORRETA para este caso.

- A) A avaliação por ecotransesofágico é necessária para excluir trombo de auriculeta esquerda ou forâmen oval patente com potencial indicação de fechamento.
- B) A avaliação com holter não se faz necessária.
- C) O ecocardiograma transtorácico faz parte da propedêutica para este paciente, pois pode revelar cardiopatias estruturais responsáveis pelo aparecimento de arritmias.
- D) Os anticoagulantes orais diretos podem ser iniciados imediatamente após liberação da equipe de neurologia.
- E) Não há indicação de pesquisa de trombofilias.

42. Paciente internado na enfermaria de clínica médica, em tratamento quimioterápico para leucemia mielóide aguda, renal crônico em diálise, quando desenvolve subitamente dispneia e dor torácica. Paciente, então, é monitorizado, com queda de saturação e taquicardia sinusal, com pressão de 100 x 60 mmHG, sem sinais de baixa perfusão. Chama a atenção nos exames laboratoriais do dia a hemoglobina de 8,0 g/dL e plaquetopenia de 22000.

Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Paciente com alta probabilidade para tromboembolismo pulmonar, iniciar enoxaparina em dose plena, antes mesmo da tomografia do tórax.
- B) Não devemos solicitar d-dímero.
- C) O ecocardiograma pode fornecer importantes dados para definição etiológica da dispneia.
- D) Caso se confirme o diagnóstico de embolia pulmonar, não podemos usar a rivaroxabana como anticoagulante oral.
- E) Só devemos indicar a passagem do filtro de veia cava, se confirmarmos o diagnóstico de embolia pulmonar.

43. "Um sinal indireto de aumento _____ é o sinal de Peñaloza-Tranchesi, quando ocorre um aumento importante da amplitude do QRS em V2 em relação ao V1".

Qual alternativa preenche CORRETAMENTE a sentença?

- A) Atrial esquerdo
- B) Atrial direito
- C) Ventricular esquerdo
- D) Ventricular direito
- E) Septal interventricular

44. Qual dos achados eletrocardiográficos a seguir NÃO é caracteristicamente encontrado nos pacientes portadores de pericardite?

- A) Supradesnívelamento do segmento ST
- B) Infradesnívelamento do segmento PR
- C) Achatamento de onda T
- D) Inversão difusa da onda T
- E) Onda U

45. Paciente em pós-operatório de cirurgia de troca valvar mitral desenvolve importante quadro de hipotensão, sem resposta a volume e noradrenalina. Após leitura dos dados obtidos por cateter de Swan-Ganz, é levantada a hipótese de síndrome vasoplégica. Para esse caso, a droga a ser considerada a seguir para tentativa de reversão do caso é

- A) Azul de Metileno.
- B) Levosimendám.
- C) Dobutamina.
- D) Vasopressina.
- E) Corticosteroide.

46. Paciente em investigação de precordialgia recebe indicação de realização de cateterismo cardíaco. Qual das seguintes medidas NÃO faz parte dos protocolos de prevenção da nefropatia por contraste?

- A) Evitar desidratação e suspender medicações nefrotóxicas, como antiinflamatórios
- B) Dar preferência aos contrastes de alta osmolalidade
- C) Administração de solução salina isotônica
- D) Administração de solução de bicarbonato de sódio como alternativa a solução salina isotônica
- E) Identificação de pacientes de alto risco pra desenvolver a patologia, como os parentes renais crônicas, portadores de insuficiência cardíaca, diabetes ou doenças oncológicas

47. Sobre o manejo terapêutico dos pacientes com diagnóstico de doença de Chagas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O bloqueio neurohormonal está indicado para o tratamento de pacientes mesmo assintomáticos, com fração de ejeção reduzida, para reduzir o risco de progressão da insuficiência cardíaca.
- B) Pacientes com disfunção do nó sinusal sintomáticos tem indicação de implante de marcapasso definitivo.
- C) Pacientes sobreviventes de morte súbita cardíaca tem indicação de implante de cardiodesfibrilador implantável.
- D) Paciente com taquicardia ventricular sustentada tem como terapia de primeira linha ablação por cateter.
- E) O cardiodesfibrilador implantável pode ser considerado como terapia de prevenção primária para pacientes com fração de ejeção abaixo de 35%, escore de RASSI acima de 10 e expectativa de vida acima de um ano.

48. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a doenças cardíacas atribuídas ao vírus HIV.

- A) O advento do tratamento diminuiu a incidência de tumores cardíacos atribuídos ao HIV, a saber o sarcoma de Kaposi, assim como quadros de miocardite e pericardite.
- B) A disfunção autonômica está presente, com predomínio do sistema simpático, o que pode levar a aumento de incidência de arritmias ventriculares malignas.
- C) Pacientes com HIV tem, paradoxalmente, menor risco de eventos tromboembólicos venosos que a população geral, apesar de níveis mais elevados de dímero e marcadores de desregulação dos sistemas de coagulação.
- D) A hipertensão pulmonar atribuída ao HIV é incomum, podendo ocorrer em qualquer estágio da infecção, sem relação direta com o grau de imunossupressão e carrega um prognóstico ruim.
- E) O papel da inflamação crônica e ativação imune pode ser central para o risco aumentado de doença arterial coronariana.

49. Fazem parte dos mecanismos caracteristicamente envolvidos na patogênese dos episódios de cianose das crianças com cardiopatia congênita todas as abaixo, EXCETO

- A) Aumento da frequência cardíaca.
- B) Aumento do débito cardíaco e do retorno venoso.
- C) Aumento do desvio de sangue da direita para a esquerda,
- D) Centros de controle respiratório vulneráveis.
- E) Relaxamento infudibular.

50. Sobre o uso da capnografia durante a ressuscitação de uma parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É uma medida indireta do débito cardíaco, e seu valor pode fornecer uma informação tão importante quanto a qualidade da compressão torácica.
 - B) Quando menor que 10 mmHg, deve servir de alerta para necessidade de melhora na qualidade de compressão ou troca de socorrista.
 - C) Um aumento abrupto no seu valor (> 15 mmHg) e com valores absolutos acima de 30 mmHg pode ser um indício de retorno a ventilação espontânea.
 - D) A queda súbita nos valores obtidos após ressuscitação pode sinalizar a perda da circulação espontânea e a necessidade de checar novamente o pulso e verificar o monitor cardíaco.
 - E) O comportamento dos valores da capnografia durante a ressuscitação cardiopulmonar não deve ser utilizada como um dos parâmetros para decisão sobre interrupção das medidas de ressuscitação.
-

CADERNO 04 - MÉDICO CARDIOLOGISTA