

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2023**

MÉDICO (CIRURGIA PEDIÁTRICA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_08/05/2023 18:30:09



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436/2017, a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos _____, de forma a _____ ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) equivalentes – associar a
- B) distintos – distinguir de
- C) discordantes – discernir entre
- D) contraditórios – distinguir e discernir entre
- E) incompatíveis – associar e ligar a

QUESTÃO 02 – Em relação à Atenção Básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas.
- () Ações de saúde que envolvem cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- () As equipes assumem responsabilidade sanitária sobre território definido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 03 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- II. Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica.
- III. Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.
- IV. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.

Qual estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa INCORRETA considerando o Estatuto da Pessoa Idosa (2003) e suas alterações.

- A) É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
- B) Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.
- C) Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- D) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- E) É assegurado o direito a acompanhante à pessoa idosa internada ou em observação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

QUESTÃO 05 – Segundo o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticados contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos:

- I. Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
- II. Conselho Interfederativo da Pessoa Idosa.
- III. Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
- IV. Defensoria Pública da Pessoa Idosa.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito de indicadores de saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Um indicador é uma variável, característica ou atributo de Estrutura, Processo ou Resultado, baseada em Donabedian (1980, 1990), que é capaz de sintetizar e/ou representar e/ou dar maior significado ao que se quer avaliar.
- II. O componente Estrutura inclui a relação entre categorias de recursos humanos existentes, tal como o número de agentes comunitários de saúde ou de profissionais de enfermagem.
- III. O componente Processo inclui a relação entre as atividades de distintos profissionais, tal como número de atividades sobre saúde reprodutiva realizadas para adolescentes no serviço de saúde ou número de primeira consulta ginecológica para gestantes.
- IV. Entre os componentes adotados na construção de um indicador, pode-se avaliar as relações que permitem a análise de quanto cada componente influencia o outro, tal como a relação estrutura/processo, avaliando a relação entre recursos existentes e a produtividade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 07 – A respeito da utilização da epidemiologia em saúde, considerando os termos comuns usados na interpretação da literatura médica para exames diagnósticos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A probabilidade pós-teste é igual a chances pós-teste / (1 + chances pós-teste).
- () Através de um nomograma, pode-se calcular a probabilidade pós-teste usando a probabilidade pré-teste e a razão de verossimilhança, sem ter que converter a probabilidade pré-teste em chances.
- () A razão de verossimilhança negativa é a razão entre a probabilidade de um resultado negativo de exame entre pacientes sem a doença e a probabilidade de um resultado positivo entre pacientes com a doença.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 08 – No campo da ética médica ou bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No estabelecimento de prioridades nas políticas públicas de saúde, os gestores têm utilizado balizamentos, entre eles, as bases epidemiológicas e demográficas, a vulnerabilidade do agravo, os recursos, a tecnologia disponível e a efetividade dos procedimentos.
- B) Como Norma Diceológica, é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- C) Como Norma Diceológica, é direito do médico realizar a procriação medicamente assistida, desde que seja com o objetivo de criar embriões com a finalidade de escolha de sexo.
- D) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- E) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.

QUESTÃO 09 – Sobre anestesia no paciente pediátrico, analise as assertivas abaixo:

- I. Náusea e vômitos pós-operatórios são as principais complicações pós-anestésicas que geram atraso na liberação de pacientes submetidos a procedimentos ambulatoriais.
- II. Edema subglótico é uma complicação comum em crianças (de 1% a 6%), não apresentando redução significativa de sua incidência apesar do reconhecimento de fatores de risco como a umidificação dos gases e uso de tubos adequados.
- III. Crianças apresentam maior risco de hipotermia, o que leva à indicação do uso de monitorização com sensor de temperatura no transoperatório na maioria dos procedimentos cirúrgicos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Sobre as alterações metabólicas relacionadas ao trauma cirúrgico, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A diferença mais dramática entre pacientes adultos e pacientes pediátricos está na quantidade relativa de gordura armazenada, sendo a reserva de gordura no adulto por quilograma de peso ideal o dobro da reserva do recém-nascido.
- B) As alterações metabólicas causadas pelo trauma cirúrgico extenso podem levar a complicações como hiperglicemia, resistência à insulina, perda de massa muscular e prejuízo na cicatrização de tecidos, caso não haja manejo adequado.
- C) Entre as primeiras alterações secundárias ao trauma (*ebb phase*) estão: redução da atividade enzimática, redução do consumo de oxigênio, redução do débito cardíaco e redução da temperatura corporal central.
- D) Estratégias para minimizar o trauma cirúrgico e reduzir a resposta ao estresse pós-operatório, como cirurgia minimamente invasiva e protocolos de recuperação aprimorados, podem ajudar a mitigar as alterações metabólicas associadas à cirurgia.
- E) O trauma cirúrgico pode causar uma série de alterações metabólicas no organismo, incluindo alterações no metabolismo da glicose, síntese de proteínas e gasto energético.

QUESTÃO 11 – Sobre obstruções intestinais em crianças, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A atresia duodenal está associada à presença de raio-X com duas áreas aeradas ovais e está associada à trissomia do cromossomo 21 em quase 50% dos casos.
- B) Pacientes com atraso da eliminação de mecônio nas primeiras 24 horas com distensão e vômitos devem ser inicialmente avaliados com enema opaco e posteriormente, se imagem compatível com zona de transição, submetidos à biópsia de reto para confirmação de doença de Hirschsprung.
- C) Pacientes com vômitos recorrentes deve-se solicitar raio-X contrastado para avaliação da posição da segunda porção do duodeno para excluir a presença de mal rotação.
- D) História de polidrâmnio e ausência de eliminações nas primeiras 48 horas podem estar associadas com atresia de intestino, podendo ser útil a realização de enema opaco para elucidação do diagnóstico.
- E) Íleo meconial ocorre devido ao acúmulo intraluminal de mecônio espessado e ressecado, associado à fibrose cística.

QUESTÃO 12 – Sobre hérnia diafragmática congênita, analise as assertivas abaixo:

- I. A oclusão traqueal fetoscópica (FETO) é uma intervenção pré-natal que tem demonstrado melhorar os resultados em casos de hérnia diafragmática congênita grave.
- II. A hérnia diafragmática congênita pode causar uma diminuição significativa da resistência vascular pulmonar devido ao subdesenvolvimento da vasculatura pulmonar.
- III. A gravidade da hérnia diafragmática congênita é tipicamente avaliada através do diâmetro pulmonar fetal dividido pela circunferência abdominal.
- IV. Hérnia diafragmática tem como fator de risco bem demonstrado a idade materna elevada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 13 – Qual das seguintes alternativas citadas abaixo NÃO é uma associação conhecida com atresia esofágica?

- A) Atresia de coanas.
- B) Defeito de septo ventricular.
- C) Fístula traqueo-esofágica.
- D) Hérnia diafragmática congênita.
- E) Síndrome de Beckwith–Wiedemann.

QUESTÃO 14 – Analise as assertivas abaixo no que se refere a hérnias inguinais na criança:

- I. A incidência de atrofia testicular após encarceramento é de 2-3 %.
- II. A criança escolar com diagnóstico de hérnia deve ser orientada a reduzir atividades físicas mesmo se assintomática até o reparo cirúrgico.
- III. Recorrência tem como fatores de risco: prematuridade, encarceramento, doenças que aumentam a pressão intra-abdominal, doenças do tecido conjuntivo e pacientes adolescentes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que corresponde ao teste diagnóstico de escolha para a hérnia inguinal neonatal e ao tratamento recomendado para essa condição.

- A) Diagnóstico clínico, seguido de cirurgia assim que paciente em condições.
- B) Radiografia abdominal, seguida de observação com reparação cirúrgica apenas se surgirem complicações.
- C) Tomografia abdominal, seguida de cirurgia em 24 horas.
- D) Ultrassom, seguido de observação com reparação cirúrgica apenas se surgirem complicações.
- E) Ultrassonografia, caso haja hérnia, e planejamento de cirurgia após o 6º mês.

QUESTÃO 16 – Analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Criptorquidia é mais comumente vista à esquerda do que à direita.
- () Correção cirúrgica antes dos 12 meses de vida é associado à melhora da fertilidade na idade adulta.
- () O risco de desenvolvimento de câncer testicular em meninos com criptorquia é significativamente reduzido se realizada correção cirúrgica antes da puberdade.
- () Em casos raros, criptorquia pode ser causada devido à anormalidade do eixo hipotálamo, pituitária-gonadal.

A ordem de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V.
- B) F – V – F – V.
- C) V – F – V – F.
- D) V – V – F – F.
- E) V – V – F – V.

QUESTÃO 17 – Qual das alternativas abaixo indica um tipo de tumor sólido da infância que está associado ao nível sérico mais elevado de Alfa-Fetoproteína (AFP)?

- A) Tumor de Wilms.
- B) Rabdomyosarcoma.
- C) Osteossarcoma.
- D) Neuroblastoma.
- E) Hepatoblastoma.

QUESTÃO 18 – Qual o tumor sólido da infância que surge das células neuroectodérmicas primitivas e se apresenta tipicamente como uma massa grande e de rápido crescimento no abdome ou na pélvis?

- A) Hepatoblastoma.
- B) Neuroblastoma.
- C) Rabdomyosarcoma.
- D) Sarcoma de Ewing.
- E) Tumor de Wilms.

QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa que indica um fator de risco para o desenvolvimento de enterocolite necrotizante.

- A) Início precoce da dieta enteral.
- B) Administração de probióticos.
- C) Gestação a termo.
- D) Uso de Anti-Inflamatórios Não Esteroidais (AINES).
- E) Aleitamento materno exclusivo.

QUESTÃO 20 – No que se refere à doença de Hirschsprung, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A doença de Hirschsprung é causada por uma falta de células ganglionares no intestino distal.
- B) O diagnóstico da doença de Hirschsprung pode ser confirmado por biópsia retal.
- C) O tratamento da doença de Hirschsprung envolve a ressecção do segmento intestinal afectado.
- D) A apresentação mais comum da doença de Hirschsprung é o vômito bilioso.
- E) A doença de Hirschsprung é mais comum nos meninos do que nas meninas.

QUESTÃO 21 – Analise as assertivas abaixo sobre anomalia anorretal em meninos:

- I. Fístula retoperineal está associado a um bom prognóstico, tendo como exemplo a malformação em alça de balde e ânus anteriorizado.
- II. A Fístula reto-vesical é relacionada a mal prognóstico, comumente associado a alterações no sacro.
- III. Anomalia anorretal sem fístula é associada a bom prognóstico mesmo quando associado a trissomias.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 22 – Quais das seguintes malformações são mais frequentemente relacionadas a Anomalias Anorretais (AAR) em geral?

- A) Agenesia Renal.
- B) Atresia intestinal.
- C) Malformações cardíacas.
- D) Deformidades no sacro.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 23 – Apesar de comumente assintomática, qual das alternativas abaixo indica um sintoma clássico relacionado à estenose da junção ureteropélvica?

- A) Dor de flanco.
- B) Frequência urinária.
- C) Hematúria.
- D) Incontinência.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 24 – Sobre as afirmações descritas abaixo, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Refluxo vesicoureteral está associado à ureterocele, nem sempre necessitando de tratamento cirúrgico.
- B) Ureterocele é um divertículo de bexiga.
- C) Ureterocele pode causar dilatação de sistema coletor bilateralmente.
- D) Ureterocele é mais comum em meninas.
- E) Ureterocele está relacionado a duplicações do sistema coletor.

QUESTÃO 25 – Analise as assertivas abaixo:

- I. Duplicações de ureteres completas são mais comuns e raramente causam repercussão clínica.
- II. Duplicações incompletas estão relacionadas a maior risco de infecção urinária.
- III. Na duplicação completa, a alteração mais comum é o refluxo vesicoureteral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 26 – Analise as assertivas abaixo:

- I. A extrofia vesical é causada por uma falha da membrana cloacal em fundir-se adequadamente durante o desenvolvimento embrionário.
- II. A extrofia vesical está comumente relacionada a alterações cardíacas.
- III. As diversas técnicas cirúrgicas descritas para o tratamento da extrofia vesical visam a criação de um colo vesical competente e uma bexiga com capacidade de contração para adequado esvaziamento.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Sobre gastrosquise e onfalocele, assinale a alternativa correta.

- A) A gastrosquise é uma anomalia congênita em que os órgãos abdominais herniam para o cordão umbilical, enquanto a onfalocele envolve um defeito na parede abdominal.
- B) A gastrosquise geralmente é coberta por uma membrana, enquanto a onfalocele não é.
- C) Ambas as anomalias estão relacionadas a malformações cardíacas.
- D) Em se tratando dos defeitos de forma isolada, a taxa de mortalidade é maior para gastrosquise do que para onfalocele.
- E) Tanto a gastrosquise quanto a onfalocele são tipicamente associadas a síndromes genéticas.

QUESTÃO 28 – Assinale a alternativa que indica um preditor de falha do tratamento conservador no trauma abdominal pediátrico.

- A) Presença de hemoperitônio na imagem inicial.
- B) Lesões pancreáticas.
- C) Lesões de múltiplos órgãos.
- D) Lesão hepática grau IV.
- E) Instabilidade hemodinâmica.

QUESTÃO 29 – Assinale a alternativa que indica uma complicação comum da correção cirúrgica de hipospádia.

- A) Fístula uretrocutânea.
- B) Estenose uretral.
- C) Estenose do meato.
- D) Deiscência da glândula.
- E) Curvatura peniana.

QUESTÃO 30 – NÃO faz parte dos objetivos da correção da hiposárdia a:

- A) Localização do meato na ponta da glândula.
- B) Formação de uma glândula simétrica e plana.
- C) Correção do encurvamento peniano.
- D) Confeção de uma neouretra de calibre uniforme.
- E) Complementação de uma cobertura cosmética satisfatória da pele.

QUESTÃO 31 – Assinale a alternativa que indica a causa mais comum de distúrbio da diferenciação sexual.

- A) Síndrome de Klinefelter.
- B) Síndrome de Insensibilidade Androgênica (AIS).
- C) Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC).
- D) Disgenesia gonadal mista.
- E) Deficiência de 5-alfa-redutase.

QUESTÃO 32 – Em relação a um passo importante na avaliação de um recém-nascido com genitália indiferenciada, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Análise cromossômica.
- () Estudos de imagem.
- () Dosagens hormonais.
- () Exame físico detalhado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – F – F.

QUESTÃO 33 – NÃO é uma apresentação clínica comum de um cisto de colédoco em bebês e crianças:

- A) Vômitos.
- B) Icterícia.
- C) Febre.
- D) Dor abdominal.
- E) Colangiocarcinoma.

QUESTÃO 34 – Sobre atresia de vias biliares, analise as assertivas abaixo:

- I. Classicamente, os principais determinantes do resultado satisfatório após a portoenterostomia são a idade na operação inicial, a obtenção bem-sucedida do fluxo biliar pós-operatório, a presença de estruturas ductais microscópicas na porta hepática e a extensão da doença do parênquima hepático no momento do diagnóstico.
- II. A colangite é a complicação mais comum da portoenterostomia hepática e ocorre em 33% a 60% dos pacientes.
- III. Com a melhora do cuidado com pacientes transplantados, a literatura vem mostrando que todos os pacientes portadores de atresia de vias biliares se beneficiam pelo transplante precoce.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 35 – Qual das seguintes alternativas indica a apresentação clínica mais comum de duplicações do intestino delgado?

- A) Tosse.
- B) Perfuração intestinal.
- C) Obstrução intestinal.
- D) Hemorragia gastrointestinal.
- E) Dor abdominal.

QUESTÃO 36 – Sobre os princípios fundamentais do Código de Ética Médica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Art. I – A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.
- B) Art. IV – Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.
- C) Art. VI – O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade, com exceção dos casos previstos em lei.
- D) Art. VII – O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.
- E) Art. XVI – Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente.

QUESTÃO 37 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto à intussuscepção.

- A) A maior incidência ocorre em lactentes entre as idades de 4 e 9 meses.
- B) É a causa mais comum de obstrução do intestino delgado entre 4 e 9 meses.
- C) É incomum antes dos 3 meses e após os 3 anos de idade.
- D) Em cerca de metade dos casos, existe história de infecção viral por adenovírus ou rotavírus.
- E) Tem uma incidência de 3 meninas para cada menino.

QUESTÃO 38 – Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Sinal de Dunphy é a dor na fossa ilíaca direita ao tossir.
- B) O Sinal de Markle é a dor com a dorsiflexão do pé direito.
- C) O Sinal do Psoas é a dor na fossa ilíaca direita quando o paciente está em decúbito lateral esquerdo e a perna é estendida.
- D) Sinal de Rovsing é a dor na fossa ilíaca direita ao se palpar o flanco direito.
- E) Sinal do obturador é dor na fossa ilíaca direita com a flexão e rotação interna do quadril.

QUESTÃO 39 – Assinale a alternativa que indica uma complicação de hemangiomas infantis que requer tratamento.

- A) Mudanças de cor.
- B) Proliferação.
- C) Telangiectasia.
- D) Ulceração.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 40 – Analise as afirmações abaixo:

- _____ é uma malformação congênita da cabeça e pescoço que envolve a formação anormal da mandíbula, língua e tecidos circundantes.
- _____ é uma malformação congênita da cabeça e pescoço relacionada a fendas faciais (Tessier 6, 7 e 8), resultando em desenvolvimento anormal da face, orelhas e pescoço.
- _____ é uma malformação congênita da cavidade nasal caracterizada por um bloqueio ou estreitamento da passagem entre o nariz e a garganta.
- _____ é uma malformação congênita caracterizada por um inchaço cístico na linha média do pescoço, causado pela persistência do ducto tireoglosso embrionário.
- _____ surge do tecido mesodérmico do terceiro e quarto arcos branquiais e resultam do desenvolvimento anormal da laringe durante a embriogênese.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Microstomia – Sequência de Pierre Robin – Fenda palatina – Cisto tireoglosso – Cisto branquial
- B) Sequência de Pierre Robin – Síndrome de Goldenhar – Craniosinostose – Cisto tireoglosso – Fístula branquial
- C) Sequência de Pierre Robin – Síndrome de Treacher Collins – Atresia de coanas – Cisto tireoglosso – Fendas laríngeas
- D) Síndrome de Goldenhar – Síndrome de Treacher Collins – Fenda palatina – Hipotireoidismo congênito – estenose subglótica congênita
- E) Síndrome de Treacher Collins – Microsomia hemifacial – Fenda laríngea – Cisto branquial – Linfangioma