



DOMINGO DE MANHÃ

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2023

MÉDICO (MEDICINA INTENSIVA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

- 1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
- 2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
- 3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
- 4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
- 5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
- 6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
- 7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
- 8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
- 9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.









726_PPS_MOD1_NS_DM	9/5/202309:59:37

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436/2017, a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos, de forma a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.
A) equivalentes – associar a B) distintos – distinguir de C) discordantes – discernir entre D) contraditórios – distinguir e discernir entre E) incompatíveis – associar e ligar a
QUESTÃO 02 – Em relação à Atenção Básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
 () É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas. () Ações de saúde que envolvem cuidados paliativos e vigilância em saúde. () As equipes assumem responsabilidade sanitária sobre território definido.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) F - F - V. B) F - V - V. C) V - V - V.

QUESTÃO 03 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- II. Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica.
- III. Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.
- IV. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.

Qual estão INCORRETAS?

A) Apenas I.

D) V - V - F. E) V - F - F.

- B) Apenas III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

726 PPS MOD1 NS DM 9/5/202309:59:37

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa INCORRETA considerando o Estatuto da Pessoa Idosa (2003) e suas alterações.

- A) É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
- B) Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.
- C) Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- D) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- E) É assegurado o direito a acompanhante à pessoa idosa internada ou em observação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

QUESTÃO 05 – Segundo o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticados contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos:

- I. Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
- II. Conselho Interfederativo da Pessoa Idosa.
- III. Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
- IV. Defensoria Pública da Pessoa Idosa.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

726 CE 33 a 61 NS DM 10/5/202322:06:51

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 - A respeito de indicadores de saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Um indicador é uma variável, característica ou atributo de Estrutura, Processo ou Resultado, baseada em Donabedian (1980, 1990), que é capaz de sintetizar e/ou representar e/ou dar maior significado ao que se quer avaliar.
- II. O componente Estrutura inclui a relação entre categorias de recursos humanos existentes, tal como o número de agentes comunitários de saúde ou de profissionais de enfermagem.
- III. O componente Processo inclui a relação entre as atividades de distintos profissionais, tal como número de atividades sobre saúde reprodutiva realizadas para adolescentes no serviço de saúde ou número de primeira consulta ginecológica para gestantes.
- IV. Entre os componentes adotados na construção de um indicador, pode-se avaliar as relações que permitem a análise de quanto cada componente influencia o outro, tal como a relação estrutura/processo, avaliando a relação entre recursos existentes e a produtividade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 07 – A respeito da utilização da epidemiologia em saúde, considerando os termos comuns usados na interpretação da literatura médica para exames diagnósticos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A probabilidade pós-teste é igual a chances pós-teste / (1 + chances pós-teste).
- () Através de um nomograma, pode-se calcular a probabilidade pós-teste usando a probabilidade pré-teste e a razão de verossimilhança, sem ter que converter a probabilidade pré-teste em chances.
- () A razão de verossimilhança negativa é a razão entre a probabilidade de um resultado negativo de exame entre pacientes sem a doença e a probabilidade de um resultado positivo entre pacientes com a doença.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V V F.
- B) V F V.
- C) V F F.
- D) F V V.
- E) F F V.

QUESTÃO 08 – No campo da ética médica ou bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No estabelecimento de prioridades nas políticas públicas de saúde, os gestores têm utilizado balizamentos, entre eles, as bases epidemiológicas e demográficas, a vulnerabilidade do agravo, os recursos, a tecnologia disponível e a efetividade dos procedimentos.
- B) Como Norma Diceológica, é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- C) Como Norma Diceológica, é direito do médico realizar a procriação medicamente assistida, desde que seja com o objetivo de criar embriões com a finalidade de escolha de sexo.
- D) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- E) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.

QUESTÃO 09 – Qual é a medicação de primeira linha recomendada pela American Heart Association para o tratamento de uma taquicardia supraventricular aguda?

- A) Adenosina.
- B) Amiodarona.
- C) Digoxina.
- D) Lidocaína.
- E) Verapamil.

QUESTÃO 10 – Qual é o principal objetivo do tratamento da sepse, de acordo com as diretrizes da Surviving Sepsis Campaign?

- A) Controle da infecção primária.
- B) Controle dos níveis de lactato sanguíneo.
- C) Inibição da resposta imunológica.
- D) Melhora da perfusão tecidual.
- E) Prevenção da falência múltipla de órgãos.

QUESTÃO 11 – O tipo de choque caracterizado por uma diminuição no retorno venoso ao coração e uma diminuição no débito cardíaco é o choque:

- A) Obstrutivo.
- B) Neurogênico.
- C) Hipovolêmico.
- D) Distributivo.
- E) Cardiogênico.

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa que corresponde à medida importante para prevenir complicações respiratórias no pós-operatório de cirurgias de grande porte.

- A) Uso de opioides como analgésicos.
- B) Realização de fisioterapia respiratória.
- C) Monitorização da função renal.
- D) Evitar balanço hídrico positivo.
- E) Administração de antibióticos profiláticos.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que corresponde a uma das principais medidas para prevenir infecções relacionadas a cateteres.

- A) Utilização de cateteres de dois lumens ao invés de um lúmen.
- B) Troca frequente do cateter.
- C) Realização de curativos diários no local da inserção do cateter.
- D) Lavagem das mãos antes e após o manuseio do cateter.
- E) Administração de antibióticos profiláticos.

QUESTÃO 14 - Qual é o tratamento mais indicado para a crise tireotóxica?

- A) Suplementação de iodo.
- B) Bloqueador do canal de cálcio diidropiridínico.
- C) Betabloqueador.
- D) Benzodiazepínicos.
- E) Administração de corticosteroides.

QUESTÃO 15 – Qual é a principal complicação da pancreatite aguda grave?

- A) Úlceras gástricas.
- B) Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA).
- C) Insuficiência renal.
- D) Insuficiência hepática.
- E) Colangite.

QUESTÃO 16 – Qual das alternativas citadas abaixo NÃO faz parte dos critérios diagnósticos para coagulação intravascular disseminada?

- A) Tempo de protrombina prolongado.
- B) Linfopenia.
- C) Fibrinogênio baixo.
- D) D-dímero aumentado.
- E) Anemia hemolítica microangiopática.

QUESTÃO 17 – Um paciente de 55 anos, sexo masculino, com antecedente de trombose venosa profunda e uso crônico de anticoagulante, apresenta-se na emergência com dispneia súbita e dor torácica. No exame físico, apresenta-se hipotenso e com taquicardia. A tomografia computadorizada de tórax revela embolia pulmonar bilateral. Qual a melhor conduta?

- A) Suspender o anticoagulante e monitorar a evolução do quadro.
- B) Realizar fibrinólise seletiva por meio de cateterismo pulmonar.
- C) Prescrever anticoagulante de baixo peso molecular e monitorar o paciente clinicamente.
- D) Indicar trombólise imediatamente, independentemente do risco de sangramento.
- E) Administrar oxigênio suplementar e hidratação venosa.

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que corresponde a um critério para diagnóstico de insuficiência hepática.

- A) Redução dos níveis de glicose no sangue.
- B) Redução dos níveis de ácido úrico no sangue.
- C) Aumento dos níveis de cálcio no sangue.
- D) Aumento dos níveis de amônia no sangue.
- E) Aumento da pressão intra-abdominal.

QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa que corresponde a uma medida eficaz para o controle da hipertensão intracraniana.

- A) Administração de anti-inflamatórios não esteroides.
- B) Elevação da cabeceira da cama.
- C) Uso de corticoides.
- D) Uso de diuréticos de alça.
- E) Uso de estimulantes do sistema nervoso central.

QUESTÃO 20 – Um homem de 45 anos, sem antecedentes médicos relevantes, é encontrado desacordado em casa por familiares, com ausência de respiração e pulso palpável. Uma ambulância é acionada e chega em cerca de 8 minutos. Ao chegarem ao local, o paciente encontra-se em PCR. Qual a melhor conduta inicial?

- A) Realizar entubação orotraqueal e administrar adrenalina endovenosa.
- B) Realizar desfibrilação com choque elétrico de 200 Joules.
- C) Iniciar massagem cardíaca interna com auxílio de dispositivo mecânico.
- D) Iniciar compressões torácicas e ventilação com máscara bolsa-válvula imediatamente.
- E) Administrar epinefrina 1 mg via endovenosa a cada 3-5 minutos.

QUESTÃO 21 – Qual é o intervalo mínimo entre os dois exames clínicos para confirmação da morte cerebral em um paciente adulto?

- A) 1 hora.
- B) 2 horas.
- C) 6 horas.
- D) 8 horas.
- E) 12 horas.

QUESTÃO 22 – Assinale a alternativa que corresponde à principal consideração ética a ser levada em conta na tomada de decisão sobre o fim do suporte de vida em um paciente em estado vegetativo persistente.

- A) Autonomia do paciente.
- B) Beneficência ao paciente.
- C) Justiça distributiva.
- D) Não aleficência ao paciente.
- E) Responsabilidade social.

QUESTÃO 23 – Qual é o principal indicador de qualidade em uma UTI em relação à mortalidade dos pacientes?

- A) Taxa de infecção hospitalar.
- B) Taxa de mortalidade ajustada por gravidade.
- C) Taxa de ocupação da UTI.
- D) Taxa de readmissão hospitalar.
- E) Tempo de permanência na UTI.

QUESTÃO 24 - A Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) é uma resposta inflamatória:

- A) Que ocorre somente em pacientes imunocomprometidos.
- B) Que ocorre somente em pacientes com lesão tecidual.
- C) Que ocorre somente em pacientes com infecções bacterianas ou virais graves.
- D) Que ocorre somente em pacientes com doenças autoimunes.
- E) Caracterizada por manifestações clínicas como febre, taquicardia, taquipneia e instabilidade hemodinâmica.

QUESTÃO 25 – Qual dos seguintes critérios é utilizado para o diagnóstico da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) em um caso clínico de um paciente com quadro de dispneia aguda e infiltrados pulmonares difusos à radiografia de tórax?

- A) Presença de sibilância e aumento do VEF1.
- B) Presença de hipocapnia e alcalose respiratória.
- C) Presença de derrame pleural e de sinais de insuficiência cardíaca.
- D) Hipoxemia refratária com PaO2/FiO2 < 200 mmHg.
- E) Aumento da capacidade vital e da complacência pulmonar.

QUESTÃO 26 – A coagulopatia de consumo:

- A) É causada pelo excesso de coagulação, levando à formação de trombos em todo o sistema circulatório.
- B) É uma consequência da diminuição dos fatores de coagulação e da formação excessiva de fibrina, levando a sangramento.
- C) É um distúrbio de coagulação que afeta apenas os pacientes com doenças hepáticas crônicas.
- D) Não tem relação com o sistema de coagulação sanguínea, sendo causada por disfunções metabólicas.
- E) É um distúrbio de coagulação que afeta apenas os pacientes com deficiência de vitamina K.

QUESTÃO 27 – Sobre o abdome agudo, assinale a alternativa correta.

- A) A dor abdominal é um sintoma comum em pacientes com abdome agudo, mas nem sempre está presente.
- B) O abdome agudo é uma condição exclusiva de pacientes idosos.
- C) O abdome agudo pode ser causado apenas por lesões traumáticas no abdome.
- D) O diagnóstico do abdome agudo pode ser estabelecido apenas com base na história clínica do paciente.
- E) O tratamento do abdome agudo sempre envolve a realização de cirurgia de emergência.

QUESTÃO 28 – Um paciente de 45 anos chega ao pronto-socorro com queixa de fezes com sangue vivo e escuro há 24 horas, além de dor abdominal tipo cólica e diarreia. Nesse caso, qual das seguintes alternativas sobre a hemorragia digestiva baixa está correta?

- A) O tratamento da hemorragia digestiva baixa, nesse caso, deve incluir o uso de inibidores de bomba de prótons.
- B) A retossigmoidoscopia é o exame de escolha para diagnóstico da hemorragia digestiva baixa nesse caso.
- C) A principal complicação da hemorragia digestiva baixa é a obstrução intestinal.
- D) A hemorragia digestiva baixa é sempre causada por lesões no intestino delgado.
- E) A colonoscopia pode ser necessária para a confirmação diagnóstica e tratamento da hemorragia digestiva baixa nesse caso.

QUESTÃO 29 – Um paciente com dor muscular intensa, fraqueza muscular e urina escura é admitido no pronto-socorro. O exame de creatina quinase (CK) está elevado e o diagnóstico de rabdomiólise é estabelecido. Qual é a principal complicação da rabdomiólise?

- A) Acidose metabólica.
- B) Hipercalcemia.
- C) Hipovolemia.
- D) Insuficiência hepática.
- E) Nefropatia induzida por contraste.

QUESTÃO 30 – Um paciente com histórico de uso de drogas injetáveis é admitido no hospital com febre, calafrios e sopro cardíaco. O exame físico revela petéquias nas extremidades e o diagnóstico de endocardite é estabelecido. Nesse caso, analise as assertivas abaixo:

- Tratamento sintomático com analgésicos e antitérmicos.
- Tratamento com anticoagulantes para prevenção de embolia.
- Terapia com antibióticos intravenosos por pelo menos 4 semanas.
- Realização de cirurgia cardíaca para remoção do tecido infectado.
- Antibióticos orais de amplo espectro.

Quantas assertivas estão corretas para o tratamento da endocardite?

- A) Apenas uma.
- B) Duas.
- C) Três.
- D) Quatro.
- E) Cinco.

QUESTÃO 31 – Em um paciente séptico com evolução refratária ao manejo ideal qual é o mecanismo fisiopatológico responsável pela evolução da disfunção de múltiplos órgãos e sistemas?

- A) Resposta inflamatória sistêmica (SIRS).
- B) Redução da oferta de oxigênio aos tecidos (hipóxia).
- C) Hipotensão arterial sistêmica.
- D) Disfunção endotelial.
- E) Acidose metabólica.

QUESTÃO 32 – Qual das alternativas abaixo NÃO é uma contraindicação absoluta para o uso de ventilação mecânica não invasiva?

- A) Cirurgia esofágica.
- B) Distensão abdominal.
- C) Gravidez.
- D) Instabilidade hemodinâmica.
- E) Queimadura de face.

QUESTÃO 33 – Qual a principal causa de morte súbita em paciente com infarto agudo do miocárdio?
A) AVC isquêmico de tronco. B) Edema agudo de pulmão. C) Fibrilação ventricular. D) Ruptura do ventrículo esquerdo. E) Taquicardia ventricular.
QUESTÃO 34 – Sobre a curva de fluxo da ventilação mecânica, analise o trecho abaixo:
A curva de fluxo é geralmente exibida em um gráfico com o no eixo X e o no eixo Y. Durante a fase inspiratória, o aumenta até atingir um pico e, em seguida, diminui gradualmente até zero no final da inspiração. Durante a fase expiratória, o é negativo e diminui gradualmente até atingir um valor mínimo antes de iniciar a próxima inspiração.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.
A) fluxo de ar - tempo - fluxo de ar - fluxo de ar B) fluxo de ar - tempo - volume - volume C) tempo - fluxo de ar - fluxo de ar D) tempo - volume - tempo - fluxo de ar E) volume de ar - tempo - volume - fluxo de ar
QUESTÃO 35 – Qual das alternativas abaixo NÃO é fator de risco para infecções fúngicas em pacientes internados em UTI?
A) Histórico de diabetes melito. B) Histórico de hipertensão arterial sistêmica. C) Infecção pelo HIV. D) Procedimentos invasivos. E) Uso prolongado de antibióticos.
QUESTÃO 36 – Qual é o principal objetivo do uso de bloqueadores neuromusculares em pacientes internados em UTI?
A) Alívio da dor. B) Controle do ritmo cardíaco. C) Melhora da oxigenação. D) Redução da pressão arterial. E) Sedação profunda.
QUESTÃO 37 – Qual é o principal escore de gravidade utilizado em UTI para avaliar o prognóstico de pacientes com sepse?
A) APACHE II. B) APACHE III. C) CURB-65. D) qSOFA. E) SOFA.

12/5/202319:25:11

726_CE_48_NS_DM

QUESTÃO 38 – Analise os itens abaixo:

- Staphylococcus aureus.
- Proteus mirabilis.
- · Acinetobacter baumannii.
- Stenotrophomonas maltophilia.
- Enterococcus faecalis.

Quantos são sensíveis a tigeciclina?

- A) Apenas um.
- B) Dois.
- C) Três.
- D) Quatro.
- E) Cinco.

QUESTÃO 39 – São resistentes à anfotericina:

- I. Aspergillus.
- II. Cryptococcus.
- III. Fusarium.
- IV. Candida glabatra.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 40 – Qual é o papel dos cuidados paliativos em UTIs?

- A) Apenas fornecer conforto para pacientes em estado terminal.
- B) Apenas fornecer informações aos familiares sobre a condição dos pacientes.
- C) Oferecer suporte apenas para pacientes com doenças crônicas.
- D) Proporcionar suporte emocional apenas para as famílias dos pacientes.
- E) Reduzir o sofrimento dos pacientes, independentemente da cura ou prolongamento da vida.