

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2023**

MÉDICO (NEUROLOGIA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_08/05/2023 18:30:09



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436/2017, a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos _____, de forma a _____ ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) equivalentes – associar a
- B) distintos – distinguir de
- C) discordantes – discernir entre
- D) contraditórios – distinguir e discernir entre
- E) incompatíveis – associar e ligar a

QUESTÃO 02 – Em relação à Atenção Básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas.
- () Ações de saúde que envolvem cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- () As equipes assumem responsabilidade sanitária sobre território definido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 03 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- II. Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica.
- III. Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.
- IV. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.

Qual estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa INCORRETA considerando o Estatuto da Pessoa Idosa (2003) e suas alterações.

- A) É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
- B) Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.
- C) Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- D) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- E) É assegurado o direito a acompanhante à pessoa idosa internada ou em observação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

QUESTÃO 05 – Segundo o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticados contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos:

- I. Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
- II. Conselho Interfederativo da Pessoa Idosa.
- III. Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
- IV. Defensoria Pública da Pessoa Idosa.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito de indicadores de saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Um indicador é uma variável, característica ou atributo de Estrutura, Processo ou Resultado, baseada em Donabedian (1980, 1990), que é capaz de sintetizar e/ou representar e/ou dar maior significado ao que se quer avaliar.
- II. O componente Estrutura inclui a relação entre categorias de recursos humanos existentes, tal como o número de agentes comunitários de saúde ou de profissionais de enfermagem.
- III. O componente Processo inclui a relação entre as atividades de distintos profissionais, tal como número de atividades sobre saúde reprodutiva realizadas para adolescentes no serviço de saúde ou número de primeira consulta ginecológica para gestantes.
- IV. Entre os componentes adotados na construção de um indicador, pode-se avaliar as relações que permitem a análise de quanto cada componente influencia o outro, tal como a relação estrutura/processo, avaliando a relação entre recursos existentes e a produtividade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 07 – A respeito da utilização da epidemiologia em saúde, considerando os termos comuns usados na interpretação da literatura médica para exames diagnósticos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A probabilidade pós-teste é igual a chances pós-teste / (1 + chances pós-teste).
- () Através de um nomograma, pode-se calcular a probabilidade pós-teste usando a probabilidade pré-teste e a razão de verossimilhança, sem ter que converter a probabilidade pré-teste em chances.
- () A razão de verossimilhança negativa é a razão entre a probabilidade de um resultado negativo de exame entre pacientes sem a doença e a probabilidade de um resultado positivo entre pacientes com a doença.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 08 – No campo da ética médica ou bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No estabelecimento de prioridades nas políticas públicas de saúde, os gestores têm utilizado balizamentos, entre eles, as bases epidemiológicas e demográficas, a vulnerabilidade do agravo, os recursos, a tecnologia disponível e a efetividade dos procedimentos.
- B) Como Norma Diceológica, é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- C) Como Norma Diceológica, é direito do médico realizar a procriação medicamente assistida, desde que seja com o objetivo de criar embriões com a finalidade de escolha de sexo.
- D) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- E) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.

QUESTÃO 09 – Um paciente reporta alteração de sensibilidade em ambos os membros inferiores, relatando alteração de propriocepção, sensibilidade vibratória e tato epicrítico. No entanto, apresenta sensibilidade termoalgésica preservada na região. A lesão que explica essa sintomatologia encontra-se na topografia de:

- A) Giro pós-central do córtex cerebral.
- B) Tálamo.
- C) Ponte.
- D) Funículo posterior da medula espinhal.
- E) Funículo lateral da medula espinhal.

QUESTÃO 10 – Um paciente de 70 anos, hipertenso, diabético e com história de fibrilação atrial (em uso irregular de varfarina) vem à emergência com quadro súbito de hemiparesia e hemihipoestesia esquerda (apresentando NIHSS: 9) com início dos sintomas há duas horas. Foi realizada uma tomografia computadorizada de crânio sem contraste que não evidenciou alterações. Sobre esse caso, analise as seguintes assertivas:

- I. O uso de agentes trombolíticos deve ser considerado.
- II. Antes da definição da estratégia de tratamento agudo, é necessária a realização de ressonância magnética de encéfalo ou nova tomografia com contraste.
- III. O uso de agentes trombolíticos deve ser contraindicado caso o RNI seja maior que 1.7.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 11 – A esclerose múltipla (EM) é uma doença neuroimunológica que apresenta diferentes padrões de apresentação e assimetria de distribuição entre homens e mulheres. Sobre a EM, pode-se afirmar que a forma mais comum de apresentação e o sexo mais acometido são, respectivamente:

- A) Primariamente progressiva – mulheres.
- B) Primariamente progressiva – homens.
- C) Surto-remissão – mulheres.
- D) Surto-remissão – homens.
- E) Secundariamente progressiva – homens.

QUESTÃO 12 – Uma mulher de 27 anos, usuária de anticoncepcional combinado e tabagista vem à consulta devido a quadro de trombose venosa cerebral acometendo veia cortical e pequena hemorragia parenquimatosa adjacente a trombose venosa. Após extensa investigação laboratorial, exames de trombofilias não apresentam alterações. Sobre esse caso, analise as seguintes assertivas:

- I. O tabagismo em combinação com o método anticoncepcional pode ser a possível causa da trombose venosa cerebral.
- II. A anticoagulação está contraindicada em função da hemorragia intracraniana.
- III. Tromboses de veias corticais (assim como as tromboses de seios venosos) podem ser tratadas apenas com analgesia, sem necessidade de anticoagulação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 13 – Uma paciente de 47 anos vem à emergência devido à cefaleia de forte intensidade, confusão mental associada à febre alta e sinais de irritação meníngea. Ressonância magnética de encéfalo com contraste evidencia alterações em lobos temporais mesiais e exame de líquido apresenta: Leucócitos: 320 cel/campo (93% linfócitos, 7% neutrófilos); Hemácias: 4 cel/campo; Proteína 73mg/dl e glicose: 68mg/dl (HGT realizado na hora da punção 104mg/dl). O quadro é compatível com:

- A) Meningite por tuberculose.
- B) Meningite bacteriana.
- C) Encefalite viral.
- D) Toxoplasmose cerebral.
- E) Hemorragia subaracnóide.

QUESTÃO 14 – Os quadros demenciais vêm aumentando sua incidência com o aumento da expectativa de vida da população. O correto diagnóstico dos diferentes tipos de demências é de fundamental importância para seu adequado manejo. Sobre demências, pode-se afirmar que:

- I. Pacientes com demência frontotemporal apresentam sintomas psiquiátricos, sendo comum agressividade e desinibição.
- II. A demência vascular apresenta forte associação com fatores de risco cardiovasculares.
- III. Deficiência de vitamina B12 e sífilis terciária com acometimento do sistema nervoso central são causas reversíveis de quadros demenciais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 15 – Um paciente de 56 anos vem à consulta referindo tremor em ambas as mãos. Ao examiná-lo, evidencia-se um tremor simétrico em ambas as mãos entre 4 e 12 Hz. O paciente reporta história familiar de tremor (pai e irmão com quadros semelhantes), também relata melhora do quadro com uso de propranolol e quando faz uso de bebidas alcoólicas. Relata já ter utilizado medicações com Levodopa sem melhora. Traz na consulta ressonância magnética de encéfalo sem evidência de alterações. A principal suspeita para esse quadro é:

- A) Doença de Parkinson.
- B) Atrofia de Múltiplos Sistemas.
- C) Paralisia Supra-nuclear Progressiva.
- D) Tremor Essencial.
- E) Parkinsonismo Vascular.

QUESTÃO 16 – Neurosífilis pode ter muitas manifestações no sistema nervoso central. Sobre a neurosífilis, pode-se afirmar que:

- I. A sífilis meningovascular é uma das possíveis manifestações.
- II. *Tabes dorsalis* é um quadro associado à neurosífilis.
- III. O uso de penicilina benzatina trata todas as manifestações da sífilis no sistema nervoso central, inclusive auxiliando no quadro demencial.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 17 – As doenças desmielinizantes são mais comuns em regiões de clima temperado e podem ter diferentes apresentações. Sobre algumas doenças desmielinizantes, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A ADEM (Encefalomielite Disseminante Aguda) caracteriza-se por ser extremamente inflamatória e apresentar surtos recorrentes com múltiplos episódios durante a vida do paciente.
- () A Doença de Dévic se caracteriza por predomínio do acometimento em medula espinhal e nervo óptico.
- () O corpo caloso é uma região constantemente acometida em pacientes com esclerose múltipla.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) F – F – F.
- C) F – V – V.
- D) V – F – F.
- E) F – V – F.

QUESTÃO 18 – A enxaqueca é uma das principais causas de cefaleia e uma das principais causas de consulta em ambulatórios de neurologia. As opções abaixo podem ser utilizadas no tratamento profilático de enxaqueca, EXCETO:

- A) Antidepressivos tricíclicos.
- B) Anticonvulsivantes (valproato de sódio).
- C) Beta-bloqueador (propranolol).
- D) Anti-CGRP e Toxina Botulinica.
- E) Sumatriptano e Naratriptano.

QUESTÃO 19 – Pacientes com epilepsia podem ter diversos tipos de crises. A localização do foco epiléptico em crises focais pode ser um desafio. Sobre a epilepsia, analise as assertivas abaixo:

- I. O lobo frontal caracteriza-se por ser o lobo mais epileptogênico do cérebro.
- II. Uma das opções para o tratamento de crises parciais é o uso de carbamazepina.
- III. O tratamento neurocirúrgico na epilepsia do lobo temporal pode ser considerado em pacientes refratários ao tratamento clínico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 20 – As doenças da junção mio-neural são autoimunes e acometem sinapses colinérgicas do sistema nervoso periférico. Sobre essa situação, pode-se afirmar que:

- I. Neoplasias como carcinomas de pequenas células do pulmão podem estar associados com a síndrome de Eaton-Lambert.
- II. Piridostigmina é uma medicação que causa melhora sintomática em pacientes com mastenia.
- III. A miastenia gravis não apresenta correlação com neoplasias e outras doenças autoimunes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 21 – A Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP) e a Atrofia de Múltiplos Sistemas (AMS) são diagnósticos diferenciais da Doença de Parkinson. Sobre a PSP e AMS, pode-se afirmar que:

- I. A PSP é um distúrbio do movimento em que o paciente apresenta uma síndrome acinéctica rígida e ocorre uma atrofia do mesencéfalo dorsal.
- II. Na AMS, pode ocorrer comprometimento cerebelar ou autonômico.
- III. A AMS caracteriza-se por apresentar um melhor prognóstico em relação à Doença de Parkinson.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 22 – Paciente de 54 anos vem à consulta devido ao surgimento de movimentos involuntários em seus membros superiores. Ao examiná-lo, evidencia-se movimentos coreicos. O paciente também reporta história familiar semelhante ao seu quadro e sintomas depressivos. Ao avaliar o exame de ressonância que ele traz à consulta, evidencia-se:

- A) Atrofia em ambos os hipocampos.
- B) Isquemia em ínsula à direita.
- C) Lesão em corpo caloso.
- D) Atrofia da cabeça dos núcleos caudados.
- E) Atrofia da porção anterior do mesencéfalo.

QUESTÃO 23 – A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma neuropatia adquirida inflamatória. Sobre exames complementares na SGB, pode-se afirmar que:

- I. Na eletroneuromiografia de pacientes com SGB, evidencia-se uma neuropatia axonal.
- II. No exame de líquido realizado em pacientes com SGB, ocorre aumento de proteínas (levando a uma dissociação entre nível de proteína e número de células).
- III. Exames de neuroimagem evidenciam alterações na medula espinhal, acometendo o corno anterior da medula espinhal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 24 – A perda de olfato é uma queixa comum entre pacientes acometidos pela infecção do Covid-19. A via olfativa apresenta algumas particularidades. Sobre essa via, pode-se afirmar que:

- I. A via do olfato é a única via de sensibilidade que não faz relé no tálamo.
- II. Na via do olfato, essa sensibilidade é conduzida para ambos hemisférios (sendo direta e cruzada) e seu ponto de cruzamento da linha média ocorre na comissura anterior.
- III. As áreas corticais de olfato estão localizadas nos lobos temporais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 25 – Hemorragias intracranianas podem ter inúmeras causas (traumáticas ou não). Sobre padrões de hemorragia intracraniana, pode-se afirmar que:

- I. Hematomas extradurais podem ser desencadeados por traumas devido à lesão da artéria meníngea média.
- II. Hematomas subdurais têm apresentações agudas devido a serem originados de grandes artérias corticais.
- III. As rupturas de aneurismas cerebrais rotos apresentam-se mais comumente com padrões de hemorragia subaracnóide.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 26 – A avaliação da escala de Glasgow é fundamental para definir prognóstico em muitos cenários, assim como para a tomada de decisões. Na avaliação do escore de Glasgow, quais itens são avaliados?

- A) Abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora.
- B) Reflexo pupilar, abertura ocular e resposta verbal.
- C) Reflexo pupilar, melhor resposta motora e resposta verbal.
- D) Abertura ocular, reflexo pupilar e melhor resposta motora.
- E) Abertura ocular, resposta verbal e presença de tubo orotraqueal.

QUESTÃO 27 – O exame neurológico dos membros inferiores envolve a avaliação de reflexos tendinosos. Sobre o reflexo patelar, o nervo e as raízes que estão envolvidas nesse reflexo são, respectivamente:

- A) Nervo Femoral, L2-L4.
- B) Nervo Femoral, S1-S2.
- C) Nervo Tibial, S1-S2.
- D) Nervo Tibial, L2-L4.
- E) Nervo Obturador, L1-L3.

QUESTÃO 28 – Cefaleia é uma das principais causas de consultas em emergências e consultórios de neurologia. Sobre cefaleia, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A enxaqueca geralmente manifesta-se com dor unilateral pulsátil associada à náusea, fotofobia e fonofobia e, em seu tratamento profilático, pode ser utilizado propranolol, amitriptilina e anti-convulsivantes (topiramato).
- () A cefaleia por hipotensão liquórica caracteriza-se por melhorar quando o paciente permanece em pé e piora ao deitar-se.
- () SUNCT é uma cefaleia nevrálgiforme rara, de curta duração associada à lacrimação e conjuntivas congestas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 29 – Paciente masculino de 37 anos com história de trauma raquimedular com lesão completa de medula espinhal há 4 anos não apresenta sensibilidade do nível da cicatriz umbilical para baixo. O nível da lesão medular ocorreu em:

- A) T1.
- B) T4.
- C) T6.
- D) L2.
- E) T10.

QUESTÃO 30 – Tumores localizados na base do crânio podem ter diferentes origens. Sobre tumores, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Tumores hipofisários com menos de 10mm e sem manifestações neurológicas ou endocrinológicas devem ter tratamento conservador, não necessitando intervenção neurocirúrgica.
- () A síndrome de Parinaud, caracterizada por uma paresia do olhar para cima ocorre em tumores de hipófise.
- () Cordomas são tumores de crescimento lento, mas localmente agressivos, que surgem de remanescentes não absorvidos do notocórdio.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V.
- B) V – F – F.
- C) V – V – V.
- D) F – F – F.
- E) F – V – F.

QUESTÃO 31 – A síndrome de Foster-Kennedy, que se caracteriza por atrofia papilar ipsilateral à lesão e papiledema contralateral, ocorre em:

- A) Pinealoma.
- B) Meningioma do Sulco Olfatório.
- C) Tumores de Hipófise.
- D) Isquemia de ambos os Lobos Occipitais.
- E) Trombose de Seio Cavernoso.

QUESTÃO 32 – Siringomielia é uma formação cística na parte central da medula espinhal. Sobre siringomielia, pode-se afirmar que:

- I. Na siringomielia, ocorre acometimento da via do tracto espinotalâmico levando à perda de sensibilidade térmica e dolorosa bilateral.
- II. Siringomielia congênita pode ocorrer em associação com a Síndrome de Arnold-Chiari tipo I.
- III. Normalmente acomete a medula lombar, afetando os membros inferiores.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 33 – O exame das diferentes modalidades de sensibilidade é parte fundamental do exame neurológico. Duas grandes vias de sensibilidade conduzem as informações sensitivas ao sistema nervoso central: o tracto espinotalâmico e o sistema da coluna posterior. Relativamente às vias de sensibilidade e suas características, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Sistema da coluna posterior.
2. Tracto espinotalâmico.

Coluna 2

- () Responsável pela condução das sensibilidades de temperatura e dor.
- () Ascende pela medula espinal pelo funículo posterior.
- () A via cruza a linha média na medula espinhal.
- () Responsável pela condução da propriocepção e sensibilidade vibratória.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 - 2 - 1 - 1.
- B) 1 - 1 - 2 - 2.
- C) 1 - 2 - 1 - 2.
- D) 1 - 2 - 2 - 1.
- E) 2 - 1 - 2 - 1.

QUESTÃO 34 – Alguns quadros demenciais são potencialmente tratáveis com regressão dos sintomas. São consideradas causas de demências tratáveis e com reversão dos sintomas, EXCETO:

- A) Demência Vascular.
- B) Hipotireoidismo.
- C) Hidrocefalia de Pressão Normal.
- D) Neurosífilis.
- E) Deficiência de vitamina B12.

QUESTÃO 35 – A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença extremamente temida, que se caracteriza pela presença de sinais de acometimento de primeiro e segundo neurônio motor ao mesmo tempo. Sobre a ELA, pode-se afirmar que:

- I. É fundamental o acompanhamento multidisciplinar de pacientes com ELA.
- II. A presença de acometimento precoce da musculatura de inervação bulbar (como fasciculações na língua) é um marcador de bom prognóstico.
- III. Os exames de neurocondução podem auxiliar na confirmação do diagnóstico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 36 – A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é um quadro muito frequente e está, muitas vezes, associado a lesões por esforço repetitivo. O nervo comprimido na STC é o:

- A) Radial.
- B) Ulnar.
- C) Axilar.
- D) Mediano.
- E) Músculo-cutâneo.

QUESTÃO 37 – Paciente de 67 anos vem à consulta neurológica devido a quadro de alteração de memória rapidamente progressivo com início há quatro meses. Familiares relatam piora do nível de consciência no último mês, período em que também surgiram contrações musculares. Ao examinar o paciente, percebe-se que ele está sonolento e há presença de mioclonias (precipitadas por estímulo luminoso ou sonoro). Exames laboratoriais sem particularidades. Estudo de ressonância magnética revelou áreas de hipersinal em T2, FLAIR e DWI em regiões temporais e frontais bilateralmente. A principal hipótese diagnóstica para esse caso é:

- A) Hidrocefalia de Pressão Normal.
- B) Doença de Creutzfeldt-Jakob.
- C) Encefalopatia Hepática.
- D) Doença de Alzheimer.
- E) Paralisia Supranuclear progressiva.

QUESTÃO 38 – A avaliação de morte encefálica é realizada com grande frequência em pacientes internados em UTI. Sobre essa avaliação, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O paciente necessita estar em Glasgow 3.
- B) Durante a avaliação, o paciente não pode estar em uso de sedação.
- C) O eletroencefalograma (EEG) e o Doppler transcraniano são exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico.
- D) O exame de teste de apneia só deve ser feito em casos de potenciais doadores de órgãos.
- E) Angiografia cerebral pode ser um exame complementar para o diagnóstico definitivo.

QUESTÃO 39 – Uma paciente de 62 anos previamente hígida vem à emergência devido a quadro de cefaleia de forte intensidade com início recente (24 horas de evolução). Descreve sua dor como mais intensa na região temporal esquerda, em que durante o exame físico evidencia-se na palpação da região um “cordão” endurecido. A paciente também reporta que sua visão no olho esquerdo parece estar alterada nas últimas horas. Realizou TC de crânio sem particularidades. Em seus exames laboratoriais, evidencia-se VSG: 118mm, demais sem particularidades. A melhor abordagem para esse caso será:

- A) Uso de sumatriptana.
- B) Uso de corticosteroide.
- C) Aplicação de Toxina Botulínica na região acometida.
- D) Dupla antiagregação plaquetária com aspirina e clopidogrel.
- E) Uso de morfina.

QUESTÃO 40 – A toxoplasmose cerebral é uma situação que comumente afeta pacientes com imunossupressão. Sobre a toxoplasmose, pode-se afirmar que:

- I. A primeira infecção de toxoplasmose durante a gestação pode ocasionar microcefalia no feto.
- II. As lesões cerebrais da toxoplasmose em geral são pequenas e sem área de edema, não impregnando com contraste nos exames de neuroimagem, sendo semelhantes à microangiopatia.
- III. O uso de sulfadiazina associado à piremetamina e ácido fólico é uma possibilidade de tratamento.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.