

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2023**

MÉDICO (OFTALMOLOGIA – PEDIATRIA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_08/05/2023 18:30:09



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436/2017, a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos _____, de forma a _____ ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) equivalentes – associar a
- B) distintos – distinguir de
- C) discordantes – discernir entre
- D) contraditórios – distinguir e discernir entre
- E) incompatíveis – associar e ligar a

QUESTÃO 02 – Em relação à Atenção Básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas.
- () Ações de saúde que envolvem cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- () As equipes assumem responsabilidade sanitária sobre território definido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 03 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- II. Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica.
- III. Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.
- IV. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.

Qual estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa INCORRETA considerando o Estatuto da Pessoa Idosa (2003) e suas alterações.

- A) É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
- B) Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.
- C) Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- D) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- E) É assegurado o direito a acompanhante à pessoa idosa internada ou em observação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

QUESTÃO 05 – Segundo o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticados contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos:

- I. Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
- II. Conselho Interfederativo da Pessoa Idosa.
- III. Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
- IV. Defensoria Pública da Pessoa Idosa.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito de indicadores de saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Um indicador é uma variável, característica ou atributo de Estrutura, Processo ou Resultado, baseada em Donabedian (1980, 1990), que é capaz de sintetizar e/ou representar e/ou dar maior significado ao que se quer avaliar.
- II. O componente Estrutura inclui a relação entre categorias de recursos humanos existentes, tal como o número de agentes comunitários de saúde ou de profissionais de enfermagem.
- III. O componente Processo inclui a relação entre as atividades de distintos profissionais, tal como número de atividades sobre saúde reprodutiva realizadas para adolescentes no serviço de saúde ou número de primeira consulta ginecológica para gestantes.
- IV. Entre os componentes adotados na construção de um indicador, pode-se avaliar as relações que permitem a análise de quanto cada componente influencia o outro, tal como a relação estrutura/processo, avaliando a relação entre recursos existentes e a produtividade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 07 – A respeito da utilização da epidemiologia em saúde, considerando os termos comuns usados na interpretação da literatura médica para exames diagnósticos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A probabilidade pós-teste é igual a chances pós-teste / (1 + chances pós-teste).
- () Através de um nomograma, pode-se calcular a probabilidade pós-teste usando a probabilidade pré-teste e a razão de verossimilhança, sem ter que converter a probabilidade pré-teste em chances.
- () A razão de verossimilhança negativa é a razão entre a probabilidade de um resultado negativo de exame entre pacientes sem a doença e a probabilidade de um resultado positivo entre pacientes com a doença.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 08 – No campo da ética médica ou bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No estabelecimento de prioridades nas políticas públicas de saúde, os gestores têm utilizado balizamentos, entre eles, as bases epidemiológicas e demográficas, a vulnerabilidade do agravo, os recursos, a tecnologia disponível e a efetividade dos procedimentos.
- B) Como Norma Diceológica, é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- C) Como Norma Diceológica, é direito do médico realizar a procriação medicamente assistida, desde que seja com o objetivo de criar embriões com a finalidade de escolha de sexo.
- D) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- E) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.

QUESTÃO 09 – Em relação ao globo ocular em crianças, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Diâmetro corneano horizontal >11 mm em recém-nascidos é considerado fator de suspeita para glaucoma congênito.
- () Lentes intraoculares devem ser evitadas em crianças menores de 2 anos, visto que 80% do crescimento axial do globo ocular ocorre neste período, causando mudanças refracionais significativas.
- () O olho das crianças apresenta maior elasticidade escleral e aumento da pressão vítrea, dificultando cirurgias intraoculares.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
- B) V – V – V.
- C) F – V – F.
- D) V – F – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 10 – Durante o procedimento de ciclotocoagulação transescleral com laser de diodo, para o tratamento de glaucoma refratário em crianças, evita-se aplicar o laser nas posições de 3 e 9 horas com qual objetivo?

- A) Prevenir dano ao corpo ciliar.
- B) Evitar isquemia do segmento anterior.
- C) Reduzir o dano às células tronco limbares.
- D) Aumentar a drenagem do humor aquoso através da malha trabecular.
- E) Diminuir a chance de descolamento de retina.

QUESTÃO 11 – Durante o exame de retinoscopia, é obtida neutralização do reflexo da iluminação do retinoscópio com uma lente de $+1,50$ durante o movimento da faixa para cima e para baixo (faixa horizontal), e com uma lente $+2,50$ durante o movimento da faixa para esquerda e para direita (faixa vertical). Considerando a distância de trabalho do examinador de 66 cm (equivalente ao desconto de $+1,5D$), qual a refração do paciente?

- A) $+1,50 -1,00 \times 180$.
- B) $+1,50 -2,50 \times 90$.
- C) $+2,50 -1,50 \times 180$.
- D) $+1,00 -1,00 \times 180$.
- E) Plano $-1,00 \times 180$.

QUESTÃO 12 – Em alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, é utilizado o cilindro positivo em prescrições de óculos. Qual a transposição correta para a receita: $+2,00 +1,25 \times 80$?

- A) $+3,25 -1,25 \times 170$.
- B) $+1,25 -2,00 \times 80$.
- C) $+0,75 -1,25 \times 170$.
- D) $-2,00 -1,25 \times 170$.
- E) $-3,25 -2,00 \times 80$.

QUESTÃO 13 – São manifestações clínicas típicas de pacientes com albinismo, EXCETO:

- A) Hipoplasia do nervo óptico.
- B) Nistagmo pendular.
- C) Estrabismo.
- D) Fotofobia.
- E) Visão subnormal.

QUESTÃO 14 – Miopia é uma condição comum que afeta uma porcentagem significativa da população, sendo cada vez mais prevalente em crianças. São estratégias para controlar a progressão da miopia, EXCETO:

- A) Ortoceratologia (Ortho-K).
- B) Atropina em baixas doses.
- C) Lentes de contato multifocais.
- D) Lentes com defocus periférico.
- E) Exercícios ortópticos.

QUESTÃO 15 – Sobre o glaucoma em crianças, é correto afirmar que:

- A) Bupololol, epífora e fotofobia compõem a tríade clássica de manifestações do glaucoma congênito.
- B) Brimonidina deve ser evitada em crianças menores de 5 anos devido ao risco de apneia, sonolência e hipotensão.
- C) O tratamento clínico é, na maioria das vezes, a escolha inicial por ser menos invasivo e ter menor taxa de complicações.
- D) Estrias de Haab representam rupturas no estroma corneano causadas pelo aumento da pressão intraocular.
- E) Goniotomia é cirurgia inicial de escolha na presença de opacidade corneana que dificulte a visualização das estruturas da câmara anterior.

QUESTÃO 16 – Qual a cirurgia mais indicada para tratamento de uma criança de 6 anos com ptose congênita unilateral de 3 mm e função do músculo levantador da pálpebra superior de 7 mm?

- A) *Frontalis flap*.
- B) Conjuntivomullerectomia.
- C) Ressecção da aponeurose do músculo levantador da pálpebra superior.
- D) Suspensão frontal.
- E) Fasanella-Servat.

QUESTÃO 17 – Ao examinar uma criança com ausência ou hipoplasia do tecido iriano pela primeira vez, sabendo que ela não possui história familiar dessa condição, deve-se solicitar:

- A) Ultrassom abdominal.
- B) Eletroencefalograma.
- C) Avaliação endocrinológica.
- D) Medida de proteínas urinárias.
- E) Tomografia computadorizada de tórax.

QUESTÃO 18 – São características da síndrome de blefarofimose:

- A) Hipertelorismo, ptose e microftalmo.
- B) Estrabismo, hipertelorismo e entrópio.
- C) Telecanto, pseudo-ptose e entrópio.
- D) Ptose, pseudo-estrabismo e telecanto.
- E) Ptose, telecanto e epicanto invertido.

QUESTÃO 19 – Uma criança que apresenta cabeça inclinada para a direita é levada ao pediatra. A suspeita é de:

- A) Hiperfunção do reto superior direito.
- B) Paresia oblíquo inferior esquerdo.
- C) Paresia oblíquo superior direito.
- D) Paresia oblíquo superior esquerdo.
- E) Paresia oblíquo inferior direito.

QUESTÃO 20 – Relativamente à anatomia e fisiologia dos músculos extraoculares, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Oblíquo superior.
2. Oblíquo inferior.
3. Reto medial.
4. Reto lateral.

Coluna 2

- () Insere-se na esclera à distância de 5.5 mm do limbo.
- () Único músculo que não se origina no ápice da órbita.
- () Na posição primária, produz inciclodução do olho.
- () Recebe apenas 1 ramo de artéria ciliar anterior.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 3 – 1 – 4.
- B) 3 – 2 – 1 – 4.
- C) 3 – 2 – 4 – 1.
- D) 1 – 3 – 2 – 4.
- E) 4 – 3 – 2 – 1.

QUESTÃO 21 – Em relação às aplicações semiológicas e terapêuticas dos prismas em casos de estrabismo, é correto afirmar que:

- A) Ao colocar um prisma na frente de um olho normal, com o outro olho ocluído, haverá o deslocamento da imagem na direção da base do prisma.
- B) Prismas podem ser utilizados para medir o estrabismo através dos testes de cobertura, de Krimsky e de Hirschberg.
- C) Não há inconveniente em somar prismas com bases em diferentes planos.
- D) Para medir estrabismos paralíticos ou restritivos, deve-se preferencialmente colocar o prisma na frente do olho normal.
- E) Um prisma de 1 dioptria produz um desvio do raio luminoso de 1 mm na distância de 1 metro.

QUESTÃO 22 – Assinale a alternativa correta sobre o teste de visão binocular pelo método de Maddox.

- A) O vidro de Maddox é composto por pequenos segmentos cilíndricos, através dos quais uma fonte luminosa é vista como uma faixa perpendicular aos respectivos eixos principais desses cilindros.
- B) Não é possível realizar a medida subjetiva do desvio, pelo método de Maddox, na presença de supressão.
- C) Pode ser utilizado para detectar ambliopia em pacientes não estrábicos.
- D) Para a medida objetiva do ângulo de desvio, é necessário realizar o teste de Maddox alternado.
- E) Na medida da torção, coloca-se um prisma na frente do olho fixador.

QUESTÃO 23 – Uma criança de 4 anos, com diagnóstico recente de exotropia intermitente, apresenta refração sob cicloplegia de +5.00 em ambos os olhos. Qual seria a conduta inicial mais apropriada?

- A) Prescrição do erro refracional.
- B) Lentes negativas.
- C) Terapia visual.
- D) Prismas de base nasal.
- E) Cirurgia de estrabismo.

QUESTÃO 24 – Quando o olho é abduzido a 51 graus, o músculo oblíquo superior age como:

- A) Elevador.
- B) Inciclodutor.
- C) Exciclodutor.
- D) Depressor.
- E) Adutor.

QUESTÃO 25 – Uma criança de 3 anos é diagnosticada com síndrome de Brown congênita. Submetida ao exame, apresenta fusão com 3 graus de elevação do mento e não tem ambliopia. Qual a conduta mais apropriada nesse caso?

- A) Tenotomia oblíquo superior.
- B) Observar.
- C) Injeção de corticóide intratrocLEAR.
- D) Espaçador no tendão do oblíquos superior.
- E) *Tucking* do oblíquo superior.

QUESTÃO 26 – Paciente com doença ocular tireoidiana tem diplopia por hipotropia do olho direito. O paciente está estável por um ano e irá realizar cirurgia de descompressão orbitária em 2 meses. Como deve ser manejado o estrabismo?

- A) Ressecar o reto superior com técnica ajustável no momento da descompressão.
- B) Retroceder o reto inferior direito com técnica ajustável no momento da descompressão.
- C) Retroceder o reto inferior direito antes da cirurgia de descompressão.
- D) Reavaliar para cirurgia de estrabismo após a descompressão orbitária.
- E) Retroceder o reto superior esquerdo após a descompressão orbitária.

QUESTÃO 27 – A toxina botulínica em estrabismo é mais indicada para:

- A) Síndrome de Duane.
- B) Paralisia aguda do VI nervo.
- C) Paralisia aguda de IV nervo.
- D) Paralisia aguda de III nervo.
- E) Paralisia do olhar conjugado.

QUESTÃO 28 – Paciente adulto, com ambliopia no olho direito por esotropia de 40 D prismáticas e consequente posição viciosa de cabeça, virada para esquerda. A conduta cirúrgica mais indicada é:

- A) Retrocesso de ambos os músculos retos mediais.
- B) Recuo do reto medial direito e ressecção do reto lateral direito.
- C) Recuo do reto medial esquerdo e ressecção do reto lateral esquerdo.
- D) Ressecção de ambos os retos laterais.
- E) Recuo de reto medial direito e ressecção de reto lateral esquerdo.

QUESTÃO 29 – Qual dos exames abaixo realiza uma medida objetiva da acuidade visual e pode ser recomendado para acompanhar a visão de bebês?

- A) Eletro-oculograma.
- B) Eletrorretinograma de campo total.
- C) Eletrorretinograma multifocal.
- D) Potencial visual evocado de varredura.
- E) Potencial visual evocado por padrões reversos.

QUESTÃO 30 – Quanto ao desenvolvimento de ambliopia, é correto afirmar que:

- A) Mesmo graus mais altos de astigmatismo não são capazes de induzi-la.
- B) Em geral, é mais frequente na presença de hipermetropia elevada do que na miopia de mesma magnitude.
- C) Não acontece quando ambos olhos, apesar de anisométropes, possuem o mesmo tipo de erro refrativo.
- D) É mais frequente em pequenos erros refratométricos.
- E) Apesar de poder ser bilateral, é sempre assimétrica.

QUESTÃO 31 – Sobre o teste bicromático (verde/vermelho) realizado no consultório durante o exame de refração, é correto afirmar que:

- A) Raios vermelhos tem comprimento de onda menores que os raios verdes.
- B) O hipermetrope hipocorrigido tem visão mais nítida sobre o fundo verde.
- C) O míope hipercorrigido tem visão mais nítida sobre o fundo vermelho.
- D) Esse teste se baseia no princípio da aberração esférica para determinar a quantidade de hipercorreção refracional.
- E) Pacientes com daltonismo não conseguem realizar esse teste.

QUESTÃO 32 – Um recém-nascido de 1 semana de vida apresenta conjuntivite neonatal purulenta e bilateral. Qual achado extraocular pode estar associado ao quadro?

- A) Sinusite.
- B) Pneumonia.
- C) Meningite.
- D) Úlcera oral.
- E) Abscesso subperiosteal.

QUESTÃO 33 – Em relação à sondagem da via lacrimal em crianças com obstrução congênita do ducto nasolacrimal, assinale a alternativa correta.

- A) Está contraindicada em crianças menores de 6 meses de idade.
- B) A sondagem realizada através do canalículo inferior reduz a probabilidade de falso-trajeto.
- C) A sondagem através do canalículo superior é facilitada pela angulação da via.
- D) A causa mais frequente de obstrução congênita é a persistência de uma membrana patente ao nível da válvula de Rosenmuller, percebida como local de resistência durante a passagem da sonda.
- E) Em caso de insucesso da sondagem, está indicada a dacriocistorrinostomia.

QUESTÃO 34 – Vigabatrina (Sabril) é uma medicação comumente utilizada para o tratamento de convulsões de difícil controle em crianças. Assinale a alternativa que corresponde ao efeito ocular mais típico dessa medicação.

- A) Córnea vetuicillata.
- B) Toxicidade retiniana.
- C) Neuropatia óptica.
- D) Glaucoma agudo de ângulo fechado.
- E) Uveíte anterior.

QUESTÃO 35 – Assinale a alternativa que se refere ao hospedeiro definitivo mais comum do agente causador da toxocaríase.

- A) Cachorro.
- B) Gato.
- C) Porco.
- D) Boi.
- E) Rato.

QUESTÃO 36 – Está entre as alterações publicadas na nova Classificação Internacional da Retinopatia da Prematuridade, 3ª edição:

- A) Caracterização adicional do estágio 6.
- B) Extinção da forma Agressiva-Posterior (AP-ROP) e sua inclusão em novas categorias 3A e 3B.
- C) Mudança da indicação de tratamento nos estágios 4.
- D) Inclusão de categoria de neovascularização persistente.
- E) Descrição adicional de ROP em regressão e ROP reativada.

QUESTÃO 37 – Indica-se o tratamento da Retinopatia da Prematuridade nos casos que apresentem:

- A) Linha demarcatória em zona 1.
- B) Proliferação fibrovascular em zona 3.
- C) Região avascular em zona 2 associada à crista elevada.
- D) Proliferação fibrovascular em zona 2 associada à doença plus.
- E) Presença de "popcorns" na zona 2.

QUESTÃO 38 – Analise as assertivas abaixo sobre a cirurgia de catarata congênita realizada em crianças menores de 7 meses de idade:

- I. O não implante de lente intraocular, nestes casos, está relacionado com a melhora da acuidade visual final.
- II. O implante de lente intraocular aumenta o risco de eventos adversos e reoperações.
- III. Quanto mais nova a criança no momento da cirurgia, maior o risco de desenvolver glaucoma.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 39 – Um recém-nascido é diagnosticado com catarata congênita unilateral. Ele apresenta diâmetros corneanos horizontais de 8 mm no olho afetado e de 10 mm no outro olho. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Doença de Coats.
- B) Glaucoma congênito.
- C) Maculopatia hipotônica.
- D) Galactosemia.
- E) Persistência de vasculatura fetal.

QUESTÃO 40 – Ao realizar o primeiro exame oftalmológico de um recém-nascido, o oftalmologista identifica que ele apresenta opacidade corneana unilateral. Qual seria o diagnóstico menos provável nesse caso?

- A) Anomalia de Peters.
- B) Glaucoma congênito primário.
- C) Dermoide epibulbar.
- D) Úlcera infecciosa.
- E) Distrofia endotelial hereditária congênita (CHED).