

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2023**

MÉDICO (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabisçar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_08/05/2023 18:30:09



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436/2017, a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos _____, de forma a _____ ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) equivalentes – associar a
- B) distintos – distinguir de
- C) discordantes – discernir entre
- D) contraditórios – distinguir e discernir entre
- E) incompatíveis – associar e ligar a

QUESTÃO 02 – Em relação à Atenção Básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas.
- () Ações de saúde que envolvem cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- () As equipes assumem responsabilidade sanitária sobre território definido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 03 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- II. Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica.
- III. Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.
- IV. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.

Qual estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa INCORRETA considerando o Estatuto da Pessoa Idosa (2003) e suas alterações.

- A) É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
- B) Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.
- C) Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- D) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- E) É assegurado o direito a acompanhante à pessoa idosa internada ou em observação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

QUESTÃO 05 – Segundo o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticados contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos:

- I. Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
- II. Conselho Interfederativo da Pessoa Idosa.
- III. Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
- IV. Defensoria Pública da Pessoa Idosa.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito de indicadores de saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Um indicador é uma variável, característica ou atributo de Estrutura, Processo ou Resultado, baseada em Donabedian (1980, 1990), que é capaz de sintetizar e/ou representar e/ou dar maior significado ao que se quer avaliar.
- II. O componente Estrutura inclui a relação entre categorias de recursos humanos existentes, tal como o número de agentes comunitários de saúde ou de profissionais de enfermagem.
- III. O componente Processo inclui a relação entre as atividades de distintos profissionais, tal como número de atividades sobre saúde reprodutiva realizadas para adolescentes no serviço de saúde ou número de primeira consulta ginecológica para gestantes.
- IV. Entre os componentes adotados na construção de um indicador, pode-se avaliar as relações que permitem a análise de quanto cada componente influencia o outro, tal como a relação estrutura/processo, avaliando a relação entre recursos existentes e a produtividade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 07 – A respeito da utilização da epidemiologia em saúde, considerando os termos comuns usados na interpretação da literatura médica para exames diagnósticos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A probabilidade pós-teste é igual a chances pós-teste / (1 + chances pós-teste).
- () Através de um nomograma, pode-se calcular a probabilidade pós-teste usando a probabilidade pré-teste e a razão de verossimilhança, sem ter que converter a probabilidade pré-teste em chances.
- () A razão de verossimilhança negativa é a razão entre a probabilidade de um resultado negativo de exame entre pacientes sem a doença e a probabilidade de um resultado positivo entre pacientes com a doença.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 08 – No campo da ética médica ou bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No estabelecimento de prioridades nas políticas públicas de saúde, os gestores têm utilizado balizamentos, entre eles, as bases epidemiológicas e demográficas, a vulnerabilidade do agravo, os recursos, a tecnologia disponível e a efetividade dos procedimentos.
- B) Como Norma Diceológica, é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- C) Como Norma Diceológica, é direito do médico realizar a procriação medicamente assistida, desde que seja com o objetivo de criar embriões com a finalidade de escolha de sexo.
- D) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- E) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.

QUESTÃO 09 – Pela classificação de Southwick para a epifisiólise femoral proximal, os escorregamentos moderados são aqueles cujo ângulo de escorregamento, em relação ao lado contralateral, é/está:

- A) Menor que 15 graus.
- B) Entre 15 e 30 graus.
- C) Entre 30 e 60 graus.
- D) Maior que 60 graus.
- E) Maior que 90 graus.

QUESTÃO 10 – Os músculos do manguito rotador podem ser comprimidos pelas estruturas do arco acromial. As estruturas que fazem parte do arco são:

- A) Porção antero inferior do acrômio, ligamento coracoacromial e processo coracoide.
- B) Porção antero inferior do acrômio, ligamentos coracoclaviculares e processo coracoide.
- C) Clavícula, ligamentos acromioclaviculares e acrômio.
- D) Clavícula, ligamentos coracoacromial e acrômio.
- E) Clavícula, ligamentos coracoclaviculares e processo coracoide.

QUESTÃO 11 – No dedo em gatilho, o dedo mais acometido é o:

- A) Anular.
- B) Polegar.
- C) Indicador.
- D) Médio.
- E) Mínimo.

QUESTÃO 12 – O suspensório de Pavlik, utilizado para tratamento da displasia do desenvolvimento do quadril, tem como principais funções, EXCETO:

- A) Manter os quadris em posição de flexão e abdução.
- B) Desenvolver o acetábulo pela presença da cabeça femoral.
- C) Promover a redução espontânea do quadril luxado.
- D) Fortalecer a cápsula e ligamentos articulares.
- E) Evitar a adução e extensão dos quadris.

QUESTÃO 13 – Em relação ao tumor de células gigantes, analise as assertivas abaixo:

- I. Ocorrem tipicamente em pacientes entre 20 e 40 anos de idade.
- II. A localização mais comum é o fêmur distal.
- III. Comumentemente aparecem como lesões solitárias.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 14 – Na via de acesso ao quadril de Smith-Petersen, o nervo que deve ser identificado e protegido é o:

- A) Femoral.
- B) Glúteo superior.
- C) Cutâneo posterior da coxa.
- D) Ramo cutâneo lateral do nervo subcostal.
- E) Cutâneo femoral lateral.

QUESTÃO 15 – Segundo a classificação de Bado para as fraturas-luxações de Monteggia, o tipo mais comum e a descrição correta da lesão são:

- A) Tipo I: luxação anterior da cabeça do rádio e fratura da diáfise da ulna.
- B) Tipo I: luxação anterior isolada da cabeça do rádio.
- C) Tipo II: luxação posterior da cabeça do rádio e fratura diafisária ou metafisária da ulna com angulação posterior.
- D) Tipo III: luxação lateral ou anterolateral da cabeça do rádio e fratura metafisária da ulna.
- E) Tipo IV: luxação anterior da cabeça do rádio e fraturas da ulna e do rádio.

QUESTÃO 16 – A lesão associada à luxação do ombro, em pacientes com mais de 40 anos de idade, que deve ser pesquisada pela sua alta prevalência é a do(a):

- A) Borda da glenoide.
- B) Cápsula articular posterior.
- C) Tendão do cabo longo do bíceps.
- D) Cabeça umeral.
- E) Manguito rotador.

QUESTÃO 17 – Segundo a classificação de Wagner para as lesões nos pés diabéticos, o grau que tem como característica a presença de infecção ativa é o:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.
- E) V.

QUESTÃO 18 – O local de acometimento ósseo mais comum na tuberculose é o(a):

- A) Ombro.
- B) Coluna.
- C) Quadril.
- D) Joelho.
- E) Tornozelo.

QUESTÃO 19 – Na artroscopia do tornozelo, o portal anterolateral põe em risco o(a) _____, cuja lesão pode ser evitada realizando a _____ e a _____ do pé.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) nervo fibular superficial – flexão – inversão
- B) tendão fibular quarto – extensão – eversão
- C) nervo cutâneo dorsal – flexão – inversão
- D) artéria fibular – flexão – inversão
- E) artéria pediosa – extensão – eversão

QUESTÃO 20 – Nas fratura-luxações posteriores do quadril, a estrutura que está sob risco de lesão é o(a):

- A) Nervo glúteo superior.
- B) Artéria glútea superior.
- C) Nervo ciático.
- D) Músculo piriforme.
- E) Artéria obturatória.

QUESTÃO 21 – Em relação às fraturas do platô tibial, assinale a alternativa correta.

- A) Cargas axiais são mais rápidas e de maior energia que cargas rotacionais.
- B) Têm incidência maior entre a segunda e terceira décadas de vida.
- C) As fraturas em mulheres ocorrem em idades menores que nos homens.
- D) Em pacientes idosos, a queda da própria altura causa mais comumente fraturas do platô medial.
- E) A tibia proximal está mais sujeita a forças em varo.

QUESTÃO 22 – Segundo a classificação de Lauge-Hansen para as fraturas do tornozelo, o mecanismo de supinação-adução causa, entre outras lesões:

- A) Fratura espiral oblíqua da fíbula distal.
- B) Fratura vertical do maléolo medial.
- C) Ruptura do ligamento deltoide.
- D) Fratura transversa do maléolo medial.
- E) Supramaleolar fratura da fíbula.

QUESTÃO 23 – Sobre as fraturas do úmero distal, analise as assertivas abaixo:

- I. Tem distribuição bimodal.
- II. Em pacientes jovens, são lesões causadas por trauma de alta energia.
- III. O mecanismo de lesão mais comum é a queda da própria altura.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 24 – Sobre a resposta fisiológica às lesões da medula espinhal, a formação do edema se dá em qual período após o trauma?

- A) Nos primeiros minutos.
- B) Entre 1 e 4 horas.
- C) Entre 4 e 8 horas.
- D) Entre 4 horas e 1 semana.
- E) Após a primeira semana.

QUESTÃO 25 – A fratura mais comum na infância e que mais comumente requer hospitalização é a do(a):

- A) Úmero distal.
- B) Tibia e fíbula.
- C) Diáfise do fêmur.
- D) Coluna torácica.
- E) Anel pélvico.

QUESTÃO 26 – Tipicamente, o paciente adulto com fratura-luxação de Monteggia queixa de dor no _____, com bloqueio mecânico da _____ do cotovelo e da _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) cotovelo – extensão – flexão do punho
- B) punho – flexão – rotação do antebraço
- C) cotovelo – flexão – rotação do antebraço
- D) punho – extensão – flexão do punho
- E) punho – extensão – rotação do antebraço

QUESTÃO 27 – O exame com maior sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de fraturas ocultas do escafoide é a:

- A) Cintilografia óssea.
- B) Radiografia.
- C) Tomografia computadorizada.
- D) Ressonância nuclear magnética.
- E) Ecografia.

QUESTÃO 28 – Em relação aos tumores ósseos, assinale a alternativa correta.

- A) O tumor de células gigantes tem predominância no sexo masculino.
- B) O exame que dá informações diagnósticas mais úteis na avaliação de lesões ósseas é a tomografia computadorizada.
- C) O sarcoma de Ewing é raro em pacientes de descendência africana.
- D) A presença do “triângulo de codman” na radiografia sugere benignidade da lesão.
- E) Em pacientes jovens com lesão do corpo vertebral, o diagnóstico mais comum é o mieloma múltiplo.

QUESTÃO 29 – A fratura por estresse mais comum na população pediátrica é a do(a):

- A) Rádio.
- B) Clavícula.
- C) Úmero.
- D) Tíbia.
- E) Fêmur.

QUESTÃO 30 – A causa mais comum de síndrome da cauda equina aguda é:

- A) Estenose do canal.
- B) Tumor de vértebra lombar.
- C) Fratura L4.
- D) Hérnia de disco lombar.
- E) Infecção.

QUESTÃO 31 – No paciente politraumatizado, o melhor momento para fazer a fixação definitiva das fraturas encontra-se em quais períodos após a lesão inicial?

- A) Do 2º ao 4º dia e do 10º dia até a terceira semana.
- B) Do 5º ao 10º dia e a partir da terceira semana.
- C) Do 2º ao 4º dia e após a terceira semana.
- D) Do 5º ao 10º dia e durante a terceira semana.
- E) Do 2º ao 4º dia.

QUESTÃO 32 – Nas fraturas do fêmur em crianças, os grupos musculares inseridos nesse osso levam a deformidades características. Nas fraturas subtrocantéricas, o fragmento proximal assume uma posição de:

- A) Extensão, abdução e rotação lateral.
- B) Extensão, adução e rotação lateral.
- C) Flexão, adução e rotação medial.
- D) Flexão, abdução e rotação lateral.
- E) Flexão, abdução e rotação medial.

QUESTÃO 33 – Em relação à ruptura do tendão patelar, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Ocorre mais comumente em pacientes com idade inferior a 40 anos.
 - II. A ruptura bilateral ocorre geralmente em pacientes com diabetes melito ou lúpus eritematoso sistêmico.
 - III. A maioria das rupturas ocorre na inserção do tendão no polo inferior da patela.
 - IV. A fratura por avulsão é mais comum que a ruptura na substância do tendão.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
 - B) Todas as assertivas estão incorretas.
 - C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - D) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
 - E) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 34 – Em relação à artrite séptica, a articulação que mais frequentemente apresenta acometimento bilateral é o:

- A) Joelho.
- B) Cotovelo.
- C) Quadril.
- D) Ombro.
- E) Tornozelo.

QUESTÃO 35 – Na paralisia cerebral, o tipo clínico mais comum é o(a):

- A) Espástico.
- B) Atáxico.
- C) Atetose.
- D) Hipotônico.
- E) Misto.

QUESTÃO 36 – São indicações relativas para a fixação primária das fraturas diafisárias da clavícula, EXCETO:

- A) Deslocamento maior que 2 cm.
- B) Encurtamento maior de 4 cm.
- C) Grande cominuição (mais de 3 fragmentos).
- D) Fraturas expostas.
- E) Fratura bilateral da clavícula.

QUESTÃO 37 – Sobre o sinal da “dupla densidade” visto nas fraturas do calcâneo, é INCORRETO afirmar que:

- A) É visto na radiografia lateral (perfil) do pé.
 - B) A superfície articular pode estar rodada 90 graus em relação ao restante da articulação subtalar.
 - C) Indica uma fratura deslocada somente da metade lateral da faceta posterior.
 - D) O ângulo de böhler está aumentado.
 - E) O ângulo de gissane está normal.
-

QUESTÃO 38 – O tendão mais comumente lesionado em associação às fraturas do rádio distal é o:

- A) Extensor longo do polegar.
 - B) Extensor radial curto do carpo.
 - C) Abductor longo do polegar.
 - D) Extensor ulnar do carpo.
 - E) Extensor curto do polegar.
-

QUESTÃO 39 – Sobre a classificação de Garden das fraturas do colo do fêmur, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Descreve três tipos, de acordo com a angulação do traço de fratura.
- II. Necessita das incidências em anteroposterior e perfil para ser realizada.
- III. A tipo I é a fratura subcapital impactada em valgo.
- IV. Nas fraturas tipo III, a cabeça femoral está em varo e estendida.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
 - B) Todas as assertivas estão incorretas.
 - C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - D) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 - E) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
-

QUESTÃO 40 – As fraturas mais comumente associadas à luxação traumática do joelho são:

- A) Diáfise da tíbia, fêmur e patela.
 - B) Platô tibial, patela e acetábulo.
 - C) Diáfise da tíbia, fêmur e acetábulo.
 - D) Pilão tibial, fêmur e patela.
 - E) Platô tibial, fêmur e acetábulo.
-