

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

QOS-PM/2023 - ENFERMAGEM

(Edital DRH/CRS nº 02/2023, de 18 de janeiro de 2023)

GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	A	В	С	D
2ª QUESTÃO	Α	В	С	D
3ª QUESTÃO	Α	В	С	D
4ª QUESTÃO	Α	В	С	D
5ª QUESTÃO	Α	В	С	D
6ª QUESTÃO	Α	В	С	D
7ª QUESTÃO	Α	В	С	D
8ª QUESTÃO	Α	В	С	D
9ª QUESTÃO	Α	В	С	D
10 ^a QUESTÃO	Α	В	С	D
11a QUESTÃO	Α	В	С	D
12ª QUESTÃO	Α	В	С	D
13ª QUESTÃO	Α	В	С	D
14ª QUESTÃO	Α	В	С	D
15ª QUESTÃO	Α	В	С	D
16ª QUESTÃO	Α	В	С	D
17ª QUESTÃO	Α	В	С	D
18ª QUESTÃO	Α	В	С	D
19 ^a QUESTÃO	Α	В	С	D
20ª QUESTÃO	Α	В	С	D
21ª QUESTÃO	Α	В	С	D
22ª QUESTÃO	Α	В	С	D
23ª QUESTÃO	Α	В	С	D
24ª QUESTÃO	Α	В	С	D
25ª QUESTÃO	Α	В	С	D

26ª QUESTÃO	Α	В	С	D
27ª QUESTÃO	Α	В	С	D
28ª QUESTÃO	Α	В	С	D
29 ^a QUESTÃO	Α	В	С	D
30a QUESTÃO	Α	В	С	D
31ª QUESTÃO	Α	В	С	D
32ª QUESTÃO	Α	В	C	D
33ª QUESTÃO	Α	В	C	D
34ª QUESTÃO	Α	В	С	D
35ª QUESTÃO	Α	В	C	D
36ª QUESTÃO	Α	В	C	D
37ª QUESTÃO	A	В	C	D
38ª QUESTÃO	Α	В	C	D
39 ^a QUESTÃO	Α	В	С	D
40 ^a QUESTÃO	Α	В	С	D
41ª QUESTÃO	Α	В	C	D
42ª QUESTÃO	Α	В	С	D
43ª QUESTÃO	Α	В	С	D
44ª QUESTÃO	Α	В	С	D
45a QUESTÃO	Α	В	С	D
46 ^a QUESTÃO	Α	В	С	D
47ª QUESTÃO	Α	В	С	D
48a QUESTÃO	Α	В	С	D
49 ^a QUESTÃO	Α	В	С	D
50 ^a QUESTÃO	Α	В	С	D

Belo Horizonte, 22 de maio de 2023.

(a) WILLDRÉ LUIZ DOS SANTOS FORTUNATO, TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO DE 2023.

QOS-PM/2023 - ENFERMAGEM (Edital DRH/CRS nº 02/2023, de 18 de janeiro de 2023)

Língua Portuguesa - Direitos Humanos - Conhecimentos Específicos

NOME:		
CPF:	IDENTIDADE:	
NR PM:	SALA:	
DATA:	•	

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

- 1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
- 2. Prova sem consulta.
- 3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
- 4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
- 5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha.
- 6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas, ou em branco, ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
- 7. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 3 (três) horas, das 8h30min até as 11h30min: resolução da prova objetiva e preenchimento da folha de respostas.
- 8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
- 9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, no intervalo de tempo abrangido pela 2ª (segunda) e 3ª (terceira) hora de realização da prova, devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
- 10. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de prova depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação.
- 11. Ao final da prova, caso o candidato não leve consigo o caderno de prova, este deverá ser entregue ao aplicador juntamente com a folha de respostas da prova objetiva, ambos devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
- 12. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs) e servirá de base/objeto para o recurso.

Assinatura do Candidato	

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA PMMG - QOS/2023

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia, atentamente, o texto abaixo e, em seguida, responda as questões propostas.

VOCÊ É UM NÚMERO

Clarice Lispector

Se você não tomar cuidado, vira número até para si mesmo. Porque a partir do instante em que você nasce classificam-no com um número. Sua identidade no Félix Pacheco é um número. O registro civil é um número. Seu título de eleitor é um número. Profissionalmente falando você também é. Para ser motorista tem carteira com número, e chapa de carro. No Imposto de Renda, o contribuinte é identificado com um número. Seu prédio, seu telefone, seu número de apartamento – tudo é número.

Se é dos que abrem crediário, para eles você é um número. Se tem propriedade, também. Se é sócio de um clube, tem um número. Se é imortal da Academia Brasileira de Letras, tem o número da cadeira.

É por isso que vou tomar aulas particulares de Matemática. Preciso saber coisas. Ou aulas de Física. Não estou brincando: vou mesmo tomar aulas de Matemática, preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral.

Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também.

Se é contribuinte de qualquer obra de beneficência, também é solicitado por um número. Se faz viagem de passeio ou de turismo ou de negócio, também recebe um número. Para tomar um avião, dão-lhe um número. Se possui ações, também recebe um, como acionista de uma companhia. É claro que você é um número de recenseamento. Se é católico, recebe número de batismo. No registro civil ou religioso você é numerado. Se possui personalidade jurídica, tem. E quando morre, no jazigo, tem um número. E a certidão de óbito também.

Nós não somos ninguém? Protesto. Aliás, é inútil o protesto. E vai ver meu protesto também é número.

Uma amiga minha contou que no Alto Sertão de Pernambuco uma mulher estava com o filho doente, desidratado, foi ao Posto de Saúde. E recebeu a ficha número 10. Mas dentro do horário previsto pelo médico, a criança não pôde ser atendida porque só atenderam até o número 9. A criança morreu por causa de um número. Nós somos culpados.

Se há uma guerra, você é classificado por um número. Numa pulseira com placa metálica, se não me engano. Ou numa corrente de pescoço, metálica.

Nós vamos lutar contra isso. Cada um é um, sem número. O si-mesmo é apenas o si-mesmo. E Deus não é número.

Vamos ser gente, por favor. Nossa sociedade está nos deixando secos como um número seco, como um osso branco seco exposto ao sol. Meu número íntimo é 9. Só. 8. Só. 7. Só. Sem somá-los nem transformá-los em novecentos e oitenta e sete. Estou me classificando como um número? Não, a intimidade não deixa. Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei. O que faz com que precisemos de muito carinho, de nome próprio, de genuinidade. Vamos amar que amor não tem número. Ou tem?

Disponível em https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/12336/voce-e-um-numero Acesso em: 20 Mar. 2023

1ª QUESTÃO - No texto, observa-se um ponto de vista claro acerca da atribuição de números às pessoas

da autora sobre isso:
A. () As pessoas precisam reagir a esse modelo e se humanizar mais, para que não sejam reduzidas a categorizações numéricas.
B. () É preciso apenas entender de Matemática e Física para compreender a sociedade e o excesso de números nas relações sociais.
C. () Os números e categorizações são meros instrumentos de controle social, por isso não incomodam realmente.
D. () É totalmente possível viver em sociedade sem se submeter às convenções numéricas vigentes.
2ª QUESTÃO – No parágrafo sete, referindo-se à morte de uma criança no Alto Sertão de Pernambuco, a autora afirma: "A criança morreu por causa de um número. Nós somos culpados". Quem é, na opinião dela responsável pela morte do menino? Por quê? Marque a alternativa CORRETA.
A. () Ela própria, sua amiga e a mãe da criança, por não terem reivindicado um atendimento médico compatível.
B. () A sociedade como um todo, por usar e reproduzir esse sistema de classificação social baseado em números.
C. () A mãe da criança, por não ter se insurgido contra a atribuição da ficha 10 ao seu filho.D. () As pessoas em geral, por não exigirem do governo um serviço público de qualidade.
3ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA . Em "Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei", o sentido explicitado é o seguinte:
 A. () É impossível virar um número na sociedade, porque integrar esse sistema não é opcional. B. () Apesar de resistente a esse sistema de classificação numérica, a autora reconhece que é difícil não fazer parte dele.
 B. () Apesar de resistente a esse sistema de classificação numérica, a autora reconhece que é difícil não fazer parte dele. C. () Não aquiescer a um sistema de categorização social implica não ser alcançado por ele.
 B. () Apesar de resistente a esse sistema de classificação numérica, a autora reconhece que é difícil não fazer parte dele. C. () Não aquiescer a um sistema de categorização social implica não ser alcançado por ele. D. () Querer ser diferente não significa fracassar, porque a força das convenções não é grande. 4ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. O texto VOCÊ É UM NÚMERO é uma crônica Considerando as características desse gênero textual e as estratégias discursivas utilizadas pela autora pode-se dizer que: A. () A autora dialoga com um interlocutor específico, possivelmente integrante do seu círculo de amigos. B. () O uso do pronome "você" é uma estratégia para promover a impessoalidade, com o objetivo de criat
 B. () Apesar de resistente a esse sistema de classificação numérica, a autora reconhece que é difícil não fazer parte dele. C. () Não aquiescer a um sistema de categorização social implica não ser alcançado por ele. D. () Querer ser diferente não significa fracassar, porque a força das convenções não é grande. 4ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. O texto VOCÊ É UM NÚMERO é uma crônica Considerando as características desse gênero textual e as estratégias discursivas utilizadas pela autora pode-se dizer que: A. () A autora dialoga com um interlocutor específico, possivelmente integrante do seu círculo de amigos.
 B. () Apesar de resistente a esse sistema de classificação numérica, a autora reconhece que é difícil não fazer parte dele. C. () Não aquiescer a um sistema de categorização social implica não ser alcançado por ele. D. () Querer ser diferente não significa fracassar, porque a força das convenções não é grande. 4ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. O texto VOCÊ É UM NÚMERO é uma crônica Considerando as características desse gênero textual e as estratégias discursivas utilizadas pela autora pode-se dizer que: A. () A autora dialoga com um interlocutor específico, possivelmente integrante do seu círculo de amigos. B. () O uso do pronome "você" é uma estratégia para promover a impessoalidade, com o objetivo de criat um discurso isento.

5ª QUESTAO – No último parágrafo, visando à construção de um determinado efeito de sentido, foram empregadas as seguintes frases: "Vamos ser gente, por favor" e "Vamos amar que o amor não tem número". Qual é o objetivo expresso nessas frases? Marque a alternativa CORRETA .
A. () Desmerecer. B. () Postergar. C. () Exortar. D. () Omitir.
6ª QUESTÃO – Considere o período a seguir: 'Não estou brincando: vou mesmo tomar aulas de Matemática, preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral".
Sobre esse enunciado, afirma-se:
 Ocorre a intencional elipse de um importante operador discursivo logo após a vírgula, o qual introduziria uma oração com valor adversativo. Em "Não estou brincando", as palavras sublinhadas compõem uma locução verbal. Em "Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também", a palavra sublinhada é um pronome. Trata-se de um período composto.
Está CORRETO o que se afirma em:
A. () II, III e IV apenas. B. () I, II e IV apenas. C. () I e III apenas. D. () II e IV apenas.
7ª QUESTÃO – Assinale a alternativa que preenche de forma CORRETA , e na ordem de cima para baixo, as lacunas das sentenças a seguir.
A lei lhe falei já está prescrita. Essa é uma árvore frutos foram usados na receita. As amizades me refiro são importantes para mim. Meus filhos são pessoas muito me orgulho. A mãe colo estava o bebê saiu e ainda não retornou
 A. () que; que os; que; que; cujo. B. () da qual; cujos os; de que; das quais; em cujo o. C. () sobre a qual; cujos; às quais; das quais; em cujo. D. () sobre a qual; que os; de quem; das quais; de cujo.
8ª QUESTÃO – Observe as frases a seguir e, ao final, responda o que se pede:
Quisera não viver em um mundo cheio de classificações numéricas. Se você não tomar cuidado vira número até para si mesmo.
Marque a alternativa CORRETA. Os verbos sublinhados estão flexionados nos seguintes tempos:
 A. () Pretérito imperfeito do subjuntivo; futuro do presente do indicativo. B. () Futuro do presente do indicativo; presente do indicativo. C. () Futuro do subjuntivo; pretérito imperfeito do indicativo. D. () Pretérito mais-que-perfeito do indicativo; futuro do subjuntivo.

9ª QUESTÃO – Considere as orações a seguir, identificando-as, com "V" ou "F" , conforme sejam verdadeiras ou falsas do ponto de vista da concordância verbal e, ao final, responda o que se pede:
 () A imprensa noticiou que foi preso muitos suspeitos durante a operação policial. () O comerciante que distribuía cestas e presentes às crianças sempre foram muito generosos. () Os oitenta por cento que ajudaram a eleger o síndico participaram da festa no clube. () Haviam trinta pessoas no barco que atracou no porto ontem à noite.
A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses na ordem de cima para baixo é:
A. () F, V, V, F. B. () F, F, F, V. C. () V, F, V, V. D. () F, F, V, F.
10ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. A crase é OBRIGATÓRIA em:
 A. () Gostaria de entregar um presente a Vossa Senhoria. B. () Refiro-me aquele paciente do leito 10. C. () Essa é minha homenagem a todos. D. () O número de feridos no acidente chegou a sessenta.
DIREITOS HUMANOS
11ª QUESTÃO – A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada em 1948, constitui uma resposta imediata às atrocidades cometidas nas duas grandes guerras mundiais do século XX. Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é CORRETO afirmar que:
A. () O direito de procurar e gozar asilo em outros países não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
B. () Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
 C. () Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas, não podendo a jornada de trabalho exceder a 44 horas semanais. D. () Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo em caso de guerra declarada.
12ª QUESTÃO – Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) , é INCORRETA a seguinte afirmação:
A. () A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
 B. () Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. C. () Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, respeitada a sua função social.
 D. () Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

13ª OUE	ESTÃO - Proclamada no contexto do pós-guerra mundial, a Declaração	Universal (dos Direitos
	os (DUDH) possui caráter universal. Nesse sentido, conforme estabelece		
	RETO afirmar que:		,
A. () I	Não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou	internaciona	al do país ou

- A. () Não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
- B. () Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
- C. () Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei.
- D. () Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração. Porém, são admitidas violações de direitos humanos advindas dos costumes dos povos.

14ª QUESTÃO – A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), datada de 1969, e ratificada pelo Brasil em setembro de 1992, reafirma o propósito de consolidar um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais. Nos termos do Pacto de São José da Costa Rica, é **INCORRETO** afirmar que:

- A. () Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento do nascimento. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.
- B. () Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
- C. () Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.
- D. () Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.

15ª QUESTÃO – O Pacto de São Jose da Costa Rica, dentre outros aspectos, disciplinou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sobre a referida Comissão, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () Compor-se-á de onze membros, que deverão ser pessoas de caráter ilibado e notório saber jurídico.
- B. () Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo Estado.
- C. () Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia-Geral da Organização, de uma lista de candidatos proposta pela ONU.
- D. () Compete à Comissão Interamericana de Direitos Humanos processar e julgar os crimes cometidos em contexto de guerra.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16ª QUESTÃO – A hemotransfusão é um ato terapêutico relevante que pode salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes.

Com relação ao processo de hemotransfusão, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- A. () O concentrado de plaquetas é um hemocomponente obtido em escala industrial, a partir do fracionamento do plasma por processos físico-químicos.
- B. () A ocorrência de reações transfusionais pode estar associada a sinais e sintomas como febre (definida como elevação de 1°C na temperatura corpórea) com ou sem calafrios associada à transfusão.
- C. () Em indivíduo adulto de estatura média, a transfusão de uma unidade de concentrado de hemácias normalmente eleva a hemoglobina em 3g/dL.
- D. () O tempo de infusão de uma dose de concentrado de plaquetas deve ser de aproximadamente 120 minutos em pacientes adultos ou pediátricos.

17ª QUESTÃO — Uma paciente de 58 anos foi submetida a quadrantectomia de mama. Após sua admissão à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) a paciente queixou dor e foi medicada com 4mg de morfina. Em seguida, apresentou agitação psicomotora, tremores, respiração superficial e pele fria, com queda da saturação periférica de oxigênio (SpO₂) para 82%, necessitando de uso de oxigênio suplementar.

Com base no caso apresentado e considerando os cuidados e complicações pós-operatórias, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () O efeito da dor no pós-operatório eleva a tensão muscular e a vasodilatação local, resultando em aumento da demanda e consumo de oxigênio do miocárdio.
- B. () O flumazenil é a medicação de escolha como antagonista dos opioides, nos casos de depressão respiratória causada por essa classe de analgésicos.
- C. () A escala de Aldrete Kroulik é uma ferramenta utilizada para os pacientes que chegam à SRPA e avalia os parâmetros: atividade, circulação, respiração, consciência e SpO₂.
- D. () Os tipos de hipóxia que podem afetar os pacientes no pós-operatório são: o subagudo e o episódico.

18ª QUESTÃO – Uma paciente de 75 anos sofreu uma queda da própria altura em casa e foi levada ao pronto atendimento. Relatava dor intensa na região do quadril direito e não conseguia levantar-se, sustentar o corpo ou deambular; apresentava equimose coxofemoral e edema (1+/4+) em membro inferior direito. Após a realização de exames de imagem foi evidenciado fratura de colo de fêmur e a paciente foi internada para realização de procedimento cirúrgico.

Considerando o caso apresentado e a assistência de enfermagem prestada ao paciente com fratura de fêmur, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () As fraturas podem ser classificadas de acordo com as características dos fragmentos ósseos, sendo a fratura cominutiva aquela em que um fragmento ósseo é comprimido contra o outro.
- B. () As complicações imediatas das fraturas incluem choque, embolia gordurosa, síndrome compartimental, trombose venosa profunda e embolia pulmonar.
- C. () "Risco de confusão aguda caracterizado por idade maior que 60 anos, dor, mobilidade física prejudicada" é um diagnóstico de enfermagem identificado para esta paciente.
- D. () Uma intervenção de enfermagem para o pós-operatório é a avaliação do edema e tumefação do membro, os quais, quando em excesso, podem comprometer a função e a circulação daquele.

19ª QUESTÃO – Considerando a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e os cuidados de enfermagem para o paciente portador dessa patologia, classifique as assertivas abaixo em V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- () O fator ambiental mais importante no contexto dessa doença é o tabagismo e o fator genético mais bem documentado é a deficiência da alfa1- antitripsina.
- () O diâmetro anteroposterior do tórax aumenta devido a hiperinsuflação pulmonar em pacientes nos quais a doença possui um componente enfisematoso primário.
- () A síndrome metabólica e a depressão são manifestações sistêmicas relacionadas a essa doença.
- () Os resultados da exacerbação da DPOC estão relacionados com o desenvolvimento de alcalose respiratória e necessidade de suporte ventilatório invasivo ou não invasivo.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- A. () F, V, F, V.
- B. () V, F, F, V.
- C. () F, V, V. F.
- D. () V, V, V, F.

20ª QUESTÃO – Considerando que a lesão renal aguda (LRA) refere-se a uma rápida perda da função renal, e que compreender suas fases e complicações são importantes para planejar um cuidado apropriado, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () A LRA pré-renal geralmente resulta de obstrução distal ao rim por determinadas condições como cálculos renais, estenoses, coágulos sanguíneos, hipertrofia prostática benigna e neoplasias malignas.
- B. () Dentre as alterações hidroeletrolíticas que acometem o paciente com distúrbio renal, a hipocalemia é a que comporta maior risco de vida.
- C. () A pré-hidratação com soro fisiológico é um fator preventivo para nefropatia induzida por meios de contraste radiológicos e deve ser aplicada aos pacientes com alto risco de lesão renal.
- D. () O período de recuperação é marcado por aumento gradual do débito urinário, indicando que a filtração glomerular começou a se recuperar.

21ª QUESTÃO – Pacientes criticamente enfermos comumente necessitam de diferentes métodos de fornecimento de nutrientes para o corpo.

Sobre as terapias de nutrição enteral e parenteral, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () As fórmulas de Nutrição Parenteral Periférica não são nutricionalmente completas em virtude do seu baixo conteúdo de dextrose.
- B. () É passível de ocorrer hipoglicemia de rebote quando a solução de Nutrição Parenteral é interrompida abruptamente.
- C. () Nos pacientes que recebem nutrição enteral de forma contínua está indicada a limpeza da sonda a cada 4 horas. Nos casos em que a sonda não está sendo utilizada é contraindicada a limpeza.
- D. () As indicações para gastrostomia e jejunostomia envolvem, respectivamente, necessidade de suporte nutricional enteral além de 4 semanas e inacessibilidade da via gástrica ou não funcionamento adequado do estômago.

22ª QUESTÃO – A mensuração da pressão intra-abdominal deve ser realizada indiretamente via pressão intravesical (PIV), a qual se tornou padrão-ouro por conta da sua facilidade e baixa complexidade.

Em relação à atuação do enfermeiro na verificação da PIV, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () Para a realização da medida o paciente necessita estar em posição supina completa e o transdutor colocado no zero na linha axilar média, ao nível da crista ilíaca.
- B. () A pressão intravesical deve ser expressa em milímetros de mercúrio e a medida realizada no final da inspiração.
- C. () Um volume de 100 mL de solução fisiológica 0,9% deve ser infundido via vesical para a técnica de mensuração da pressão intravesical intermitente.
- D. () A determinação da pressão intravesical deve ser realizada 30 a 60 segundos após a infusão de soro via vesical para permitir a contração do músculo detrusor da bexiga.

23ª QUESTÃO – Sobre os cuidados de enfermagem para o paciente com dreno de tórax, analise as assertivas abaixo:

- I. O borbulhamento contínuo na câmara de selo de água indica que o vazamento está entre o paciente e o selo de água.
- II. É contraindicado clampear o dreno guando há a locomoção ou transporte do paciente pois a pressão pode resultar em pneumotórax hipertensivo.
- III. A ordenha do sistema de drenagem deve ser realizada de maneira rotineira, uma vez que move coágulos e aumenta a drenagem torácica.
- IV. A posição elevada de Fowler é indicada para drenar hemotórax por favorecer a drenagem de fluidos.

Fstão	CORR	FTAS	25 25	sertivas:
LSIAU	CONN	LIAG	as as	ociuvao.

A. () I, II e IV, apenas. B. () II e IV, apenas. C. () I, III e IV, apenas. D. () I, II e III, apenas.
24ª QUESTÃO – As infecções de corrente sanguínea estão associadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde. Assim, medidas de prevenção devem ser instituídas para promover o cuidado seguro ao paciente.

Considerando as recomendações do manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (ANVISA, 2017), classifique as assertivas abaixo em V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- () O mesmo cateter periférico pode ser reutilizado uma única vez na tentativa de punção venosa, desde que não tenha sido contaminado.
- () A cobertura utilizada para proteger o sítio de inserção e fixar o dispositivo não deve ser trocada em intervalos pré-estabelecidos.
- () Não se deve utilizar cateteres periféricos para a administração contínua de qualquer tipo de solução cuja osmolaridade seja superior a 900mOsmol/L.
- () O dispositivo com agulha de aço só deve ser utilizado para a coleta de amostra sanguínea e a administração de medicamento em dose única.
- () O preparo da pele utilizando o gliconato de clorexidine 0,5% deve respeitar o tempo de aplicação de 20 segundos.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo:

A. () V, V, F, V, F. B. () F, V, V, V, F. C. () V, F, V, F, V. D. () F, F, V, F, V.

25ª QUESTÃO – Um lactente de 9 meses, pesando 8 quilogramas, deu entrada no pronto atendimento pediátrico com quadro de prostração e esforço respiratório importante. Ao ser avaliado, o enfermeiro observou que a criança não estava respondendo aos estímulos verbais e dolorosos, apresentando *gasping* e pulso não palpável. Imediatamente acionou ajuda e iniciou as compressões torácicas intercaladas com as ventilações. Assim que o desfibrilador estava disponível, foi constatado que o lactente se encontrava com ritmo de atividade elétrica sem pulso.

Em relação ao atendimento deste lactente, de acordo com as Diretrizes de Reanimação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência (AHA, 2020), analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () Considerando o peso do lactente, foi administrado como primeira dose 80 unidades internacionais da solução de 0,1mg/ml de epinefrina endovenosa.
- B. () É aconselhável administrar a dose inicial de epinefrina em até 5 minutos depois do início das ventilações.
- C. () A dose máxima de epinefrina via endovenosa que poderá ser administrada é de 0,8mg por vez.
- D. () Se não tiver acesso venoso, pode-se administrar 0,01 mg/kg de epinefrina por via endotraqueal.

26ª QUESTÃO — Acerca dos cuidados de enfermagem durante o procedimento de aspiração traqueobrônquica de um paciente com via aérea artificial, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () A instilação de solução salina 0,9% deve preceder a aspiração endotraqueal, já que um dos seus benefícios é fluidificar secreções e permitir a remoção atraumática.
- B. () O fato de introduzir o cateter e concomitantemente realizar aspiração de secreções não reduz o oxigênio das vias respiratórias.
- C. () O diâmetro externo do cateter de aspiração não deve ser maior que a metade do diâmetro interno da via respiratória artificial.
- D. () O tempo de aspiração deve ser limitado a 20 segundos para evitar hipoxemia, cansaço do paciente e traumatismo dos tecidos.

27ª QUESTÃO – O atendimento à parada cardiorrespiratória (PCR) é permeado por vários desafios, especialmente em condições atípicas.

Considerando as Diretrizes de Reanimação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência (AHA, 2020), analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Como as pacientes grávidas são mais propensas à hipóxia, a oxigenação e o manejo da via aérea devem ser priorizados durante a ressuscitação de uma PCR na gravidez.
- B. () Se a carga de choque para desfibrilação recomendada pelo fabricante for desconhecida, deve-se administrar a carga máxima disponível.
- C. () Uma das prioridades na RCP da grávida é o alívio da compressão aortocaval com deslocamento uterino lateral.
- D. () Se não houver retorno da circulação espontânea em 10 minutos de ressuscitação cardiopulmonar na grávida em PCR, deve-se considerar uma cesariana de emergência.

28ª QUESTÃO — O exame físico cardiovascular completo e minucioso ajuda o enfermeiro a detectar as anormalidades e correlacioná-las com a clínica do paciente.

Sobre este tema, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

	ooto torria, arramoo		
B. ()	frequentemente e Durante a palpac sanguíneo relació Um aumento na abdome por 60 aumentado. O atrito pericárdi	encor ção donado press segu co é	pulso que desaparece durante a inspiração, mas retorna durante a expiração trado na insuficiência ventricular esquerda. o precórdio, a presença de um frêmito representa uma interrupção no fluxo com um defeito em uma das valvas atrioventriculares. ão venosa jugular de mais de 1 centímetro, enquanto se aplica a pressão no ndos, indica a incapacidade do coração para acomodar o retorno venoso o som agudo e áspero produzido pelas camadas inflamadas do pericárdio e a acordo com a respiração.
Saúde	(ANVISA, 2017), d	que c	do o manual Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à ontempla as medidas para a prevenção de pneumonia associada à ventilação as abaixo e assinale a alternativa INCORRETA :
B. ()	se estiver sujo ou O sistema fechac reduz a incidência Os umidificadore grande volume de	l com do de a de s aqu e sec assi	ventilador não deve ser realizada de forma rotineira e apenas deve ser trocado mau funcionamento. aspiração é preferível quando comparado ao sistema aberto porque o seu uso pneumonia associada à ventilação mecânica. decidos podem ser a preferência em relação aos passivos em pacientes com reções respiratórias e hemoptise abundante. stência respiratória classificados como críticos, devem ser submetidos a quada limpeza.
30ª QU do pac		ne fís	ico do paciente é um meio confiável para reunir dados essenciais à avaliação
respira abaixo	tório e que estes p enumerando a seg	pode gunda	exame físico de um paciente é possível encontrar diferentes tipos de padrão m correlacionar-se com diversos processos patológicos, analise as assertivas coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa que contém RRETA, na ordem de cima para baixo:
(1)	Cheyne-Stokes	()	Padrão irregular que pode ser observado na meningite, caraterizado por profundidade e frequência variáveis das respirações, seguidas de períodos de apneia.
(2)	Kussmaul	()	Padrão regular, caracterizado por períodos alternados de respiração rápida e profunda, seguida de períodos de apneia, podendo ser resultado de insuficiência renal.
(3)	Biot	()	Respiração rápida, profunda e dispneica, habitualmente observada na cetoacidose diabética.
(4)	Atáxica	()	Desorganização significativa com profundidade irregular e variável da respiração, podendo indicar comprometimento respiratório.
B. ()	3, 1, 2, 4. 1, 4, 3, 2. 2, 1, 3, 4.		

D. () 3, 4. 2. 1.

31ª QUESTÃO – A avaliação dos nervos cranianos é uma área importante da avaliação neurológica, devendo ser incluída ao examinar cada um dos sistemas do corpo humano.

Considerando que para a criança pequena, os testes podem ser apresentados de forma lúdica para obter sua confiança e segurança, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Para avaliação do nervo glossofaríngeo, observe a rouquidão da voz, a capacidade de engolir e se a úvula encontra-se na linha central.
- B. () Para avaliação do nervo vago estimule a faringe posterior com uma espátula e verifique se a criança sente ânsia.
- C. () Para avaliação do nervo hipoglosso, peça a criança para mover a língua em todas as direções, e colocá-la para fora o mais longe possível.
- D. () Para avaliação do nervo trigêmeo, faça a criança sorrir, fazer uma careta ou mostrar os dentes para avaliar a simetria da expressão.

32ª QUESTÃO – Um paciente de 51 anos do sexo masculino, previamente hígido, vítima de atropelamento, apresentou trauma cranioencefálico grave, com hemorragia subaracnóide traumática e necessidade de intervenção neurológica cirúrgica. No segundo dia de pós operatório encontrava-se: sedado com midazolam e fentanil em bomba de infusão contínua, escore 5 pontos negativos na escala de RASS (Richmond Agitation Sedation Scale), com pressão intracraniana (PIC) 25mmHg, intubado em ventilação mecânica, com modo ventilatório pressão controlada, com secreção mucopurulenta visível no tubo orotraqueal (TOT), ausculta com roncos em ápices pulmonares e com dispositivos invasivos (tubo orotraqueal, cateter venoso central, cateter intra-arterial, cateter PIC e cateter vesical de demora). Os dados vitais evidenciavam pressão arterial média 65mmHg, frequência cardíaca 80bpm, frequência respiratória 35irpm, temperatura axilar 36,3°C e saturação periférica de oxigênio (SpO₂) 88%.

Considerando o caso apresentado e as recomendações para formulação de diagnóstico de enfermagem, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Mobilidade na cama prejudicada relacionado a disfunção cognitiva (sedação).
- B. () Capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionada a lesão cerebral traumática evidenciada por PIC 25mmHg e pressão de perfusão cerebral 40mmHg.
- C. () Risco de infecção relacionado a dispositivos invasivos (tubo orotraqueal, cateter venoso central, cateter intra-arterial, cateter de PIC e cateter vesical de demora).
- D. () Desobstrução ineficaz de vias aéreas relacionado a hemoptise secundária ao trauma torácico evidenciado por secreção visível no tubo orotraqueal, taquipneia, ausculta com roncos em ápices pulmonares e saturação de oxigênio 88%.


33ª QUESTÃO – Uma paciente de 76 anos do sexo feminino, portadora de hipertensão arterial sistêmica, deu entrada no pronto atendimento com temperatura axilar 39.2°C, taquicardia, taquipneia, confusão mental, pressão arterial 84x60mmHg e relato de disúria. Após avaliação na classificação de risco, o enfermeiro acionou o médico e abriu o protocolo de sepse.

Considerando que esta paciente foi avaliada com alta probabilidade de sepse e de acordo com as Diretrizes Internacionais para Manejo da Sepse e Choque Séptico 2021, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA:**

- A. () A administração de antimicrobiano deve ser realizada imediatamente, idealmente dentro de três horas a partir da suspeita.
- B. () Para orientar a ressuscitação com fluidos, sugere-se o uso de medidas dinâmicas ao invés de somente o exame físico ou parâmetros estáticos.
- C. () Recomenda-se o uso de procalcitonina, juntamente com a avaliação clínica, para decidir quando iniciar o antimicrobiano.
- D. () A ressuscitação volêmica inicial deve ser realizada, preferencialmente, com solução salina ao invés de cristaloide balanceado.

34ª QUESTÃO – Uma paciente de 32 anos do sexo feminino, previamente hígida, deu entrada no pronto atendimento com relato de palpitação de início súbito na região precordial, sem outras queixas. Na avaliação inicial encontrava-se consciente e orientada em tempo e espaço, com bom padrão respiratório, frequência respiratória 16irpm, frequência cardíaca 190bpm, pressão arterial 118x61mmHg, temperatura axilar 36,1°C, saturação periférica de oxigênio 96% em ar ambiente, tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos.

Considerando o caso exposto e o eletrocardiograma desta paciente mostrado a seguir, analise as assertivas abaixo:



Fonte: KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 4ed. São Paulo: Atheneu, 2016. p. 452.

- I. Trata-se de uma taquiarritmia de complexo QRS estreito (menor que 120 milissegundos) e regular.
- II. A paciente tem indicação imediata de cardioversão elétrica com carga inicial de 100 Joules bifásico.
- III. A adenosina é a droga de primeira escolha para esta arritmia devendo ser administrada lentamente via endovenosa.
- IV. A condução inicial pode se dar com massagem do seio carotídeo devido à estabilidade hemodinâmica da paciente.

Estão CORRETAS as assertivas:

A. () II, e IV, apenas.
B. () II e III, apenas.
C. () I e IV, apenas.
D. () I, II e IV, apenas.

35ª QUESTÃO – Nem todo medicamento é dispensado na unidade de medida em que foi prescrito, e por isso é importante que o enfermeiro tenha a compreensão das habilidades matemáticas básicas para calcular doses de medicamentos, misturar soluções e realizar várias outras atividades.

Considerando que um médico prescreveu a administração endovenosa de Midazolam 3mg para ser diluído em água bidestilada até completar uma solução de 10mL, e que a ampola disponível na farmácia é de 5mg/mL e contém 3mL, realize o cálculo e assinale a alternativa **CORRETA** que corresponde à quantidade de solução a ser administrada:

A. () 1,7mL B. () 2,6mL C. () 2mL D. () 3mL

36ª QUESTÃO – O acidente vascular encefálico (AVE) refere-se ao início e à persistência de disfunção neurológica em decorrência da interrupção do suprimento sanguíneo ao cérebro e é classificado em isquêmico ou hemorrágico.

Considerando que a terapia trombolítica pode ser um tratamento utilizado no AVE isquêmico, e que o enfermeiro é parte importante deste processo, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () A terapia trombolítica deve ser realizada nos pacientes com AVE isquêmico em até 12 horas do início dos sintomas.
- B. () Após administração da terapia trombolítica, recomenda-se manter a pressão arterial sistólica menor que 140mmHg ou a pressão arterial diastólica menor que 120mmHg durante as primeiras 24 horas.
- C. () O paciente deve apresentar contagem de plaquetas maior que 50.000 para receber a terapia trombolítica.
- D. () A pressão arterial sistólica maior que 185mmHg constitui contra indicação para a administração da terapia trombolítica.

37ª QUESTÃO – A utilização de marca-passo constitui importante terapia no tratamento de arritmias quando há falhas nas medidas clínicas ou mesmo concomitante a elas.

Considerando que é fundamental o enfermeiro ter conhecimento de sua instalação e operação para monitoramento e planejamento de cuidados para o paciente, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () A sensibilidade é expressa em milivolts e refere-se ao limite de voltagem no qual um sinal cardíaco espontâneo é reconhecido como tal.
- B. () A impedância refere-se à mínima intensidade de energia capaz de despolarizar o miocárdio, podendo ser medida em volts ou miliamperes.
- C. () O modo de estimulação cardíaca artificial denominado VVI significa que o ventrículo é a câmara estimulada e sentida, com resposta de deflagração do marca-passo a um sinal cardíaco intrínseco.
- D. () A amplitude de estimulação deve ser programada em 20% acima do limiar de comando, para evitar falha de captura.

38ª QUESTÃO – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem envidado esforços para promover ações voltadas à segurança do paciente e melhoria da qualidade nos serviços de saúde.

Considerando a RDC nº 36 de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança dos pacientes em serviços de saúde, marque a alternativa CORRETA:

- A. () Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até setenta e duas horas a partir do ocorrido.
- B. () Compete ao Núcleo de Segurança do Paciente monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos serviços de saúde.
- C. () Compete à ANVISA elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.
- D. () A notificação dos eventos adversos deve ser realizada mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente, até o décimo dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância.

39ª QUESTÃO – Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do **Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (2017)**, bem como a inobservância das normas do sistema Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)/Conselhos Regionais de Enfermagem (COREN).

Levando-se em consideração as penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN/COREN, marque a alternativa CORRETA:

- A. () As penalidades referentes à censura, suspensão e cassação do exercício profissional são da responsabilidade do COFEN e serão registradas no prontuário do profissional de Enfermagem.
- B. () As penalidades a serem impostas são: advertência escrita, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.
- C. () São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- D. () A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até noventa dias e será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN/COREN, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

40ª QUESTÃO – A vacinação apresenta papel fundamental na prevenção, controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis, assim como na redução da morbimortalidade por certos agravos.

No que diz respeito ao calendário de vacinação da criança, do Ministério da Saúde, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () A vacina contra a Hepatite B deve ser administrada nas primeiras 48 horas, preferencialmente, nas primeiras 24 horas de vida, ainda na maternidade, podendo ser administrada até 30 dias após o nascimento.
- B. () A vacina tetra viral corresponde à segunda dose da vacina tríplice viral e à primeira dose da vacina *influenza*. Na sua indisponibilidade, pode ser substituída pelas vacinas tríplice viral e vacina *influenza*.
- C. () A vacina contra o Papiloma Vírus Humano (HPV quadrivalente) está disponível na rede pública de saúde para meninos e meninas entre 9 e 14 anos, sendo o seu esquema composto por 3 doses.
- D. () A vacinação contra a febre amarela é administrada uma dose aos nove meses e uma dose de reforço aos quatro anos. Para crianças a partir de cinco anos, deve-se administrar uma dose única.

41ª QUESTÃO – Os grupos de resíduos de serviços de saúde, estão descritos na Resolução da Diretoria Colegiada Nº 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências.

Assinale a alternativa **CORRETA** sobre o subgrupo ao qual pertence os resíduos do grupo A descritos a seguir: kits de linhas arteriais e endovenosas, dialisadores, bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós transfusão:

A. ()	subgrupo A1.
B. ()	subgrupo A2
C. ()	subgrupo A4

D. () subgrupo A5.

42ª QUESTÃO – A esterilização de artigos a vapor, cujo tempo total do ciclo é mais curto, quando comparado

aos ciclos convencionais, é denominada flash.

Sobre esse método de esterilização, marque a alternativa **CORRETA**:

A. (B. (C. ()	A utilização do método A limpeza prévia a este	<i>fla</i> erili	sh é zaç	riais processados pelo ciclo <i>flash</i> sejam armazenados. e recomendada para a esterilização de implantes. ão <i>flash</i> deverá ser realizada no Centro de Material e Esterilização ou
D. ()	na antessala do centro A urgência pela deman		_	co. artigo de saúde permite abreviar o processamento deste.
		ESTÃO – A hemorragia s gastrointestinais.	a d	iges	tiva é uma das principais indicações de internação em pacientes com
Sobre	ее	essa condição clínica, m	arc	que :	a alternativa CORRETA:
A. ()	Pacientes com doença potencial de hemorragia			atória intestinal, doença péptica e doença diverticular apresentam risco
В. ()	Hematêmese e/ou mel	en	a sâ	no as principais apresentações da hemorragia digestiva alta, ou seja, er parte entre o esôfago proximal e o final do duodeno, no ligamento de
C. (•	quantidade ou o grau d	e p	erd	· ·
D. ()				grande volume ocasionado por varizes esofágicas, pode ser necessária co Sengstaken- Blakemore com a finalidade de hemostasia definitiva.
		ESTÃO - Em relação à com a primeira e, ao fina			nplicações do Diabetes Mellitus (DM), enumere a segunda coluna de ponda ao que se pede:
(1)		Cetoacidose diabética	()	Caracteriza-se pelo espessamento da membrana basal capilar e as alterações secundárias mais comuns são a retinopatia e nefropatia.
(2)		Síndrome Hiperosmolar Hiperglicêmica	()	A doença da artéria coronária, a doença vascular cerebral e a doença vascular periférica constituem os principais tipos de complicações.
(3)		Complicações microvasculares	()	Mais comum no DM tipo 2, resulta de um déficit relativo de insulina em que predominam hipotensão, desidratação profunda, taquicardia e sinais neurológicos variáveis.
(4)		Complicações macrovasculares	()	É marcada pela ausência de insulina ou pela sua presença em quantidade acentuadamente inadequada, o que resulta em distúrbios no metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios.
Assin	al	e a alternativa que conté	ém	a s	equência CORRETA de respostas, na ordem de cima para baixo:
B. (C. ()	4, 1, 3, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 2, 1. 4, 2, 3, 1.			

ananco	as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA :
A. ()	A epinefrina deve ser administrada o quanto antes, sendo o ideal em até cinco minutos depois do início da parada cardiorrespiratória de um ritmo chocável.
B. ()	·
C. ()	A taxa de ventilação assistida para todos os casos de ressuscitação pediátrica é uma ventilação a cada 2 a 3 segundos.
D. ()	Exames de imagem neurológicos para avaliação de prognóstico devem ser considerados durante as primeiras 72 horas da ressuscitação cardiopulmonar.
conform	JESTÃO – Considerando as recomendações para suporte básico e avançado de vida pediátrico ne as Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência 2020), analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
A. ()	A profundidade da compressão deve ser maior ou igual a um terço do diâmetro torácico anteroposterior.
B. ()	Se a vítima de parada cardiorrespiratória tiver via aérea avançada, a relação deverá ser de 15 compressões para 2 ventilações.
C. () D. ()	
	ESTÃO – O desbridamento de uma lesão consiste na remoção de tecido desvitalizado que impede ou o processo de cicatrização.
Sobre CORRI	os tipos de desbridamento e indicações, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa ETA :
A. ()	O desbridamento autolítico é realizado por meio de instrumentais para a remoção do tecido desvitalizado.
B. ()	O desbridamento do tecido desvitalizado de maneira regular e o uso de antissépticos tópicos ativos
C. ()	contra o biofilme são importantes para o manejo de lesão por pressão com atraso na cicatrização. O desbridamento enzimático é um processo que utiliza as próprias enzimas digestivas do corpo para degradar o tecido desvitalizado.
, ,	
D. ()	O desbridamento enzimático é um processo que utiliza as próprias enzimas digestivas do corpo para degradar o tecido desvitalizado. O desbridamento de escara dura, seca e estável nos membros e calcanhares isquêmicos deve ser
D. () 48 ^a QU internac	O desbridamento enzimático é um processo que utiliza as próprias enzimas digestivas do corpo para degradar o tecido desvitalizado. O desbridamento de escara dura, seca e estável nos membros e calcanhares isquêmicos deve ser realizado rotineiramente para que o processo de cicatrização retorne à normalidade. ESTÃO – A Lesão por Pressão (LP) está associada ao aumento nos custos de tratamento e tempo de ção dos pacientes hospitalizados. elação às recomendações sobre o uso de coberturas nas lesões por pressão, contidas em Prevenção amento de Úlceras/Lesões por Pressão: Guia de Consulta Rápida 2019, marque a alternativa
D. () 48ª QU internace Com ree Trata	O desbridamento enzimático é um processo que utiliza as próprias enzimas digestivas do corpo para degradar o tecido desvitalizado. O desbridamento de escara dura, seca e estável nos membros e calcanhares isquêmicos deve ser realizado rotineiramente para que o processo de cicatrização retorne à normalidade. ESTÃO – A Lesão por Pressão (LP) está associada ao aumento nos custos de tratamento e tempo de ção dos pacientes hospitalizados. elação às recomendações sobre o uso de coberturas nas lesões por pressão, contidas em Prevenção amento de Úlceras/Lesões por Pressão: Guia de Consulta Rápida 2019, marque a alternativa
D. () 48ª QU internace Com ree Trata CORRI	O desbridamento enzimático é um processo que utiliza as próprias enzimas digestivas do corpo para degradar o tecido desvitalizado. O desbridamento de escara dura, seca e estável nos membros e calcanhares isquêmicos deve ser realizado rotineiramente para que o processo de cicatrização retorne à normalidade. ESTÃO – A Lesão por Pressão (LP) está associada ao aumento nos custos de tratamento e tempo de ção dos pacientes hospitalizados. Plação às recomendações sobre o uso de coberturas nas lesões por pressão, contidas em Prevenção amento de Úlceras/Lesões por Pressão: Guia de Consulta Rápida 2019, marque a alternativa ETA: O alginato de cálcio pode ser utilizado em LP estágio 3 e 4, com presença de grande volume de
D. () 48a QU internace Com ree Trata CORRI A. () B. ()	O desbridamento enzimático é um processo que utiliza as próprias enzimas digestivas do corpo para degradar o tecido desvitalizado. O desbridamento de escara dura, seca e estável nos membros e calcanhares isquêmicos deve ser realizado rotineiramente para que o processo de cicatrização retorne à normalidade. ESTÃO – A Lesão por Pressão (LP) está associada ao aumento nos custos de tratamento e tempo de ção dos pacientes hospitalizados. Elação às recomendações sobre o uso de coberturas nas lesões por pressão, contidas em Prevenção amento de Úlceras/Lesões por Pressão: Guia de Consulta Rápida 2019, marque a alternativa ETA: O alginato de cálcio pode ser utilizado em LP estágio 3 e 4, com presença de grande volume de exsudato. O filme transparente pode ser utilizado como cobertura secundária, quando coberturas avançadas

49ª QUESTÃO – O eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações fornece informações que auxiliam no descarte ou no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio (IAM). Durante o monitoramento das alterações seriadas no ECG, é possível identificar e monitorar a localização, a evolução e a resolução do IAM.

No que diz respeito às possíveis alterações presentes no ECG de um paciente com diagnóstico de IAM, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () As alterações no ECG esperadas no IAM são a inversão da onda T, a elevação do segmento ST e o desenvolvimento normal da onda Q.
- B. () A elevação no segmento ST em uma derivação no ECG é suficiente para diagnosticar IAM.
- C. () Uma onda Q anormal pode indicar um infarto do miocárdio antigo.
- D. () Durante a recuperação de um IAM, a onda T é o primeiro indicador no ECG a se normalizar.

50ª QUESTÃO – Os fibrinolíticos constituem um grupo de medicamentos capazes de lisar a fibrina e desfazer do trombo. Dentre suas aplicações destacam-se o infarto agudo do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST (IAM-cST) e o acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi).

Em relação as aplicações clínicas dos fibrinolíticos no IAM-cST e no AVCi, classifique as assertivas abaixo em **V** (**Verdadeiro**) ou **F** (**Falso**):

- () A administração deve ser realizada em até 30 minutos da chegada do paciente ao serviço de pronto atendimento (tempo porta-agulha).
- () A terapia fibrinolítica está indicada nos pacientes de alto risco: hipotensão arterial (pressão arterial sistólica menor ou igual a 90 mmHg), sinais de disfunção/dilatação do ventrículo direito, embolias extensas e polissintomáticos.
- () O uso do fibrinolítico no AVCi está indicado nas primeiras 6 horas do início dos sintomas, administrado por via endovenosa periférica ou em até 4 horas quando via intra-arterial.
- () Quando a diferença entre os tempos porta-agulha e porta-balão for maior ou igual a 90 minutos, deve-se optar pelo tratamento fibrinolítico.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo é:

- A. () V, V, F, F.
- B. () F, V, V, F.
- C. () V, F, F, V.
- D. () F, F, V, V.

-----corte aqui-----

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50