

MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação Aplicada ao SUS 5 (cinco) questões, Legislação Aplicada à EBSERH 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 35 (trinta e cinco) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá se retirar do setor de prova **02 (duas) horas** após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LINGUA PORTUGUESA

Leia com atenção os dois textos a seguir para responder às questões de 1 a 6.

[Texto 1]

Trecho do artigo Trabalho e Existência produzido pelo Sesc São Paulo.

As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário, também são responsáveis por construir identidades. Uma vez que organizam o tempo, determinam as relações entre os indivíduos e configuram sua autorrepresentação, torna-se compreensível que nos entendamos em função das atividades laborais que exercemos.

Catálogo impresso Publicação Sesc SP - **Nós, criação, trabalho e cidadania**. Novembro de 2019.

[Texto 2]



Fonte: https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0-e3SVhEsvygcJ6L-mg.jpeg

1) Sobre a interpretação dos textos, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os dois textos pactuam do mesmo ponto de vista sobre o trabalho.
- II. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de descontinuidade na compreensão de trabalho.
- III. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de contiguidade na compreensão de trabalho.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas a afirmativa II está correta.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- e) Apenas a afirmativa III está correta.

2) Sobre a interpretação dos textos, assinale a alternativa correta.

- a) O [texto 1] é uma sequência tipológica injuntiva enquanto a tirinha [texto 2] representa uma sequência tipológica narrativa.
- b) Por ambos os textos terem como função “vender” uma ideia sobre trabalho, eles podem ser considerados sequências tipológicas propagandísticas.
- c) O [texto 1] apresenta uma sequência explicativa sobre uma ideia de trabalho, enquanto a tirinha [texto 2] apresenta uma menção denotativa sobre trabalho por meio da dúvida do personagem.
- d) A tirinha [texto 2] faz uso da fala de personagens que mesmo representando o público infantil promove uma reflexão profunda sobre o trabalho na vida adulta.
- e) O [texto 1] por ser ficcional promove um olhar romantizado e errôneo da concepção de trabalho.

3) Quanto à principal distinção de ponto de vista dos dois textos, assinale a alternativa correta.

- a) Enquanto o primeiro texto apresenta uma sequência de descrições sobre o trabalho e a constituição identitária dos sujeitos, a dúvida do personagem da tirinha denuncia uma percepção de trabalho que rouba a vida de quem o realiza.
- b) Eles se distinguem por serem aleatórios na apresentação propositiva confundindo o leitor sobre o foco pretendido por eles enquanto tema.
- c) A tese que sustenta o [texto 1] fundamenta-se no senso comum sobre o trabalho, enquanto a tese da tirinha está assentada em pesquisas e estatísticas brasileiras.
- d) O sentido de contradição entre os textos pode ser pensado pelo primeiro quadrinho ser uma afirmação e o segundo quadrinho uma interrogação.
- e) Os textos se diferem enquanto estrutura por mais que os argumentos e o ponto de vista de ambos coincidam.

4) Assinale a alternativa que indica o sentido correto do emprego do termo “para” no trecho: “Trabalhar para ganhar a vida”.

- a) Conclusivo.
- b) Finalidade.
- c) Explicativo.
- d) Concessivo.
- e) Alternativo.

5) Assinale a alternativa correta que contenha a expressão mais condizente com a interpretação sobre trabalho proposta pelo [texto 1].

- a) O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
- b) Deus ajuda quem cedo madruga.
- c) Tempo é dinheiro.
- d) Cabeça vazia, oficina do diabo.
- e) O trabalho enobrece o homem.

6) Analise as afirmativas abaixo em relação ao [texto 1] e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () No trecho “As atividades **humanas** designadas como trabalho, para além de seu caráter **utilitário**”, os termos destacados são classificados como adjetivos.
- () A palavra “também” é um advérbio de exclusão.
- () No trecho “Uma vez que organizam **o tempo**”, o termo destacado funciona sintaticamente como Objeto Direto.
- () O trecho “que nos entendamos em função das atividades laborais.” É classificado sintaticamente como Oração Subordinada Completiva Nominal.
- () O trecho “que exercemos” é classificado sintaticamente como Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, V, V, V.
- b) V, V, F, F, F.
- c) F, F, V, F, F.
- d) V, F, V, F, V.
- e) V, F, F, V, V.

Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 7 a 11.

Adaptado

A terceira edição da pesquisa Nossa Escola em (Re)Construção ouviu estudantes dos ensinos fundamental e médio e mostrou que 64% deles “consideram importante” ter psicólogo na escola para atendê-los.

Os jovens querem profissionais de psicologia na escola “tanto no apoio para lidar com sentimentos, quanto para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.

“Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles”, destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa.

A atuação permanente de psicólogos nas escolas está prevista em projeto de lei (PL) aprovado pelo Congresso Nacional.

A pesquisa ouviu 258.680 estudantes, de 11 a 21 anos, de todo o Brasil. A maior participação na pesquisa foi de estudantes da Região Sudeste (63,5%). A maioria passou a maior parte da vida escolar em escolas públicas (93,4%), tinha de 15 a 17 anos (58%), é formada de meninas (52%) e se define de cor parda (42%).

Fonte: <https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/11/30/maioria-estudantes-psicologo-escolas.html>

7) A partir da interpretação do texto acima, assinale a alternativa correta.

- Trata-se de uma reportagem baseada em estatísticas internacionais e que sustenta os argumentos necessários para a aprovação do PL pelo Congresso Nacional.
- A demanda dos estudantes por profissionais da educação se deve a uma necessidade tanto de saúde emocional como de orientação vocacional.
- Por tratar-se de uma pesquisa feita tanto com alunos do ensino fundamental como do ensino médio nada podemos inferir sobre a necessidade de profissionais da saúde mental para aluno da primeira infância.
- O resultado da pesquisa sustenta-se, majoritariamente, na demanda de estudantes de escolas da rede pública e dividiu-se igualmente pela escuta de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino.
- Sabemos pelo texto que a pesquisa não ouviu estudantes da rede de ensino privado por compreender que a maior necessidade por auxílio psíquico advém das pessoas que não podem pagar pelo ensino.

8) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do trecho a seguir, respeitando o sentido pretendido pelo texto e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa.

“_____ no apoio para lidar com sentimentos, _____ para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.

- Seje / seja.
- Seja / como.
- Quiça / seja.
- Mas / mais.
- Mais / menos.

9) Leia o trecho: ‘Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles’, destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa.’ e assinale a alternativa incorreta.

- O verbo “haver” é impessoal.
- A palavra “entre” é, morfológicamente, uma preposição.
- A expressão “uma plataforma” é composta, respectivamente, por um artigo indefinido e um substantivo.
- Em “apoio a educadores”, a palavra “a” é uma preposição.
- Em “que também esteve”, a palavra “que” é uma conjunção.

10) De acordo com as regras de concordância verbal e nominal, assinale a alternativa correta.

- As dificuldades socioemocionais representam problemas muito graves e presentes na vida de adolescentes de vários níveis social.
- A presença de profissionais da área de psicologia é uma reivindicação e direito dos jovens que, na rede de ensino, tem necessidade de apoio psicológico.
- A necessidade de auxílio psicológico, por meio da presença de profissionais da área de saúde mental nas escolas, deve ser um fato observado pelas autoridades.
- Os direitos devem ser cumpridos para que haja condições saudável de convivência entre os jovens na idade escolar.
- Os pais e responsáveis devem ficar atentos com quem os adolescentes convive no seu cotidiano.

11) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente.

- açaí, impár, música.
- essencialmente, caráter, neurônios.
- necessário, projéto, específico.
- despértam, até, médicos.
- sáudam, privilégio, herói.

Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 12 a 15.

Hospitalização de adolescentes por transtornos mentais aumenta e preocupa pediatras.

As internações hospitalares de adolescentes com idade de 10 a 14 anos motivadas por doenças mentais e comportamentais aumentaram 107% nos últimos dez anos no Sistema Único de Saúde (SUS), registrando quase 25 mil casos no período. Na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil internações em uma década.

Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), elaborado com base em dados do Ministério da Saúde, o aumento das hospitalizações – muitas delas motivadas por quadros graves de transtorno de humor, estresse e outras doenças – pode estar relacionado a um aumento da incidência da chamada doença do século XXI: a depressão. No entanto, os pediatras não descartam a possibilidade também de maior procura pela assistência ou aperfeiçoamento das notificações.

Fonte: <http://www.saudebrasilnet.com.br/noticias/hospitalizacao-de-adolescentes-por-transtornos-mentais-aumenta-e-preocupa-pediatras>

12) Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta.

- a) De acordo com o texto, abre-se um novo campo de pesquisa para os pediatras que precisam fazer uma nova formação para compreender esse novo fenômeno.
- b) Segundo o levantamento apontado, transtorno de humor e estresse são alguns dos motivos das hospitalizações de adolescentes.
- c) Uma hipótese para o aumento do número de hospitalizações de adolescentes por transtornos mentais pode ser a chamada doença do século XXI: a depressão.
- d) Com base em dados do Ministério da Saúde, na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil internações em uma década.
- e) A pesquisa abrangeu adolescentes da faixa etária de 10 a 19 anos.

13) Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os sinônimos das palavras “motivadas” e “incidência” presentes no segundo parágrafo do texto.

- a) causadas / coincidência.
- b) resultadas / existência.
- c) originadas / ocorrência.
- d) esperadas / concorrência.
- e) animadas / abstinência.

14) Assinale a alternativa em que, de acordo com as regras de pontuação, o título do texto está corretamente reescrito.

- a) O aumento, de hospitalização, de adolescentes por transtornos mentais preocupa pediatras.
- b) A hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes preocupa, pediatras.
- c) O aumento de adolescentes hospitalizados por transtornos mentais, preocupa pediatras.
- d) Por transtornos mentais, hospitalização de, adolescentes, preocupa pediatras.
- e) O aumento da hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes, preocupa pediatras.

15) Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi usado corretamente.

- a) Às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde embasam as conclusões do texto.
- b) O texto é embasado segundo às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde.
- c) O Ministério da Saúde embasou às informações fornecidas pelo texto.
- d) Em relação às informações do texto, elas foram embasadas pelo Ministério da Saúde.
- e) Às conclusões do texto foram embasadas de acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

16) É previsto na Lei nº 8.080/1990, em seu Capítulo VI no Art. 1º, sobre o subsistema e atendimento domiciliar, incluído pela Lei nº 10.424/2002, que dispõe sobre os atendimentos e internações domiciliares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio
- b) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se os procedimentos médicos e de enfermagem, não havendo necessidade entre outras áreas para este tipo de cuidado
- c) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes, exclusivamente médicas, que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora
- d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação da família, sem a concordância com a equipe médica
- e) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, sem a necessidade de concordância do paciente ou de sua família

17) Leia abaixo parte do Art. 1º da Lei nº 8142/1990, que discorre sobre a participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS).

“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, _____ e _____, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder _____ constituído em cada esfera do governo”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas

- a) profissionais de saúde / usuários / ilegalmente
- b) médicos / sanitaristas / verbalmente
- c) profissionais de saúde / usuários / legalmente
- d) profissionais de saúde / sanitaristas / legalmente
- e) médicos / usuários / legalmente

18) Os serviços de saúde devem garantir a segurança do seu paciente. Para auxiliar nesse manejo do cuidado, foi criada a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36, de 25 de julho de 2013, com objetivo de instituir ações para promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Em relação à vigilância, monitoramento e notificações de eventos adversos, assinale a alternativa correta.

- A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada semestralmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa
- Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 (setenta e duas) horas a partir do ocorrido
- A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde
- Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do ocorrido
- Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 (quarenta e oito) horas a partir do ocorrido

19) O Conselho Nacional de Saúde é procurado por várias instâncias como: usuários, trabalhadores, gestores, diferentes entidades da sociedade civil (como Organizações não governamentais e órgãos de exercício profissional), entre outros, com a finalidade de sanar dúvidas e obter esclarecimentos sobre o plano de gestão. Neste sentido, também é indicado aos membros dos conselhos de saúde fiscalizar o andamento dos serviços. Em relação à fiscalização dos conselheiros de saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- “É recomendada a leitura do Plano de Saúde e as deliberações apresentadas no relatório da última Conferência de Saúde da cada região.”
- “São indicadas visitas às unidades de saúde, sem agendamento ou aviso prévio, com a finalidade de analisar a compatibilidade do serviço com critérios pré-definidos.”
- “É orientado conversar com usuários e com trabalhadores de saúde, levantando informações e percepções sobre a qualidade e deficiências dos serviços de saúde.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- F, V, F
- V, V, V
- V, F, F
- V, V, F
- V, F, V

20) Os determinantes sociais da saúde interferem diretamente no processo saúde-doença e ditam o mapa de saúde de uma região. Esses determinantes sociais referem-se aos fatores sociais, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Em relação aos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa correta.

- No Brasil, com a finalidade de identificar com menor precisão os fatores ambientais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores genéticos e hereditários que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Global sobre Determinantes Sociais da Vida
- No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores biopsicossociais que determinam a doença, foi criada a Comissão Nacional contra os Determinantes Culturais da Saúde

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH

21) No Capítulo XVI do Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), é tratado sobre a auditoria interna, que é vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do comitê de auditoria. Sobre a auditoria interna da EBSEH, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- “Compete executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa.”
- “Cabe propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados.”
- “Deve verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações do Ministério da Saúde, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Executivo.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, V, V
- V, V, F
- V, F, F
- F, F, F
- F, F, V

22) Leia abaixo o Art. 6º da Lei nº 12.550/2011.

“A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia _____, poderá _____ os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições _____ de ensino ou instituições congêneres”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) hospitalar / prestar / privadas
- b) hospitalar / prestar / públicas
- c) universitária / prestar / federais
- d) universitária / negar / federais
- e) universitária / prestar / privadas

23) De acordo com o Capítulo III do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), sobre os compromissos de conduta, os princípios éticos e morais são fundamentais para o trabalho. Em relação ao Art. 6º, sobre os princípios e valores norteadores e compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os valores e compromissos devem estar refletidos nos relacionamentos nos âmbitos interno e externo à Empresa, sempre zelando pela imagem, reputação e integridade da EBSEERH
- b) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos colaboradores
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente ou em parceria e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) Os valores e compromissos da empresa, com base em seu patrimônio capital e intelectual, não são regidos pelos aspectos éticos e morais de conduta, pois se norteiam com base administrativa e executiva
- e) Deve-se proteger a marca e a propriedade intelectual do mau uso, desvios ou utilização para benefícios pessoais

24) O Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) baliza os princípios e valores requeridos pela empresa, sob responsabilidade da Comissão de Ética da EBSEERH (CEE). Em relação à CEE, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () “Compete à CEE a divulgação, implementação e atualização do Código de Ética e Conduta, a resposta a consultas éticas, bem como a apuração de denúncias de descumprimento de conduta ética.”
- () “Qualquer pessoa poderá entrar em contato com a CEE, pelos canais de comunicação indicados na intranet e internet, sendo assegurado parcial sigilo e confidencialidade das informações.”
- () “A denúncia de uma conduta contrária aos preceitos éticos poderá ser feita por qualquer cidadão, empregado da EBSEERH ou não.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V
- b) V, V, V
- c) F, V, F
- d) V, V, F
- e) F, F, F

25) A Assembleia Geral é o órgão máximo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Em relação à Assembleia Geral, assinale a alternativa correta.

- a) As deliberações serão registradas no livro de atas, que não podem ser lavradas em forma de sumário dos fatos ocorridos e serão divulgadas exclusivamente no Diário Oficial da União em sua versão impressa
- b) Os trabalhos da Assembleia Geral são dirigidos pelo Presidente da União ou pelo substituto que esse vier a designar
- c) A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e extraordinariamente sempre que necessário
- d) A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho Executivo ou, nas hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Fiscal ou pela União
- e) A Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) Paciente de 45 anos, hipertenso não aderente ao tratamento comparece ao serviço de pronto atendimento acompanhado pelo filho que refere ter encontrado o pai caído no banheiro após ter sido visto bem pela última vez há 45 minutos. Ao exame o paciente apresenta-se confuso, desorientado no tempo e espaço e com hemiparesia desproporcionada de predomínio braquial à direita associada à desvio de rima labial, afasia e disartria. Você identifica PA 176/86mmHg FC= P 98 bpm FR 26 irpm e SatO₂: 98%, glicemia capilar 176 mg/dL. Você realiza uma tomografia que não evidenciou nenhum achado anormal. Assinale a alternativa correta quanto à proposta de farmacoterapia.
- Alteplase 0,75 mg/Kg e enalapril 10mg
 - Tenectplase 50mg apenas
 - Alteplase 0,9 mg/Kg e enalapril 10 mg
 - Estreptoquinase 1.500.000 UI e enalapril 10 mg
 - Alteplase 0,9mg/kg apenas
- 27) Paciente de 59 anos, sexo feminino, menopausada, diabética e hipertensa com bom controle comparece em unidade de pronto atendimento com queixa de dispneia e diaforese há duas horas de forte intensidade iniciada ao repouso e sem melhora espontânea associada à náuseas e vômitos. Ao exame físico PA = 187/78 mmHg, FC=P= 111 bpm FR = 17 irpm SatO₂ = 98% em ar ambiente, murmúrio vesicular fisiológico com crepitações bilaterais em bases. Em relação ao caso assinale a alternativa correta quanto à conduta.
- Trata-se de uma síndrome coronariana aguda, provavelmente às custas de um infarto agudo do miocárdio. Iniciar com eletrocardiograma em 10 min e proceder cateterismo diagnóstico/ terapêutico independentemente do resultado, por a clínica é típica
 - Trata-se de uma síndrome coronariana aguda com equivalente isquêmico. Deve-se realizar eletrocardiograma em até 10 min da entrada, iniciar terapia dupla anti-agregante, iniciar pesquisa enzimática seriada e a depender do resultado do eletrocardiograma de entrada programar angioplastia primária ou trombólise
 - Trata-se de uma dor torácica atípica, provavelmente não anginosa. Deve-se realizar o eletrocardiograma em 10 min da entrada para descartar infarto agudo do miocárdio e orientar o paciente quanto à baixa especificidade do quadro clínico
 - Trata-se de um edema pulmonar agudo, provavelmente hipertensivo, às custas de infarto agudo do miocárdio. Deve-se iniciar terapia anti-agregante e analgesia, seguimento com pesquisa enzimática seriada e o eletrocardiograma pode ser considerado desnecessário uma vez que as manifestações clínicas são típicas
 - Trata-se de uma síndrome coronariana aguda, provavelmente às custas de um infarto agudo do miocárdio. Deve-se realizar eletrocardiograma em até 10 min da entrada e a depender do resultado realizar terapia dupla anti-agregante, iniciar pesquisa enzimática seriada e conforme resultados e evolução programar angioplastia primária ou trombólise
- 28) Queda é uma das principais causas de mortalidade em pacientes idosos. Em relação às causas imediatas da morte associada à síndrome de queda, assinale a alternativa correta de maior prevalência e que está mais fortemente associada aos fatores de risco: tabagismo, obesidade e imobilidade.
- Edema agudo pulmonar
 - Síndrome coronariana aguda
 - Sepse de foco pulmonar
 - Tromboembolismo pulmonar
 - Embolia gordurosa
- 29) Paciente de 30 anos comparece a unidade de pronto atendimento com quadro de hemorragia digestiva alta. Durante a abordagem inicial apresentou quadro de choque que não respondeu a terapia inicial de fluidos. Assinale a alternativa correta quanto à terapia farmacológica nessa situação.
- Vasopressina
 - Dobutamina
 - Adrenalina
 - Dopamina
 - Noradrenalina
- 30) Paciente do sexo feminino de 30 anos é trazida ao pronto atendimento após ter sido encontrada desacordada, com diminuição do ritmo respiratório, pupilas míticas bradirreagentes e com várias cartelas de nitrazepam ao seu lado. Em relação às opções de manejo imediato assinale a alternativa correta quanto à droga de eleição a ser administrada nesse caso.
- Atropina
 - Naloxona
 - Flumazenil
 - Metoprolol
 - Carvão ativado
- 31) Paciente do sexo feminino foi levada ao pronto atendimento após ter sido vítima de mordedura por cachorro na panturrilha esquerda. O animal é de origem conhecida, pertencente aos seus vizinhos e tem histórico de vacinação completa. Sobre o caso, leia as afirmativas a seguir:
- Realizar sutura do ferimento para melhorar o processo de cicatrização após revitalização das bordas.
 - Iniciar antibioticoterapia profilática com metronidazol, sem necessidade de associações pois a maior probabilidade é de contaminação por anaeróbios.
 - Iniciar imediatamente o esquema profilático com 4 (quatro) doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via IM
 - Cicatrização por segunda intenção e monitoramento do animal por 10 dias.
- Assinale alternativa correta.**
- Apenas a afirmativa I está correta
 - Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
 - Apenas as afirmativas I e II estão corretas
 - Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
 - Apenas a afirmativa IV está correta

- 32) Em relação ao manejo de exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica, assinale a alternativa correta.**
- Corticoterapia sistêmica é sempre desnecessária
 - A corticoterapia inalatória é uma medida que não se aplica no manejo de casos agudos
 - Está contraindicada a antibioticoterapia com aminoglicosídeo
 - A antibioticoterapia deve conter preferencialmente aminoglicosídeo e betalactâmico, mas não é medida aplicável a todos os casos
 - A indicação de antibioticoterapia com aminoglicosídeo e betalactâmico em associação com corticoterapia sistêmica é sempre a melhor conduta
- 33) Paciente de 85 anos, masculino, comparece à unidade de pronto atendimento referindo dor abdominal de forte intensidade com início há 6 horas mais intensa em fossa ilíaca esquerda, associada à febre, constipação intestinal e sinais de irritação peritoneal ao exame físico. Inicialmente você toma as condutas para o agravo mais provável nesse caso. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico.**
- Apendicite aguda
 - Doença diverticular dos cólons
 - Trombose de mesentérica
 - Neoplasia de cólon
 - Doença inflamatória intestinal
- 34) Paciente de 69 anos, hipertenso e deu entrada em pronto atendimento com quadro de dispneia progressiva apresentando no momento taquipneia, dispneia e esforço respiratório. PA: 200/115 mmHg FC 109 bpm FR 31 irpm SatO2: 88% em ar ambiente, ausculta pulmonar com crepitações até terço médio bilateralmente. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico e conduta terapêutica.**
- Tromboembolismo pulmonar - nitroprussiato de sódio
 - Edema agudo de pulmão hipertensivo - furosemida
 - Infarto agudo do miocárdio - morfina
 - Edema agudo de pulmão hipertensivo - anlodipino
 - Tromboembolismo pulmonar – metoprolol
- 35) Paciente 68 anos em seguimento com histórico de cardiomiopatia isquêmica há cinco anos com redução de fração de ejeção, comparece em consulta com piora de padrão de dispneia, com necessidade de auxílio para atividades instrumentais básicas como tomar banho, além de dispneia paroxística noturna, ortopneia e edema de membros inferiores. Em relação às etiologias possíveis para o quadro atual e a conduta de propedêutica adequada para confirmá-las, assinale a alternativa incorreta.**
- Anemia - hemograma
 - Hipotiroidismo - TSH
 - Infecção de trato urinário - urocultura
 - Isquemia miocárdica – troponina I
 - Pneumonia comunitária – proteína C reativa
- 36) Paciente 46 anos comparece em consulta de rotina para investigar estado geral de saúde. Refere que está preocupado com quadro geral, pois na família seu pai e tios são hipertensos. No consultório você percebe PA 168/89 mmHg e solicita um MAPA. Você identifica que o paciente está hipertenso estágio I a partir do resultado. Em relação às opções terapêuticas, assinale a alternativa correta.**
- Dieta hipossódica, atividade física e hidralazina
 - Anlodipino
 - Dieta hipossódica e anlodipino
 - Dieta hipossódica, atividade física e hidroclorotiazida
 - Metoprolol
- 37) Paciente de 58 anos comparece ao serviço após ter apresentado quadro de palpitação e dor torácica de início súbito. Refere ter tido episódios semelhantes anteriormente. Ao solicitar um eletrocardiograma você encontra um padrão de taquicardia regular com complexo QRS estreito sem visualização de ondas P. Assinale a alternativa correta.**
- Trata-se de uma taquicardia atrial e conduta farmacológica é amiodarona
 - Trata-se de uma taquicardia ventricular e a conduta farmacológica é metoprolol
 - Trata-se de uma taquicardia supraventricular paroxística e a conduta é metoprolol
 - Trata-se de uma fibrilação atrial e a conduta é adenosina
 - Trata-se de uma taquicardia supraventricular paroxística e a conduta é adenosina
- 38) Paciente do sexo masculino com 26 anos em terapia de manutenção para asma persistente com uso de beclometasona 400mcg/dia comparece em reavaliação ambulatorial com queixa aumento de tosse com episódios isolados de sibilância, ocorrendo uma vez a cada duas semanas, sem despertares noturnos diários e necessidade esporádica de medicação de resgate. Em relação às opções terapêuticas a serem instaladas nesse caso assinale a alternativa correta.**
- Manter a dose de corticoide inalatório
 - Associar beta-2 agonista de longa duração e resgates com beta-2 agonista de curta duração se necessário
 - Aumentar a dose de corticoide inalatório
 - Realizar a troca por corticoide inalatório de maior potência em associação com beta-2 agonista de longa duração e medicações de resgate se necessário
 - Associar antileucotrienos
- 39) A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença com evolução progressiva que em determinado momento pode necessitar de oxigênio terapia domiciliar. Assinale a alternativa correta que contenha um critério para início dessa modalidade terapêutica.**
- Número de exacerbações
 - SpO2 < 98%
 - Aumento do hematócrito
 - Dispneia aos médios esforços
 - PaO2 < 65 mmHg

- 40) Em relação às hepatites virais, para a hepatite B é possível se determinar marcadores de contato, cura e imunização. Em relação a marcadores de contato, assinale a alternativa correta que indique um marcador de contato.
- Anti HCV
 - Anti HBs
 - HbS Ag
 - Anti HBe
 - HBeAg
- 41) Paciente do sexo feminino, com 40 anos, etilista, comparece em consulta apresentando astenia e fadiga associada à aumento de volume abdominal, icterícia discreta e episódio de epistaxe isolado ontem. Durante investigação o painel sorológico evidenciou AntiHCV reagente, e HBeAg não reagente. Em relação à conduta imediata para esse caso, assinale a alternativa correta.
- Solicitar PCR para RNA do vírus C
 - Iniciar Sofobusvir e daclatasvir
 - Iniciar Tenofovir
 - Avaliar fibrose hepática
 - Iniciar daclatasvir e ribavirina
- 42) Paciente de 69 anos, sexo masculino, comparece em unidade hospitalar com queixa de ausência de diurese há 24 horas. Durante investigação paciente refere diagnóstico de neoplasia de próstata gleason 8 com tratamento conservador. Os exames laboratoriais indicaram creatinina 4mg/dL (basal 1,2 mg/dL) e ureia de 59 mg/dL. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico.
- Injúria renal aguda de padrão pré-renal
 - Doença renal crônica estágio III
 - Injúria renal aguda de padrão intrínseco
 - Injúria renal aguda de padrão pós-renal
 - Doença renal crônica com necessidade de diálise
- 43) Paciente hipertenso comparece referindo astenia, prostração, confusão mental e edema de membros inferiores. Durante os procedimentos diagnósticos você encontrou um quadro de anemia microcítica e hipocrômica, associada à clearance estimado de creatinina de 28 ml/min/1.73 m². Em relação ao caso assinale a alternativa correta.
- Trata-se de uma DRC estágio 2 e a conduta é seguimento com nefrologia exclusivamente
 - Trata-se de uma DRC estágio 4 e a conduta é considerar terapia renal substitutiva
 - Trata-se de uma DRC estágio 3 a conduta é controle de complicações e comorbidades
 - Trata-se de uma DCR estágio 4 e a conduta é seguimento exclusivo com UBS
 - Trata-se de uma DRC estágio 3 e a conduta é preparação para terapia renal substitutiva
- 44) Paciente do sexo feminino de 48 anos, obesa, comparece em consulta referindo preocupação com próprio estado de saúde pois apresenta história familiar de hipertensão e diabetes. Durante avaliação inicial você solicita exame de rastreio para diabetes e a glicemia de jejum encontrada é 129 mg/dL. Assinale a alternativa que contenha a conduta propedêutica correta.
- Iniciar metformina 500 mg ao dia
 - Solicitar hemoglobina glicada e se o resultado for inferior à 5,5% iniciar metformina 500mg ao dia
 - Solicitar glicemia capilar e se o resultado vier abaixo de 200 mg/dL iniciar insulinoterapia
 - Solicitar glicemia de jejum e se o resultado vier maior ou igual a 126 mg/dL recomendar dieta, atividade física e hipoglicemiante oral
 - Iniciar sulfonilureia
- 45) Paciente do sexo feminino, com 48 anos, comparece ao consultório referindo que sente nodulação em região cervical e está preocupada com própria saúde. Refere ainda que tem apresentado aumento de peso, sonolência excessiva, alterações de cabelos e unhas. Você solicita o TSH e o resultado é 6,8 mU/dL. Em relação ao manejo, assinale a alternativa correta.
- Seguimento clínico e reavaliação em seis meses
 - Iniciar levotiroxina
 - Avaliação de anticorpos tireoideanos e T4 livre
 - Solicitar ultrassonografia de tireoide
 - Solicitar novo TSH
- 46) Paciente com 45 anos, trabalhador rural, refere dor lombar de forte intensidade, com piora ao esforço físico irradiando para membros inferiores e encerrando-se à altura do joelho. Refere ainda presença de assimetria em relação ao comprimento de membros inferiores e dor intensa à adução e abdução de membro inferior e estresse de articulação coxofemural ao exame físico. Em relação aos diagnósticos possíveis assinale a alternativa correta.
- Ciatalgia verdadeira
 - Artrose de coluna
 - Bursite trocantérica
 - Radiculopatia compressiva
 - Espondilite anquilosante
- 47) Paciente do sexo feminino, 26 anos, comparece referindo aumento de volume de região parotídea com associação à xerostomia, xerofthalmia e hiperemia conjuntival. Refere ainda dor articular de padrão inflamatório e dor difusa com pontos gatilho. Nega sintomas geniturinários. Em relação às hipóteses diagnósticas, assinale a alternativa correta.
- Doença de Wegner
 - Artrite psoriásica
 - Lupus
 - Síndrome de Sjogren
 - Doença de Beçet

- 48) **Paciente de 37 anos do sexo feminino apresentou-se no consultório referindo há cerca de três dias tem apresentado oligúria, algúria e tenesmo fazendo uso de medicações caseiras sem melhora. Assinale a alternativa correta quanto à conduta para esse caso.**
- Iniciar Sulfametoxazol/trimetropina e solicitar urina I
 - Iniciar cefalexina e solicitar urocultura
 - Iniciar ciprofloxacino
 - Iniciar Sulfametoxazol/trimetropina
 - Nitrofurantoína e solicitar urocultura
- 49) **Paciente de 70 anos deu entrada em pronto atendimento com quadro de confusão mental e rebaixamento do nível de consciência. Acompanhante refere que há 07 dias paciente tem apresentado febre, hiporexia, tosse produtiva e dispneia, tendo ainda ficado anúrico nas últimas 24h. Ao exame físico mal estado geral, confuso, anictérico, acianótico, febril PA; 86/54mmHg FC 128 bpm FR 31 irpm sem demais alterações significativas no exame segmentar. Em relação à melhor conduta para esse caso assinale a alternativa correta.**
- Iniciar expansão volêmica, solicitar culturas e iniciar amicacina
 - Solicitar culturas e inicar ceftazidima
 - Inicar expansão volêmica, inicar corticoterapia e ampicilina + sulbactam
 - Inicar expansão volêmica, solicitar culturas e inicar ceftriaxona
 - Solicitar culturas e inicar vancomicina
- 50) **Paciente de 64 anos, tabagista, comparece no consultório com queixa de astenia e prostração, refere ainda períodos de constipação intestinal com episódios alternados de diarreia. Ao exame físico você não encontra grandes alterações percebe na usa abordagem inicial quadro de anemia microcítica e hipocrômica. Em relação à conduta imediata assinale alternativa correta.**
- Solicitar exame de sangue oculto nas fezes
 - Solicitar endoscopia digestiva alta
 - Solicitar colonoscopia
 - Solicitar tomografia de abdomen
 - Iniciar reposição de ferro
- 51) **Paciente de 19 anos comparece no consultório portando resultados de teste rápido para infecções sexualmente transmissíveis. O teste rápido para sífilis veio positivo e você solicita o VDRL. Em relação à conduta nesse caso assinale alternativa correta.**
- Checar tratamento prévio para sífilis e solicitar ainda FTAbS
 - Iniciar penicilina benzatina 1.200.000 UI/IM em cada nádega semanalmente por 3 semanas para qualquer título de VDRL
 - Considerar cicatriz sorológica se VDRL for menor do que 1:64
 - Iniciar penicilina benzatina 2.400.000 UI/IM se o VDRL for maior do que 1:16
 - Iniciar penicilina cristalina
- 52) **Em relação ao choque séptico refratário à volume assinala a alternativa correta quanto às opções de sequência terapêutica progressiva de modo genérico após expansão volêmica sem resposta.**
- Vasopressina 0,04 UI/min e Hidrocortisona 100mg/ml
 - Soro fisiológico 0,9% 30ml/kg
 - Noradrenalina 3mcg/kg/min e Dobutamina 20mcg/kg/min
 - Noradrenalina 3 mcg/kg/min, Dobutamina 20mcg/kg/min e Hidrocortisona 100mg/ml
 - Noradrenalina 3 mcg/kg/min, Vasopressina 0,04 UI/min e Hidrocortisona 100mg/ml
- 53) **Paciente de 28 anos comparece em consulta referindo dor torácica de forte intensidade, associada à taquicardia palpitações. O eletrocardiograma evidenciou taquicardia sinusal com complexo QRS estreito, encurtamento do intervalo PR e supra desnivelamento de seguimento ST, enquanto sua investigação enzimática não mostrou elevação de marcadores de necrose miocárdica. Em relação aos diagnósticos possíveis, assinale a alternativa correta.**
- Síndrome de brugada
 - Pericardite
 - Flutter atrial
 - Síndrome Wolff-Parkinson-White
 - Taquicardia supraventricular paroxística
- 54) **Paciente de 29 anos, sexo feminino, em uso de contraceptivo oral combinado comparece em pronto atendimento referindo holocraniana, de forte intensidade, em aperto, associada a náuseas e vômitos, confusão mental com alteração do nível de consciência. Nega crises convulsivas prévias, adocimentos anteriores semelhantes ou escotomas. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico provável.**
- Migrânea
 - Cefaléia em salvas
 - Trombose de seio venoso
 - Neuralgia do trigêmeo
 - Enxaqueca com áura
- 55) **O processo de tomada de decisão clínica perpassa pelo domínio de ferramentas de medicina baseada em evidências. Em relação a isso assinale a alternativa correta quanto ao indicador mais expressivo para a tomada de decisão clínica em relação à uma intervenção.**
- Prevalência
 - Incidência
 - Razão de chances
 - Especificidade
 - Número necessário para tratar

56) Paciente do sexo feminino, 56 anos, com diabetes melitus tipo 2 em seguimento há 8 anos com boa adesão à terapia não farmacológica e uso regular de metformina e sulfonilureia há 4 anos comparece para consulta de controle e possui hemoglobina glicada de 11%. Em relação à proposta terapêutica, assinale a alternativa correta.

- a) Aumentar dose de hipoglicemiante oral
- b) Iniciar insulinoterapia com NPH 0,3 UI/kg em dose única à noite
- c) Iniciar insulinoterapia com regular 0,3 UI/kg em dose única à noite
- d) Manter terapêutica por bom alvo terapêutico
- e) Retirar metformina e associar pioglitazona

57) Paciente de 68 anos deu entrada em unidade de pronto atendimento apresentando quadro de confusão mental, sonolência e vertigem. Observou-se que o paciente se apresenta hipocorado, com turgor cutâneo reduzido, mucosas desidratadas. Acompanhante refere que o paciente é diabético e a cerca de 15 dias não tem utilizado medicação de forma adequada. Você afere glicemia capilar com resultado de 415 mg/dL. Em relação ao quadro clínico assinale a alternativa correta quanto à conduta.

- a) Iniciar infusão de insulina regular em bomba com 1UI/Kg
- b) Iniciar insulina regular subcutânea 10 UI em dose única
- c) Iniciar insulina NPH subcutânea 10 UI em dose única
- d) Iniciar expansão volêmica com 1 000ml de soro fisiológico
- e) Iniciar infusão de insulina NPH em bomba com 1UI/Kg

Leia o caso a seguir para responder as questões 58 e 59.

Paciente de 26 anos portadora de lúpus comparece no consultório para otimização de imunossupressor.

58) Em relação aos cuidados de imunização, assinale a alternativa correta.

- a) Deve-se orientar a não imunização contra influenza nas épocas de campanha
- b) O status vacinal não tem importância para o seguimento da paciente
- c) A vacina antitetânica não faz parte do programa de imunizações à que a paciente têm direito
- d) Deve-se orientar a vacinação antipneumocócica
- e) Deve-se contraindicar vacinação contra varicela

59) Em relação aos cuidados relacionados à gestação, assinale a alternativa correta.

- a) Orientação de planejamento familiar e contraceptivo não faz parte das orientações necessárias
- b) Nenhuma terapia imunossupressora pode ser mantida durante a gestação
- c) Orientação de planejamento familiar e contraceptivo faz parte das orientações necessárias
- d) Toda terapia imunossupressora pode ser mantida durante a gestação
- e) A paciente não irá poder engravidar em tempo algum após início de imunossupressores

60) Paciente de 37 anos, do sexo masculino, comparece referindo diarreia volumosa, associada à perda de sangue e muco, emagrecimento e lesão de borda anal. Ao investigar o quadro assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico mais provável e o resultado esperado da propeidêutica.

- a) Doença de Chron e colonoscopia com lesões saltatórias, acometendo toda extensão da parede colônica
- b) Síndrome do colo irritável e colonoscopia com lesões contínuas desde a borda anal, sangrantes acometendo toda a extensão da parede colônica
- c) Retocolite ulcerativa e com lesões saltatórias, acometendo toda extensão da parede colônica
- d) Doença de Chron e colonoscopia com lesões contínuas desde a borda anal, sangrantes acometendo toda a extensão da parede colônica
- e) Retocolite ulcerativa e colonoscopia com lesões contínuas desde a borda anal, sangrantes acometendo apenas a camada mais superficial da parede colônica