



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

004. PROVA OBJETIVA

MÉDICO (ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA)

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

POLÍTICA DE SAÚDE

- 01.** A clínica ampliada é uma das diretrizes que a Política Nacional de Humanização propõe para qualificar o modo de se fazer saúde. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma das características da clínica ampliada.
- (A) Proporcionar o acesso facilitado aos serviços de especialidades para que cada usuário possa autonomamente ser assistido conforme seus sintomas, de maneira que se reduza o tempo de espera.
 - (B) Integrar a equipe de trabalhadores da saúde de diferentes áreas na busca de cuidado e tratamento, de acordo com cada caso, com a criação de vínculo com o usuário.
 - (C) Valorizar a especialidade médica como forma de propiciar um atalho entre o início dos sintomas e o diagnóstico, e entre o diagnóstico e o programa terapêutico multidisciplinar.
 - (D) Propiciar um treinamento das equipes de saúde para que sejam capazes de selecionar apenas as queixas dos usuários que têm relação direta com o diagnóstico provável e o tratamento.
 - (E) Simplificar o cuidado em saúde, sendo de fácil execução e baixa complexidade, com procedimentos simples, de forma que a relação custo-benefício é extremamente benéfica.
- 02.** Assinale a alternativa correta sobre as notificações compulsórias de doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (A) Como se tratam de notificações de interesse público, o sigilo das informações pessoais é facultativo.
 - (B) Apenas os eventos que estejam explicitamente na lista publicada pelo Ministério da Saúde devem ser notificados.
 - (C) Devem ser sempre feitas por todos os serviços de saúde, sejam de emergência, de especialidades ou da Atenção Primária da Saúde (APS), assim que o diagnóstico for confirmado.
 - (D) Devem ser realizadas pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente imediatamente.
 - (E) Podem ser realizadas à autoridade de saúde por qualquer cidadão que tenha conhecimento da doença, agravo ou evento de saúde pública.
- 03.** Uma das diretrizes da APS é o estímulo à participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa correta sobre essa temática.
- (A) Trata-se de uma forma de ampliar a autonomia do usuário e a sua capacidade na construção do cuidado à sua saúde e coletividades do território.
 - (B) Trata-se de uma forma de educar a população para que não faça uso de medicamentos sem prescrição médica.
 - (C) Tem o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos advindos de alguns de seus hábitos.
 - (D) É uma forma da população compreender os problemas do SUS e ter mais tolerância com as suas falhas.
 - (E) A democratização do SUS é importante, pois a gestão e as responsabilidades são compartilhadas com o usuário.
- 04.** A vacina que deve ser administrada anualmente para determinadas faixas etárias é a vacina
- (A) contra a poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – VIP.
 - (B) contra a febre amarela.
 - (C) contra sarampo, caxumba, rubéola.
 - (D) influenza (fracionada, inativada).
 - (E) pneumocócica 10-valente (conjugada).
- 05.** Um entregador de mercadorias utiliza sua bicicleta para fazer as entregas. Sofre um acidente no trânsito com fratura de perna quando levava uma pizza para um cliente. Assinale a alternativa correta.
- (A) Esse caso não se configura como acidente de trabalho, pois trata-se de um trabalhador do mercado informal.
 - (B) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho se o trabalhador ficar com sequela.
 - (C) Trata-se de um acidente de trabalho e deve ser notificado ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
 - (D) Esse caso não pode ser caracterizado como acidente de trabalho, porque eventos no trânsito não são de responsabilidade do empregador.
 - (E) O acidente de trânsito não é mais considerado relacionado ao trabalho.

06. Um estudo realizado em 1961 comparou crianças com malformações com crianças sem essas malformações e descobriu-se que das 46 mulheres que tiveram bebês afetados, 41 haviam tomado talidomida entre a quarta e a nona semanas de gestação, enquanto nenhuma das 300 mães que tiveram crianças não afetadas havia ingerido o medicamento.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de um estudo caso-controle, apropriado para investigação de causa na situação apresentada.
- (B) Trata-se de um estudo transversal não utilizado para investigar causas de determinada anomalia.
- (C) O estudo descrito não tem valor, pois envolveu amostras muito reduzidas de crianças com e sem anomalias.
- (D) O estudo indicado para esse tipo de problema é o de Coorte, capaz de ser mais conclusivo.
- (E) Os pesquisadores deveriam ter optado por um estudo observacional.

07. A proporção de pessoas com obesidade e excesso de peso continua aumentando no Brasil, tendência verificada desde 2006. De acordo com o inquérito telefônico para vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis (Vigitel), 2020, 57,5% da população adulta no Brasil está com excesso de peso e 21,5% está com obesidade. A vigilância alimentar e nutricional como um componente da vigilância em saúde possibilita a descrição contínua e a predição de tendências da alimentação e nutrição da população e seus fatores determinantes.

Assinale a alternativa correta sobre essa temática.

- (A) As pessoas em situação de rua por motivos óbvios não são população de ações de vigilância alimentar e nutricional, pois a prioridade nesse caso é a alimentação de qualquer espécie.
- (B) A estratégia mais importante da vigilância alimentar e nutricional é a realização de palestras nos serviços de saúde que informem sobre os malefícios do alimento ultraprocessado.
- (C) Um dos grandes obstáculos atuais para que as equipes da Atenção Primária da Saúde (APS) atuem adequadamente em ações de vigilância alimentar e nutricional é a ausência de nutricionistas.
- (D) As equipes da APS devem conhecer o que é produzido no seu território e a relação das família e da comunidade com esta produção para analisar os determinantes da situação alimentar e nutricional.
- (E) O período mais crítico para o desenvolvimento da obesidade está na vida adulta, particularmente após os 60 anos de idade, sendo prioritário que se promova o acesso dessa população ao Programa Academia da Saúde.

08. Assinale a alternativa correta sobre acidentes com aranhas.

- (A) As aranhas não fazem parte das preocupações da vigilância em saúde, pois mesmo as venenosas não causam quadros clínicos graves.
- (B) As aranhas viúvas-negras são as mais agressivas e são encontradas próximas ou dentro das casas, em ambientes sombreados.
- (C) O diagnóstico de uma picada de aranha é eminentemente clínico-epidemiológico.
- (D) O tratamento soroterápico é o preferencial contra os efeitos de picadas de todas as aranhas.
- (E) Todos os hospitais públicos e privados dispõem de recursos para a soroterapia contra os efeitos de picadas das aranhas.

09. Em um certo bairro periférico de uma cidade de porte médio, um dos serviços de emergência atende várias crianças e adolescentes com politraumatismo por queda de laje. A equipe de saúde da família toma conhecimento de que essa laje, de obra inacabada, estivera inacessível por um certo tempo, mas agora servia de local de lazer e ponto de encontro.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Como se trata de um problema de saúde pública, a equipe de saúde da família deve visitar os domicílios alertando para os perigos de acidentes.
- (B) A secretaria de saúde deve redimensionar sua capacidade de prestar assistência a pacientes politraumatizados.
- (C) A secretaria de saúde deve chamar os pais, alertá-los sobre o perigo e responsabilizá-los pelos acidentes.
- (D) A regulação de como devem ocorrer as obras não é assunto da secretaria de saúde, que deve só manter a assistência aos necessitados.
- (E) Deve-se promover uma ação integrada com outros órgãos da prefeitura para que jovens tenham opções de lazer, e o acesso à obra deve ser vetado.

10. Assinale a alternativa que apresenta as vacinas que devem ser dadas ao nascer, segundo o Calendário Nacional de Vacinação.

- (A) Poliomielite 1,2,3 e contra hepatite A.
- (B) BCG e contra hepatite B.
- (C) Contra sarampo, caxumba e rubéola.
- (D) Contra hepatite B e febre amarela.
- (E) BCG e pneumocócica 10 valente.

11. Assinale a alternativa correta sobre a seguridade social, a saúde e a previdência social.

- (A) A Constituição Federal define o seu financiamento por recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de determinadas contribuições sociais.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade e é garantida apenas para a população carente.
- (C) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, mediante contrato de direito privado, que é mais ágil, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (D) A previdência social é organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e oferece proteção a todas as gestantes do país por meio do salário-maternidade.
- (E) O financiamento da seguridade social conta com as contribuições do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, incidindo contribuição sobre aposentadoria pelo RGPS.

12. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) lançou virtualmente a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que será realizada de 2 a 5 de julho de 2023.

Assinale a alternativa correta sobre as conferências nacionais de saúde.

- (A) Devem ocorrer a cada 2 anos.
- (B) São espaços democráticos de mobilização social.
- (C) São eventos fechados apenas aos delegados.
- (D) Têm obrigatoriamente a participação de representantes do legislativo.
- (E) Constituem-se em instâncias de apoio ao Ministério da Saúde.

13. Chuvas fortes deixam centenas de pessoas desabrigadas em uma cidade. Na tentativa de socorrer as pessoas, um bombeiro militar morre afogado, um motorista de ônibus sofre uma fratura ao tentar sair do veículo que dirigia para se salvar das águas e uma moradora apresenta quadro compatível com leptospirose 7 dias depois de ter tido contato com as águas por várias horas.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Como os agravos todos estão relacionados a fenômenos naturais, nenhum deles deve ser notificado ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- (B) Os 3 casos devem ser notificados ao SINAN, o óbito do bombeiro e a fratura do motorista, como acidentes de trabalho, e a leptospirose da moradora.
- (C) A leptospirose da moradora deve ser imediatamente notificada no SINAN, assim como a fratura do motorista de ônibus; mas o óbito do bombeiro deve ser notificado apenas em registro de acidentes com militares.
- (D) A leptospirose da moradora deve ser notificada se confirmado o diagnóstico, a fratura e morte, respectivamente, do motorista e do bombeiro, como acidentes de trabalho; todos no SINAN.
- (E) Sendo os agravos decorrentes de fenômenos imprevisíveis, apenas a leptospirose da moradora deve ser notificada ao SINAN pela previsibilidade de sua ocorrência em tal situação.

14. Assinale a alternativa correta sobre a Rede de Atenção à Saúde (RAS).

- (A) O objetivo da RAS é valorizar o conceito de emergência para que haja agilidade na prestação de ações e serviços do SUS.
- (B) Os arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas das RAS, não são sustentáveis financeiramente.
- (C) A RAS foi instituída para superar a fragmentação das ações e dos serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado.
- (D) A RAS, ao excluir o setor privado da prestação de serviços, valoriza o componente público do SUS.
- (E) Embora seja mais custoso financeiramente, a RAS oferece recursos importantes para garantir a universalidade da atenção à saúde.

15. A Portaria MS nº 2.436/2017 prevê o Gerente de Atenção Básica (Gerente de AB). Assinale a alternativa correta sobre esse Gerente de AB.

- (A) Deve ser necessariamente médico ou enfermeiro.
- (B) Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) devem contar com um Gerente de AB.
- (C) Deve contribuir para o aprimoramento e a qualificação do processo de trabalho nas UBS.
- (D) É obrigatório que haja em todas as RAS.
- (E) Tem o papel de organizar as equipes das UBS e ao mesmo tempo ser retaguarda técnica às equipes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 16.** Adolescente de 16 anos de idade, previamente hígido, apresenta febre de 38 graus há um dia, com dor e edema no tornozelo direito e recusa em apoiar este membro. No ultrassom apresenta efusão articular e, após punção da articulação, há a saída de líquido francamente purulento. Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada.
- (A) Manter o paciente internado enquanto os resultados de GRAM e cultura não ficam disponíveis, e iniciar antibioticoterapia por via oral.
 - (B) Solicitar GRAM e cultura do líquido colhido e levar o paciente para o centro cirúrgico para limpeza da articulação.
 - (C) No próprio pronto-socorro(PS) proceder à lavagem da articulação com 02 litros de SF 0,9%.
 - (D) Solicitar uma RM para avaliar o grau de lesão articular para planejar a cirurgia.
 - (E) Iniciar antibiótico por via oral e reavaliar o paciente após 48 horas.
- 17.** O tumor de células gigantes tem como característica:
- (A) ser uma lesão solitária.
 - (B) ser um tumor maligno.
 - (C) ser frequente em pacientes pediátricos.
 - (D) ser localizado na diáfise de ossos longos.
 - (E) ser indolor.
- 18.** Na classificação AO das fraturas da região toraco-lombar, o tipo B2 representa qual tipo de lesão? Qual o exame a ser solicitado para avaliar esta lesão além do raio-x?
- (A) Lesão ligamentar posterior; solicitar uma RM.
 - (B) Lesão tipo impactação; solicitar uma RM.
 - (C) Lesão tipo burst; solicitar uma cintilografia óssea com Tecnécio.
 - (D) Lesão óssea posterior; solicitar uma TC.
 - (E) Lesão tipo split; solicitar uma TC.
- 19.** Sobre a síndrome do espaço quadrangular do ombro, assinale a alternativa correta.
- (A) Afeta com maior frequência pacientes idosos.
 - (B) Nesta síndrome, há a compressão do nervo supra escapular.
 - (C) O espaço quadrangular é delimitado, em parte, pelos músculos redondo maior e menor.
 - (D) O padrão ouro para o diagnóstico é a ENMG.
 - (E) Como os pacientes normalmente acometidos por esta patologia têm baixa demanda funcional, o tratamento é conservador.
- 20.** Paciente com diagnóstico de tuberculose pulmonar apresenta dor no tornozelo esquerdo há 40 dias. Após realização de exames de imagem, que se mostram inconclusivos, opta-se por uma biópsia aberta da região, no entanto, o paciente ainda não iniciou o uso da medicação para tratar a doença. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta neste caso.
- (A) Realizar a cirurgia mesmo sem cobertura da medicação.
 - (B) Realizar a cirurgia, iniciando o uso da medicação prescrita no momento da indução da anestesia.
 - (C) Não realizar a cirurgia pelo risco de amputação do tornozelo.
 - (D) Aguardar a resolução da parte pulmonar antes de realizar a cirurgia.
 - (E) Iniciar a antibioticoterapia efetiva antes da cirurgia para diminuir a probabilidade de disseminação da doença.
- 21.** Assinale a alternativa que apresenta a orientação correta a ser dada a uma mãe com o segundo filho de 03 meses de idade, cujo irmão, hoje com 04 anos de idade, apresentou displasia de desenvolvimento do quadril.
- (A) Essa criança deve iniciar imediatamente o uso do suspensório de Pavlik.
 - (B) Essa criança deve realizar uma cintilografia como exame de triagem para DDQ.
 - (C) Essa criança deve ser examinada aos 06 meses para triagem de DDQ.
 - (D) Essa criança deve realizar um raio-x da bacia em AP como triagem para DDQ.
 - (E) Essa criança deve realizar um ultrassom como exame de triagem para DDQ.
- 22.** Em relação ao cordoma, assinale a alternativa correta.
- (A) Acomete com grande frequência a região do sacro-cóccix.
 - (B) É um tumor benigno agressivo.
 - (C) Mais frequentes em indivíduos do sexo masculino, entre a terceira e quarta décadas de vida.
 - (D) O tratamento é iniciado com quimioterapia e radioterapia.
 - (E) Quando localizados na diáfise da tíbia, o tratamento é quimioterapia após amputação.
- 23.** Qual é a inervação do músculo adutor do polegar?
- (A) Nervo radial.
 - (B) Nervo ulnar.
 - (C) Nervo mediano.
 - (D) Nervo interósseo posterior.
 - (E) Nervo interósseo anterior.

24. Durante o tratamento cirúrgico de uma fratura do colo do fêmur, na qual optou-se pela redução incruenta e fixação interna com parafusos, qual o alinhamento correto no perfil e quantos parafusos devem ser utilizados e em qual configuração?
- (A) 180 graus e três parafusos no formato de triângulo invertido.
 - (B) 160 graus e três parafusos no formato de triângulo invertido.
 - (C) 150 graus e três parafusos paralelos.
 - (D) 120 graus e quatro parafusos em formato de retângulo.
 - (E) 160 graus e quatro parafusos em formato de retângulo.
25. Paciente adulto previamente hígido, apresenta uma fratura fechada da diáfise do úmero direito. A fratura *per se* não apresenta indicação de cirurgia, porém o paciente possui um déficit parcial do nervo radial no exame físico. Assinale a alternativa que apresenta a opção correta para esse caso.
- (A) Explorar cirurgicamente o nervo imediatamente e realizar a fixação da fratura com placa e parafusos.
 - (B) Solicitar uma ENMG e uma cintilografia com Tecnécio.
 - (C) Explorar o nervo imediatamente, porém não há necessidade de fixar a fratura.
 - (D) Com a fratura consolidada, se após 03 a 04 meses da ocorrência da mesma não houver indício de retorno da função do nervo, realizar a exploração cirúrgica.
 - (E) Solicitar uma RM do braço direito para guiar a exploração, inevitável, do nervo radial.
26. Uma criança de 07 anos de idade apresenta uma fratura do tipo 2 da classificação de Delbet do quadril direito. Qual a localização desta fratura e por que possui uma alta chance de osteonecrose?
- (A) Transcervical e possui alta chance de osteonecrose por ser intra-articular.
 - (B) Basocervical e possui alta chance de osteonecrose por ser intra-articular.
 - (C) Transepifisária e possui alta chance de osteonecrose por ser extra-articular.
 - (D) Cervicotrocantérica e possui alta chance de osteonecrose por ser extra-articular.
 - (E) Intertrocantérica e possui alta chance de osteonecrose por ser extra-articular.
27. Adolescente de 13 anos, do sexo masculino e sem patologias prévias, vem a consulta para avaliação de deformidade na região da coluna torácica. No raio-x em ortostase apresenta um ângulo de Cobb de 30 graus. Assinale alternativa que apresenta o tratamento correto a ser instituído.
- (A) Esperar o paciente terminar de crescer para avaliar o melhor tratamento.
 - (B) Orientar a mãe sobre a necessidade de cirurgia.
 - (C) Informar à mãe que esta curva terá resolução espontânea.
 - (D) Avaliar o paciente em 09 meses para julgar a progressão da curva.
 - (E) Iniciar o uso de órtese.
28. Assinale a alternativa que apresenta uma complicação decorrente de uma fratura luxação de Lisfranc em um paciente adulto com indicação de fixação, porém tratada sem cirurgia.
- (A) Osteonecrose da cabeça do 2 metatarsiano.
 - (B) Artrose do joelho.
 - (C) Pé plano e valgo.
 - (D) Artrose do tornozelo.
 - (E) Osteonecrose do navicular (síndrome de Mueller-Weiss).
29. Sobre a contratura de Volkmann, assinale a alternativa correta.
- (A) Ocorre com frequência maior nos membros inferiores.
 - (B) É uma complicação aguda de uma fratura de ossos do antebraço.
 - (C) É o epônimo de uma lesão causada por tumores ósseos malignos localizados na mão.
 - (D) Comumente apresenta-se com o cotovelo em flexão e ao antebraço em pronação.
 - (E) Quando ocorre no joelho, pode apresentar-se como uma deformidade em equino no pé.
30. Durante o exame físico de um paciente com ombro doloroso, este se apresenta com teste de Jobe positivo. Qual a estrutura acometida?
- (A) Tendão (porção intra-articular) da cabeça longa do bíceps.
 - (B) Tendão do músculo supra-espinhal.
 - (C) Articulação acrômio-clavicular.
 - (D) Tendão do músculo redondo maior.
 - (E) Labrum (lábio) da glenóide.

31. Assinale a alternativa que apresenta o exame adequado para avaliar um paciente em estágio inicial da doença de Legg-Perthes.
- (A) Raio-x com contraste.
 - (B) Ultrassom.
 - (C) Cintilografia com o uso de Tecnécio-99m.
 - (D) RM com o uso de contraste com Gadolínio.
 - (E) Tomografia computadorizada de cortes finos.
32. Assinale a alternativa que apresenta uma indicação de tratamento cirúrgico de uma lesão aguda do ligamento cruzado posterior por avulsão com um pequeno fragmento ósseo associado.
- (A) Translação tibial anterior de 22mm.
 - (B) Com o joelho em flexão de 30 graus, frouxidão rotacional de 05 graus.
 - (C) Translação tibial posterior de 17mm.
 - (D) Artrose preexistente à lesão.
 - (E) Paciente portador de DM.
33. Onde se insere o tendão do músculo fibular curto e qual sua função principal?
- (A) Insere-se no 4º metatarso posterior à inserção do fibular terceiro e realiza eversão do pé.
 - (B) Insere-se no 5º metatarso anterior à inserção do fibular terceiro e realiza a flexão dorsal do pé.
 - (C) Insere-se no 5º metatarso posterior à inserção do fibular terceiro e realiza a inversão do pé.
 - (D) Insere-se no 4º metatarso anterior à inserção do fibular terceiro e realiza a flexão plantar do pé.
 - (E) Insere-se no 5º metatarso posterior à inserção do fibular terceiro e realiza a eversão do pé.
34. Paciente adulto jovem e previamente hígido queixa-se de trauma torcional do tornozelo esquerdo há 02 horas. No raio-x, apresenta uma fratura do maléolo lateral tipo Weber B com desvio mínimo. Apresenta dor à palpação do maléolo medial e hematoma nesta localização. Assinale a alternativa que apresenta a condução correta deste caso.
- (A) Esta é uma fratura que deve ser avaliada com TC antes de optar-se entre o tratamento cirúrgico e não cirúrgico.
 - (B) Esta é uma fratura de tratamento com robofoot e carga precoce pois apresenta desvio mínimo no raio-x.
 - (C) Esta é uma fratura de tratamento cirúrgicos e a sindesmose deve ser testada no intra operatório para avaliar sua estabilidade.
 - (D) Esta é uma fratura que deve ser tratada inicialmente com tala gessada, pelo risco de síndrome compartimental que pode ocorrer com o uso de gesso.
 - (E) Esta é uma fratura que deve ser tratada com gesso inguino-maleolar.
35. Assinale a alternativa que apresenta a inervação do músculo iliopsoas.
- (A) Nervo ciático.
 - (B) Nervo femoral e ramos do plexo lombar.
 - (C) Nervo obturatório.
 - (D) Nervo femoral e algumas raízes do nervo obturatório.
 - (E) Nervo tibial.
36. Criança de 12 anos de idade, sem patologias prévias, apresenta uma fratura fechada da diáfise do úmero direito com 25 graus de angulação anterior no raio-x. Não apresenta déficits neurológicos neste membro. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.
- (A) Tratar esta fratura com redução incruenta no centro cirúrgico e aplicação de gesso axilo-palmar.
 - (B) Tratar esta fratura com uma imobilização tipo Pinça de confeito.
 - (C) Tratar esta fratura com tala gessada axilo-palmar.
 - (D) Fixar esta fratura com fios de Kirchner.
 - (E) Fixar esta fratura com placa e parafusos.
37. Menino obeso de 11 anos de idade apresentou dor na região da virilha e no joelho esquerdo há uma hora. Mãe nega trauma e nega doenças prévias. Criança não consegue andar pois refere bastante dor. No raio-x, apresenta uma epifisiólise proximal femoral à esquerda. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento a ser instituído.
- (A) Medicá-la e dar alta com analgésicos e muletas. Deixá-lo sem carga no membro por 07 dias.
 - (B) Internar o paciente com uma tração esquelética enquanto este aguarda cirurgia.
 - (C) Fixar o quadril esquerdo com parafuso canulado e profilaticamente o quadril direito.
 - (D) Aguardar 48 horas e então fixar a lesão com fios de Kirchner.
 - (E) Fixação nas primeiras 24 horas dessa lesão com parafuso canulado percutâneo.
38. No tratamento cirúrgico de uma lesão de tendões flexores na zona 2, nota-se que as polias A1 e A4 estão lesadas. Qual(is) dessas deve ser reparada junto com a laceração do tendão flexor?
- (A) Nenhuma destas deve ser reparada pelo risco de efeito quadriga.
 - (B) Somente a polia A1.
 - (C) Somente a polia A4.
 - (D) Ambas devem ser obrigatoriamente reparadas.
 - (E) As polias devem ser reparadas em um segundo tempo após o reparo do tendão flexor.

- 39.** Nas fraturas supra condilares do úmero em crianças, do tipo em extensão, qual o nervo mais frequentemente lesado?
- (A) Nervo interósseo anterior.
 - (B) Nervo interósseo posterior.
 - (C) Nervo ulnar.
 - (D) Nervo axilar.
 - (E) Nervo supraescapular.
- 40.** Paciente adulto e sem patologias prévias, relata dor e edema no joelho direito há 06 meses, após episódio de entorse. No exame físico, apresenta dor difusa à palpação anterior e teste de “pivot-shift” positivo. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura lesada.
- (A) Menisco medial.
 - (B) Menisco lateral.
 - (C) Ligamento colateral medial.
 - (D) Ligamento cruzado anterior.
 - (E) Ligamento cruzado posterior.

